




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.498







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.498



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.498




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.498


1.6.498


























*C  
Ch  
Cis  
Com  
C  
S*

1. 6. 1988

1 N. 6

Ma: Sachtij:

AI

In vehementib; multis medicamentis utendi 425.

Celi secundus liber ab Hippocrate penè totus desumptus. 15.

Diei die potius quam semel cibi et ex 17.

Concubitus reg. concupiscendus reg. quiescendus. 17.

In secunda ualiditate aduersa praesidia non consumenda. 17.


Paulatim renutriendi 203 - famis definita 79.

1.6.498

XV 7

CELS

111833





1  
6  
1498

A V R E L I I  
C O R N E L I I C E L S I  
D E  
R E M E D I C A  
L I B R I O C T O .

A C C E S S E R E  
In primum eiusdem, HIEREMIAE THRIVERI  
BRACHELII commentarij doctissimi:  
*In reliquos verò septem, BALDVINI RONSSEI  
GANDENSIS, Reipub. Goudanae medici*  
E N A R R A T I O N E S .



L V G D V N I B A T A V O R V M ,  
E X O F F I C I N A P L A N T I N I A N A ,  
A p u d F r a n c i s c u m R a p h e l e n g i u m .  
C L O I O . X C I I .

*N. S.*

*Hippocrati quantum debet Cos insula parua,  
Pergama tantundem docte Galene tibi.  
Sed tamen ambobus quantum sua patria debet,  
Tantum, Corneli, maxima Roma tibi.*



NOBILISSIMIS,  
AMPLISSIMIS, <sup>III</sup>  
PRUDENTISSIMISQVE  
BATAVIÆ ORDINIBVS.



ÆPE ego metmecum cogitare soleo, Viri Amplissimi, quî fiat vt in hac rerum omnium disciplinarumque luce, maximis erroribus tanquam nebulis densissimis antiquissimos auctores offuscatos comperiamus. Et quamquam omnibus in ore esset barbariem quæ multis iam annis in scholis viguisset, atque adeò immanissimas Gotthorum ac Longobardorum, Vandalorumque excursionem malo huic, quod aiunt, fenestram aperuisse, mihi certè id nondum satisfacere potuit; præsertim quando antiquissimi scriptores doctissimo hoc seculo omnibus in manu sint, atque inter reliquos corrupti deprauati que legantur. Altiùs igitur nonnihil huiusce rei causam indagandam

\*

2

dam



dam censui, atque honestum quendam, ne  
dicam subrusticum pudorem, in causa com-  
peri, dum quæ apud graues auctores corruptè  
legimus, amicè interpretari, religioseque de-  
fendere malimus, quàm errati originem per-  
scrutari. Id namque, ut auctor est Plinius li-  
bro Naturalis historiæ quinto, plerumque fal-  
lacissimo experimento deprehenditur, quia di-  
gnitate indagare vera pigeat, ignorantiaë pu-  
dore mentiri non piget, haud alio fidei pro-  
niori lapsu, quàm ubi falsæ rei grauis auctor  
existit. Siquidem quando ea sit quorundam  
insania, ut quod semel animo conceperint,  
mordicus tueri malint ( dummodo grauem  
aliquem auctorem in testimonium afferre  
possint) quàm saniori opinionì cedere; factum  
est ut dum in suam sententiam antiquorum  
scripta torquent, foedissimis nonnunquam  
lituris eosdem aspergant, contaminentque,  
quas temporum spacio, ni propicius aliquis  
intercedat, deus, pro genuinis, germanisque  
recipi contingit. Quod sanè, prò dolor, in  
Celfo nostro usu venisse nimis quàm comper-  
tum habet, qui in eodem aliqua ex parte ver-  
satus est. Siquidem quum iam antè visos ut-  
cunque

IV  
cunque eiusdem libros in manus recepissē,  
ac quòd præ cæteris Hippocratis mentem ex-  
primerent, in eosdem breues enarrationes con-  
scribere mens esset, primùm, & ante omnia  
dum lecta prius attentius relego, atque cum  
Hippocratis sententiis, vt sic loquar, recoquo,  
multa occurrunt quæ ad senis illius Coi limam  
reuocanda erant, quòd mendi opinionem præ  
se ferrent: aut confitendum nobis erat, studio  
quodam in multis ab Hippocrate descivisse  
Celsum. Quod quàm sit verisimile, intelliget  
qui proœmium eiusdem in librum secundum  
De signis & communibus auxiliis legerit: si-  
quidem ibidem ingenuè fatetur, eo præsertim  
libro, sese auctoritate antiquorum virorum, &  
præcipuè Hippocratis, vti. Igitur quum non  
possemus in animum inducere eam esse multis  
locis Celsi genuinam lectionem quæ apud me  
esset, plurimos errores acceptos ferebam ex-  
emplari quod vnicum nobis erat Venetiis in  
officina Pinzana excusum: atque dum aliun-  
de alia accerso, adfertur aliud Haganoæ typis  
Ioannis Secerij cum lima Ioannis Cæsarij:  
quod sicuti ex titulo plurimum lucis allatu-  
rum videbatur, ita parum admodum, aut ni-  
hil



hil contulit : nam præter breues aliquot  
D.Cæsarij annotationes, nihil erat Pinzano  
correctius. Quando igitur hinc nobis con-  
staret, temporum iniuria, mutilum, hiulcum,  
atque deprauatum esse Celsum, bonamque  
illius partem ex Hippocrate, Galeno, Oriba-  
sio, Dioscoride, Ægineta, atque aliis absolu-  
issem, instandum iudico, atque quod antè re-  
ligio erat, locos quos priùs inter legendum  
asteriscis annotaueramus, immutare mens  
erat, atque ad Hippocratis sententiam reuo-  
care. Sed quum arduum hoc opus & ita dif-  
ficile animaduertem, vt alium virum, aliud  
ingenium, aliasque vires deposceret, pedem  
retrahere omnino erat animus, nisi iam antè  
perspectum nobis fuisset, nihii tam esse du-  
rum quod non emolliat, nihil tam arduum  
quod non efficiat, nihil tam abstrusum  
quod non eruat improbus assiduusque la-  
bor. nam vt Galenus tertio De temperamen-  
tis libro, ἔτι δὲ τοῦ κακικοῦ καλῶς εἰρηθεῖν  
δοκεῖ,

Πέτραν κοιλίνην ῥανὶς ὕδατος ἐνδελεχέειν :  
præsertim quando iugis, continuaque Hippo-  
cratis lectio ad Celsi restitutionem satis esse  
possit,

possit, vt omittam Galeni in Hippocratem  
commentarios, qui non parum lucis eidem  
afferre queant. Nam hoc ingenuè fateor, me  
non solum ab Hippocrate, Galeno, Oribasio,  
atque aliis classicis auctoribus vbi res postu-  
labat, integras periodos desumpsisse, sed & à  
neotericis quibusdā: siquidem ē Ioannis Fer-  
nellij libello De arte vacuandi, multa mu-  
tuati sumus, capitibus secūdi libri De sangui-  
nis missione, de deiectione, & de cucurbitulis.  
libro autem quinto vbi simplicium quarum-  
cumque rerum ex quibus medicamenta fiunt  
facultates perscrutatur, plurima ad propo-  
situm nostrū ex Hollerij Stempani De materia  
chirurgica libello decerpimus: Et quod de  
Fernelio, Hollerioque fatemur, de aliis idem  
quoque dictum volumus: siquidem quoties-  
cunque vsus postulabat, non piguit eorundem  
bene scripta pro nostris ascribere. quod prae-  
monendum censuimus, ne quis plagij nos in-  
cuset. Quum igitur totus in hoc sum, vt se-  
cundum Cornelij Celsi De signis & commu-  
nibus auxiliis tandem absoluerem, coeptisque  
vtcunque aspiraret fortuna, me ipso iam quo-  
dammodo robustior effectus, plures longè  
quàm



quàm spes erat locos restituo, atque ita resti-  
tuo, vt sperem me nusquam in Celsum aut  
durum aut iniurium fuisse. Verùm postea-  
quam iam postremam manum operi impo-  
suissem, afferuntur nobis in eundem librum  
commentarij D. Gulielmi Pantini Tiletani,  
quos quando solum nomen Pantini omnibus  
modis absolutissimos, & doctissimos persua-  
sum redderet, animus erat nostras enarratio-  
nes suppressere ( tum quòd certò nobis con-  
staret, illum qua est eruditione, & diligentia,  
nihil intactum, nihil inexcussum relicturum;  
tum quòd puderet nostra cum illius scriptis  
conferre ) nisi aliquot nominis nostri nimis  
quàm studiosi, hortarentur, instarentque ne  
ab incepto desisterem; sed quod in reliquos po-  
steriores sex libros inceperam, tandem absol-  
uerem: nam etsi maximè perspicaci ingenio  
sit Pantinus; esse tamen nonnulla quæ illum  
subterfugiant, aliisque perspicua sint: Siqui-  
dem & ipse Pantinus post D. Doctoris Hiere-  
miæ præceptoris quondam nostri absolutissi-  
mas in primum Celsi De sanitate tuenda li-  
brum, enarrationes, alios superaddidit com-  
mentarios: & vtrisque succedens Iodocus  
Lommius

VI

Lommius Buranus tertios in eundem emisit:  
fore igitur si inceptum prosequar opus, ut non  
minus mihi debeant studiosi, quam aut Hie-  
remia, (debent autem plurimum) aut ipsi  
Pantino. Nam si multa post fusissimas eius-  
dem in secundum librum enarrationes, à me  
sunt enodata, quæ non animaduertit ille,  
aut volens alioqui prætermisit, futura multo  
plura in reliquis sex quos ille obiter tantum  
percurrit, quæ censuram ac limam requirant.  
Ego interim mecum perpendens, quam sit  
domi mihi curta supellex, & quam sit varius,  
quam sit intricatus, neque semper pede stans  
in vno auctor, etiam si amplos satis Pinzani  
exemplaris margines annotationibus, quæ  
brevis commentarii vices supplere poterant,  
iam illeueram, meo me pede metiens operam  
recuso, quum illi eandem semper occinentes  
cantilenam urgent, nolentemque compel-  
lunt, ut coeptum opus semel ad umbilicum  
perducam, neque labores meos studiosis in-  
uideam, & auctorem qui quondam à doctis  
tantum legi poterat, quibusvis iam per me  
planum redditum euulgem. Quibus inter-  
pellationibus, Viri Nobilissimi, ac Patres  
\* \* Amplif-



Amplissimi, coactus quodammodo in publicum iam emitto nostras in posteriores Cornelij Celsi septem libros enarrationes: In primum etenim deinceps aliquid velle addere, aut commentari, quid sit aliud quàm θαλάτῃ ἐν χαράδρῃ ὕδωρ: quando tres in eundem, vt iam diximus, extent doctissimorum virorum amplissimæ enarrationes? Verum quum magna sit hodie ingeniorum varietas, variaque sint hominum iudicia, & qui hodie aliquid in publicum emittunt, omnium subiiciantur censuris, sciens nostra tanta, taliaque non esse quæ per se maleuolorum calumnias subterfugere possint; ex veteri, & à multis vsque seculis vsurpata consuetudine hosce nostros labores sub alterius tutela & patrocinio in publicum emittere statui: & quum mecum reputo quem potissimum deligam; vos, viri Amplissimi, statim occurritis, tum ob amplissimam auctoritatem qua præditi estis, tum ob doctrinam qua plerique vestrum excellitis; tum etiam quòd quasi iure quodam V. A. id debeatur, quum potio rem vitæ meæ partem (elapsis iam quadraginta annis quòd Furnis municipio Flandriæ occidentalis publico stipen-

stipendio medicum agens, magistratus Gou-  
dani literis in Hollandiam accitus sim) hæc  
transegerim, atq. operam meam non tantum  
ciuitati cui seruiio impenderim, verum om-  
nibus, dum res ita postulare, qui me sibi au-  
xiliares manus allaturum putarent, præsens  
præsentis consilio adfuerim. Accipite igitur,  
Viri Amplissimi, exporrecta fronte, beneuo-  
loque animo, A.V. dicatum opus, tanquam  
meæ erga A.V. obseruantia *μνημόσυρον*: quod  
certè seu domi, seu militia agatis, plurimum  
prodesse poterit. Siquidem si domi vitam  
tranquillam, & ab omni molestia securam,  
curisque liberam transigatis, docebit vos  
Celsus noster firmam quo ad fieri potest, con-  
seruare valetudinem: sin ea iam collapsa,  
molestior sit morbus, aut symptoma ali-  
quod, habetis ad manum explicata cuiusuis  
morbi signa, & causas, atque adeò ipsa  
tandem adscripta remedia. Verum si tur-  
bido bello impliciti, aut alio quouis modo  
faucij (quod omen auertat Deus) chirurgi  
exposcatis operam, en vobis Celsum in che-  
rurgicis exercitatissimum, & in ambiguis  
maximè expeditum. Ita vt ex hoc nostro

\*\*

2

Celso



Celso sanitatem integram & conseruare, &  
quouis modo collapsam valetudinem optimè  
resarcire possitis: quam vt firmam, stabi-  
lemque Deus opt. max. diu conseruet, vnice  
mihi in votis est. Gouda ex Museo nostro  
Anno cId. Id. xcii.

A. V.

*addictissimus*

BALD. RONSSEVS.

viii

I. HEVRNIUS  
CLARISSIMO  
MEDICINÆ DOCTORI  
D. BALDVINO RONSSEO  
GOVDANORVM ARCHIATRO,  
AMICO SALVTEM.



OMMENTARIOS tuos ad Celsum legi cum maxima animi voluptate: qui celsiora quadam viridaria medica quam vulgò solet, longeque amœniora, flosculisque vndique picturata facundia, ad vsum reuocas: unde, te auctore, mox celsiores medicos spero, et voveo. Video enim te Latinum hunc Hippocratem ad Gracum, suum parentem, cum maxima studiosorum medicarum rerum utilitate, deduxisse. Cui sane ego tantum tribuo, ut primas ei per totam medicinam deferam, neque Galenum excipio, quod pace maximorum virorum dictum volo. Sit enim Galenus, quod omnes sani fatentur, amœnior ac suauior in dicendo, alliciat blandius in sententiam auditorem: inductionibus, insinuationibus, demonstrationibusque nos ita circumscribat, ut nos sinamus quicquid velit persuaderi. Attamen Hippocrates pressa illa breuitate, oraculisque infallibilibus, tanquam cogentissimis rationibus, cunctos adigit manus dare veritati. Nam usu rationeque doctus, cominus rem aggreditur, et abiectis Samnitum hastis, quibus ad voluptatem magis gladiatores quam ad pugnam utebantur,

\* \*

3

signis



signis tecmeriis, id est, fulgentibus veritatis armis, quibus rem ipsam aperiat, & si pugnandum, quibus mox iugulum petat, in hominū animos grassatur, & volentes nolentes suam in sententiam rapit. Ego, doctissime Ronssee, in ea sententia sum, optimos & significantibus verbis splendentes in quaque arte scriptores legendos esse. qui, etiamsi nitore dicendi ornamenti nihil remediis adferant, certè dignitatem medelis non detrahunt. Fateor, eloquentia non medicos, attamen maiores, in facienda medicina, ut appareant medici, facit. Illud non dissimulabo, ea quæ acutis & grauibz modulata sententiis animo immittimus, animos nostros in sui quasi characterem transferre, ac longè fidelius menti inherere. Viden ut Platonem legentes heroicam quandam amplitudinem hauriant, ac afflatu propè diuino concitentur? qui frequentes Isocratem voluunt, ut picturatam comptamque orationem effingant? qui Demosthenem voluunt, ut tubam quandam classicam animo fingant, ut paulò minùs ad arma profiliant, vulneraque inferre & accipere honestum putent? quid dicam de his qui apud Ciceronem sunt? qualem illi ducunt animi habitum? qui clamores? qui tumultus? qui luctus? quæ deplorationes animis? Si itaque tantum potest auctorum lectio; profectò optimus in quaque arte proponendus erit. Si de medicis quis quærat? Unicus Celsus medicis Latinis præferatur: qui pomæria Romanæ eloquentiæ eò protulit, ut Medicina suauissimo ore eloquentiæ iam sese cunctis cultioribus ingenis meritò commendet. Quàm pressè ubi lubet ille progreditur! quàm luculenter causas morborum enarrat! certè rem planè admirandam præstitit, ut quum muta hæc nata ars sit, minimeque eloquentiæ capax, is tamen tanto splendore eam exornauit, ut non aliunde libentiùs



18  
tius eloquentiae medicae rationem mutueris. Et quanta haec  
portio innumerabilium laudem, quas facundus hic medicus  
promeruit? Velim sane omnes intelligant, ei qui in glo-  
riam literatam surget, & sermonis decore opus esse: quo  
ablegato ac reiecto, non aliter fraudabitur, quam si onera-  
ria naui pacato in mari, remittentibus ventis, renitenti-  
bus ac inhibentibus nautis, fluctuet tantum, neque pro-  
moueat, portus optatos sibi polliceatur. Nec tamen ego  
hoc dico, quod ceteros medicinae scriptores in ordinem re-  
digam, aut suo honore fraudatos velim. absit à me hic  
furor, ut Celsum cunctis praeferam. An ego Dictatorem  
medicinae Hippocratem non suspiciam, & cunctis prae-  
feram? qui eo scripsit animi acumine, ut recte dixerim in  
eo fulgere verborum pressam proprietatem, sententiarum  
concisam subtilitatem, sermonis venerandam antiquita-  
tem, artificij commendabilem dignitatem: cuius tanta fuit  
benignitas, ut nihil sciuerit quod nos nescire voluerit, tan-  
ta autem solertia & sapientia, ut nemo post eum sciue-  
rit, quod ipse ignorauerit. Quem, tanquam summum  
Medicinae praeceptorem publice in hac academia vnicumque,  
interpretor & enarro. Quid dicam Galeum? quem cun-  
ctis panè pretulerim, quo certè nemo mirificas illas na-  
turae opes feliciore penicillo expressit, nemo suauius, nemo  
polydada rerum historia iucundiùs. At hoc dico, Cel-  
sum imitandum, Hippocratis imitorem, quod eleganter  
Hippocrates Latine loquatur. nam, ut verum fatear, eius  
potius latinitatem amplector, quam Medicinae scientiam,  
ubi ab Hippocrate abit. Fatetur ipse se in multis Ascle-  
piadem sequutum esse. Prudentem itaque lectorem po-  
stulo ad Celsum, hoc est, qui Hippocratica à methodicis se-  
cernat.

cernat. Quare meritò tibi, Clariss. Ronssée, gratias debent omnes; qui indigitas ex quibus sedibus hac translata commigrarint in Latinam ditionem. quid ex Æsculapidiū gente enatum, quid aliunde scriptis suis intulerit auctor: quo sanè nihil felicius ad commodam lectionem huius auctoris excogitari potuit. Vale, ac me ama. Ex hoc lyceō Batauiensi Leida. M. D. XCI. Die XVI. Iulij.

Tuus I. Heurnius.

BAL.



BALDVINVS RONSSEVS  
LECTORI.

**P**OSTEA QUAM iam omnino staret  
sententia, candide lector, quæ in Cor-  
nelij Celsi libros De re medica com-  
mentatus essem, in publicum emittere,  
& ἀνέφαλον prorsus videretur opus,  
quòd primum quem De sanitate tuen-  
da conscripsit, intactum reliquisssem, quòd in eun-  
dem extarent D. Hieremiæ, Pantini, & Lom-  
mij Burani commentarij, non videbatur incon-  
sultum, si vnum aliquem prædictorum com-  
mentariorum nostris præfigi curarem enarratio-  
nibus, vt omni ex parte absolutum esset opus. Igi-  
tur quum mecum delibero cuiusnam potissi-  
mum deligam, vicit ea opinio, quæ D. Hiere-  
miæ Thriueri Brachelij quondam præceptoris  
mei doctissimi, & de re medica optimè meriti,  
adscribendas annotationes dictitaret: id quæ eo  
potissimum, quòd (sicuti fuit homo à natura pla-  
nè philosophus) inter reliquos (absit verbo in-  
uidia) magis philosophici sint, atque adeò ex in-  
timis medicinæ arcanis deprompti. Nobis por-  
rò in nostris enarrationibus id studio fuit, vt lo-  
cum loco ex Hippocrate redderemus, atque id  
si non vbique concederetur, saltem ad Græco-  
rum Hippocrate posteriorum censuram reuoca-  
remus. hæc enim vera mihi videbatur com-  
mentandi

\*\*\*

mentandi

mentandi ratio, idque cō potissimū quod dicat se auctoritate antiquissimorum virorum, & præsertim Hippocratis, vti. Quanquam & in id quoque incubuerim, vt si quando obscurior esset lectio, eandem enarrationibus planiorem reddiderim. Tu interim, amice lector, nostris hisce fruire ac vtere laboribus.

IN BALD.



IN BALD. RONSSEI

VI

*Gandensis*

CORNELIVM CELSVM

Epigramma

AD LECTOREM.

**R**ONSSEVS nuper Musis & Apolline dextro  
VENATVM melicè composuit MEDICVM,  
Ad Flacci genium permiscens Utile dulci:  
Nomine quo punctum quamlibet omne tulit.  
At modò dum CELSI scriptis adiungit honorem,  
Et face perplexis dum rutilante præt,  
Maior se, atque adeò CELSO propè celsior ipso,  
Latè conspicuum tollit in astra caput.  
Quæ patria huic? dices. Vel quis nunc degit in oris?  
GANDA dedit luci, GAVDA Batàua tenet.  
Felicem ô patriam, felicem hoc hospite Gaudam!  
Quàm vellem posset dicere LEYDA suum!  
Gymnasij augetet famam ille decusque Batàui,  
Paonia illustrans Orgia voce, libris.

Bon. Vulcanij.

\*\*\*

2

DE

DE C. V.  
BALDVINI RONSSEI  
IN  
CORNELIVM CELSVM  
ENARRATIONIBVS

*Carmen.*

**D**EBES Ronſſeo tantum doctiſſime Celſe,  
Quantum æger medico cuius ab arte valet.  
Hic tibi reſtituit quod longior abſtulit ætas,  
Integer vt poſthac tempora plura feras.  
Mancus enim mutiluſq. diu membra ægra trahebas,  
Huius ope incedis debilitate carens.  
Ergo chæruꝝgis quod confers, quodq. medendi  
Peritis, Ronſſei id ſedula lima tibi.

*Zibrandus Dominicus, legum apud  
Duacenſes profeſſor.*

IN BAL-

DE



IN BALDVINI RONSSEI

NOVOS IN CELSVM

Commentarios.

**E**CQVID apud Latios scriptores doctius extat  
Quam Celsus medica primus in arte dedit?  
Cuius scripta tamen multis obscura videntur,  
Quod crassis mendis illa referta iacent.  
Sed quo cheirurgis placeat, doctis que probetur,  
Ronssei lima cuncta novata vides.  
Qui dedit obscuris lumen, reliquisque nitorem,  
Qui refecat falsum, restituens mutila.  
Vulnera qui veteri putredine fada repurgans  
Abstulit, & mendas, difficilesque locos.  
Quare isthunc emito, curandi vulneris artem  
Qui petis, aut medicus qui cupis esse bonus:  
Atque vide quantos impenderit ille labores  
Celfo illustrando; tum quoque gratus eris.

Henricus Iunius Goudanus.

\*\*\*

3

IN



IN NOVVM CELSVM

D. BALDVINI RONSSEI

*Gandensis Gaudanorum  
archiatri.*

**E**XESTE quotquot invidentiæ sacro  
Caletis igne, iudices  
Amore Græciæ invidi, ite Græculi,  
Exosculamini inuicem,  
Medendi arte qui negatis vspiam  
Vigere, & esse nobilem,  
Quem non vetusta protulere Pergama,  
Coi senis vel insula,  
Athenæ, Amidos, Ægina, & Quiritibus  
Boni relinquitis nihil  
In arte quæ omnibus sacratior cluit  
Patre edita Æsculapio.  
Vobis nihil salis, parumque pectoris  
Et fibra planè cornea est.  
Negatis? en vobis vel invidentibus  
Viros in arte nobiles  
Quiritium orbe fusos, & perennibus  
Famæ decoros præmiis.  
Scribonius, Celsusque, & ipse Plinius,  
Qui vno Latiam volumine,  
Et Græciam conclusit, atque Cælius  
Aurelianus nomine,  
Marcellus ille, Priscianus, & quidem  
Hos CELSVS inter emicans,

Vt Phœ-

XIII

Vt Phœbus orbe splendidum fundens iubar  
Inter minora sidera:  
Cui pectus ipse præses Æsculapius,  
Suadæ rigauit nectare:  
Qui nunc vel ipsis inuidendus Gratiis  
Dias in oras luminis  
Prodit, nitens, venustus, elegans, tuo  
Labore docte Ronsee.  
O qualis hoc splendor, decor volumine!  
Quàm gratiosa gratia  
Diffusa semet explicat sententia,  
Prius remota & abdita!  
Nitore plena spirant omnia en tibi,  
Vernant rosæ hæc, & lilia,  
Nouus color, noua omnia, & Celsus nouus,  
Quem promus ecce Ronseus  
In arte Apollinari haut infimus, tibi  
Donat, beatque munere,  
Quo magis optari haut queat, vel inuido, &  
Furente Momo iudice.  
Cape ergo lector candidi hoc munus viri.  
Fauente natum Apolline,  
Cui triga Gratiarum abunde gratiam  
Et nectar infudit merum,  
Eique partus vt subinde edat nouos  
Æuum precare Nestoris.

*Gualterus Verdoesius Medic.*

ELEN-



# ELENCHVS AVCTORVM,

*quorum auctoritatibus auctor vtitur.*

Abenzoar	Ianus Cornarius
Aëtius	Iacobus Syluius
Albucas	Iacobus Holerius
Alexander Aphrodiseus	Ioannes Fernelius
Alexander Trallianus	Ioannes Cæsarius
Alexander Benedictus	Ioannes Manardus
Aliabas	Ioannes Morisotus
Alexander Pedemontanus	Ioannes Guinterius Ander.
Andreas Martheolus	Iosephus.
Andreas Vesalius	Leonarthus Fuchsius.
Apitius	Martialis
Apuleius	Matthias Cornax
Aristoteles	Mesue
Actuarius	Michael Sauanarola.
Asclepiades	Nicolaus Massa.
Athenæus	Oribasius.
Auicennas.	Palladius
Carolus Stephanus	Paulus Aegineta
Cato	Philothæus
Cassius	Philon Iudæus
Cælius Methodicus	Plinius
Columella.	Psellus
Dion	Ptolemæus.
Dioscorides.	Q. Serenus Sammonicus.
Erasistratus.	Rembertus Dodonæus
Fabianus	Rhazes.
Franciscus Messarius.	Scribonius Largus
Galenus	Simeon Sethi
Gualterus Ryffius	Suidas.
Guilielmus Pantinus.	Theophilus
Hadrianus Iunius	Theodorus Priscianus
Herodotus	Theophrastus
Heraclides	Varro
Hesichius	Vidus Vidius
Hippocrates	Vitruuius.
Hieremias Thriuerus	
Horatius.	



1.6.498

XIV

A V R E L I I  
C O R N E L I I C E L S I  
D E  
R E M E D I C A  
L I B E R P R I M V S,

Ab HIEREMIA DRIVERO BRACHELIO *medico,*  
*Commentarius illustratus.*

**V**T ALIMENTA sanis corporibus Agri-  
cultura, sic sanitatem ægris Medicina pro-  
mittit. Hæc quidem nusquam non est.  
Siquidem etiã imperitissimę gentes her-  
bas, aliaque prompta in auxilium vulne-  
rum, morborumque nouerunt. Verun-  
tamen apud Græcos aliquanto magis, quàm in cæteris natio-  
nibus exculta est: ac ne apud hos quidem à prima origine, sed  
paucis ante nos seculis, utpote cùm vetustissimus auctor Æs-  
culapius celebreretur. Qui quoniam adhuc rudem & vulga-  
rem hanc scientiam paulo subtiliùs excoluit, in deorum nu-  
merum receptus est. Huius deinde duo filij Podalyrius &  
Machaon bello Troiano ducem Agamemnonem secuti, non  
mediocrem opem commilitonibus suis attulerunt. Quos  
tamen Homerus non in pestilentia, neque in variis generibus  
morborum aliquid attulisse auxilij, sed vulneribus tantum-  
modo ferro, & medicamentis mederi solitos esse proposuit.  
Ex quo apparet, has partes medicinæ solas ab his esse tentatas,  
cæque esse vetustissimas. Eodemque auctore disci potest,  
morbos, tum ad iram deorum immortalium relatos esse, &  
ab iisdem opem posci solitam. Verique simile est, inter non-  
nulla auxilia aduersæ valetudinis plerumque tamen eam bo-  
nam contigisse ob bonos mores, quos neque desidia, neque  
A luxu-

\* tentarāt. luxuria \* vitiant. Siquidem hæc duo corpora prius in Græcia, deinde apud nos affligerunt. Ideoque multiplex ista medicina, neque olim apud Græcos, neque apud alias gentes  
 \* nobis necessaria, vix aliquos ex \* bonis ad senectutis principia perducit. Ergo etiam post eos (de quibus retuli) nonnulli clari viri medicinam exercuerunt, donec maiore studio litterarum  
*Disciplina corpori inimica.* disciplina agitari cœpit, quæ ut animo præcipuè omnium necessaria, sic corpori inimica est. Primoque medendi scientia, sapientiæ pars habebatur, ut & morborum curatio, & rerum naturæ contemplatio sub iisdem auctoribus nata sit. Scilicet his hanc maximè requirentibus, qui corporum \* suorum  
 \* sanorum  
 \* quieta robora \* inquieta cogitatione, nocturnaque vigilia minuerant. Ideoque multos ex sapientiæ professoribus, peritos eius fuisse accipimus. Clarissimos verò ex his Pythagoram & Empedoclem, & Democritum. Huius autem (ut quidam crediderunt) discipulus Hippocrates Cous, primus quidem ex omnibus memoria dignis ab studio sapientiæ disciplinam hanc separavit, vir & arte & facundia insignis. Post quem Diocles Carystius, deinde Praxagoras, & Chrysippus, tum Herophilus & Erasistratus, sic artem hanc exercuerunt, ut etiam in diuersas curandi vias processerint. Iisdemque temporibus, in tres parteis medicina diducta est, ut vna esset quæ victu, altera quæ medicamentis, tertia quæ manu mederetur. Primam *διατητικὴν*, secundam *φαρμακευτικὴν*, tertiam *χειρουργικὴν*, Græci nominauerunt. Eius autem, quæ victu morbos curat, longè clarissimi auctores etiam altius quædam agitare conati, rerum quoque naturæ sibi cognitionem vindicauerunt, tanquam sine ea trunca & debilis medicina esset. post quos Serapion primus omnium, nihil hanc rationalem disciplinam pertinere ad medicinam professus, in usu tantum & experimentis eam posuit. Quem Apollonius & Glaucias, & aliquanto post Heraclides Tarentinus, & aliqui non mediocres viri secuti, ex ipsa professione, se Empiricos appellauerunt. Sic in duas parteis ea quoque quæ victu curat, medicina diuisa est, aliis rationalem artem, aliis usum tantum sibi vendicantibus, nullo verò quicquam post eos, qui suprâ comprehensi



prehenſi ſunt, agitante niſi quod acceperat: donec Aſclepiades medendi rationem ex magna parte mutauit. Ex cuius ſucceſſoribus Themifon nuper ipſe quoque quædam in ſenectute deflexit. Et per hos quidem maximè viros ſalutaris iſta nobis profeſſio increuit. Quoniam autem ex tribus medicinæ partibus, vt difficillima, ſic etiam clariffima eſt ea, quæ morbis medetur, ante omnia de hac dicendum eſt. Et quia prima in ea diſſenſio eſt, quòd alij ſibi experimentorum tantummodo notitiam neceſſariam eſſe contendunt, alij niſi corporum rerumque ratione comperta, non ſatis potentem uſum eſſe proponunt: indicandum eſt, quæ maximè ex vtraque parte dicantur, quo faciliùs noſtra quoque opinio interponi poſſit. Igitur hi, qui rationalem medicinam profitemur, hæc neceſſaria eſſe proponunt, Abditarum & morbos continentium cauſſarum notitiam, deinde Euidentialium, poſt hæc etiam Naturalium actionum, nouiſſimè partium Interiorum. Abditas cauſſas vocant, in quibus requiritur, ex quibus principiis noſtra corpora ſint, quid ſecundam, quid aduerſam valetudinem faciat. Neque enim credunt poſſe eum ſcire, quomodo morbos curare conueniat, qui vnde hi ſint, ignoret. Neque eſſe dubium, quin alia curatione opus ſit, ſi ex quattuor principiis, vel ſuperans aliquid, vel deficiens aduerſam valetudinem creat, vt quidam ex ſapientix profeſſoribus dixerunt, alia, ſi in humidis omne vitium eſt, vt Herophilo viſum eſt: alia, ſi in ſpiritu, vt Hippocrati: alia, ſi ſanguis in eas \*venas, quæ ſpiritus accommodatæ ſunt, transfunditur, & inflammationem, quam Græci φλεγμονή nominant, excitat, eaque inflammatio, talem motum efficit, qualis in febre eſt, vt Eraſiſtrato placuit: alia, ſi manantia corpuscula, per inuiſibila foramina ſubſiſtendo, iter claudunt, vt Aſclepiades contendit. Eum verò rectè curaturum, quem prima origo cauſſæ non feſellerit. Neque verò inficiantur, experimenta quoque eſſe neceſſaria. Sed ne ad hæc quidem aditum fieri potuiſſe, niſi ab aliqua ratione contendunt. Non enim quidlibet antiquiores viros ægris inculcaſſe: ſed cogitaſſe, quid maximè conueniret, & id uſu exploratſſe, quod

\*arterias,



\* didicif-  
sent.  
\* an initia  
pleraque

antè coniectura aliqua \*duxissent. Neque interesse, \*an nunc iam pleraque explorata sint, si à consilio tamen coeperunt. Et id quidem in multis ita se habere. Sæpe verò etiam noua incidere genera morborum, in quibus nihil adhuc vsus ostenderit. Et ideo necessarium sit animadvertere, vnde ea coeperint: sine quo nemo mortalium reperire possit, cur hoc, quàm illo potius viatur. Et ob hæc quidem in obscuro positas causas persequuntur. Euidentes verò has appellant, in quibus quærunt initium morbi calor attulerit, an frigus: fames, an satietas: & quæ similia sunt. Occursurum enim vitio dicunt eum, qui originem non ignorarit. Naturales verò corporis actiones appellant, per quas spiritum trahimus, & emittimus cibum, potionemque & assumimus, & concoquimus. Itemque per quas eadem hæc in omnes membrorum partes digeruntur. Tum requirunt etiam, quare venæ nostræ modò submittant se, modò attollant: quæ ratio somni, quæ vigiliæ sit. Sine quorum notitia neminem putant vel occurrere, vel mederi morbis \*inter hæc nascentibus posse. Ex quibus \*quàm maximè pertinere ad rem concoctio videtur. \*Huic potissimum insistent, & duce alij Erasistrato, atteri cibum in ventre contendunt: alij Plistonico, Praxagoræ discipulo, putrescere: alij credunt Hippocrati, per calorem cibos concoqui. Acceduntque Asclepiadis æmuli, qui omnia ista vana & superuacua esse proponunt. Nihil enim concoqui, sed crudam materiam (sicut assumpta est) in corpus omne diduci. Et hæc quidem inter eos parum constant. Illud verò conuenit, alium dandum cibum laborantibus, si hoc: \*aliud, si illud verum est. Nam si teritur intus, eum quærendum esse, qui facillimè teri possit. Si putrescit, eum in quo hoc expeditissimum est. Si calor concoquit, eum qui maximè calorem \*moueat. At nihil ex his esse quærendum, si nihil concoquitur. Ea verò sumenda quæ maximè manent, qualia assumpta sunt. Eademque ratione cum spiritus grauis est, cum somnus, aut vigilia vrgēt, eum mederi posse arbitrantur, qui prius illa ipsa qualiter eueniant perceperit. Præter hæc cum in interioribus partibus & dolores, & morborum varia genera

\* intra  
\* quia  
quam in.  
\*, huic

\* alium,

\* foueat.



genera nascantur, neminem putant his adhibere posse remedia, quæ ipse ignoret. Necessarium ergo esse incidere corpora mortuorum, eorumque viscera atque intestinâ scrutari: longèque optimè fecisse Herophilum, & Erasistratum, qui nocentes homines à regibus ex carcere acceptos, viuos inciderint, considerantque etiam spiritu remanente, ea quæ natura antè clausisset, eorumque posituram, colorem, figuram, magnitudinem, ordinem, duritiem, mollitiem, laxiorem, contactum: processus deinde singulorum, & recessus: & siue quid inseritur alteri, siue quid partem alterius in se recipit. Neque enim cum dolor intus incidit, scire quid doleat, eum, qui qua parte quodque viscus, intestinumve sit, non cognouerit. Neque curari id quod ægrum est posse, ab eo, qui quid sit, ignoret. Et cum per vulnus alicuius viscera patefacta sunt, eum qui sanæ cuiusquam colorem partis ignoret, nescire quid integrum, quid corruptum sit. Ita ne succurrere quidem posse corruptis, aptiusque extrinsecus imponi remedia, compertis interiorum & sedibus & figuris, cognitaque eorum magnitudine: similesque omnia, quæ \* posita sunt, rationes habere. Neque esse crudele (sicut plerique proponunt) hominum nocentium, & horum quoque paucorum suppliciis, remedia populis innocentibus seculorum omnium quæri. Contrà, hi qui se Empiricos ab experientia nominant, euidentes quidem causas, vt necessarias amplectuntur: obscurarum verò causarum, & naturalium actionum quæstionem ideo superuacuam esse contendunt, quoniam incomprehensibilis natura sit. Non posse verò comprehendere, patere ex eorum, qui de his disputarunt, discordia: cum de ista re, neque inter sapientiæ professores, neque inter ipsos medicos conueniat. Cur enim potius aliquis Hippocrati credat, quàm Herophilo? Cur huic potius, quàm Asclepiadi? Si rationes sequi velit, omnium posse videri non improbabiles: si curationes, ab omnibus his ægros perductos esse ad sanitatem. Ita neque disputationi, neque auctoritati cuiusquam fidem derogari oportuisse. Etiam sapientiæ studiosos maximos medicos esse, si ratiocinatio hoc faceret: nunc

*Per lano-  
rem, & cō-  
stitū, aspe-  
ritatem in-  
telligit, &  
quod illi est  
corarium.*

\*intus pos.

Per lauo-  
rem, & cō-  
tactū, aspe-  
ritatem in-  
telligit, &  
quod illi est  
cōtrarium.

\*intus pos.



illis verba superesse, deesse medendi scientiam. Differre quoque pro natura locorum genera medicinæ, & aliud opus esse Romæ, aliud in Ægypto, aliud in Gallia. Quòd si morbos eadem causæ facerent ubique, remedia quoque ubique eadem esse \* debuissent. Sæpe etiam causas apparere, vtputa lippitudinis, vulneris, neque ex his patere medicinam. Quòd si scientiam hanc non subiiciat euidens causæ, multominus eam posse subiicere, quæ in dubio est. Cùm igitur illa incerta, incomprehensibilisque sit, à certis potius, & exploratis petendum esse præsidium, id est his, quæ experientia in ipsis curationibus docuerit, sicut in cæteris omnibus artibus. Nam ne agricolam quidem, aut gubernatorem disputatione, sed vsu fieri. At nihil istas cogitationes ad medicinam pertinere: eò quoque disci, quòd qui diuersa de his senserint, ad eandem tamen sanitatem homines perduxerint. Id enim fecisse, quia non ab obscuris causis, neque à naturalibus actionibus, quæ apud eos diuersæ erant, sed ab experimentis, prout cuique responderant, medendi vias traxerint. Ne inter initia quidem ab istis quæstionibus deductam esse medicinam, sed ab experimentis. Ægrorum enim, qui sine medicis erant, alios propter auiditatem primis diebus, protinus cibum assumptisse, alios propter fastidium abstinuisse, leuaturnque magis eorum morbum esse, qui abstinerant: itemque alios in ipsa febre aliquid edisse, alios paulò ante eam, alios post remissionem eius, optimè deinde his cessasse, qui post finem febris id fecerint. Eademque ratione, alios inter principia protinus vsos esse cibo pleniore, alios exiguo, grauiorisque eos factos, qui se impleverint. Hæc, similiaque, cùm quotidie inciderent, diligentes homines notasse, quæ plerumque melius responderent: deinde ægrotantibus ea præcipere cœpisse. Sic medicinam ortam, subinde aliorum salute, aliorum interitu, perniciofa discernentem à salutaribus. Repertis deinde iam medicinæ remediis, homines de rationibus eorum differere cœpisse; nec post rationem medicinam esse inuentam, sed post inuentam medicinam, rationem esse quæsitam. \* Requiritur etiam, si ratio idem doceat, quod experientia, an aliud. Si idem,



Si idem, superuacua esse: Si aliud, esse contrariam: Primò tamen remedia exploranda summa cura fuisse, nunc verò iam explorata esse, neque vlla aut noua genera morborum reperiri, aut nouam desiderari medicinam. Quòd si iam incidat mali genus aliquod ignotum, non ideo tamen fore medico de rebus cogitandum obscuris: sed eum protinus visurum, cui morbo id proximum sit, tentaturumque remedia similia illis quæ vicino malo sæpe succurrerint, & per eius similitudinem opem reperturum. Neque enim se dicere consilio medicum non egere, & irrationale animal hanc artem posse præstare: sed has latentium rerum coniecturas ad rem non pertinere: quia non intersit, quid morbum faciat, sed quid tollat. Neque ad rem \*pertineat, quomodo, sed quid \*pertinere, \*incidat, optimè digeratur. Siue hac de causa concoctio \*intercidat, siue de illa: &, siue concoctio sit illa, siue tantum digestio. Neque quærendum esse quomodo spiremus: sed quid grauem, tardumque spiritum expediat. Neque quid venas moueat, sed quid quæque motus genera significant. Hæc autem cognosci experimentis, & in omnibus eiusmodi cogitationibus in vtranque partem differi posse. Itaque ingenium & facundiam vincere, morbos autem non eloquentia, sed remediis curari. Quæ si quis elinguis, vsu \*discretus bene norit, hunc aliquanto maiorem medicum futurum, quàm si sine vsu linguam suam excoluerit. Atque ea quidem, de quibus est dictum, superuacua esse tantummodo. Id verò quod restat, etiam crudele, viuorum hominum aluum, atque præcordia incidi, & salutis humanæ præsidem artem, non solum pestem alicui, sed hanc etiam atrocissimam inferre, cum præsertim ex his, quæ tanta violentia quærantur, alia non possint omnino cognosci, alia possint etiam sine scelere. Nam colorem, læuorem, mollitiem, duritiem, similiaque omnia non esse talia inciso corpore, qualia integro fuerint: quia cum corporibus inuiolatis, hæc tamen metu, dolore, inedia, cruditate, lassitudine, \*mille aliis mediocribus affectibus, sæpe mutantur: multo magis verisimile est, interiora, quibus maior molities, lux ipsa noua sit, sub grauissimis vulneribus, & ipsa trucidatione



\* Nam ne  
vici.

\* alia: ita  
sed.

\* defera-  
tur, al.  
distraba-  
tur.

cidatione mutari. Neque quicquam esse stultius, quàm quale quidque viuo homine est, tale existimare esse moriente, imò iam mortuo. \* Nam vterum quidem, quì minus ad rem pertineat, spirante homine posse diduci? Simul atque verò ferrum ad præcordia accessit, & discissum transuersum sectum est, quod membrana quadam superiores partes ab inferioribus diducit (*διαπερυμν* Græci vocant) hominem protinus animam amittere. Ita demum mortui præcordia, & viscus omne in conspectum latrocinantis medici dari: quod necesse sit tale esse, quale mortui sit, nō quale viui fuit. Itaq. consequi medicum, vt hominem crudeliter iugulet: non vt sciat qualia viui viscera habeamus. Si quid tamen sit, quod adhuc spirante homine conspectui subiiciatur, id sæpe casum offerre curantibus. Interdum enim gladiatorem in arena, vel militem in acie, vel viatorem à latronibus exceptum, sic vulnerari, vt eius interior aliqua pars aperiatur, & in alio \* alia sita, ita sedem, positum, ordinem, figuram, similiaque cognoscere prudentem medicum, non eadem, sed sanitatem molientem, idque per misericordiam discere, quod alij dira crudelitate cognouerint. Ob hæc ne mortuorum quidem lacerationem necessariam esse. Quæ etsi non crudelis, tamen fœda sit, cùm aliter pleraque in mortuis se habeant. Quantum verò in viuis cognosci potest, ipsa curatio ostendat. Cùm hæc per multa volumina, perque magnæ contentionis disputationes à medicis sæpe tractata sint, atque tractentur, subiiciendum est quæ proxima vero videri possint. Ea neque addicta alterutri opinioni sunt, neque ab vtraque nimium abhorrentia, media quodammodo inter diuersas sententias. Quod in plurimis contentionibus deprehendere licet, sine ambitione verum scrutantibus, vt in hac ipsa re. Nam quæ demum causæ vel secundam valetudinem præstent, vel morbos excitent: quomodo spiritus, aut cibus, vel \* detrahatur, vel digeratur, ne sapientiæ quidem professores scientia comprehendunt, sed coniectura persequuntur. Cuius autem rei non est certa notitia, eius opinio certum reperire remedium non potest. Verumque est, ad ipsam curandi rationem nihil plus



plus conferre, quàm experientiam. Quanquàm igitur multa sint ad ipsas artes propriè non pertinentia, tamen eas adiuuat excitando artificis ingenium. Itaque ista quoque naturæ rerum contemplatio, \* quamuis non faciat medicum aptiorem, tamen medicinæ reddit perfectum. Verique simile est, & Hippocratem, & Erasistratum, & quicumque alij non contenti febres & vlcera agitare, rerum quoque naturam ex aliqua parte scrutati sunt, non ideò quidem medicos fuisse, verum ideo quoque maiores medicos extitisse. Ratione verò opus est ipsi medicinæ, etsi non \* inter obscuras causas, \* neque inter naturales actiones, tamen sæpe. \* Est enim hæc ars coniecturalis: neque respondet ei plerunque non solum coniectura, sed etiam experientia. Et interdum non febris, non cibus, non somnus subsequitur sicut assuevit. Rarius, sed aliquando tamen morbus quoque ipse nouus est, quem non incidere, manifestè falsum est: cum ætate nostra quædam ex naturalibus partibus carne prolapsa, & \* arente, intra paucas horas expirauerit: sic ut nobilissimi medici, neque genus mali, neque remedium inuenerint. Quos ego nihil ideo tentasse iudico, quia nemo in splendida persona periclitari coniectura sua voluerit: ne occidisse, nisi seruasset, videretur. Veri tamen simile est, potuisse aliquid cogitare, detracta tali verecundia, & fortasse responsurum fuisse id, quod aliquis esset expertus. Ad quod medicinæ genus neque semper similitudo aliquid confert, etsi quando confert, tamen id ipsum rationale est inter multa similia genera, & morborum, & remedium cogitare, quo potissimum medicamento sit vtendum. Cum igitur talis res incidit, medicus aliquid oportet inueniat, quod non vtique fortasse, sed sæpius tamen etiam respondeat. Peret autem nouum quoque consilium, non à rebus latentibus (istæ enim dubiæ, & incertæ sunt) sed ab his quæ explorari possunt, id est euidentibus causis. Interest enim fatigatio morbum, an sitis, an frigus, an calor, an vigilia, an fames fecerit, an cibi, vini quæ abundantia, an intemperantia libidinis. Neque ignorare hunc oportet, quæ sit ægri natura, humidum magis, an magis siccum corpus eius sit: validi nerui, an infirmi: fre-

\* Alias:  
quamuis  
non faciat  
medicum:  
aptiorem  
tamen me-  
dicina red-  
dit, atque  
perfectum.  
\* semper  
inter  
\* atque

Caro ex  
naturalis-  
bus pro-  
lapsa.  
\* hærente,

B

mi: fre-



mi : frequens aduersa valetudo, an rara : eaque cum est, vehemens esse soleat, an levis : brevis, an longa. Quod is vitæ genus sit secutus, laboriosum, an quietum : cum luxu, an cum frugalitate. Ex his enim, similibusque sæpe curandi noua ratio ducenda est. Quamuis ne hæc quidem sic præterire debent, quasi nullam controuersiam recipiant. Nam & Erasistratus non ex his fieri morbos dixit, quoniam & alij, & iidem aliàs post ista non febricitarent : & quidam medici seculi nostri sub auctore (vt ipsi videri volunt) Themisone contendunt, nullius causæ notitiam quicquam ad curationes pertinere, satisque esse quædam communia morborum intueri. Siquidem horum tria genera esse, vnum adstrictum, alterum fluens, tertium mixtum. Nam modò parum excernere ægros, modò nimium : modò alia parte parum, alia nimium. Hæc autem genera morborum, modò acuta esse, modò longa : & modò incrementum, modò consistere, modò minui \* consueuerunt. Cognito igitur eo quod ex his est, si corpus adstrictum est, digerendum esse : si profluuium laborat, continendum : si mixtum vitium habet, occurrendum subinde vehementiori malo : & aliter acutis morbis medendum, aliter vetustis, aliter incrementibus, aliter subsistentibus, aliter iam ad sanitatem inclinantibus. Horum obseruationem medicinam esse ; quam ita finiunt, vt quasi viam quandam, quam *πρόδοξος* Græci nominant, eorumque quæ in morbis communia sunt, contemplatricem esse \* contendunt. ac neque rationalibus se, neque experimenta tantum spectantibus annumerari volunt, cum ab illis eo nomine dissentiant, quod in coniectura rerum latentium \* volunt esse medicinam ab his, eò quod parum artis esse in obseruatione experimentorum credunt. Quod ad Erasistratum pertinet, primum ipsa euidencia eius opinioni repugnat, quia raro, nisi post horum aliquid morbus venit. Deinde non sequitur, vt quod alium non afficit, aut eundem aliàs, id ne alteri quidem, aut eidem tempore alio noceat. Possunt enim quædam subesse corpori, vel ex infirmitate eius, vel ex aliquo affectu, quæ vel in alio non sunt, vel in hoc aliàs non fuerunt, eaque per se non tanta \* vi concitant morbum,

\* consue-  
uissent.

\* contem-  
plantur.

\* volunt

\* vt comi-  
tentur



bum, tamen obnoxium magis aliis iniuriis corpus \* efficiunt. \* efficiant.  
 Quòd si contemplationem rerum naturæ ( quam temere  
 medici sibi vendicant ) satis comprehendisset , etiam illud  
 scisset, nihil omnino ob vnam causam fieri, sed id pro causa  
 apprehendi, quod contulisse plurimum \* videtur. Potest au- \* videatur.  
 tem id dum solum est, non mouere, quod iunctum aliis ma-  
 ximè mouet. Accedit ad hæc, quòd ne ipse quidem Eras-  
 stratus , qui transfuso in arterias sanguine febrem fieri dicit,  
 idque nimis repleto corpore incidere reperit, cur ex duobus  
 æquè repletis, alter in morbum inciderit, alter omni periculo  
 vacarit (quod quotidie fieri apparet) non discreuerit. Ex quo  
 dici potest, vt vera sit illa transfusio, tamen illam non per se  
 (cùm plenum corpus est) fieri : sed cùm horum aliquid ac-  
 cesserit. Themisonis verò æmuli, si perpetua quæ promittunt  
 habent, magis etiam quàm vlli rationales sunt. Neque enim  
 si quis non omnia tenet, quæ rationalis alius probat, protinus  
 alio nouo nomine artis indiget : si modò, quod primum est,  
 non memoriæ soli, sed rationi quoque insistit. Si, quod vero  
 propius est, vix vlla perpetua præcepta medicinalis ars recipit:  
 idem sunt quod ij, quos experimenta sola sustinent. Eo ma-  
 gis, quoniam si compresserit aliquem morbus, \* an fuderit,  
 quilibet etiam imperitissimus videt. Quid autem compres-  
 sum corpus resoluat, quid solutum teneat, si à ratione tractum  
 est, rationalis est medicus. Si (vt ei, qui se rationalem negat,  
 confiteri necesse est) ab experientia, Empiricus est. Ita apud  
 eum morbi cognitio extra artem, medicina intra vsum est.  
 Neque adiectum quicquam Empiricorum professioni, sed  
 demptum est : quoniam illi multa circumspiciunt, hi tantum  
 facillima, & non plus quàm vulgaria. Nam & ij qui pecori-  
 bus ac iumentis medentur, cùm propria cuiusque ex multis  
 animalibus nosse non possint, communibus tantummodo in-  
 sistunt. Et exteræ gentes, cùm subtilem medicinæ rationem  
 non nouerint, communia tantum vident. Et qui amplè vale-  
 tudinarios nutriunt (quia singulis summa cura consulere non  
 sustinent) ad communia ista confugiunt. Neque Hercules  
 istud, & antiqui medici nescierunt, sed his contenti non fue-  
 runt.

*Hinc me-  
dicina, ars  
interpolis  
à Plinio di-  
cta est.*

*\* aut*



runt. Ergo etiam vetustissimus auctor Hippocrates dixit, mederi oportere & communia, & propria intuentem. Ac ne isti quidem ipsi intra suam professionem consistere vlllo modo possunt. Siquidem & compressorum & fluentium morborum genera diuersa sunt, faciliusque id in his quæ fluunt, inspicere potest. Aliud est enim sanguinem, aliud bilem, aliud cibum vomere: aliud deiectionibus, aliud torminibus laborare: aliud sudore digeri, aliud tabe consumi. Atque in partibus quoque humor erumpit, ut in oculos auresque. Quo periculo nullum humanum membrum vacat. Nihil autem horum sic, ut aliud curatur. Ita protinus in his à cōmuni fluentis morbi contemplatione, ad propriam medicinam descendit. Atque in hac quoque rursus alia proprietatis notitia sæpe necessaria est: quia non eadem omnibus, etiam in similibus casibus opitulantur. Siquidem certæ quædam res sunt, quæ in pluribus ventrem aut astringunt, aut resoluunt. Inueniuntur tamen, in quibus aliter atque in cæteris, idem eueniat. In his ergo communium inspectio cōtraria est, priorum tantum salutaris. Et causæ quoque æstimatio sæpe morbum soluit. Ergo etiam ingeniosissimus seculi nostri medicus, quem nuper vidimus, Cassius febricitanti cuidam, & magna siti affecto, cum post ebrietatem eum premi cœpisse cognosceret, aquam frigidam ingessit. Qua ille epota, cum vini vim miscendo fregisset, protinus febrem somno & sudore discussit. Quod auxilium medicus opportune prouidit, nō ex eo, quod aut strictum corpus erat, aut fluebat: sed ex causâ, quæ antè præcesserat. Estque etiam proprium aliquid & loci & temporis, istis quoque auctoribus, qui cum disputant, quemadmodum sanis hominibus agendum sit, præcipiunt, ut grauius aut locis aut temporibus, magis vitetur frigus, æstus, satietas, labor, libido, magisque ut conquiescat: iisdem aut locis, aut temporibus, si quis grauitatem corporis sentit, ac neque vomitu stomachum, neque purgatione aluum sollicitet. Quæ vera quidem sunt: à communibus tamen ad quædam propria descendunt, nisi persuadere nobis volunt, sanis quidem considerandum esse, quod cælum, quod tempus anni sit, ægris verò



verò non est. Quibus tanto magis omnis observatio necessaria est, quanto magis obnoxia offensis infirmitas est. Quinetiam morborum in iisdem hominibus aliæ atque aliæ proprietates sunt: & qui secundis aliquando frustra curatus est, contrariis sæpe restituitur. Plurimaque in dando cibo discrimina reperiuntur, ex quibus contentus vno ero. Nam famem facilius fert adolescens, quàm puer: facilius in denso cælo, quàm in tenui: facilius in hyeme, quàm æstate: facilius vno cibo, quàm prandio quoque assuetus: facilius in exercitatus, quàm exercitatus homo sustinet. Sæpe autem in eo magis necessaria cibi festinatio est, qui minus in diem tolerat. Ob quæ \* competit eum, qui propria non novit, communia tantum intueri debere: eumque qui nosse propria potest, illa quidem non oportere negligere, sed his quoque insistere. Ideoque cum par scientia sit, utiliorem tamen medicum esse amicum quàm extraneum. Igitur, ut ad propositum meum redeam, rationalem quidem puto medicinam esse debere, instrui verò ab evidentibus causis, obscuris omnibus non à cogitatione artificis, sed ab ipsa arte reiectis. Incidere autem viutorum corpora, & crudele, & superuacuum est: mortuorum corpora discantibus necessarium. Nam positum, & ordinem nosse debent: quæ cadauera melius, quàm viuis, & vulneratus homo repræsentant. Sed & cætera, quæ modò in viuis cognosci possunt, in ipsis curationibus vulneratorum paulo tardius, sed aliquanto mitius, usus ipse monstravit. His propositis, primum dicam, quemadmodum sanos agere conveniat: tum ad ea transibo, quæ ad morbos, curationesque eorum pertinebunt.

# HIEREMIAE DRIVERI BRACHELII COMMENTARIA.

**D**ECRETUM erat semel exempto hoc capite ad artem salubrem transilire, postea vero servari, ut ex illo lector antiquissimam medicinam agnosceret, sectas atque ipsarum conditores, conditionesque in quo si quid

contraxit aut obscure ab ipso dictum est, à stia ferunt. nobis illustratur: melius enim erat, non tantum duas hareses, sed tres distinguere; verum tertiam Celius cum Empirica coniunxit: Etenim manca fuit longo tempore medicina, in nullas sectas distracta, paucis nec dum fir-

B -3

\* Quibus-  
dā videtur  
hic legendū  
potius, in  
tenui cælo,  
quàm in dē-  
lo: & æsta-  
& quā hye-  
me, propte-  
rea quod  
Hippocrat.  
dicat lib. 1.  
Aphor. Vē-  
tres hyeme  
et vere sunt  
calidissimi.  
Quare per  
ea tempora  
alimenta  
copiosiora  
sunt exhi-  
benda.  
Ex Paul.  
Ægineta  
libro itidē  
1. cap. 33.  
Hyeme qui-  
dem & for-  
tiori exer-  
citatione,  
& pleniora  
cibo uten-  
dum est.  
Nisi ed re-  
feras, quod  
in denso  
cælo, & per  
hyemē cor-  
pora sunt  
robustiora,  
atque ideo  
etiam faci-  
lius quam  
libet mole-



dum firmis confirmata experientis, ratione quidem non contempta, sed nondum adiecta, id enim primus tentavit Hippocrates, qui insigniter medicinam locupletavit, at primus elementa in ordinem ac numerum digessit, veterum inuenta, ac fortunatas illas experientias, ratione expensas, circumquaque causis signisque instruxit, munivit, ac plura longe ratione eruit, quam ipsa experientia forte fortuna veteribus ostendit. Non tulit Philinus hoc medicinae accessorium, sed rationalem contemplationem ab ea separavit, ac rationem empiricam primus instituit, quem Serapion postea secutus est. qui verò suam sectam antiquiorem, aut venerabiliorem facere voluit, \* Anacreonem huic sectae praeferunt. Multum tamen dissimilis fuit hac factio ab his qui hodie Empirici vocantur, nam hi analphabeti quidem nebulones, ac circumforanei circulatores sunt, nulla experientia praediti, sed tantum duobus aut tribus remediis, at potius venenis instructi. Illi verò gravissimi erant philosophi, qui in singulis morbis, sua habebant remedia: & prius singulorum morborum concurrentia signa, syndromas, seu concursus, appellabant: verum natura in quas morbi incidunt, ac conditiones quae corpora circumscribunt, tam variae sunt, ut congesta illa signorum series, nihil perpetuum habeat. Rarissimus enim morbus est ubi haec omnia vel ipsorum plurima, concurrant, & non unum ex aliis omnibus assecat, quod reliqua confundere possit. Ergo vulgari modo Cornelius Celsus arbitratus videtur, qui utrique sectae aliquid indulget, & medium quoddam tenet, dum experientia medicinam instituit, ratione autem perficit. Nam contra maior pars ratione, minor autem ab experientia proficitur: etenim simplicia experientia, ac saepe forte fortuna inuenta sunt, tamen ratio sola morbos eruit, axiomata ac medicorum praecepta digerit, & ostendit: Quippe neque à simplicibus abstinet, sed hac quoque in methodum refert. Quapropter recte in tertio Therapeutices, & multis aliis locis Galenus, rationem citra experientiam, quam experientiam citra ratio-

nem praefert: nam ut alibi dicit, ad solas supputationes experientia comprehendendas, mille annorum tempus non sufficeret. Pessima tamen tertia secta est, quae neutram tolerat, & si verum fateri velit, alia quam empirica non est, nisi quod multo sit inartificialior. Anceps tamen ratio ipsius auctoris quae methodicos à rationalibus separat, ubi dicit, Si verò quod propius est, vix vlla perpetua praecepta ars medicinalis continet, idem sunt quod ij quos sola experientia sustinet: Nam & rationales alios re vera involvere videtur, quoniam neque horum rationes perpetuae sunt, sed plerumque tantum artificiales coniectura contingunt; ergo hanc redargutionem ad methodicos tantum referre licebit, qui ob eam fortè causam rationales dedignabantur, quia ratio perpetua ac stabilis non erat, atque ob eandem causam methodum suum tanquam magis perpetuam praeferebant: sed neque id iis obigit, quare dum rationem nimis angustè finiunt, neque sub rationali secta contineri, neque maiori iure sibi nomen usurpare methodica secta possunt, sed in empiricam nolentes incidunt: verum etiam dum sub lege perpetua sint, nonne ob hac empiricos vincunt? nequaquam. nam empirici nihil adiciunt, sed particularia detrahunt, communibus contenti: ob gloriam tamen novum nomen sibi hac haeresis instituit, & methodica appellari voluit. Huius primus artifex Themison, princeps autem Thessalus, quorum admodum brevis fuit methodus, quia nihil aliud quam purgare aut astringere docebat, ad quos mihi prope accedere videntur multi ex nostris philosophis, quibus per omnia hic unus ordo est, ut primo minoratum aliquod solutivum quod vocant exhibeant, secundo syrupum aliquem in tres aut quatuor vices partiuntur: hoc statim medicamentum quod eradicativum appellant, excipit, qualiscunque morbus fuerit, longus vel brevis: nam neq. morbi tempus animadvertunt, propterea, quocunque die occurrant, idem faciunt, & si forte quis diversos per annum integri consuluerit, eandem methodum

\* Acronem  
Agrigentinum.



thodum inueniet: Propterea vir quidam neque malus neque indoctus, iis qui rerum notis videntur comparauit, quoniam virique suum perpetuo compendium ac formam seruant eandem: non tolerant tamen hanc toties repetitam tyrannidem morbi longi; & propterea quamuis ij à principio magis securi sunt, tamen fere plurimi illorum commouentur, quod aduersis medicinis exasperantur: Atqui non est eadem omnibus fortuna, sed alia atque alia fama, quippe alios mores commendant, alios aurum, alium Græcæ, alium Latine lingua peritæ, alium loquacitas, alium cōtentio, alium ingenium, alium muliebris assentatio, alium ex vrina impostura, & mille alia, nam quod nondum diximus, plurimos promouet fastus annuli, longa peregrinatio, & bibliotheca varia, prout scilicet agrorum varia sunt studia: etenim alius alio capitur. verumtamen omnes in hoc vno fere sunt, ut ventrem soluant, vel astringant, adeo atque alius quidam propter hos nefarias breuius, an malignius medicinam defmuerit stercoreis vnius adiectionem aut detractionem, & re vera horum methodus, longe quàm methodicorum (quos diximus) breuior: etenim hi fluorem atque astrictiōnem in singulis moliebantur partibus, illi verò tantum in ipso ventre, propterea quoque nostri breuius quàm illi euaserunt medici: nam methodicis iis sex saltem mensibus opus erat, nostris vero paucissimis diebus medicinam illis innasci, vel subito inspirari diceres, adeo subito fiunt medici, sine labore, sine ratione, nulla experientia instituti, sed tantum aliquot exemplaribus instructi, quibus quomodo variè abundant seplasiarij, de medicorum, eadem fortuna certant primatu, non tantum vulgo iudice, sed & doctis, & quod magis miraberis, illiteratæ mulieres quoque in his suam laudem sæpe obtinent, & quod hominibus sæpe imponit etiam philosophis, quos ratio non vindicat, temeritas adiuvat. Cum qua secta ego hos omnes conseram nescio: nam breuior videtur mihi prædictarum sectarum numerus, quàm ut aliquis ex ijs contineat, certe nisi forte cum Thessaliis illis a finis locum sibi compascant

tur, nullus superest. Credo vero quod neque hos Thessalis dignabitur, ut gratis admittat: atque inter reliquos philosophos vel empiricos, vel rationales nunquam non etiam precio locum innexient. Non enim ille rationalis statim dicitur qui axioma aliquod pronunciare didicit, aut qui verbis aliquot, nunquid contrarium contrario curetur, disceptare nonit, sed qui dialecticam, physicam speculationem, aut vniuersam rem medicam ad vnguem tenet: neque ob eam causam empiricus est, quia multa vidit, sed quia multa animaduertit, atque à se inuicem prompte discernit. Vide ergo quàm male huc confugunt, qui quomodo rationibus parum valent, atque longe vincuntur, his contemptis experientiam multorum annorum iactant, & quasi reliquos omnes totis humeris supereminent: in singulis etenim citra rationem sibi tribui volunt, quorum experientia (si vera dicere fas est) cæcorum terroribus eadem est, qui varium perpetuo iter inierunt, sed dum viam baculo tentant, nunc huc nunc illuc oberrant, ita & iis, qui quotidie varia vident quidem, sed illorum rationem non tenent, imperitiores quotidie euadunt, atque nunc huc nunc illuc feruntur, tanquam hi qui sine remis velisque nauigant. cerè pueri in platea ludentibus mihi videntur similes, dum velatis oculis de scopo aliquo certant: nam & ij quo frequentius à coetaneis prius circumducuntur, eo longius à scopo aberrant; verum hoc statim dicere audies & rationales sese esse, sed omnium rationem non exquirere, neque ad medicinam exigere, satis esse generalibus quibusdam contentos esse. quorum responsio multo peior est, quàm ipsa criminatio; nam hoc verbo plane se methodicos ostendunt. Itaque nunc se magis produnt: nam in variis locis Galenū asserit multo securiores medicos esse qui sola experientia nituntur, quàm qui dilutam illis rationem adiciunt, quippe ij optimam experientiam, sæpe diluta ratione confundunt, ac vitiant, ac multo præstiterit nulla quàm infirma ratione uti. Ac tantum de medicorum sectis: inter quos bonos non redarguimus, sed indoctos, ut ab illis discat



illis discat canere vulgus, prodigius. Super-  
est ut Casario scrupulum eximamus : qui  
non circa suspicionem, locum illum in fine  
legit : Nam famem facilius fert ad-  
ulescens, quàm puer; facilius in  
denso cœlo quàm in tenui, quasi se-  
cunda hæc pars cum aliis Hippocratis locis  
pugnaret. Rerum autem nulla est contro-  
uersia : quoniam licet plus alimenti feratur  
sub denso cœlo, quàm tenni; tamen diutius  
disferri potest. Exemplum exhibet hyems  
respectu ætatis, quod ipse quoque præscri-  
psit : quippe in hyeme cœlum densius, in  
æstate tenuius; & tamen hic quàm ibi ie-  
iunium egregius fertur, serè enim sub ea-  
dem constitutione alimenti copia assatim  
exhibita admittitur, ubi ieiunium difficile  
toleratur. Magis suspectus est mihi locus  
qui præcessit, ubi dicitur : Itaque ista  
quoque naturæ rerum contempla-  
tio, quamvis non faciat medicum  
aptiorem, tamen medicinæ reddit  
perfectum. Cuius loco ego legere malim;  
tamen medicum reddit perfectum.  
Fortè autem hæc castigatio minus tibi arri-  
debit; quo magis cum priora parte disidet :  
nam si aptiorem quidem faciat, quomodo  
perfectiorem reddet? Verum hac ratione  
non est quod reformides : quippe quum quod  
sequitur eandem habeat controuersiam; ubi  
legitur : non ideo quidem medicos  
fuisse, sed maiores medicos exti-  
tisse, quod idem est, ac si dicas, Medicos  
perfectiores : ita utrunque cum eo quod prius  
aptiores negauit, ex æquo pugnat. Quare  
quispiam arbitrabitur illum rerum differen-  
tias omisisse, quum in verbis luxuriaretur.

Malim tamē  
salua pace  
D. Hieronimū  
priorē Celsi  
lectionē ser-  
uare. Alij sic  
hic legunt:  
Quamuis non  
faciat medicū,  
aptiorem ta-  
men medicinā  
reddit, atque  
perfectum.

Rerum autem ista ipse ex professo scripsit,  
quia ad aptum propriè nihil istorum perti-  
nere dixit, sed ad exercendum artificis inge-  
nium. Neque est quod hic illi excusationem  
aliquam queramus, qui tantillum à ratio-  
nabili secta tanquam scrupulosa recessit, &  
medium quoddam inter utranque sectam  
elegit : & experientia quidem medicamina  
instituit; ratione autem perfecit. qua si ad  
inventionem medicina referas, vera sunt : è  
contrario verò, nunc in medio res se habet,  
quo primum ratione singulorum instrui de-  
bet, experientia perficitur. Nam, ut alibi  
(præcitur autem libro de Crisibus) dixit  
Galenus, priusquam quis omniaque scripta  
sunt diligenter didicerit, nihil agrotos in-  
tuendo proficiet. Et in tertio Therapeutices,  
solam rationem soli experientia præferat. Et  
iterum in quinto De sanitate tuenda usum  
quantumvis longum sine ratione nihil posse  
efficere perhibet. Rationem alibi citra expe-  
rientiam non item formidat : nam is putat  
serè nihilo secius ex suis libris, quàm eni-  
dentibus operibus, instrui experientiam; ita,  
ipso dicente, in omnibus his nos quasi manu  
duxit. Vnus adhuc superest locus, qui  
Hippocratem fortè vitiat. Is autem in  
principio serè scribitur; ubi ex Hippocrate  
omnium malorum causam spiritum reddit.  
nam contrà Hippocrates, primus ordinem  
elementorum ostendit; atque ex horum  
preparatione vel bene vel male affici de-  
monstrauit. verumtamen spiritum subinde  
his malis occasionem præstare, in libello De  
statibus dixit : atque hoc est quod Celsus no-  
ster paràm feliciter accepit.

## CAPVT I.

## Quemadmodum sanos agere conueniat.

**S**ANVS homo, qui & bene valet, & suæ spontis est, nul-  
lis obligare se legibus debet : ac neque medico, neque ia-  
tralipta egere. Hunc oportet varium habere vitæ genus :  
modò ruri esse, modò in vrbe : sæpiusque in agro, nauigare,  
venari,

\* Reuocato-  
res videtur  
transfere  
Plinius lib.  
29. cap. 1.



venari, quiescere interdum, sed frequentius se exercere. Si-  
quidem ignavia corpus hebetat, labor firmat: illa maturam  
senectutem, hic longā adolescentiam reddit. Prodest etiam  
interdum balneo, interdum aquis frigidis uti: modò vngi,  
modò idipsum negligere: nullū cibi genus fugere, quo populus  
vtatur: interdum in conuiuio esse, interdum ab eo se retra-  
here: modò plus iusto, modò non amplius assumere: bis die  
potius, quàm semel cibum capere: & semper quàm pluri-  
mum, dummodo hunc concoquat. Sed vt huius generis ex-  
ercitationes, cibi quē necessarij sunt, sic athletici superuacui.  
Nam & intermissus propter ciuiles aliquas necessitates ordo  
exercitationis corpus affligit: & ea corpora, quæ more eo-  
rum repleta sunt, celerrimè & senescunt, & ægrotant. Con-  
cubitus verò neque nimis concupiscendus, neque nimis per-  
timescendus est. Rarus, corpus excitat, frequens \* soluit.  
Cum autem frequens, non numero sit, sed natura, ratione  
ætatis & corporis scire licet, cum non inutilem esse, quem  
corporis neque languor, neque dolor sequitur. Idem inter-  
diu peior est, noctu tutior: ita tamen, si neque illum cibus,  
neque hunc cum vigilia labor statim sequitur. Hæc firmis  
seruanda sunt, cauendum quē ne in secunda valetudine, ad-  
uersæ præsidia consumantur.

\* resoluit.

*Spicula Chel*  
Paulus Æ-  
gineta li. i.  
ca. 37. Fre-  
quens concu-  
bitus, cor-  
pus rarius,  
frigidius,  
& imbecil-  
lius reddit.

## COMMENTARIA.

SANVS homo nullis se debet obligare  
legibus: sed, vt Hippocrates inquit,  
aliquando ad insueta permutare, propter  
fortunas (commentante Galeno) quæ nobis  
imminis imminet: & vt Celsus noster in  
tertio capite dicit, quia potest incidere labo-  
ris necessitas, non autem laboris tantum: sed  
& multorum aliorum. Ne ergo ex inspe-  
rato nos afficiant, oportet illorum vnum-  
quodque prius in libertate tentare: lubrica  
enim est rerum humanarum conditio. Huc  
quidem Galenus putat respexisse Hippocra-  
tem: ego verò & hunc & Celsum gene-  
ralius aliquid censuisse arbitror. Nam tam-  
etsi nobis semper aqua, libera verò aque lu-

culenta vita possit contingere conditio: in-  
dicarem ego molestum sanitati nostræ idem  
perpetuū vitæ genus: natura enim nostræ  
non vno sed pluribus est constituta elemen-  
tis; unde quandam mediocritatem obtinet.  
vni autem viuendi generi, non nisi vnum  
dominatur elementum: quare periculum est,  
ne vitæ similitudo prius satis hoc ipsum ele-  
mentum ultra alia efferat, ac mediocritatem  
corporis nostri tollat. Non ergo voluptas in  
varietate tantum est sita, vt vulgo dici-  
tur: sed & sanitas. Oportet autem hanc  
varietatem & in aliis capere, non tantum  
in cibo ac potu. nam aer nihilo minus corpus  
nostrum immutat, quàm vitæ illorum.

C

Igitur



Igitur tamen si pestilens aer aut aliter corruptus nunquam non sit fugiendus: tamen non semper rusticum, sed & urbanum subire salubre est. etenim hic crassus, ille vero tenuis, atque uterque suo more corpus afficit. Quapropter ne ex altero illorum periculum impendat; inimicem nunc hunc, nunc illum, magis autem rusticum eligere oportet. Sic interdum bis, interdum semel comedere, aliquando ientari, aliquando omittere, tum propter alia, tum ut defectus si quis ante fuit reponatur: & præterea è contrario, si qua fuit cruditas, abstinentia emendetur; ut etiam importunitate agritudinis, (cuius paroxysmus aliquando manet cibum, aliquando in prandio, interim in cena reformidat, amatur) prauideas, ac cibum ut morlus exigit, quocunque tempore melius ferat. Nam si quis per sanitatem præter consuetudinem ientaculum non ferat; quomodo id ipsum in morbo tolerabit? Semper tamen, inquit, quamplurimum cibum prodest sumere, dummodo hunc concoquat: quoniam minor est error plenitudinis, quam parcimonie quippe, quod vulgo dicitur, Natura paucis contenta est, ut & id ipsum verissimum est; ita dumtaxat quod ultra vires concoctricis est, redarguit. Eò spectat quod ab Hippocrate dicitur, Vesci citra satietatem, seruare semen genitale, atque impigrum esse ad laborem, esse ex maxime salubribus. Sic & intelligitur id quod postea ab auctore nostro dicitur, ubi ad cibum ventum est, nunquam est utilis nimia satietas. Atque hæc de vicissitudine cibi ipsius. Neque minus exercitium ipsum variare oportet, ut nulla sit pars qua relinquatur ociosa. Veruntamen athletica illa atque violenta exercitia non laudat. Redarguit verò eadem ante hunc Hippocrates. de quibus quia in primo Aphorismorum libro diximus, nunc super sedemus. Eandem mediocritatem & in Venere obseruare oportet: non enim minima sunt accidentia, qua reterentur semen sequuntur; quippe calor naturalis, ab illius copia facile strangulatur: quamvis is qui breuiter ratiocinatur, non libenter ista semini tanquam calido accepta

ferret. Qua verò incommoda sequantur profusam Venerem, quotidiana ostendit experientia, podagra, cheragra, atque vniuersum genus malorum, præsertim articulorum: quippe spiritus in ipsa frustra it, in quo plurima vite nostra portio, ac ferè tota est. atque alius quidem magis, alius minus Venerem tolerat: verum quam mens rectior, somnus iocundior, atque appetitus melior insequitur, generatim bona est; quemadmodum contra mala, quam dolor capitis euident excipit, corporis mollicies, aut flaccidus aliquis languor: nam hæc plus satis spirituum detrimentum consequuntur. multis etiam melius feritur à primo somno ac noctu, quam interdiu ab ipsa vigilia. Spiritus satis magnam patitur iacturam, tamen si ex Venere non accedit secunda. A primo autem somno, ut cruditatis ferè in ventre nullum est periculum; ita si qua subit lassitudo, per sequentem somnum recreatur. nam si Venerem à somno statim labor accipiat, nihil melior est, quam qua interdiu admittitur; sed quam cito statim sequitur: quantum enim spiritus cibo statim recreantur, proportio ostendit corporis, si idem à cibo, & ante cibum expendas. Sed vel citra hoc, omnes sentientes nobis, à cibo finis leniores. Bene ergo se habet senis Hippocratis oratio atque ordo: Labor, cibus, potus, somnus, Venus; omnia mediocritate. Secundum hunc ordinem, si suam narrationem digessisset noster Cornelius, paulo fuisset breuior, atque clarior. Huiusmodi ergo observatio integris atque firmis corporibus satis est. neque enim medico ager, neque chyrurgo quem forte aliptam vocant: nam contra nihil magis cavendum, quam ut præsidia aduersa valetudinis, magna scilicet illa auxilia purgatio & phlebotomia, consumantur. in prospera etenim corpus colligant, atque effeminant, non autem firmant: quamvis hodie quibusdam aliter videtur non sine maximo hominum detrimento. Melius vulgares sentire dices, qui per sanitatem phlebotomia cavent, ut tempore agritudinis (ita enim illos audies dicere) admissa præsentis cōferat ad quorū forte opinionem, licet vulgare, nūc allusit Celsus.

CAPVT



## CAPVT II.

*Quæ stomacho imbecilli seruanda sint.*

**A**T imbecillis stomacho (quo in numero magna pars  
 vrbanoꝝ, omnesqꝛ penè cupidi litterarum sunt)  
 obseruatio maior necessaria est: vt quod vel corporis, vel loci,  
 vel studij ratio detrahit, cura restituat. Ex his igitur qui bene  
 concoxit, manè tutò surget: qui parum, quiescere debet: &  
 si manè surgendi necessitas fuerit, redormire. Qui non con-  
 coxit, ex toto conquiescere, ac neque labori se, neque exer-  
 citationi, neque negotio credere. Qui crudum sine præcor-  
 diorum dolore ructat, is ex interuallo aquam frigidam bibe-  
 re, & se nihilominus continere. Habitare verò ædificio lu-  
 cido, \* per statum æstiuum hibernum solem habente, cauere  
 meridianum solem, matutinum & vespertinum frigus, item-  
 que auras fluminum, atque stagnorum, minimeque nubilo  
 cælo, soli aperiendi se committere, ne modò frigus, modò ca-  
 lor moueat. Quæ res maximè grauedines, distillationesque  
 concitat. Magis verò grauibꝛ locis ista seruanda sunt, in qui-  
 bus etiam pestilentiam faciunt. Scire autem licet, integrum  
 corpus esse, cùm quotidie manè vrina alba, dein ruffa est.  
 Illud concoquere, hoc concoxisse significat. Vbi expectatus  
 est aliquis, paulū intermittere, deinde (nisi hiems est) fouere  
 os multa aqua frigida debet, longis diebus meridiari potius  
 ante cibum, sin minus, post eum: per hiemem potissimum  
 totis noctibus conquiescere. Sin lucubrandum est, non post  
 cibum id facere, sed post concoctionem. Quem interdū  
 vel domestica, vel ciuilia officia tenuerunt, huic tempus ali-  
 quod seruandum curationi corporis sui est. Prima autem  
 eius curatio exercitatio est, quæ semper antecederè cibum  
 debet: in eo, qui minus laborauit, & bene concoxit, amplior:  
 in eo, qui fatigatus est, & minus concoxit, remissior. Com-  
 modè verò exercent, clara lectio, arma, pila, cursus, ambula-  
 tio, atque hæc non vtique plana commodior est. Siquidem  
 melius ascensus quoque & descensus cum quadam varietate

\* perfato,  
 æst. hiber-  
 numque

Exercita-  
 tio.



*In sole, si caret non  
to, ambulat nubes*

*Phn lib 3.  
epist: pri.*

*Lassitudo  
est graui-  
tas corpo-  
ris. Virgil.  
Lassoue  
papaueru  
collo qua  
etiam citra  
labore ac-  
cidit.*

*Fatigatio-  
nem verò  
nimietatē  
laboris in-  
telligimus.  
idem: Velo-  
ces iaculo  
cernos cur-  
susq; sati-  
gat quod  
mox immo-  
dicū labo-  
rem appel-  
lauit. Verū*

*de generi-  
bus lassitu-  
dinis legen-  
dus est lib.  
3. Galeni  
de Sanitate  
tuenda.*

corpus \*moueat, nisi tamen id perquam imbecillum est. Me-  
lior autem est sub diuo, quàm in porticu: melior (si caput pa-  
titur) in sole, quàm in vmbra: melior in vmbra, quàm parie-  
tes, aut viridaria efficiunt, quàm quæ tecto subest: melior  
recta, quàm flexuosa. Exercitationis autem plerunque finis  
esse debet sudor, aut certè lassitudo, quæ citra fatigationem  
sit, idque ipsum, modò minus, modò magis faciendum est.  
Ac ne his quidem Athletarum exemplo, vel certa esse lex, vel  
immodicus esse labor debet. Exercitationem rectè sequitur,  
modò vinctio, vel in sole, vel ad ignem; modò balneum, sed  
in conclau quàm maximè & alto, & lucido, & spatiofo. Ex  
his verò neutrum \*sæpe fieri oportet, sed sapius alterutrum  
pro corporis natura. Post hæc paulum conquiescere opus est.  
Vbi ad cibum ventum est, nunquam utilis est nimia satietas.  
Sæpe etiam inutilis nimia abstinentia. Sæpe si qua intempe-  
rantia subest, \*durior est in potione, quàm in esca. Cibus à  
falsamentis, oleribus, similibusque rebus melius incipit. Tum  
caro assumenda est, quæ assa optima, aut elixa est. Condita  
omnia duabus de causis inutilia sunt, quonià & plus propter  
dulcedinem assumitur, & quod \*modò par est, tamen ægrius  
concoquitur. Secunda mensa bono stomacho nihil nocet,  
in imbecillo coacescit. Si quis itaque hoc parum valet, pal-  
mulas pomaque & similia melius primo cibo assumit. Post  
multas potiones, quæ aliquantum sitim excesserunt, nihil  
edendum est; post satietatem, nihil agendum. Vbi expletus  
est aliquis, facilius concoquit, si quicquid assumpsit potione  
aquæ frigidæ includit, tum paulisper inuigilat, deinde bene  
dormit. Si quis interdiu se impleuit, post cibum neque fri-  
gori, neque æstui, neq. labori se debet committere. Neque  
enim tam facile hæc inani corpore quàm repleto nocent. Si  
quibus de causis futura inedia est, labor omnis vitandus est.

\* mouet,

\*semper

\*tutior  
Cibus

\*modò  
paruum

#### COMMENTARIA.

PRÆSTITERAT qua hic de medica-  
tione stomachi dicit, ad octauum caput  
transfere, quoniam hæc extra primam ra-  
tionem salutem est contemplatio: nihil  
secus fortassis, quia & iis qui stomacho la-  
borant, atque aliis qui citra querelam sani  
sunt, eadem somni ratio congruit, cū iis il-  
los simul perstrinxit, etenim hactenus omni-  
bus



bus dormiendum est, donec perfecta fuerit in ventre concoctio: nam ea qua in hepate fit, non ita admodum multum somnum requirit; ferè autem prima concoctio spatio septem horarum perficitur. Itaque non temerè, sed & eadem ratione, licet pauci fiant, in mediocri natura somnus mediocris tot horarum expenditur. Quòd si ultra differatur concoctio; & somnum amplius promovere oportet: neque ad hoc tu multum studere debes, nam vel ultro ferè longitudo somni diuturnitatem concoctionis imitatur. etenim non antè ferè vapor in cerebro diffunditur, qui vigilias moratur; quàm concoctio in stomacho perfecta fuerit. Quòd si non satis ex somno victus concoctionem assequatur (ut ex rusticis est deprehendere;) aquam frigidam libere quidem debet; modò lenius tantum malum fit, ac sine dolore. iam nunc contractum etenim frigida stomachum indensat, ac calorem naturalem congregat, ut postmodum dicemus. Neque iam obambulandum est, etiamsi nullum somnum speres: sed saltem quiescendum, quia motus omnis concoctionem distrahit; de quo inferius. nam nunc fortè magis quispiam requireret causam, cur (asserente in principio Celsò) studiosi literarum stomacho minus valeant. non enim ex studiis tantum hoc illis accidit; sed felicioribus ingeniis innatum est: quia hæc spiritus subtilitate gaudent; qua cum corporis robore raro coniungitur.

### Habitare verò ædificio, &c.

TAMETSÌ ab hoc in illum aërē, atq. è conuerso, aliquando transeundum sit; tamen magna ex parte, aër perlucidus atque purus captandus est atque hæc definitio in omni varietate audienda est. Ergo domicilium iam hieme quàm æstate ab ipso sole bene dissilabile habere oportet. Quia autem omnis excessus cauendus est, meridianum in æstate sol; vespertinum ac matutinum frigus in hieme formidandum est. quoniam unumquodque istorum excellenter corpus afficit: & quod magis miraberis, etiam aër cui flumina (paludes enim & stagna volens emitte) subiacent, inidoneus est. grauiissimus

tamen, qui inæqualis (modò frigidus, modò calidus) est; nam hic propemodum pestilens est, si diutius duret: nec tamen quantumcunq. diutius sit, discrimine vacat; quoniam distillationes sine catarrhos promptissimè mouet. caliditas enim attrahit; frigiditas expulsiuit. Itaque minime se committere oportet soli sese aperiendi per nubilum cælum: quoniam in huiusmodi constitutione maxime prædicta inæqualitas deprehenditur.

### Vbi experrectus est aliquis.

MIRABITVR quispiā fortasse cur æstate (nam hiemem excipit) aqua frigida os fouere moneat: nam, ut nequam aliquis conuitiabitur, tantum ad abluionem, (quemadmodum Quintus ille dicebat de calido) spectare videtur. Re verà autem plurimum confert corroboranda universo cerebro, atque deinceps cunctis sensibus; dum spiritus, quibus animales operationes obveniunt, cogit atq. in unum contrahit. unde & oculis præsentissimum remedium putauit Ægineta, illos manè aqua frigida imbuiere. Nimis autem nosler Celsus indulgens est, dum meridianum in æstate concedit; nam nisi nocturnus somnus iusto breuior fuerit, omnino admittendus non est. nec fortè simpliciter consulit, sed potius ante cibum quàm post cibum admittit, si qui sint qui alterum pertinaciter facere velit. Habet autem id ex Hippocrate, ut multa alia. quanquam tu mirari non desines, quum potius post cibum, quàm ante illum, natura prima somnum instituisse videtur; nisi longè nostra ab illa discesserit, aut degenerauerit: nam pauci ante cibum, multi verò post ipsum ultro dormiunt. Re vera tamen tam breui somno citius potius corrumpitur, quàm concoquitur; ante illum forsàn defectum restituit, & corpus tantum leniter infigidat & humectat: idque non semel in hoc libro. sed pluries somnum à cibo redarguit; nouissimè autem in peste. Nec secus, cum Hippocrate, in libro De victu priuatorum, exercitium à cibo reformidat. Cui quid respondendum nescio; qui exercitium concoctioni conferre dicunt; atque ob id prandium quàm liberassimum



sumum accipiunt, bis etenim peccant: & quod plenius prandium quam cenam describunt; & secundo quod motum permittunt. Dixit enim praesens autor, ne lucubrandum quidem esse ante concoctionem: non enim contemnendum est literarum studium; nam cerebrum atque spiritus maxime ad se rapit, atque exercet, quos melius erat ad concoctionem concurrere. Nunquid ergo à meridie perpetuo feriandum est? nequaquam. sed more antiquorum philosophorum, qui non nisi mel ex pane lingeant, in prandio lenissimum aliquod gustandum est, quod non multam concoctionem desideret: reliquum facile cena suppletur, in qua si quid peccatum fuerit, citra distractionem negotiorum nostrorum facile somnus emendabit. Quod autem in habitu corporis relictum est; hoc promptè matutina disiciet exercitatio, balneum, frictio: in quibus antiqui totam ferè curam curationem collocaverunt; à quibus nos duntaxat proverbium ad ventrem accommodamus. Quovisque autem exercitium fieri debeat, contendunt adhuc neoterici. quidam usque ad lassitudinem; quidam citra fieri volunt. Qui si nostrum autorem, potius quam barbaros, amassent, nunquam in ea re tam diu hæsissent, nam is paucissimis verbis tantam absolvit disputationem; dicens: Exercitationis autem plerumque finis esse debet sudor, aut certè lassitudo, quæ citra defatigationem sit. Quippe lassitudo spiritum nonnihil exolvit, fatigatio etiam plus satis corpus incalfacit & exiccat. Et tamen Galenus in libro De sanitate tuenda, lassitudinem cauet. Verum hæc de nomine tantum est controversia; Galeno, aut potius eius interprete, lassitudinem reddente quod Celsus fatigationem appellat. Quod quum neoterici non intelligant, de rebus etiam dubitare ceperunt. sed hæc latius in secundo Aphorismorum. Diligens autem fuit nosster Latinus Hippocrates: qui non tantum discrimina exercitationis scripsit; sed ipsius aeris quoque, sub quo exercendum voluit. Vnum omnium eorum caput est, ut sit aer maxime illustris: nã & qui in vridarius est, magis dissipatur,

quàm qui in porticu est. Solem tamen meridiano, ac omnem aerem ferventem vitare oportet.

### Vbi ad cibum ventum est.

NUNQUAM per se utilis nimia satietas: nisi scilicet vomitu corpus expurgare velis; de quo postea. nam & hic fortè melius aliis quibusdam pronocantibus, quàm ebrietate, provocatur aut crapula. Panci verò intellexerunt quod sequitur. neque enim dubium est, quin immodica quantitas cibi molestior sit corpori quàm potus. Nam eo alludit quod vulgo dicitur, Omnis repletio mala; panis autem pessima. Atque hæcenus illud verum est: non tamen ex omni parte, ut post dicemus. & si quàm verissimum esset, non tamen hunc locum redarguit: quia Celsus qualitatem, non autem quantitatem, potus ac cibi inter sese æstimavit. dubium enim non est, quin in potu peior sit intemperies, quàm in cibo: quippe intemperamenta cibi stomachus ferè rerundit; quoniam primò illorum fert iniurias, dum diutius in eo morantur. At potus facillimè è ventre fluctuat, atque internis visceribus qualitas illius sese promptè insinuat; etiam cordi: quod nisi patitur, vita non interit. Exemplo Socrates est, qui tum primùm mortem sensit, quum, eo dicente, vis cicuta ad cor pervenit. Hæc ferè ratione, (& quod quidam perhibent) vinum lympharum promptius infigidat, quàm ipsa aqua.

### Cibus à falfamentis, oleribus.

PRIMAM partem mensa sibi vendicant quæ ventrem movent. Talia sunt, inscula salsa, & pinguis. neque enim vis hæcenus credere oportet, qui exhibituri insculum aliquod ad emolliendum ventrem, insulsum ac macilentum propinant. Ferendi erant neoterici, si hac ratione & carnes salas apponerent, & cerenissimæ. Verum dum illarum cruditatem timent, dum vini caliditatem formidant; nostram excitationem adimunt. Et re verà, prout hodie assumuntur falfamenta illa rudia ac cerenissima, melius in sinum referuntur. quemadmodum & aqua. Quod autem



antem Cornelius Celsus per salsamenta potius colymbades & similia intellexit, quæ antiquis ad primam veniebant mensam; ex eo astringitur quod post hæc dicit: Tum caro assumenda est quæ assa optima aut elixa est: nam frigida exuicis est. Elixæ autem assumetur à siccis; assa ab humidis: quod elixa multo humidior sit, non enim eos amplius audire oportet, qui dicunt assa succo interno; elixa magis externo succulenta. Quorsum enim iis ambagibus vii oportet, quum elixa absolute multo melius humectent, ut patet ex Hippocrate de victu idiotarum. Conditæ antiqui medici ferè nominare solebant, quæ vulgo Hippocratica appellantur. nunc vero conditæ, hoc est carnes conditæ variis aromatibus, damnat, ac post illum de sanitæ tuenda redarguit Galenus: non solum quia auidiùs assumuntur; sed quia, ut nosse Celsus dicit, etiam difficiliùs concoquuntur. Nam & hoc attestatur Galenus, quod egrius multo huiusmodi concoquuntur aromata, quàm ipsa caro: quoniam rudis ferè est horum substantia, quæ plus negotij ipsa carne exhibet: sicut & omnis alia herba etiam calida, quamquam rudis aliquis hæc, & similia ad carniùm concoctionem multum momenti habere putet. Atque hæc sunt duæ partes primæ mensæ: secundam, quæ ex bellariis & (ut apparet) tempore auctoris, non secus quàm nostro, ex fructibus & pomis fieri solet, meritò redarguit: nam nisi fortunatum stomachum invenerint, quadam acescunt, alia etiam vilesunt. Itaque & quivis alius, & præsertim qui malè solido stomacho præditus est, potius ea ad primam mensam referet: nam & ibi quidem commoditatem quandam obtinent: & dum ventrem movent, nihil illorum dulcedinem in parva quantitate veriti, quod multis hodie supersticiosè formidant. Committitur autem & alius in sine error ab iis qui de poculis certant: nam veriti ut copia vini illis officiat, studio etiam caseum adiciunt; quasi hoc modo illius excessum temperent, ac contra bis delinquant, atq. dupliciter naturam affligunt: hoc est quod dicit, post multas potiones edendum non

est: nam cibus hic in ventre fluctuabit, nihil priori peccato conferens. Neq. post multum cibum aliud superbire expedit: nisi forte aut aquam frigidam, aut cerenissimam adbibas; nam nihil segnius quàm caseus, aut aliquid astringens, stomachum roborat: adducitq. non minimum ad concoctionem, atque somnum momentum. Nam stomachum cibum completi est necessarium, si modò bene concoctus sit. sed neque tam multus vapor ad caput fertur, dum totus cibus frigida includitur. Quantum autem is vapor somnum aliquando interturbet, pueri exemplo sunt; qui ratione illius sæpe excitantur atque turbantur insomniis. nam & viri multi hac ratione à potu vini & brevius dormiunt & insuavius. Rectè ergo & consentaneè cum Galeno alibi à nostro auctore idipsum dictum est, quod totum quod assumptum est, frigida portione includere salubre est.

### Si quis interdiu se implevit.

QVAM difficile feratur immodicū prandium, ex hoc loco manifestum est, ubi inquit post satietatem nihil agendum. Durior tamen sermo apparet quem subiicit: Neque enim tam facile hæc inani quàm repleto nocent corpori: nam corpus pleno ventre melius videtur perferre frigus, quàm inani. Igitur per inane corpus moderatum intelligere oportet, ac mediocre: quod respectu cibi, quod admodum repletum est, inane dicitur, qualem in aliis commentationem & Galenus aliquando in Hippocrate exquirat. Mihi autem melius apparet audire ipsum sermonem simpliciter. non enim (quamvis alius putet) per immodicum alimentum quod concoqui non nisi longo tempore potest, natura ab iniuriis frigoris protegitur; sed aliqua ex parte strangulatur: quapropter eo tempore in mediam melius ferret; nam hæc nulla ex parte calorem suffocat. Optimum autem sub huiusmodi frigore mediocria esse: nam ex iis natura non opprimitur, sed spiritus recreatur non minimum, caloris natini habitaculum. Quod autem labor potius pleno quàm inaniro noceat, ante sæpe dictum est. De



est. De aestu quoque cum frigore, eadem est ratio, natura enim lenius unum, quam duo, tolerat incommoda. eadem ratione labor prohibetur sub inedia. Nec pugnant haec cum priori sententia: nam aliud est inanitum esse, ac foridè ieiunum; aliud longa laborare inedia. Accepit autem Celsus hanc mutandam ab Hippocrate sententiam, Vbi fames laborandum non est, quam quia in secundo Aphorismo multum illustrauimus, nunc omittimus.

## CAPVT III.

*Observationes quaedam prout res nouae accidunt,  
& prout corporum genera, & sexus, &  
ætates, & tempora anni sunt.*

ATQUE haec quidem pæne perpetua sunt. Quasdam autem observationes desiderant & nouae res, & corporum genera, & sexus, & ætates, & tempora anni. Nam neque ex salubri loco in grauem, neque ex graui in salubrem transitus satis tutus est. Ex salubri in grauem prima hieme: ex graui in eum, qui salubris est, prima ætate transire melius est. Neque verò ex multa fame, nimia satietas: neque ex nimia satietate, fames idonea est. Periclitaturque & qui semel, & qui bis die cibum incontinenter, contra consuetudinem assumit. Item neque ex nimio labore subitum ocium, neque ex nimio ocio subitus labor sine graui noxa est. Ergo cum quis mutare aliquid volet, paulatim debet assuescere. Omnem etiam laborem facilius, vel puer, vel senex, quam infuetus homo sustinet. Atque ideo quoque nimis otiosa vita utilis non est, quia potest incidere laboris necessitas. Si quando tamen infuetus aliquis laborauit, aut multo plus quam solet, etiam is qui assuevit, huic ieiunio dormiendum est, multo magis, si etiam os amarum est, vel oculi caligant, aut venter perturbatur. Tum enim non dormiendum tantummodo ieiunio est, sed etiam in posterum diem permanendum, nisi citò id quies sustulit. Quod si factum est, surgere oportet, & lentè paululum ambulare. At si somni necessitas non fuit, quia modicè magis aliquis laborauit, tamen ingredi aliquid eodem modo debet. Communia deinde omnibus sunt post fatigationem cibum sumpturis, ubi paulum

*Puer.  
Senex.  
Homo.  
Puer. accit.  
Senex. laboris ni  
ciuitus, ut qua  
pot. incidere et  
legenda puto.*

\* aliquan-  
tum



lum deambulauerunt, si balneum non est, calido loco, vel in sole, vel ad ignem vngi, atque sudare: si est, ante omnia in tepidario residere, deinde vbi paulum conquieuerunt, intrare, & descendere in solium, tum multo oleo vngi, leniterque perfricari, interdum in solium descendere. Post hæc os aqua calida fouere, deinde frigida. Balneum his feruens idoneum non est. Ergo si nimium alicui fatigato parè febris est, huic abunde est loco tepido demittere se inguinibus tenus in aquam calidam, cui paulum olei adiectum sit: deinde totum quidem corpus, maximè tamen eas partes, quæ in aqua fuerunt, leniter perfricare ex oleo, cui vinum, & paulum contriti salis sit adiectum. Post hæc, omnibus fatigatis, aptum est cibum sumere, coque humido vt: aqua, vel certè diluta portione esse contentos, maximeque ea quæ moueat vrinam. Illud quoque nosse oportet, quòd ex labore sudanti, frigida potio perniciosissima est, atque etiam (cùm sudor se remisit) itinere fatigatis inutilis. A balneo quoque venientibus Asclepiades inutilem eam iudicauit. Quod in his verum est, quibus alius facilè, nec tutò resoluitur, qui que facilè inhorrescunt. Perpetuum in omnibus non est, cùm potiùs naturale sit, portione æstuantem stomachum refrigerari, frigentem caleferi. Quod ita præcipio, vt tamen fatear, ne ex hac quidem causa sudanti adhuc \* frigidum bibendum esse. Soler etiam prodesse, post varium cibum, frequentesque dilutas portiones, vomitus, & postero die longa quies, deinde modica exercitatio. Si assidua fatigatio vrget, in vicem modò aqua, modò vinum bibendum est, raroque balneo vtendum. Leuatque lassitudinem etiam laboris mutatio, eumque quem nouum genus \* eiusdem laboris pressit (id quod in consuetudine est) reficit. Fatigato quotidianum cubile tutissimum est, insolitum contra lassat. Quod enim contra consuetudinem est, nocet, seu molle, seu durum est. Propriè quædam ad eum pertinent, qui ambulando fatigatur: hunc reficit in ipso quoque itinere frequens frictio, post iter, primum sedile, deinde vinctio, tum calida aqua in balneo magis superiores partes, quam inferiores foueat. Si quis verò exustus in sole est, huic

\* frigidam  
bibendam  
esse.

\* eiusdem

D

in bal-

\* super  
\* eū q. p.  
o. e. in b.  
p. in o.  
lutum

in balneum protinus eundum est, perfundendumque oleo corpus & caput, deinde in solium bene calidum descendendum est, cum multa aqua \* per caput infundenda, prius calida, deinde frigida. At \* ei qui perfrixit, opus est balneo primum inuoluto sedere donec insudet, tum vngi, deinde lauari, cibum modicum, deinde potiones meracas assumere. Is verò qui nauigabit, & nausea pressus est, si multam bilem euomit, vel abstinere cibo debet, vel paululum aliquid assumere. Si pituitam acidam effudit, vtrique sumere cibum, sed assueti leuiorem: si sine vomitu nausea fuit, vel abstinere, vel post cibum vomere. Qui verò toto die, vel in vehiculo, vel in spectaculis sedit, huic nihil currendum, sed lentè ambulandum est. Lenta quoque in balneo mora, dein cœna exigua prodesse consueuerunt. Si quis in balneo æstuat, reficit hunc ore exceptum, & in eo retentum acetum. Si id non est, eodem modo frigida aqua assumpta. Ante omnia autem norit quisque naturam sui corporis: quoniam alij graciles, alij obesi sunt, alij calidi, alij frigidiores, alij humidi, alij sicci, alios astricta, alios resoluta aluus exercet. Rarò quisquam, non aliquam partem corporis imbecillam habet. Tenuis verò homo implere se debet, plenus extenuare: calidus refrigerare, frigidus calefacere: madens siccare, siccus madefacere: itemque aluum firmare is, cui fusa; soluere is, cui astricta est. Succurrendumque semper parti maximè laboranti est. Implet autem corpus modica exercitatio, frequentior quies, vinctio: & si post prandium est balneum, contracta aluus, modicum frigus hieme, somnus & plenus & non nimis longus, molle cubile, animi securitas, assumpta per cibos & potiones maximè dulcia & pingua, cibus & frequentior, & quantus plenissimus potest concoqui. Extenuat corpus aqua calida, si quis in eam descendit, magisque si salsa est, in ieiunio balneum, inurens sol, & omnis calor, cura, vigilia, somnus nimium vel brevis, vel longus, lectus per æstatem terra, hieme durum cubile, cursus, multa ambulatio, omnisque vehemens exercitatio, vomitus, deiectio, acidæ res & austeræ, & semel die assumptæ epulæ, & vini non perfrigidi potio ieiunio in consuetudi-



suetudinem adducta. Cum verò inter extenuantia posuerim vomitum, & deiectionem, de his quoque propria quædam dicenda sunt. \* Electum esse ab Atclepiade vomitum in eo volumine, quod De tuenda sanitate composuit, video, neque reprehendo, si offensus eorum est consuetudine, qui quotidie eiiciendo vorandi facultatem moluntur. Paulò etiam longius processit. Idem purgationes quoque eodem volumine expulit. Et sunt hæc perniciosæ, si nimis valentibus medicamentis fiunt. Sub hæc tamen submouenda esse non est perpetuum, quia corporum temporumque ratio potest ea facere necessaria, dum & modo, & non nisi cum opus est, adhibeantur. Ergo ille quoque ipse, si quid iam corruptum esset, expelli debere confessus est. Ita non ex toto res condemnanda est. Sed esse eius etiam plures causæ possunt, estque in ea quædam paulo subtilior observatio adhibenda. Vomitum vtilior est hieme, quàm æstate. Nam tum & pituita plus, & capitis grauitas maior subest. Inutilis est gracilibus, & imbecillum stomachum habentibus. Vtilis est plenis & biliosis omnibus, si vel nimium se replerunt, vel parum concoxerunt. Nam siue plusest, quàm quod concoqui possit, periclitari ne corrumpatur, non oportet. Si verò corruptum est, nihil commodius est, quàm id, qua via primùm expelli potest, eiicere. Itaque vbi amari ructus cum dolore & grauitate præcordiorum sunt, ad hunc protinus confugiendum est. \* Item prodest ei, cui pectus æstuat, & frequens saliuæ, vel nausea est, aut cui sonant aures, aut madent oculi, aut os amarum est. Similiterque ei, qui vel cælum vel locum mutat hisque quibus (si per plures dies non vomuerunt) dolor præcordia infestat. Neque ignoro inter hæc præcipi quietem, quæ non semper contingere potest agendi necessitatem habentibus, nec in omnibus idem facit. Itaque istud luxuriæ causa fieri non oportere confiteor. Interdum valetudinis causa recte fieri, experimentis credo. Commoneo tamen, ne quis, qui valere, & senescere volet, hoc quotidianum habeat. Qui vomere post cibum volet, si ex facili facit, aquam tanquam tepidam antè debet assumere: si difficilior, aquæ vel salis, vel mellis paulum

Vomitum.

• Reiectū

\* Idem

D 2

paulum



*Provacat  
sia vomit  
tuna.*

paulum adiacere. At qui manè vomiturus est, antè bibere mulsum, vel hyssopum, aut esse radiculam debet, deinde aquam tepidam, ut suprà scriptum est, bibere. Cætera, quæ antiqui medici præceperunt, stomachum omnia infestant. Post vomitum (si stomachus infirmus est) paululum cibi sed huius idonei, gustandum, & aquæ frigida cyathi tres bibendi sunt. Si autem vomitus fauces exasperavit, qui vomit (si manè id fecit) ambulare debet, tum vngi, deinde cœnare. Si post cœnam, postero die lauari, & in balneo sudare, hinc proximus tibus, mediocris utilis est, utque esse debet cum pane hesterno, vino austero, meraco, & carne assa, cibique omnibus quàm siccissimis. Qui vomere bis in mense vult, melius consulat, si biduo continuerit, quàm si post quintum decimum diem vomuerit, nisi hæc mora gravitatem pectori faciet. Deiectione autem medicamento quoque petenda est, ubi venter suppressus parum reddit, ex eoque inflammationes, caligines, capitis dolores, aliaque superioris partis mala increpant. Quid enim inter hæc adiuuare possunt quies & inedia, quæ per illa maximè eueniunt? Qui eicere vult, primum cibis, vinisque utetur his, quæ hoc præstant. Dehinc si parum illa proficiant, aloën sumat. Sed purgationes quoque ut interdum necessariae sunt, sic ubi frequentes sunt, periculum afferunt. Assuescit enim non ali corpus, & ob hoc infirmum erit, cum omnibus morbis obnoxia maximè infirmitas sit. Calefacit autem vinctio, aqua salia, magisque si calida est, omnia salia, amara, carnosâ, si post cibum est balneum, vinum austerrum: refrigerat in ieiunio & balneum, & somnus, nisi nimis longus est, & omnia acida, aqua quàm frigidissima, oleum si aquæ misceatur. Humidum autem corpus efficit labor \* maior, quàm ex consuetudine, frequens balneum, cibus plenior, multa potio, post hæc ambulatio, & vigilia: per se quoque ambulatio multa, & vehemens, & matutina exercitatio, & non protinus cibus adiectus, ea genera esse quæ veniunt ex locis frigidis, & pluviis, & irriguis. Contra siccat, \* modica exercitatio, fames, vinctio sine aqua, color, sol \* modicus, frigida aqua, cibus exercitationi statim subiectus,

*Deiectione.*

*Purgationes.*

*\* alia, minor,*

*\* alia, immodica  
\* alia, immodicus,*



iectus, & is ipse ex siccis & æstuosis locis veniens. Aluum  
 astringit labor, sedile, creta figularis corpori illita, cibus im-  
 minutus, & is ipse semel die assumptus ab eo, qui bis solet:  
 exigua potio, neque adhibita, nisi cum cibi quis quantum  
 assumpturus est, cepit: post cibum quies. Contra soluit, aucta  
 ambulatio atque esca, post motus qui post cibum est, subinde  
 potiones cibo immixtae. Illud quoque scire oportet, quod  
 ventrem vomitus solutum comprimit, compressum soluit.  
 Itemque comprimit is vomitus, qui statim post cibum est:  
 soluit is, qui tardè superuenit. Quod ad ætates verò pertinet,  
 inedia facillimè sustinet medix ætates, minus iuvenes, mi-  
 nimè pueri, & senectute confecti. Quo minus fert facile quis-  
 que, eo sapius debet cibum assumere, maximeque eo eget,  
 qui increfcit. Calida lauatio, & pueris & senibus apta est. Vi-  
 num dilutius pueris, senibus meracius, neutri ætati quæ infla-  
 tiones mouent. Iuuenum minus, quæ assumant, & quomo-  
 do curentur interest. Quibus iuuenibus fluxit aluus, plerun-  
 que in senectute contrahitur: quibus in adolescentia fuit astri-  
 cta, sæpe in senectute soluitur. Melior est autem in iuvene  
 fusior, in sene astrictior. Tempus quoque anni considerare  
 oportet. Hieme plus esse conuenit: minus, sed meracius bi-  
 bere: multo pane uti, carne potius \*clixa, modicè oleribus;  
 semel die cibum capere, nisi si nimis venter astrictus est. Si  
 prander aliquis, vtilius est exiguum aliquid, & ipsum siccum  
 sine carne, sine potione sumere. Eo tempore anni calidis  
 omnibus potius vtendum est, vel calorem mouentibus. Ve-  
 nus tum non æquè perniciofa est. At vere paulum cibo de-  
 mendum, adiiciendumque potioni, sed dilutius tamen bi-  
 bendum est: magis carne vtendum, magis oleribus: trans-  
 eundum paulatim ad assa ab elixis. Venus eo tempore anni  
 tutissima est. Æstate verò & potione & cibo corpus sapius  
 eget. Ideo prandere quoque commodum est. Eo tempore  
 aptissima sunt, & caro, & olus, potio quàm dilutissima, vt &  
 sitim tollat, nec corpus incendat, frigida lauatio, caro \*assa, fri-  
 gidi cibi, vel qui refrigerent. Vt sapius autem cibo vtendum,  
 sic exiguo est. Per autumnum propter cæli varietatem peri-  
 culum

culum maximum est. Itaque neque sine veste, neque sine calceamentis prodire oportet, præcipueque diebus frigidioribus: neque sub dio nocte dormire, aut certè bene operiri. Cibo verò iam paulo pleniore uti licet: minus, sed meracius bibere. Poma nocere quidam putant, quæ immodicè toto die plerunque sic assumuntur, \* nequid ex densiore cibo remittatur. Ita non hæc, sed consummatio omnium nocet. Ex quibus in nullo tamen minus, quàm in his noxæ est. Sed his uti non sæpius, quàm alio cibo convenit. Denique aliquid densiori cibo, cum id accedit, necessarium est demi. Neque æstate verò, neque autumno utilis Venus est. Tolerabilior tamen per autumnum: æstate verò in totum, si fieri potest, abstinendum.

\* ut ne q.

#### COMMENTARIA.

**Q**UAM difficiles sint corpori subita mutationes, in Aphorismis Hippocratis ostendimus. Neque difficile est uniusque mutationi sua mala subscribere; sine ex subito otio in laborem assurgas, sine ex fatietate diuturna in abstinentiam, sine è contravio transeat. Nam & qui præter consuetudinem ieiunant, ventriculo gravantur. nec proderit si tantillum aut sequenti praudio, aut præterita cæna detraxeris: sæpe magis oberis, dum suo tempore alimentum subtrahis; fortè enim præ desiderio soliti alimenti inflammabitur. omitto quod tenuem illam quantitatem forsitan venter assuetus pluribus, contemnet, nec aliter quàm alienam qualitatem corrumpet: non enim magis mirum cibum corrumpi ob iniquam quantitatem, quàm qualitatem. Gravissima tamen incommoda eos sequuntur, qui aërem mutant: itaque valde religiose id faciendum est. Summa autem totius observatio- nis est, ut tum has tum alias mutationes non repente, sed pederentiùs; non assatim, sed paulatim obeas. Itaque (quod mirum tibi hæcenus visum est) mirari desines, cur ex salubri in gravem hieme, & contrarium in æstate transitum Cornelius noster præcipiat: nam gravis locus calidus & humidus

est; salubris verò, aut temperatus, aut frigidus & siccus. Nunc ergo aer gravis, hoc est calidus & humidus, ut tempore hiemis minus calidus; ita salubri, hoc est frigido & sicco, similior est. Sic & è contravio astinus in salubri regione aer similior est gravi quàm hibernus: nam tempore æstatis calidus enatit; quamvis ex conditione loci sit bene frigidus. Summa ergo rei est quam dixit Hippocrates, Plurimum atque repente enacnare, replere, incalfacere, aut quonvis alio modo mutare, est periculosum: sed quod paulatim fit, intum est; nisi morbus scilicet acutus sit, de quo alibi.

#### Omnem etiam laborem.

HANC sententiam etiam accepit ab Hippocrate, secundo Aphorismorum: quam, ut ibi diximus, non integrè Galenus expressit. nam non est dubium, quin senis uniuscuius corpus imbecillius sit iuuenili: quippe & hoc supponit Hippocrates. & tamen promptius ac facilius exercebitur uniuerso corpore ac fortè pila (quippe quod vastissimum uniuersarum corporum partium exercitium est,) quam dissuetus iuuenis. itaq. virtus in causa esse non potest; sed membrorum, laceriorum, ac nervorum promptitudo: tractabili-  
lior



lior enim in omnem partem nervus est confectus, quam diffusus. itaque à parva facultate facilius exercetur, quam rigidus à multa. Verum siue senex siue iuuenis inciderit in fatigationem; huic etiam ieiuno, (non autem à cibo, ut antè diximus) dormiendum: atque eò diutius quò fatigatio fuerit maior: nam fatigatio affectus quidam calidus & siccus est; quies autem infrigidat & humectat. cuius demonstrationem hic de me non expectabis, puto; quia ex physicis querenda est. Si ergo os emaricat, oculi caligant, aut turbator venter (hac enim signa sunt, plus satis fatigatis sanguinem plus a quo biliosum redditum,) eoque dormiendum, donec corpus ab eiusmodi accidentibus recreatum sit. Nec ob eam causam cutili exurgere debet quispiam, quia fortè dormire non lubet; fortè quia minus fatigatus est: nam & quies ipsa (necum somnus) siccum corpus recreat. itaque tamen si somni necessitas non fuit, tamen ingredi cubile aliquo tempore debet. Hac scilicet videtur mihi nouissima sententia. cui non abstinilem in hoc loco Paulus Aegineta habet, ubi inquit: Caterum post longa itinera aliosque labores vehementiores, quamquam non fatigatus es; curari tamen exemplo fatigatum debet, ut facilius futuras iniurias denitet.

### Communia deinde omnibus sunt.

HÆC pars est de apothepia, atque de ea recreatione quam antiqui philosophi subierunt ab exercitio: qua corrigebatur si quid erat delictum; perficiebatur quod erat omisum. Subinde excrementa usque ad cutem exercitio perferuntur; sed ob cutis densitatem illic morantur. ob hanc causam aliquot ex his in Laconico sedebant, illinc ad solium calidum transibant: & ne corpus nimis contineret obnoxium externis iniuriis, denum varias unctiões, frictiões adhibebant; maxime tamen illis paribus qua fortè ex balneo magis conuerebant: aliquando tamen in postremis frigida suffundebantur.

Hæc tractat in hoc loco. nobis satis fuit eadem obiter percurrere, ad illustrationem nostri auctoris: nam usque ad fastidium ferè ea tractat Galenus in omnibus libris De sanitate tuenda. Atque hæc fortè hodie multis ridicula & superstitiosa videbuntur, qui nihil nisi medicamentosum ament. tamen talia hæc sunt, que grauisimi quique philosophi dignati sunt scribere, ac quibus suam sanitatem in longissimam senectam testantur sese promouisse: solaque hæc erat (ut antè dixi) ratio, qua quondam homines suam curam curarent, quamdiu sanitatem potiores quam voluptatem habebant.

### Post hæc omnibus fatigatis, &c.

CELSVS frigidam perniciosam dedit, non tantum sudantibus adhuc; verum etiam, dum sudor remisit, itinere fatigatis. Asclepiades etiam inutilem putauit eis qui à balneo veniunt, tamen si sudor reliquit. In hoc autem ab Asclepiade Cornelius discedit. & re verà multo magis fatigatis quam à balneo venientibus periculosa est: nam in fatigatis uniuersum corpus conuertit; in balneo verò magis externa cutis, multo ergo minus periculi à balneo quam à molesto itinere frigida minatur: etenim hic solum calorem uniuersi corporis facile extinguit; saltem marasmo stomachum afficit: ibi verò æstus stomachi in laconico, atque balneo contractum, dumtaxat reprimat; nisi statulentum admodum, & frigidum corpus sit: nam hoc promptè refrigeratur, ac uniuerso ventre perturbatur; subinde etiam alius resoluitur, qui non ita facile restringi poterit. Intelligere tamen oportet, non statim à laconico, neque ante omnem alium cibum frigidum admitti: sed postquam cibus ingestus requirit. Semper enim meminisse oportet ordinem quem Hippocrates nobis reliquit, Labor, cibus, porus. Contra quem pueriliter deliquit, qui primus pueriliter versum illum descripsit, à potibus incipe cenam. Hæc autem non ita multis admodum oportet, quoniam neque imperiti omnium à multo



à multo labore peribunt; sed prius bolum aliquem assument; experientia edocti, sitim quidem extinguunt, sed tardius ad interiora viscera deferri: est enim id optimum ad tollendam sitim compendium. Quod verò Celsus à balneo diluat: potionem, aut etiam aquam vino prætulit, fortè ob eam causam erat, ut caliditatem præsentius reprimeret: fortè siquid supererat, sudore excluderet. experientia enim id ostendit, tum à cretusiatum ab aqua citius quam vino sudorem proveniri; nam frigiditas interna non aliter repellitur foras qua intus sunt, quam externa, introque foris in habitu sunt. Cur autem adiecerit hoc in loco, Solet etiam prodesse &c: ego coniectare non possum: fortè ex alio loco huc translatum est ab imperito; ut aliqua quædam que postea annotabimus.

### Si assidua fatigatio vrget.

VINUM perpetuò qui diutius fatigantur non competit, quia corpus excalfacit, ac digerit; neque rursus aqua, quia neque spiritus efficaciter recreat, neque virtutem instaurat: & rursus minus vinum lymphatum; quia periculum est, ne interna viscera fortius infrigidentur: quippe antè dictum est, vini lymphati quam aque periculosiorem subinde frigiditatem esse. Balneum etiam frequens inter multas fatigationes inutile est: quia corpus exolvit atque effeminat. Mirum autem quod scribit, altero labore corpus fatigatum, altero recreandum, nam contrà scripsit Hippocrates, In omni corporis motu, quies lassitudinem auferat. Habet tamen & illud ex Hippocrate aut Polybo, qui sic scripsit: Qui cursu fatigantur, luctari debent; qui lucta fatigationem sentiunt, his currendum est. Videtur autem mihi hoc cæ ratione scriptum, quia in eiusmodi oppositis exercitiis, membra que prius exercebantur, non aliter sere quam si integrè quiescerent, feriantur: torpida etiam quodammodo in priori motu exierunt opposita membra; unde non minus flaccida apparent, quam si vere fuissent fatigata: quippe sic & sedentes, non seduli, sed lenta recreantur obambula-

tionem. sic & postea dicitur, qui toto die vel in vehiculo, vel spectaculis sedet, huic lentè obambulandum est. Miraberis etiam quòd durum enibile fatigato alicui quamvis consuetudo volupe sit: & tamen re vera ita est, quia nò aliter durum afficitur à molli, quam frigidum à calido; aut, ut propius accedamus, siccum ab humido. quia autem humidum plus afficitur à secco, ac molle à duro; hinc ipsa mutationis ratio præ paritate à se continentur.

### Propria quædam ad eum pertinent.

FRICTIO blandior motus est; quapropter emollit: quem autem citatior aut violentior aut longior aliquis cursus excitavit, spiritum etiam attrahit, quem ille digere. Mirum tamen est, quod ab itinere vel semel fatigatus (nam pluribus continuisque fatigationibus prius importuna balnea diximus) potius superiores quam inferiores partes balneo diluendas præcipiat; nam inferiores ut magis laboraverint, ita maiori quoque recreatione egebant. An ergo iste locus innersus erit, ut contrario modo legatur? id quoque mihi persuasum est.

### Si quis verò exustus in sole.

QUOD ille qui sub frigido aere ambulavit, atque perfixit, diutius in Latorico atque balneo morari debet, quam qui sub æstate exercitatus est; luce clarior est: quippe in illo cutis enasit densior; quanto autem usus aque frigide in balneo admittendus est, apud Galenum in libro De sanitate tuenda dicitur; non enim nisi in iunone bene carnoso tempore æstatis opportuna est.

### Is verò qui nauigavit.

LIBERIVS indulget cibum qui pinnitum quam qui bilem inter nauigandum enomuerit: contrarium autem magis rationale apparet; quoniam humidis corporibus, ut que pinnitum colligunt, quam biliosos famem adhibere convenit. verumtamen biliosi promptius quam pinnitosi nauis tentantur;



sentantur; itaque in illis studioſius vomitum obſervare oportet. in iis vero qui irrita nauſea tentantur, pertinaciter pituita ventriculo adhuc affixa eſt; itaque omnino abſtinere conuenit, ut ſpacio temporis concoquas, vel poſt cibum vomere, ut promptius totam ſentinam euacues. Non puto nunc ex me exigeris, quare nauigantibus, ſed inſuetis, plarumque nauſea oboriatur. Nam ſi ambulatio qua inferiores partes exercet, inferiorem ventrem à cibo mouet; multo minus admirabile, ſuperiorem ventrem his exerceri quibus ſuperiores diutaxat partes agitantur. Inſpectio etiam aqua mota huc conſert: argumento eſt, quòd potius nauigantibus, quàm curru ueſtis præcordia turbantur, quapropter ab ea contemplatione abſtinere debet qui vomitum timet.

### Qui verò toto die.

DE eo ſuperius dictū eſt: quòd verò ab ocio minus; ab exercitio autem amplius & appetitur & concoquitur, omnibus manifeſtum eſt. Cane tamen ex eo inferas, prandium liberalius eſſe debere cæna; nam contrarium poſſius ſequitur.

### Si quis in balneo æſtuat.

IN balneo non internas, ſed externas partes rareſcere intendimus: fieri autem non poteſt, quum idem aër & ſuam caliditatem internis partibus maxime cordi inſinuet. Itaque vnum eſt illius remedium, vel acetum vel aquam in ore continere: ſic enim ab altero iſtorum temporaliter ſpiritus, priuſquam ad cor perueniat.

### Ante omnia autem norit.

DEBET hic diſtinctio intercedere; que ea que ſequuntur, à præcedentibus partiatur: nam ea que ſequuntur, ad ſecundam ſalubris partis ſectionem attinent, que corpus ſanum ad melius traducit, non autem in eodem ſtatu, ut prima, conſeruat. etenim ſunt quedam intemperata corpora, que licet ſana ſint, tranſferri tamen in aliam conditionem amant. ac plura quidem alia ſunt que in corpore emendationem requirant: commun-

nia tamen octo, caliditas paulo promotor, frigiditas, humiditas, ſecitas, alui conſtantia, atque ruruſus ipſius mollicies. ſapiens autem male fertur gracilitas in corpore, atque obefitas: quocirca hæc duo Celſus primum corrigit, in quibus omnibus nullus eſt modus; excepto eo quod de balneo à prandio dicitur: nam & is error eſt vulgaris, & (dicente Galeno) admodum pernicioſus, quippe concoctionem perturbat balneum à cibo, & cibum in corpus præcocius plerumque rapit: quo fit ut non ſecus quàm exercitium aliquando veras infarciat. Verumtamen ſi ab hoc periculo abſit corpus, minus extenuat, quam idipſum ante cibum. Atque idipſum noſtrum Celſum tantum dixiſſe puto: nam quomodo ipſum ſimpliciter impugnaret, non ſatis coniectare poſſum: neque enim à cibo crudo digeſto, ſed concocto nutritur. Balneum ergo à cibo vniuerſum corpus malis ſuccis implet; tantum abeſt, ut inpinguet: & tamen Galenus idem in ſexto libro De ſanitate tuenda aſſerit; ubi de bilioſis dicit, quòd hos à cibo balneum quoque inuat, adiciens: Quidam verò eorum incredibile quàm etiam obefi ſint redditi ex tali victus ratione. idem ille aſſerit XIII. Therapeutices. Ergo balneum id intelligendum eſt de balneo dulcium aquarum, quod non admodum cibum capere poteſt, ſed tantum humectat: quanquam vel hoc nonnihil diſſat; idè in gracilibus manè eiſdem uſus ſuſpectus eſt: atque à cibo tutior, ubi nullus reſolutionis timor eſt: licet & hic quoque aliquando noceat, ut ibidem Galenus teſtatur. Ergo ſecuriorem impinguandi vim habet cibus pleniffimus. adiciunt tamen, Quantum concoqui poteſt. nam contra, edacitas ipſa, ut ſacra licet teſtantur, vertitur in choleram: atque hac ratione ſerè fit, ut guloſi quàm minimè nutrantur, ſed atrophiam patientibus ſerè ſimiles ſint; nempe, licet multa ingurgitent, nequaquam corpus multum proficit, ſed venter totam illam ſaburram indiguatus deorſum præcipitat, priuſquam hepar attrahere anticipet. argumento eſt quòd plerique iſtorum, ventrem perpetuò mollem obſineant: quippe & ipſa contracta alui in-

E

cer in



ter impingnantia hic merito auditur. Multum etiam ad hoc confert somni plenitudo: nam vel brevis, vel longus admodum, utque extenuat; ac de brevi non est dubitatio: sed multa somni prolixitas, corporis molem servare potest, nam in externis partibus nutritionem offendit, ac tandem etiam in internis visceribus concoctionem ledit, quoniam spacio temporis calor emarcescit. Recte ergo & brevem & nimis prolixi somnum inter extenuantia posuit. Duvior apparet in icinio vini non perfrigidi aut calidi commendatio. quippe haec sapes auditum est, quod vinum ieiuno potum nocet articulis; praesertim dum per corpus impurum digeritur, nempe impingens excrementa secum rapit: forte ad articulos, quod loco defluxionibus oportunior sit. non tamen in puro corpore haec formidanda sunt: nam contra Galenus in huiusmodi corpore non tantum simplex vinum, sed & diureticum commendat, ut à praedictis vitii praeservetur. non etiam simpliciter Celsus manè ante omnem cibum fortassis laudat; sed manè in ipso ientaculo: semper enim cibus potum antecedere debet, nam alioquin copia vini dum nullo impediante ad univsum corpus deferitur, saltem nervos mordere possit. atque hoc est secundum vini incommodum: quo vel illi offenduntur, qui corpus purum habent; modo simpliciter vel ieiunum, vel liberaliter admodum bibant.

#### Quum verò inter extenuantia.

ASCLEPIADES aetate magni Pompei; quia ex Rhetorica parum laute vitabat, ad medicinam se converterit, ut maiorem faceret quaestum; nescias maiori cum reverentia an felicitate. nam occurrens ignoto funeri, hominem à rogo abstulit, atque etiam servavit; adeo ut sponsonem cum fortuna fecisse videretur. qui usque ad multam senectam validus vixit, nec ullo morbo, sed scalarum lapsu exanimatus est: quasi aliter mori non potuisset. Hic decreta medicorum antiquorum abstulit; & ut ipse magis solemnis esset, quasi nova secta auctor, vetigillis sui causa

leges posuit; quae non tantum imperitum hominem apud plebeculam promoverunt, sed & regibus venerabilem fecerunt; adeo ut Mithridatis regis pollicitationes ac legationes sperneret. Nec ego adeo ista, ut Plinius, demoror: nam is saltem neque inter rhetores, neque inter philosophos minimus erat, quanquam in re medica parum versatus: At (deum immortalem!) quales homunciones hodie fortuna, atque plebecula usque ad miraculum effert! atque haec ferendum erat: dum verò etiam à doctis conspiciuntur, quis non indignabitur? Fere autem huiusmodi homines bisariam sunt: alij qui de se atque porrentis in corpore possunt insigniter mentiri (nam ista docti, indoctique mirantur): alij verò qui elegantiores literas, forte etiam Graecas posunt ostentare. nam hi statim hodie totam recentiore medicinam, ipsum Hippocratem atque Galenum videntur imbibisse. Sed neque ab his, neque fortunis, amicis, vel etiam diuitiis (quippe & haec insignia ferè primum in exultatione locum obtinet) medicum aestimare oportet: sed, ut Hippocrates, ut Galenus à natura sine ingenio, ac bona à pueris institutione, novissime à perpetuo labore. nam qui ista otrigerunt, periculum non est ut male aliquid committat: quemadmodum cui aliquid istorum trium desideratur, medicum iustus esse non potest. Tanto autem tolerabilior erat Asclepiades homuncionibus quos diximus, quanto purgationum frequentia, vino ipso, gestationibus, frictionibus, quae abstinentia est molestior: nam in his ferè ille summam medicaminis ponebat: vomitus, deiectiones, (in quibus aliis ferè unica anchora ac spes est; usque adeo ut ferè nihil aliud faciant) ab usu submouebat, non quidem omnium ut videtur, sed sanorum. neque in hoc multa reprehensione dignus est; nam si aliquando, raro tamen, expetunt; verumtamen inter praecepta salubria audiri debent: praesertim vomitus; quippe neque hunc Hippocrates redarguit, & Galenus iuxta antiquos in libro De usu partium, semel aut bis in mense commendat. temporis tamen, temperatura, & aliorum (ut statim subscribitur)



subferibitur) observationem adhibere oportet  
ut oportunitatem illius melius teneas.

### Vomitum utilior est hieme.

Ex diametro, ut apparet, hac sententia ab ea qua in quarto Aphorismorum scripta est, diffidet: nam ea contra vomitum in aestate commendat, in hieme vituperat. Itaque si princeps fueris, statim nostrum auctoritatem tanquam parum similia vero commentatum contemnes. Et forte in sequentibus locis minorem illi fidem habebis. In qua criminatione ipse maxime recriminandus es: nam et hanc sententiam ipse ab Hippocrate de victu idiotarum mutuo accepit. Compositum autem eas inter se Galenus, dum in altera qua in hieme probat vomitum, audit purgationem ipsius ventris; in altera autem, uniuersi corporis. Verum hac concordia difficultates nihilo minus nobis relinquere videtur, quam prior discordia: non enim uniuersum corpus, sed tantum ea qua supra praecordia sunt, vomitu purgare expedit; quemadmodum altera perhibuit in aphorismis auctoritas. Decet autem neque hanc neque simpliciter in aphorismis, sed tantum exilis motum humoris discernere: quippe qui in praecordiis, hoc est superiore ventre, haerent, promptius per vomitum educuntur; qua vero infra, vel inferius, vel alibi, copiosius per sedem; nisi forte aliud impediatur: ut caloris circumfluentis aestus: nempe huius occasione, humores etiam ab uniuerso corpore potius sursum rapiuntur, quam deorsum. non tamen pituita multa in ventre generatur hoc tempore, sed hierno magis: et qua in inferiori parte gignitur, per sedem abire potest; at ea qua in superiori parte nascitur, nullam a natura excretionem promptam habet: quapropter stimulum aliquem requirit; quippe etsi cum utilitate aliqua ibidem generetur, non tamen utilitatem aliquam inuenies, qua illius moram ibi requirat. itaque singulis mensibus vomere expedit, modo alia conueniant, neque natura multum abhorreat: nam, ut alibi Galenus inquit, cogere uolentem absurdum est. Eadem ratione in-

utilis est gracilitas: etenim hi calidi sunt, et imbecillum stomachum, hoc est extenuatum, habent. nam neque illic pituita multa accumulatur, sed prompte stomachus lacoratur. Utilis tamen et plenis et biliosis et reliquis temperaturis omnibus, ubi vel multa ingesserunt, vel aliqui modica concoxerunt. cuius signa sunt, dolor, grauitas praecordiorum, salina, ac pituitatio praeter solitum frequens, sonitus utriusque auris, vel lachryma utrorumque oculorum; nam quae alterum tantum organum praehendunt, magis ex ipsa parte, vel saltem non longius quam a cerebro ferè descendunt. Quod si iam pectus, hoc est, praecordia ipsa aestuant, aut etiam os amaricat (quamuis hoc aliud alibi significet) hic tamen non simplicem sed corruptam pituitam arguit: atque vel ob hanc causam magis vomitum requirit. maxime autem nausea: nam hic vomitus non bene differtur, etenim hac non a temperatura, sed a praesenti dispositione accipiuntur signa. Sed et citra hac vomitus consultius iis qui calum aut locum mutant: nam melius externum aërem fert corpus purum quam impurum; salubre quam insalubre. Non tamen sapius vomitus monendus est, ut ij qui luxuria student, ac subinde vomunt, ut multa ingerant: sed satis est semel vel bis hibernis mensibus. Quod autem duobus diebus continuus in mense vomere, praestare, quam per longiora intervalia, dixit Cornelius, et ante illum scripsit aut Hippocrates aut Polybius; merito tamen recusauit Galenus. At nos distinctionem ponere possumus, et seruare utriusque auctoritatem. nam si primo vomitu satis purgatum sit; secundus melius differtur: sin aliter, exquisitor erit qui alterum sequitur: nam duas in uno die euacuationes moliri, tantum neotericis ausi sunt. Itaque neque illud perpetuum est, quod inter vomendum quietem seruare necesse est: quippe Hippocrates quibusdam è contrario motum consulit, si forte non satis uomant. huc Celsus accessit, quando dixit, quod quies non in omnibus idem facit; etenim quibusdam inutilis, quibusdam rursus utilis erit.

E 2

Qui



### Qui vomere post cibum volunt.

QVIDAM facile, quidam difficile vomunt: calidi ac macri natura, facile; crassi aut frigidi, iterum difficile. his ergo à cibo; illis vero manè commodius excitatur vomitus. nam, ut alias purgationes, ita & hanc quoque vacuus venter melius fert. Itaque in iis qui maxè vomituri sunt, satis est vel nullum simplex libere, vel (si difficilior sit) in quo hyssopus aut radícula elixa fuerit, aut aliquid quod incidat; deinceps aquam tepidam assumere, quæ stomachum infirmet, aut quæ emolliat. hac etiam ratione promptissime vomitus sequitur. A cœna autem varia (nam variam esse oportet & in cibo, & potu, à quâ vomitum expectes) satis effertur humor sursum; adeò ut hic tantum aquam tepidam superbibere sit satis: nisi fortè pituita tenacius hæreat. nam tum & hic vel salis, vel mellis parum adiacere oportet; aliquando etiam radiculam, aut aliquod simile prius esse: Quippe cætera (ut inquit) quibus antiqui vomitum ciebant, helleborus, asarum, nimis stomachum vellitant: & re vera helleborus sanis non competit, sed tantum extremis morbis. Recreatio autem quæ à vomitu præcipit, nullam difficultatem habet; nisi fortè mireris cur potius à cœna quàm maxè vomenti præscribat balneum. sed neque eius causa longè posita est; quippe duas euacuationes, ut diximus, egre corpus vno die sustinet.

### Deiectio autem medicamento.

NIMIS perniciosus error hactenus fuit medicorum (agris enim condonandum erat,) putantium eadem medicamenta esse stercorearia, atque purgantia: qui iis qui difficile desiderant, medicamentum purgans statim exhibebant; atque ob id serè tantum: nam & Auicenna (si rectè memini) dixit quam periculosa aliquando illis accidentia superueniunt, qui consilipato aliquot diebus ventre purgationem experiuntur: Quippe non per se, sed per accidens tantum euenit,

ut purgationem, dixit, stercus sequatur, dum venter ab humoribus discurrentibus vellicatur. itaque nunquam purgationes in duro ventre, periculo vacant. Sed distinguere oportet, (sicuti nunc noster auctor fecit) deiectionem à purgatione: hanc quidem molimur, ubi uniuersum corpus, atque ipsas venas à suis excrementis afferre; illam autem, ubi ventrem suo onere lenare volumus; præsertim si diutius alius fuerit astricta; pro uniuscuiusque scilicet conditione. nam & hoc spatium potius est aliis quibusdam accidentibus metiri, quàm diem numero, quibusdam à natura sæpius in die, quibusdam vix tercio quoque die respondet alius. Astrictiorem ventrem congeneruntur inflammationes superiorum partium; nō quidem nunc proprie inflammationes nobis vocabitur, sed improprie omnem calidam euaporationem, quam sequuntur dolores capitis, caligines & alia. His igitur apparentibus, statim ventrem mouere oportet: primum oleulis, insculis & aliis humidioribus cibis, vinis quæ id præstant, ut quæ melle condita sunt; nam musta aliis quibusdam conditionibus plus obstant quàm sua lenitate prosunt: idem ex aliis capere oportet, quoniam varia est causa (quemadmodum in Aphorismis diximus) quæ ventrem firmant. Non sime autem ipsa aloē nō quidem per os ingesta (sicut illi qui pilulas ante cibum aut statim post cibum vocant) sed in glandem redacta; aut si neque id profit, per chlosteris sedi infusa: nam neque quies neq. inedia ventrem molliunt; potius sistunt: quippe prædicta mala sæpe ultra sunt vasa sequi; tamen, si non nihil contulerint, conferre aliquando loco purgationis possunt: dicit enim Galenus in quarto Therapeutices, Non statim laborante corpore confugiendum ad phlebotomiam, aut purgationem; sed optimam pro his commutationem esse aliquando; ambulationem, aut inediam. Quam autem periculosa sunt temerarie, aut frequentes purgationes, nos alibi diximus: dicit autem id ipsum Celsus paucis, Quia corpus infirmum, hoc est (ut insinuat) omnium morbus obnoxium facit. Id verò & ipsa experientia testatur. pauci enim.



ex his medicamentis indulgent, qui non  
ferè perpetuò valetudinarij fiant, atque ab  
omnibus causis promptissimè afficiantur: et  
enim calorem naturalem detrahunt, liquant;  
à quo omnis sanitatis firmitas.

### Calefacit autem vnctio.

DIGRESSVS EST hactenus à proposito;  
regreditur nunc ad emendanda reliqua, quæ  
prius attulit, corporis vicia: scilicet calidum  
infrigidat, siccum humectat; & è contra, in  
quibus nulla est difficultas, si non viti osissi-  
mum hic esset exemplar, & multa ab vno  
loco in alium transposita. Primum est, quòd  
inter humectantia dixit, multa potio,  
posthæc ambulatio, & vigilia. Ac de  
multa quidem potione, nemo tam rudis est  
qui contendant; quoniam insigniter hume-  
ctat, ac digestionem in corpus promouet: &  
propterea rectè vulgo dicitur, Tentaculum  
canium extenuare; dilutum verò potum,  
obesum reldere. Illud tamen scimus quòd  
ambulatio & vigilia nullam insigniter vim  
habent humectandi; sed potius exiccandi:  
& quauis modicè id potest ambulatio,  
non tamen vigilia ullam eius rationem pa-  
tuitur. Excusari potest utrumque, si aliquid  
tale hic audiamus quale prius de balneo à  
eibo. opinor enim Cornelium Celsum, non  
illud dicere quòd ambulatio & vigilia sim-  
pliciter humectet, sed minus quàm antè ci-  
bum exiccat: nam tamen vigilia minus,  
magis motus, potum in corpus pertrahit, at-  
que ita magis humectat; non est sine crimi-  
ne hoc consiliu. ergo & in calidis remedijs  
audire decet, balneum à cibo calefacere, hoc  
est minus quàm antè cibum, infrigidare.  
Verum quod sequitur, Per se quoq. am-  
bulatio multa & vehemens, & ma-  
tutina exercitatio, & non protinus  
cibus adiectus humectat: nulla ratione  
excusari potest; nam eadem ferè prius inter  
extenuantia audita sunt, quæ ferè cum exic-  
cantibus consueiunt. ergo ad exiccantia ro-  
tus ille sermo transferri debet: quemadmo-  
dum ille qui sequitur in siccantibus auxilijs,  
cibus exercitationi statim subiectus;  
hic è contrario transcribere oportet. Fortè

autem & illud quod dicit, vnctio line  
aqua: nam aqua potius humectare quàm  
exiccare videtur. quòd tamen frigidum per  
se aquam inter exiccantia posuit, tolerari  
potest: nam insigniter calidum & frigidum  
per accidens ambo astringentiam facultatem  
obtinent; caliditas tamen magis. inde &  
fructus & escas bene humidas, non tantum  
à locis humidis, sed simul frigidis commen-  
dat; è contrario, sicus à calidis, nedum siccis.  
est tamen in regione frigida aliquando re-  
perire fructus multo exiliores quàm calida.  
Potissimum autem humectationis vis in vi-  
ctu consistit: nam natura quasi vitæ nostræ  
inuida, medicamenta humida nobis negasse  
videtur: nam si vel victu, vel medicami-  
nibus, detrimentum humiditatis reponere  
possemus, immortales maneremus. sed de iis  
alibi. Vinum autem omnisimè inter cale-  
facientia exponere, quòd austerum vinum  
ibidem pro acri audiri oportet: sic & in alijs  
quibusdam locis ac posterioribus.

### Aluum astringit labor, sedile, &c.

ID est septimum & octauum quod sa-  
nitatem non infirmat, verum tamen incer-  
torem facit. itaque durum magis mouere,  
& motum astringere expedit: hoc autem fa-  
cit, inquit, labor, sedile: labor scilicet  
ante cibum; sedile post cibum: creta figu-  
laris corpori, præsertim macilento, illita:  
in obesum etenim pauca facultate dotata est.  
Putarem illum nunc vocare cretam figu-  
laris, secundam speciem terræ cimoliz, quæ  
paulo tenacior est; nisi utraque disenteret.  
Cibus non imminuens sine modicus, nam  
excrementa ferè semper respondent ali-  
mento. exigua portioneque adhibi-  
ta, nisi quum cibi quis quantum  
assumpturus est, cepit: hoc est, Huic  
expedit, non paulum, sed in sine assatim bi-  
bere. Contra illi qui durior ventris est,  
magis conuenit paulatim quàm assatim bi-  
bere: & id ferè omnibus simpliciter sanis  
magis utile est; quoniam hoc pacto melius  
cibus cum potu subigitur, temperatur, ac fa-  
cilis digeritur. at in agris plerisque & se-  
britan-



bricitantibus è contrario expedit affatim potius quàm paulatim bibere; nam modico potu, potius calorem suscitant, quàm sedant; more salutorum, qui ferru vt magis igniant, prius obiter diluunt. Sed & vomitus nimis violentus est, vt lubrici aut duri ventris remedium sit: ob eam etenim causam à cibo ventrem comprimit; quia ipsum cibum enommit, atque materiam ventri adimit: verum tamen iam delapsam ad inferiora faciem, ad sedem comprimit atque detrudit.

### Quod ad ætates verò pertinet.

MIROR quare hæc interposuit, nam omnia ista vsque ad sequens caput potius ad initium tertij capitis spectant; atque ad primam partem salutem desiderantur, non autem ad secundam. Quod verò calidi & humidi (cæteris paribus) minis ferant inediã, in causa est quia promptius dissolantur: tamen si biliosi forè ieiuni magis tentantur dolore capitis, & similibus accidentibus. Diximus autem de iis in primo Aphorismorum; aliter autem ac paulo clarius in Secundo: etenim controuersiam ista disceptatio habet non parnam. Indulgens est Cornelius Celsus, qui pueris dilutum vinum permittit: nam Plato omnino interdixit. quanto ergo amplius parentes qui adhuc student prolihus; nutrices quæ lactant; mulier quæ uterum gerit, abstinere debent? non enim multo minis infans in utero leditur, quàm si ab ipso sumeretur: non tametsi vis vini prius utcumque refingitur, tamen ipse conceptus multo tenerior est, atque à lentore causa offenditur. nec est quod concoctionem eo promoueri dicas, nimis enim facile mentem ledit; ac spiritum, qui non nisi halitus quidam est, digerit. Hoc, pnto, considerauit, qui prius vinum, potius quàm cordi aut hepatis, cerebro nimirum prodesse pronunciant: nam hoc frigidu, illa verò calida; itaque id ipsum reliquis vino magis oblectari decebat. Ego certè, etiamsi cogor aliam causam reddere, non possum, cur plerumque debiles ac stupidos parentes generosiores pariant; nisi v-

triusque parentis, tum in aliis tum in vino luxuriam. Iam non tantum spectare oportet an iuuenes sint; sed an calidi, frigidi, humidi vel sicc: itaque rectè adiecit, Iuuenum minis, quæ assumant, & quomodo curentur, interest. puto sic legendum: Iuuenum qui minus assumerunt &c: Forè ad illud Hippocratis allusit, qui postquàm pueros minime ferè inediã ferre scripsit, notam ex temperatura adiecit ingès in omnes & inter hos maxime qui animo sunt viuiores. altera autem partem illius dictionis credo pertinere ad illud quod statim sequitur quibus iuuenibus &c. nam quibus iuuenibus aluus fluida est, mollioribus medicamentis egent, reliqui durioribus. Sumpsit autem hæc sententiam noster auctor ex sene Hippocrate, secundo aphorismorum; quam nos ibi illustramus. Eo autem quod subicit, Melior in iuuenes fusio, in sene astringior; videtur mihi reddere sententiam nouissimi aphorismi in fine secundi libri Aphorismorum qui sic habet: Quicumque aluus humidas habet, siquidem iuuenes fuerint, melius degunt; ad senectutem verò deterius, nam senescentibus magna ex parte exiccatur. in quo interpretes variant: sed nos ibi causam reddidimus.

### Tempus quoque anni considerare oportet.

IN victu iuxta hiemem assa pro elixis scribere oportet: sic in eo qui æstate compe-  
tit, elixa pro assis; & iterum in eo qui veri accommodatur, legendum est ab assis ad elixa, pro eo quod scriptum est ad assa ab elixis. & ex iis & similibus locis liquet, à quàm paucis hætenus Celsus sit lectus, quum adhuc tam multis scateat mendis. nam Casarius non nisi obuia correxit. Sic autem restituto loco, nulla est difficultas: nisi fortassis mireris cur panis copiam laudauit in hieme; carnem in æstate: etenim ea vt calida est, ita parum in æstate congruere apparet; atque aliqui plus semper panis quàm carnis conueniit; melius tamen fertur in hieme



in hiema quam astate, quoniam vires requirit, quæ in hieme pleniores sunt. Possem hic multa transfundere quæ à Galeno, & alijs scripta sunt, de pannum discrimine; si quidem ego in labore alieno desudare vellem more neotericorum scriptorum, qui hodie nihil aliud faciunt: sed nunquam scit mihi is animus, ut alienis plumis superbi rem; vel quod alij prius scripserunt, recorderem. Itaque hoc loco dicere sufficit, ut syncomistos, siue antopyros maximè familiaris est; ita generatim sanis maximè salubris est. atque in huius quidem substantia omnes conveniunt; præter unum Ruellium, qui contraria in eodem loco super eo scribit, atque aliquando leniter, aliquando autem omnino non secro fursure antopyron fieri dicit; multa autem & alia ibidem confundit: nam & cibarium (quem tamen ex Celso infirmisimum allegat) secundario committit, atque secundum ab antopyro habet. minùs delinquit, quando sordidum cum syncomisto comparat, atque paulum miratur quodammodo quòd ipsum à syncomisto separet; nam saltem magis cum ipso quam cum cibario convenit, qui proximè illi asidet. Videtur ergo aliquando alium syncomistum, alium antopyrum putasse. Sed & siliginem potius speciem quandam tritici, quam pariem, videtur arbitratus, & in hoc non solum vulgarem opinionem, sed & Plinium habere patronum: tamen, si mihi liberè liceat dicere quod sentiam, Celsus non ster potius tritici optimam partem, quam speciem aestimasse videtur, ubi differentias panis enumerans ait, Firmius triticum quàm milium; id ipsum quàm hordeum; ex tritico firmissima siligo est; deinde simila; deinde cui nihil ademptum est, quod autopyron Græci vocant; infirmior est ex polline, infirmisimus cibarius panis. Itaque res mihi paries videtur in tritico cogitasse Celsus, optimam siliginem, secundo loco pollinem, tertio fursur: quod si verum sit, pollinem ipse dixit, quod alij vitriculos appellant, aut fortè quod ex vitriculis & fursure est commistum; quale ferè remanet dum per

renuins cribrum sola siligo concernitur: similam verò forsitan putavit, quod nonnihil pollinis habet admixtum; ut quando leniter tantum fursur secernitur. noua profectò hæc sunt; neque ego diu pro his contendere volo, & aliter hunc locum Celsi interpretari possum: verumtamen ipsius auctoris dictio huc magis inclinasse videtur: nam absque discretione, si siliginem iuxta communem modum audias, nequaquam ex ea nitidissimus panis pinsetur. hæc si vera sunt, (nam coniectare possum, asserere volo,) panis differentias ostendere facile erit: nam qui ex sincerissima parte ipsius tritici fit, siliginem appellatur; huic responderet qui allus dicitur hodie; qui verò ex simila fit, ut ubi fursur tantum leniter secernitur, semidialis Græcè dicitur, secundarium quidam appellant; cui non iniquè comparatur is qui hodie secundum locum ab albo obtinet: quòd si nullo modo, nec obiter fursur discernitur, syncomistos atque antopyros est, quo hodie familiariter utimur. Sordidus ergo erit, qui ex polline; cibarius autè, qui ex fursure. Quamquam & hic fortè multi mirabuntur, nos pollinem pro vitriculis usurpasse: verum nisi ita fit, nescio quomodo ex polline sordidorem, atque infirmorem panem Cornelius Celsus pinset. Itaque (non tamen sine formidine) omnes has differentias ex uno tritico consari putem, qui verò siliginem aliter audiunt, ita facere non possunt; verumtamen liberum unicuique summa manet iudicium, nunc de salubritate harum aliquid obiter dicamus: nam licet siliginem nitidissimus ac solidissimus fit; tamen senilis, & qui ad obstructions oportuni sunt, periculosus est; & syncomistos magis laudatur: ita & secundarius siue semidialis iis suspectus est; ne nunc dicam multò infalubriorem esse quem nos album vocamus, quoniam fermentum nullum habet, quod Galenus perpetuò frè requirit, ac tantum de panis differentia. Possem hic & carnis & piscium varietatem ostendere: sed quia hæc satis ab omnibus dicta sunt, sufficit hoc tantum dixisse; inter pisces, optimos esse marinos; peiores fluminales, præsertim qui in iis fluminibus degunt

Et iure mictetur quivis, quando pollen is in tritico fit, quod hos in siligine. Marcellus Pollinem esse dicit tenuissimum pulverem, magis quam fatinā: qualis circa molas plerūque & loca quibus panis pinsetur, parietibus hærens inuenitur, unde fit panis omnium infirmisimus. Nos libro secundo de his panum differentiis etiam nonnulla in medium attulimus.



degiunt qui cinitates expurgant; pessimos paludinosos ac stagnales. inter marinos vero optimi sunt saxatiles ac squammosi. Sed nunc ad propositum reuertamur: nam eadem ratione qua panis fertur in aestate, itaque neque aliud assatum alimentum, sed modicum: conuenit autem hac occasione, ut & fames saepius incidat; itaque leui & exiguo, sed frequente, opus est alimento. Hieme autem, raro solido ac pleno, tum propter alia, tum quia modicum semel ingestum cibum forte natura continet atque corrumpit: itaque non solum propter negotia, ut alibi diximus, utilius est, sed ob hanc dictam causam, salubrius quoque est ipsum cibum in duabus vicibus accipere, quam in tres aut quatuor parti. Bene autem distinguit Cornelius in aestate cibum frigidum, vel qui refrigeret: quamuis quis alterum vocare putaret; nam alius actu vel phantasia frigidus; alius vero duntaxat facultate, aut energia: utriusque in aestate competit. Ex nullo autem quam superiori loco manifestius est prandium longe ante canam esse debere; nam in hieme omnino prandium admittit, in aestate tantum exiguum permittit. quare Platina non satis diligenter Celsum perlegit, licet ex eo plurima transcripsit; qui canam quoque leniorem prandio precepit.

### Per autumnum propter cœli varietatem.

ET in hieme cauendum quoque frigus putant: sed magis in autumnio admoenit, ne aliquis illius paruitatem cotermineret. nam etsi non aequale cum hieme frigus autumnus habeat; tamen quia cum inequali frigore coniunctus est, non minus periculum affert. Poma (quibus potissimum autumnus tempore abutimur) liliarius commendauit: ac tu forte paradoxum putabis. & re verâ admodum sunt, & magis quam caro, excrementitia, non solum autem poma, sed & panis: quamuis nihil salubriorem carnem quam panem dicimus; quippe & illius plus quam huius assumimus. Iam nihilo plus molestum ex pomis contractum, excrementum, quam ex carnis plenitudo: idque recte dixit; quod non ipsa poma, sed ipsorum consummatio, atque copia nocet. nam & quondam dum homines tantum mediocriter viverent, neque infelicius degebant, neque breuius. quod autem potius his, quam aliis, abutimur, dulcedo facit; propter quam immodicè appetuntur: contra autem modicè illis vti oportet, ac tantum solidiori cibo deirahere, quantum illis indulgetur; nam plus satis multitudine istorum oneramus, praesertim quum ex solidiori cibo praeterea nihil remittitur.

### CAPVT IIII.

#### De his qui aliqua parte corporis laborant, & primum de his quibus caput infirmum est.

PROXIMUM est, ut de his dicam, qui partes aliquas corporis imbecillas habent. Cui caput infirmum est, is (si bene concoxerit) leniter perfricare id manè manibus suis debet: nunquam id (si fieri potest) veste velare, aut ad cutem tonderi: utileque lunam vitare, maximeque ante ipsum lunam, solisque concursum: sed nusquam post cibum progredi. Si cui capilli sunt, eos quotidie pectere, multum ambulare: sed (si licet) sub tecto, neque in sole. Ubique autem vitare solis ardorem,



ardorem, maximeque post cibum & vinum potius vngi quàm lauari, nunquam ad flammam vngi, interdum ad prunam. Si in balneum venit, sub veste primùm paulum in tepidario insudare, ibi vngi, tum transire in calidarium: vbi \*sudabit, \*sudauit, in solium non descendere, sed multa calida aqua per caput se totum perfundere: tum tepida vti, dein frigida, diutiusque ea caput, quàm cæteras partes perfundere: deinde id aliquandiu perfricare: nouissimè detergere & vngere. Capiti nihil æquè prodest, atque aqua frigida: itaque is, cui hoc infirmum est, per ætatem id bene largo canali quotidie debet aliquandiu subiicere. Semper autem, etiam si sine balneo vinctus est, neque totum corpus refrigerare sustinet, caput tamen aqua frigida perfundere. Sed cùm cæteras partes attingi nolit, demittere id, ne ad ceruices aqua descendat, eamque ne quid oculis, aliisue partibus noceat, defluentem subinde manibus ad os regerere. Huic modicus cibus necessarius est, quem facile concoquat: isque, si ieiunio caput læditur, assumendus etiam medio die est: si non læditur, semel potiùs. Bibere huic assiduè vinum dilutum \*leue, quàm aquam magis expedit: vt cùm caput grauius esse cœperit, sit quod confugiat: ei que ex toto neque vinum, neque aqua semper vtilia sunt: medicamentum vtrumque est, cùm inuicem assumitur. Scribere, legere, voce contendere, huic opus non est, vti que post cœnam, postquam nec cogitatio quidem ei satis tuta est, maximè tamen vomitus alienus est.

*Aqua frigida capiti prodest.*

*\*leue,*

## COMMENTARIA.

**H**ÆC est tertia salubris artis sectio: qua neutrum, siue infirmum, nondum tamen agrum, corpus firmat, ac imminetia vitia profligat; ac primùm capitis, quia hæc præsertim philosophis ac literatis scripsit, quibus hoc propter intempestiuum studium imbecille existit. Non libenter autem Galenus, perplexum imbecillitatis nomen audit, sed acceptius habet, calidum, humidum, frigidum, siccum; vnde ipsa imbecillitas oritur: attamen ipse magnam intemperiem

subinde imbecillitatem appellat; aliquando & conualescentium corpora infirma, atque imbecilla nominat (tamen si nullam insignem hic intemperiem, ipso dicente, inuenias) quia scilicet modico sanguine & spiritu præditi sunt. Ita & hic Cornelius Celsus potiùs capiti vires reponit, quàm aliquam peculiariter temperaturam emendat. Fere autem in caput rarum est, quod & ab externis facile afficitur, & fluxionibus ab infernis partibus opportunum est. itaque hæc fere duo in

F

hoc



hoc prænidet: primò ut nihil ab infernis recipiat; secundo ut ipsum etiam contra externas iniurias bene denset: ubique verò rarefacientia reformidat. Ergo pileum damnat; nuditatem capitis commendat: videtur tamen id non solum contra nostrorum philosophorum consuetudinem, verum etiam Hippocratis, qui præ aliis philosophis tegebatur caput. natura ipsa ad exemplum nos innuisse videtur; quando & ipsa caput pilis nobis studiosè obsepit. fecit autem & alia multa natura, non solum ad utilitatem sed & ad decorem; quòd si utroque modo caput pilis circumsepisset, externo auxilio non egeret, nisi ubi ipsa deficit. utroque modo Hippocrates excusari poterat, qui præcociter calvus erat. Sed quid de iis dices, qui bene densam adhuc casariam, non simplici sed duplici pileo onerant: non debent ipsi expectare redargutionem Aristotelis, dicentis, illos promptè canescere? nam ipsi diu ante canos sua incommoda experiuntur, dum perperam caput molle, & effeminatum circumferunt. Eodem modo offenduntur qui aut felinas, aut leporinas pelles in pectore gerunt: neque dubito, quin hodie eiusmodi homines ostentatio potius quàm sanitas promoret, nec minus eos damnabis, qui præter necessitatem caput aggravant. Ego verò miror eiusmodi etiam non & faciem ipsam involuere. nec quisquam ista me putabit dicere derisionis causa: nam re vera plus periculi videtur imminere internis visceribus à frigido, quàm externo capiti ab aëre circumfluo: consuetudo tamen seruanda est, aut pederentim relinquenda. Eadem ratione tonsio exquisitè periculosa est: nam quantum corpus rarefaciat, indicat sequuta pilorum fecunditas. Quòd autem promptius iniuria externa sese insinuat corpori raro, quàm denso, nemo est qui ignoret. Sed & conualescentes id ipsum experti sunt, qui hac de causa sæpe fecerunt recidivam. Quòd si sacra prophanis comparare liceat, & Sampson ille de raso capite vires amisit; iterum comatus recuperavit: quantum mysterium in illo quoque loco subsit. Luna autem, præsertim in suo vigore, ut quando cum sole concur-

rit, siue quia caput rarefacit, siue quia sol ipsos humores eo pettrahit, quippe & externis sol plus dominatur: tamen & hunc à cibo cauere oportet, & caput potius ungere quàm lauare, quoniam hoc quoque caput infirmius reddit, & plus quàm unctio rarefacit, hac enim sæpe densat. Quòd autem potius ad prunas quàm flammam unctiorem laudat, generale est; quia unctio ad flammam melius insinuat, etenim flamma externa nimis cito astringit: tamen ex prunis lentum assum, quàm ex lignis viuacem flammam vulgus magis veretur, atque capiti magis suspectum habet: iniquè meo indicio; nisi assus minor fuerit & diuturnior. Sicuti autem motum à cibo cauere oportet; ita multo magis lectionem, studium aut alteram cogitationem, quæ maximam & præcipuam studiorum partem obtinet: etenim motus tantum leniter cibum in ventre perturbat, ac nonnunquam ad superiora mittit fumos; aliquando autem retrahit, si tantum lentus fuerit: cogitatio autem, hæc sursum pronocat. Sed & balneum facile caput confundit, tamen si tunc ipsum, tum ipsius aër, sæpe præsens remedium fuerit ubi ab infernis partibus (præsertim ab uniuerso corpore) corpus feriunt: alioqui ipsum cauere oportet; aut (si forte ex consuetudine est) quàm lenissimè aut citissimè relinquere.

### Capiti nihil æquè prodest atque aqua.

AQUA frigida, ut postea dicemus, non tantum capiti, sed & omnibus particulis frigidis per se obest: per accidens autem prodest; scilicet sanis, quos in eodem seruare volumus, inutilis; infirmis autem, quos mutare, utilis: ita enim melius est res ipsas quàm nomina distinguere, ne auditiorem suspendamus: quemadmodum faciunt, qui priori distinctione aut hic aut alibi contenti non sunt. Condensat autem ipsum caput vehementer aqua: quapropter non tam tantum aduersus externas iniurias, sed & ab infernis quoque impetibus bene repellit, compescit; nec tantum caput corroborat, sed oculos,

Scribonius  
Largus compositione 10.  
Prodest, inquit, cum diu caput dolet, ad eum tonderi. Nec negandum est, quin, ut prima quartæ ait ille, tonsura capitis poros aperiat, & q. ob id salubris existat: verum, cum rasura densam reddat cutem, prohibet, ne vapores exhalent.



oculos, ut antè diximus, si quis illos in ipsa frequenter imbuat.

**Bibere huic assidue vinum dilutum.**

DECEBAT autem in hac observatione, & victum præscribere: quapropter præter alia perpetuum vinum vetat, ne caput alius satis rentet; sed & aquam propter cruditatem reformidat. Itaque vinum dilutum ac leue consulit, ut forte fortuna tandem contrariam capitis gravitatem, vino familiariter & citra incommodum, disiciat. etenim & dolores oculorum hoc modo Hippocrates

medicatur, & ex vino conceptam gravitatem hoc modo curat, ubi dicit: Quem læsit hesternæ vini potio, crastina curat; modò leue hoc pondus sit, & citra corporis consensum. Veruntamen vinum molestè tempore aggritudinis ferret, qui ne antea lymphatum quidem bibit. hinc quidem mihi illius verba spectare videntur; nam paulo obscuriora sunt: quippe postea statim, nunc vinum nunc aquam permittit; eadem forte ratione, qua prius vinum dilutum commendat. Reliqua manifesta sunt, quippe quòd vomitus caput offendant; nisi forte ex ipso ventre capitis gravitas oborta sit, ex se patet, alioqui autem alienat.

## CAPUT V.

**De his qui lippitudine, grauedine, destillatione, tonsillisque laborant.**

NEQVE verò his solis, quos capitis imbecillitas torquet, vsus aquæ frigidae prodest: sed iis etiam, quos assidue lippitudines, grauedines, destillationes, tonsillæque malè habent. His autem non caput tantum quotidie perfundendum est, sed os quoque multa frigida aqua fouendum est: præcipueq. omnibus, quibus hoc utile auxilium est, eo vtendum est, ubi grauius cælum Austri reddiderunt. Cumque omnibus inutilis sit post cibum aut contentio, aut cogitatio animi: tum his præcipue, qui vel capitis, vel arteriæ dolores habere consueverunt, vel quoslibet alios oris affectus. Vitari etiam grauedines, destillationesque possunt, si quàm minimè eum (qui his opportunus est) aërem vel loca, aquasque mutet, si caput in se protegit, ne incendatur, nève subitum ex repentino nubilo frigus id moueat, si post concoctionem ieiunus caput radit, si post cibum neque legit, neque scribit.

## COMMENTARIA.

NOS quidem in multis aliis locis diximus contra quosdam ex neotericis, causam destillationis immediatam semper

esse frigidam; calidam autem nunquam: neque enim in aëre pluvia unquam generatur (cui uni destillatio comparatur) nisi per aëris rigorem;



rigorem; nam quod aliquid vaporem indensare posset, præter frigus, non est intelligibile. Attamen nunc rationem velis refellere, & illis ex hoc Celsi loco patrocinari, qui audientibus omnibus frigidam laudat. sed non hæc suadet ille in his qui iam distillationem patiuntur, sed quod ab ea præservare voluit. dictum enim prius est, quod frigida non solum adversus externas, sed internas quoque iniurias caput pertinax faciat: quapropter vel sub aëstro hæc maxime observanda sunt, ubi caput repleti formidamus. Quod autem non his consulat qui tam parvum, sed quibus hi affectus recurrunt, tum ex aliis patet, tum ex eo ma-

xime quod omnem morborum curationem ad reliquos libros differt. & tamen per accidens quoque conferre frigida hic posset. Eadem ferè observatio est, ubi arteria laborat; quippe raucedine: nam & hæc una ex distillationis speciebus est, & de affectibus aliarum supernarum partium, oris atque similibus. Reliqua prius dicta sunt. Illud autem indistinctè, atque à precedente capite dissentire dictum est, quod vel post concoctionem ieiunio capitis rationem admittat, quippe plus omnino venit. si forè autem non simpliciter laudat, sed minus quam post cibum vituperat, ac facilius indulget; forè etiā tempore declinationis id ipsum intelligit.

## CAPUT VI.

*Ad solutam aluum remedia.*

**Q**UEM verò frequenter citata aluus exercet, huic opus est pila, similibusque superiores partes exercere, dum ieiunus est ambulare, vitare solis nimium ardorem, continua balnea, vngi citra sudorem, non vti cibis variis, minimeque iurulentis, aut leguminibus, oleribusve his, quæ celeriter descendunt, omnia denique fugere quæ tardè concoquuntur. Venatio, durique pisces, & ex domesticis animalibus assa caro maximè iuvant. Nunquam vinum falsum bibere expedit, ne tenue quidem, aut dulce, sed austerum, & plenius, neque id ipsum peruerus. Si mulso vti volet, id ex decocto melle faciendum est. Si frigida potiones ventrem eius non turbant, his utendum potissimum est. Siquid offensæ in cœna sensit, vomere debet, idque postero quoque die facere, tertio modici ponderis panem ex vino esse, adiecta vva vel olea, vel ex defruto, similibusque aliis, deinde ad consuetudinem redire. Semper autem post cibum conquiescere, ac neque intendere animum, neque ambulatione, quamvis levi, dimoueri.

Plin. lib.  
14. cap. 3.  
Tenne,  
Dulce,  
Austum,  
Plenus.

## COMMENTARIA.

**M**IRUM est qua ratione hoc Caput Celsus hic ascripsit, nam prius aluum lubricum satis medicatus est: quod si ibidem

obiter fecit, satisfacere potuit, quod in secundo commentatus est. Omitto nunc literas & desulibus (quibus hæc potissimum videtur



videatur scripsisse) potius astringi ventrem, quam disfluere. Faciunt etiam caput quibusdam suspectum, ea quae de ardore solis dicuntur, & unctione circa sudorem: nam aestus solis potius omnem aliam euacuationem molitur, quam per sedem; nam hanc potius renellit, dum sudorem pronocat. & propterea Hippocrates tempore aestatis magis vomitum quam deiectionem probat. Quod si ea ratione, qua virtutem, aliquando deiecit, ventrem turbet; & hoc quoque frigori magis frequens est: artamen excusari potest; quemadmodum & illud; quod de unctione circa sudorem scriptum est: nam licet contra sudor deiectionem renellit, forte ex ea unctione solutionem & emollitionem universi corporis possit timere. Diversa etiam ratio & consilium huius capitis esse potuit: quippe prius ventrem mollem in sanis medicatus est; hic in neutris, ubi magis suspectus est. Prosequamur ergo reliqua ab eo loco, ubi superiores partes exercere consilium; nam motus semper ad se revellit: itaque & pila non est inutilis; quoniam neque haec tam aequè omnes partes exercet, quin superiores magis fatiget. ergo, è contrario, inferiorum partium motus cavendus est; nam facillimè totum onus quod in ventre est, deorsum traheret: quod si forte nullum ibidem onus sit, iam non ipsum ventrem turbat, sed excccat, & aliis quibusdam rationibus; magis autem quia excrementa in ambitum corporis disiecit. itaq. matutina deambulatio ventrem corroborat; pomeridiana & vespertina lubricat. nec minor huic debet esse victus observatio; etenim in primis omnem varietatem, saltem in uno mense, cavere debet; quoniam promptè hanc deiectionis ventris sequitur; aliquando etiam cholera: quippe varietas ista, ut non percoquatur, ita ab hepate non allicitur, sed in ventre moratur. corrumpitur autem haec varietas maxime, si quidem scilicet etiam praepostero ordine assumantur dura ac deinde lenia: neque tamen à corruptione vindicantur, si ordo servetur, nam diversa qualitate seipsa conficiunt: ac natura quoque, quae ea conficere deberet, nonnihil ab eo patitur.

Neque tantum varietatem ipsorum ferulorum vitare oportet, sed ipsius substantiae cruditatem: nam dum haec diutius in ventre atque intestinis morantur, oneratus, atque, ut ita dicam, designatus venter deorsum ea praecipitat. Quod autem intulenta, legumina, olera vitare oportet, prima ratione efficitur; quia ferè ea lubrica sunt; praeter paucissima olera, quae virtutem astringentiam habent, ut portulaca: & haec tamen ipsa dum viridis est, inter mollientia postea numeratur. Eadem ferè ratione contingit, quod brassica, sine crambe (intra pronerbium) bis cocta atque posita, ventrem stringat; semel, molliat: nam secunda coctione recens illi humiditas extracta est. Conferunt autem è contrario omnes silvestres carnes: quod haec perpetuò domesticis sicciores sunt: sic & pisces qui duram carnem habent, & friabilem, his qui mollem; solis enim siccis per se astringere enenit; calidis autem ac frigidis, per accidens. non operatur autem hanc siccitatem tantum rerum species, sed & ipsa concoctionis diversitas. hac ratione & assa potius esse oportet, quam elixa. Neque minor debet esse in potu observatio: etenim studiosissime illius copiam vitare oportet. ubi verò bibendum est, non cervisia, non vinum tenue, ac dilutum, aut dulce, sed plentius, ac vinosius, amsterum quoque bibendum est: nam illa omnia ventrem molliunt dum humectant. ita & vetera vina dum in acidam facultatem degeneraverunt, non aliter quam acetum ac cholera ipsa, ventrem vellicant. Ergo neque mulsum bibere oportet; id enim antiqui ferè ex musti partibus duabus, & mellis una composuerunt, saltem mel perpetuò admixtum habet: quare si quis eo uti velit hoc tempore, erit satius ipsum ex melle prius cocto facere; ita enim minus statulentum reddetur, ac lubricum. Nec tantum facultatem istorum spectare oportet; nam & hoc plurimum refert, sub qua qualitate exhibeas. confert autem semper his quaecunque quam frigidissimum bibere, etiamsi vinum fuerit, nisi venter facillè turbetur: ut si quis ex natura frigidus ulsero, vel statulentus



lentus est, non frigidissimum magis com-  
petit: nunquam autem repidum, quamuis  
ita hodie abusus habet; emollit enim uniuersum  
ventrem. Potes etiam hoc loco per frigi-  
das potiones, & aquam intelligere; nam  
& hæc nonnihil ventrem aliquando corro-  
borare potest. quum autem prius ea que  
tarde coquantur, suspecta habuit, hinc nunc  
vomitus à cæna iis consultit, qui aliquid of-  
fense senserunt: scilicet sine ob multitudi-  
nem, sine ob cruditatem grauatus sit, ven-  
ter fluctuet, murmuret, iremat, vel aliter  
vacillet, aut solito plures ructus edat; quippe  
hæc omnia cruditatem indicant, aut malum  
ventris complexum. Veriti igitur ne per  
ventrem, totum onus præcipiteur, præstat  
in contrarium vomitu renellere, non sine ob-  
seruatione in sequentibus diebus: non enim  
subito a vomitu ad crapulam, & consuetu-  
dinem redendum est. sed & illo die, atque  
altero quoque frugaliter viuendum unicui-  
que iuxta discrimen consuetudinis: nam  
tanta sobrietas quantam hic præscribit, no-  
stratibus non conuenit; sed tantum iis qui

alioqui sobrii esse consueuerunt. Sed neque  
tertio die quemuis cibum assumere oportet,  
sed eum qui nonnihil facultatis astrictoria  
obinet: ut integram uinam passam, nam  
caro illius lubrica est. Consultata est & olea,  
si eam intelligas, qua in muria seruatur &  
colymbadis nomen accepit; non autem dru-  
piam, nam hæc aut parum aut nihil astri-  
ctoria facultatis habet: sed & colymbades  
ventrem mouent, non per se sed ratione con-  
dimenti. Ergo uinam hanc vel oleam po-  
tius ex defruto quam sapa accipere conue-  
nit: nam longe minus quam sapa lubricat,  
quoniam plus quam sapa ad dimidium de-  
coctum est; utrumque tamen ex musto fit.  
Quod in fine sequitur, obscuritatem non ha-  
bet; nisi quod animi intentio nihil incom-  
modare lubrico ventri uidetur; nam contra  
potius renellit: attamen quatenus concoctio-  
nem, ut prius diximus, inturbat, ventrem  
quoque nonnihil tandem mouere potest; nam  
quo minus venter coquit, eo magis diffinit.  
hoc (puto,) nec aliud, Cornelius noster in-  
tellexit.

## CAPVT VII.

*Remedia ad coli dolorem.*

**E**T SI laxius intestinum dolere consueuit (quod *κωλον*  
nominant) cum id nihil nisi genus inflationis sit, id agen-  
dum est, ut concoquat aliquis, ut lectione, & aliis generibus  
exerceatur: utatur balneo calido, cibis quoque & potionibus  
calidis: denique omnimodo frigus cuitet, item dulcia omnia  
leguminaque, & quicquid inflare consueuit.

## COMMENTARIA.

**L**AXIVS nunc intestinum appella-  
uit colon, quod ceteris laxius sit. Con-  
sistit autem & in ilco similis dolor; mollior  
tamen ac breuior, quanquam suspicentur  
neoterici contrarium. sed & de his alibi  
multa. Duo tantum hic adicere oportet,  
ad præcautionem istorum dolorum non pa-  
rim conferentia, cinguli angustiam, atque

alij esum: nam iis duobus etiam testatur  
multos vicisse vehementissimos circums; non enim  
consueuerunt antiqui adeo prom-  
ptè ad solutinos clystères confugere, ut ho-  
die moris est. quippe & ipse Galenus solo  
clysteri acri, hoc est, incisivo, aut solo oleo  
rutaceo, in hoc morbo uti consueuit; de quo  
alibi.

## CAPVT



## CAPVT VIII.

*Quæ agenda sint stomacho laborantibus.*

**S**i quis verò stomacho laborat, legere clarè debet: postlectionem ambulare: tum pila, vel armis, aliòve quo genere, quo superior pars mouetur, exerceri: non aquam, sed vinum calidum bibere ieiunus: tum cibum bis dicassumere, sic tamen vt facilè concoquat: vti vino tenui, & austero, & post cibum frigidis potionibus potiùs. Stomachum autem infirmum indicant, pallor, macies, præcordiorum dolor, nausea, & nolentium vomitus, in ieiuno dolor capitis. Quæ in quo non sunt, is firmi stomachi est. Neque credendum vtiq; nostris est, qui cùm in aduersa valetudine vinum aut frigidam aquam concupierunt, deliciarum patrociniũ in accusationem non merentis stomachi habent. At qui tardè concoquunt, & quorum idèd præcordia inflantur, quìve propter ardorem aliquem noctu sitire consueuerunt, antè quàm conquiescant, duos, trèsvè cyathos per tenuem fistulam bibant. Prodest etiam aduersus tardam concoctionem clarè legere, deinde ambulare, tum vel vngi, vel lauari assiduè, vinum frigidum bibere, & post cibum magnam potionem, sed (vt supra dixi) per siphonem, deinde omnes potiones aqua frigida intercludere. Cui verò cibus acescit, is ante eum bibere aquam egelidam debet, & vomere. At is cui ex hoc frequens deiectione incidit, quoties aluus ei constiterit, frigida potione potissimùm vtatur.

## COMMENTARIA.

**I**n fine huius capitis, bis medicatur stomachum, hoc est ventrem: primò frigidum; secundo calidum. periculum ergo est, ne bis idem in eodem capite audiamus; nisi quispiã in principio capitis stomachum propriè pro superiore ventris osculo audiat. Fortè etiam in prima capitis parte dolorem discuit; in secunda verò ac. tertia, concoctionem corrigit, prout frigido immutat

vel calido: ac quæ in tota prima parte scribit, nisi quòd fortè agrè feret ipsum ieiuno indulgere vinum: potes autem coniectare, quod antè respondimus, non enim subito vinum modicum articulos tentat, eò quòd tantumquam medicamentum recipiatur, sed immòdicum. Maior est obscuritas in his verbis: Neque credendum vtiq; nostris est, qui quum in aduersa valetudine,



dine, vinum aut frigidam aquam concupierunt, deliciarum patrociniū in accusationem non merentis stomachi habent. Videtur autem mihi eos breuiter recriminari, qui fortè ex intemperantia vite stomacho affecti, genuinum stomachi intemperamentum male accusant pro ipsa incontinentia.

At qui tardè concoquunt &c:

HÆC est secunda huius capitis pars, qua frigidum stomachum emendat, ex quo (quod mirum est) ardor & sitis aliquando suboritur. itaque si modica ac toleranda est, superdormire oportet, inquit Hippocrates; si autem magna, theorema medicinale est, intemperiem ac defectum potui restringere. ita quidem Galenus consuluit. Quomodo bibendum esset, ipse Celsus adiecit: Per tenuem, inquit, fistulam vel siphonem, non affatim sed paulatim demittere. Videtur autem hoc pugnare cum eo quod prius

diximus, magnam sitim optimè in febris dilui vniuerso potu simul affuso. verum in febris vniuersum corpus incensum est; hac autem sitis à supremo ventris osculo oritur: quod melius delinitur paulatim exucta vniuersa potione, quàm affatim affusa. Lectiōnem etiam (matutinam scilicet, non autem pomeridianam,) ad concoctionem laudat; quia præsertim supremas partes exercet atque corroborat.

Cui verò cibus acescit, &c.

NOVISSIME ventrem calidum medicatur: sape enim cibos hic corrumpit; præsertim faciles ac calidos; idq; verbum acescit audire oportet pro, amarescit: nam si propriè audias, nihil tali ventri magis inutile quàm aqua frigida. fortè verò ita verbo acescit vsus est, ex opinione antiquorum medicorum, qui acidum saporem per caliditatem fieri arbitrabantur: quos Galenus refellit libro quarto (si rectè memini) de simplicium facultatibus.

## CAPVT IX.

*Quid obseruandum sit dolore nervorum laborantibus.*

SI cui verò dolere nerui solent (quod in podagra, chira-græve esse consuevit) huic quantum fieri potest, exercendum id est, quod affectum est, obiciendumque labori & frigori, nisi cum dolor increuit. Sub \* dio quies optima est. Venus semper inimica est. Concoctio (sicut in omnibus corporis affectibus) necessaria est. Cruditas enim id maximè lædit, & quoties offensum corpus est, vitiosa pars maximè sentit. Vt concoctio autem omnibus vitiis occurrit, sic rursus aliis frigus, aliis calor. Quæ sequi quisque pro habitu corporis sui debet. Frigus inimicum est seni, tenui: vulneri, præcordiis, intestinis, vesicæ, auribus, coxis, scapulis, naturalibus ossibus, dentibus, neruis, vuluæ, cerebro. Idem summam cutem facit pallidam, aridam, duram, nigram. Ex hoc horrores,



rores, tremoresque nascuntur. At prodest iuuenibus, & omnibus plenis, erectiorque mens est, & melius concoquitur, ubi frigus quidem est, sed cauetur. Aqua verò frigida infusa, præterquam capiti, etiam stomacho prodest. Item articulis, doloribusque qui sunt sine ulceribus. Item rubicundis nimis hominibus, si dolore vacant. Calor autem adiuuat omnia quæ frigus infestat. Item lippientes si nec dolor, nec lacrymæ sunt. Nervos quoque qui contrahuntur, præcipueque ea ulcera, quæ ex frigore sunt. Idem corporis colorem bonum facit, urinam mouet. Si nimius est, corpus effœminat, nervos emollit, stomachum soluit. Minimè verò aut frigus, aut calor tuta sunt, ubi subita insuetis sunt. Nam frigus lateris dolores, aliaque vitia: frigida aqua strumas excitat. Calor concoctionem prohibet, somnum aufert, sudorem digerit, obnoxium morbis pestilentibus corpus efficit.

## COMMENTARIA.

**PODAGRA**, chetragra, & similes articulorum morbi, ex his sunt qui literatis quoque aut certe urbanis superuenire consueverunt: etenim hi morbi non nisi molles & effœminatos sequuntur: nam qui ex penuria accedunt, nunquam peculiarem aliquem locum deligunt, sed vniuersos simul articulos (dicente Galeno) ferè affligunt: podagra verò & chiragra ferè ob tres generatim causas eueniunt: intemperstiam Venerem, immodicam crapulam; aliquando autem ob articulorum aut genuinam, aut adscititiam imbecillitatem: quam non parum promouet otium; nam articuli sua natura frigidi sunt, ac ab hoc situ promptè languescunt. neque minùs partem infirmam, qui ipsam multis ouerant: nam re vera calorem exolunt, tantùm abest ut partem corroborent; quippe calor digerit, frigus vnit; ergo molliem tollere oportet. E contra, pars ipsa frigori subinde obicienda; non eo quidem tempore quo languet, sed quo valet maximè exercenda: quod si fieri non licet, saltem frictio ex sale vel aqua ardente negligenda non est; nequaquam enim

calor iste, ut qui à multitudine vestium suscitatur, mollis est ac languidus, sed siccus. Quòd si præter hæc fastidita crapula sobrietatem seruare possit atque legitimam concoctionem; non dubium est quin rarò paroxysmus recurreret: nam ferè in corpore euenit, quod in republica, ut semper onus aliarum partium detrudatur in viliorem atque imbecilliores. Sed rarò paucissimi ex his præseruantur; quoniam non nisi effœminati ferè sunt, qui eiusmodi vitiis corripuntur: qui mallent singulis annis semel morbum atque dolorem parturire, quam diu sobrie, ac frugaliter benèque viuere; digni profectò suo partu homines.

Ut concoctio autem omnibus vitiis occurrat.

**CALIDI**, frigidi externi, atque interni commoda & incommoda satis late in Aphorismis demonstrauimus: etenim frigus inimicum est generatim omnibus frigidis, omnibus tenuibus, atque ulceratis; quia licet ab internis abstineat, ulcerata tamen mordet. ad concoctionem autem, ac deinceps

G.

omnia

omnia opera animalia; prodest si caueatur; hoc est non nisi modice admittatur: per accidens autem prodest, & articularum, & nervorum sine ulcere doloribus; dum calorem reuocat, iuxta eas conditiones quas in Aphorismis & alibi præscripsimus. Circa corporis extrema variè sese habet; nam lenius frigus aut non admodum diuturnum, calorem subinde meliorem aduocat; alibi autem nunc pallidam, nunc liuidam, aliquando nigram cutem reddit: pallidum autem appellat, non ut hodie recentiores, sed ut vulgus ipsum inaudit; sic & prius. Male vero hic legitur, Item rubicundis nimis hominibus, si dolore vacant; pro eo quod suspicor (Item rubicundis inflammationibus si ulcere vacant:) nam & hoc consentit cum Hippocrate in quinto Aphorismorum, unde hæc pleraque Cornelius Celsus desumpsit.

Calor autem adiuuat omnia.

Quæ de calore dicuntur, ex iis quæ de frigore diximus, manifesta sunt; excepto principio, ubi lippientius commendat si dolore quidè ac lachrymis vacent, vocat autem lippitudinem non vulgariter, sed more medicorum, inflammationem in oculo: atque hæc duplex est; aliquando enim cum euidenti foras defluxu; aliquando vero sine eo: nam si varius cõperculum, vel ex corporis vel ex circumstantiæ aeris natura obtigerit, ferè manifesta defluxio visitur. Igitur frigidum non admonebimus, veriti ne particulam ipsam plus satis astringamus. Cur autem & dolorem secludat, nescio; etenim citra dolorem, quomodo lippitudines ista esse possint? credo quod & hic sine ulcere legendum sit; nam hoc cum plurimo dolore esse solet: nos tamen integram lectionem retinere maluimus.

## CAPVT X.

### *Observatio in pestilentia.*

EST etiam obseruatio necessaria, qua quis in pestilentia vtatur adhuc integer, cum tamen securus esse non possit. Tum igitur oportet peregrinari, nauigare. Vbi id non licet, gestari, ambulare sub diuo, ante æstum leniter, eodemque modo vngi, & vt suprâ comprehensum est, vitare fatigationem, \* crudelitatem, frigus, calorem, libidinem, multoque magis se continere, si qua grauitas in corpore est: tum neque manè surgendum, neque pedibus nudis ambulandum est, minimeque post cibum, aut balneum, neque ieiuno, neque cœnato vomendum est. Neque mouenda aluus, atque etiam si per se mota est, comprimenda est. Abstinendum potius, si plenius corpus est. Itemque vitandum balneum, sudor, meridianus somnus, utique si cibus quoque antecessit, qui tamen semel die tunc commodius assumitur: insuper etiam modicus, ne crudelitatem moueat. Alternis diebus inuicem modò aqua, modò vinum bibendum est. Quibus seruatis, ex reli-

\* crudelitatem,



ex reliqua victus consuetudine, quàm minimum mutari debet. Cùm verò hæc in omni pestilentia facienda sint, tum in ea maximè, quam Austri excitarint. Atque etiam peregrinantibus eadem necessaria sunt, vbi graui tempore anni discesserunt ex suis sedibus, vel vbi in graues regiones venerunt. Ac si cætera res aliqua prohibebit, vtique abstinere debebit. Atque ita ab vino ad aquam, ab hac ad vinum eo, qui suprà positus est, modo transitus ei esse.

## COMMENTARIA.

VTISSIMUM est aërem pestilentem quàm longissimè fugere: sed non nunc id suadet Celsus, sed diuersa exercitiorum genera, vt nulla pars relinquatur ociosa, quæ clam suo situ venenum alere possit. Secundò omnem excessum cauere oportet; maximè autem libidinis: quia hæc corpus maximè emollit, exoluit & putredini obnoxium reddit; quippe spiritum affatim euacuat, qui corpus regit, ac veges suslinet: videtis enim vt corpus destitutum spiritu, ac mortuum promptè corrumpatur. Neque multo minùs plenitudo cauenda est, ac cruditas; nam iustissimam concoctionem obseruare oportet. Ergo neque nudis pedibus obambulandum est, quia hoc concoctionem infirmit: & si qua prius in corpore granitas fuit, domi sese continere oportet, donec cruditas ipsa perficiatur. quippe motus, vt diximus, concoctionem moratur. Confert igitur & sobrius esse, ne quid imperfectum relinquatur, & semel tantum in die cibum capere, quippe in cæna; ne forte concoctio in die interrumpatur, vel alioqui alius excessus admittatur. Rectè igitur somnus meridianus (praesertim à cibo statim) interdicitur: nam, vt antè diximus, ipse quoque concoctionem corrumpit. & virumq. cum obseruatione hodierna pugnat: nam & hæc ientaculum habet, & cibum quàm plenissimam comprobatur; quoniam & Auicenna ipse dixit, Tantum euadunt qui viriliter bibunt, & comedunt, neque hoc multum abest à mente Galeni, vt alibi diximus, ne fortassis recentiore Auicennam asperneris. Verùm hæc illorum præ-

cepta non ad ipsam obseruationem, ac præcautionem, sed præsentem affectum pertinent: neque etiam corpus integrum præter consuetudinem ientaculum desiderat; sed penuria affectum atque indigum: nam & id auidius omnem aërem allicit, etiam malum; quapropter ipsum replere oportet. Huc fortè pertinet quod vulgo dicitur, Quod intus est prohibet extraneum: quippe interna mediocritas non facillè admittit externam copiam. Magis autem ab omnibus his discedi, quàm phlebotomiam, purgationem, vomitum prohibet, atque etiam si quid horum vltro accesserit, astringit. nam in hac obseruatione hodie in his nihil est communis, quàm subinde singulis diebus pilulas aliquos deglutire, atque hos fortè postea non laudabimus: non tamen Galenum contemnere possumus, qui corpora humida exiccavit, sicca humectauit, plena euacuauit, & impura purgauit: quid ergo dicemus? quod Celsus ista, tanquam Asclepiades alter, temerè abstulit? nequaquam. nam illa in corporibus neutris ac insalubribus Galenus duntaxat obit. Celsus verò integrum corpus accipit, quod nullam immutationem admittit. Verùm & si modicè plenum, aut impurum fuerit, neque hic neq. alibi (dicente Galeno in Therapentica,) statim ad phlebotomiam aut purgationem fugiendum est: Subinde enim, inquit, probè satis facit exercitium; aliquando inedia. quanto religiosius hic in euacuationibus sobrius esse debemus, vbi omnibus modis, viribus studendum est, quæ per euacuationes cum spiritu nonnihil exoluantur?



Macrobius  
vinum lim-  
phatū ideo  
commēdat,  
quod cor, ce-  
rebrum, he-  
par à quali-  
bet putrefa-  
ctione vene-  
nosa præfer-  
uat: & ut  
veneno ma-  
gis resistat,  
laminā au-  
ream in ipso  
exringuit.

Benè ergo & hic dictum est ab auctore no-  
stro, etiam abstinendum potius esse si  
corpus plenius fuerit, quàm enacman-  
dum. Eàdem ratione & balneum veterur,  
& sudoris profusum: atque his obseruatis,  
nihil in reliqua consuetudine variare per-  
mittit; nisi quod inuicem modò aquam,  
modò vinum consilii: fortè tamen & di-  
lutum vinum permetteret; nam aqua conti-  
nua, cruditas; vinum verò perpetuum,  
caliditatis periculum minatur: contrà verò  
vicissim maxime confirmat: nam vinum  
putredinem; aqua verò inflammationem  
dyscutit: ergo & vicissitudo ipsorum magis  
quàm confusio expedit.

### Cum verò hæc in omni pestilentia.

Hæc est grauissima pestilentia: etenim  
multo minor est quam tantum hominum  
affatus atulit; quippe illa multo vniuersa-  
lior. neque tantum istam obseruationem  
præfens pestilentia desiderat, sed & quænis  
grauis constitutio, unde hæc imminet. Ma-  
ximè autem eam obseruare debet, qui sub eo  
ambulat, aut peregrinatur: nam is eiusmodi  
aërem nullo modo vitare potest; & is qui  
domi manet, domesticum aërem studio me-  
liorem reddere potest. Ergo & in granibus  
regionibus (præsertim si quis recens in eas  
venerit) eadem cautio adhibenda est; atque  
eo modo inuicem modò vinum, modò aquam  
bibere decet, & si quam grauitatem senserit,  
donec percossa fuerit, sese continere at-  
que abstinere. Talis est obseruatio tum in  
his tum in peste, quæ aliquando febrem con-  
iunctam habet, aliquando autem sine ea

contingit, & tamen nihilo priore iuior.  
Sed nondum cum neotericis diariam ali-  
quam febrem pestilentem ponimus: nam &  
contra Galenum est in libro primo De diffe-  
rentiis febrium; & contra rationem, quæ  
nihilo facilius diariam admittit inter pesti-  
lentes, quàm inter putridas, ac nos de iis  
alibi. Nunc verò obseruationem quam cæpi-  
mus, prosequi oportet. quæ otiosa, ieiuna, &  
admirabilis, ac omnino ridicula, iis (non du-  
bito) apparebit, qui in recentioribus Arabibus  
ac barbaris versati sunt: apud quos nihil  
magis audies, quàm pilulas varias, amule-  
ta, alexipharmaca, quæ etiam bezearthica  
barbari appellant. quam salubriter verò hæc  
ab illis descripta sint, alij æstiment: omnia  
enim hæc excellentē quadam facultate do-  
tata sunt, quæ in mediocritas atque integritas  
vehementer suspecta est, in quibus & quænis  
alium excessum atq. mediocritatem prius  
verebamur; nedum hanc. Ergo nisi in  
impuris corporibus, aut iam sub venenato  
aëre versantibus, exhibenda sunt: nimirum  
quæ media sunt inter salubria, atque into-  
xicata, quibus opportunè accommodatur au-  
xilium, aliis autem venenum: quippe neque  
Galenus Armenum bolum (quantumcumque  
ab omni euidenti excessu semotum) aliis pro-  
pinat, quàm iam laborantibus. Atque hæc  
precor mecum alij cogitent: ne fortè quos  
vindicare volumus, maiori afficiamus discri-  
mine. nam antiqui ista alexipharmaca non  
ignorauerunt: & tamen ad præseruationem  
in corporibus firmis, extra conditionem pe-  
stilentem, ea non commendauerunt; soli  
neoterici ista faciliârunt.

Finis Commentariorum D. Hieremiæ Driuerij  
in primum Cornelij Celsi librum.



A V R E L I I  
C O R N E L I I C E L S I  
L I B E R S E C V N D V S ,  
D E C A V S I S S I G N I S Q V E  
C O M M V N I B V S E T A V X I L I I S ,

A B A L D V I N O R O N S S E O *Gandensi, medico,*  
*Enarrationibus illustratus.*

P R O O E M I O N .

**I**NSTANTIS autem aduersæ valetudinis  
signa complura sunt. In quibus explican-  
dis non dubitabo auctoritate antiquorum  
virorum uti, maximeque Hippocratis:  
cū recentiores quoque Medici, quam-  
uis quædam in curationibus mutarint,  
tamen hæc illum optimè præfagisse fa-  
teantur. Sed antequam dico, quibus præcedentibus mor-  
borum timor subsit, non alienum videtur exponere, quæ  
tempora anni, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis,  
qualia corpora maximè tuta, vel periculis opportuna sint,  
quod genus aduersæ valetudinis in quoque timeri maximè  
possit. Non \*quòd non omni tempore, in omni tempestatum \*quòd  
genere, omnis ætatis, omnis habitus \*hominum per omnia \*homines  
genera morborum & ægrorent, & moriantur: sed quòd fre-  
quentiùs tamen quædam eueniant. Ideoque vtile est scire  
vnumquemque, quid, & quando maximè caueat.

B A L D V I N I R O N S S E I

E N A R R A T I O .

CAPTAT Celsus hic non secus, ac in ipso statim initio sese dicturum pollicetur,  
præcedenti libro, per occupationem quæ quibusvis non solum vtilia, sed &  
quandam, auditoris benevolentiam: atque cognitu necessaria sint: vtile est enim vnum-  
quemque quodammodo attentum reddis, dum in quemque scire, ut dicis, quid & quando  
maximè

maximè caueat. & quum homini nihil utilius, nihilque magis expetendum sit, quam ut omnia corporis munia quàm rectissimè obeantur; & si ea aliqua parte lasa sint, quàm fieri potest ocysimè restituantur; promittit se signa aduersa valetudinis futura enarraturum: ut iis cognitis, omnem nostram operam impendamus ad id quod deest restituendum, (est enim, ut postea ex Hippocrate docet, medicina additio, & subtrahitio) & quod superest demendum, subtrahendumque; ac proinde, valetudinem quàm longissimè seruare incolumem: & deinceps, si eo iam ventum sit, ut lasis functionibus naturalibus & animalibus, contingat hominem malè valere atque egrotare; tum demum, quæ stem, quæ uè merum polliceantur, sese dicturum spondet. Atque post omnia quibus modis ægrotis subueniendū sit, edocet: Siquidem cherrurgicen, atque pharmaceuticen nobis ob oculos ponit, dum phlebotomia, frictionis, unctionis cucurbitularumque mentionem facit. Dieteticen autem ita absoluit, ut nihil melius, nihil exactius, nihilque quod in eà desiderare possis, reperiri queat. Nam præterquam quod clarè satis disseruerit, quando cibandum, ac rursum quando à cibo abstinendum, omnium etiam eduliorum facultates; insuper quæ multum, quæ parum nutriant, quæ ὀξύπονα, quæ

βραχύπονα, quæ res stomacho amica, aut aliena sint, fusissimè explanat. Idg, se non ex vulgi aut quorumuis qui rem medicam profitentur opinione, sed ex antiquorum medicorum præcipueque medicina parentis antiquissimi Hippocratis placitis facturum, ut maiorem dictis auctoritatem conciliet, pollicetur: ne videlicet, aut bullatas nugas aut aniles fabulas lectori proposuisse videatur. Nam quantumuis, inquit, recentiores nonnulli medici, sicuti Asclepiades, eiusque sequaces, relicta Hippocratis curatoria methodo, nouo quodam ordine Therapeuticen aggressi sunt: ad unum tamen omnes in signis causisque salubribus insalubribusque Hippocrati subscribere coacti sunt; quod & verissima, & rationi quàm maximè consona dixerit. Quare quum Hippocratis potissimum auctoritate hoc secundo libro insignorum enarratione usus sit Celsus; id quoque nobis faciendum restat, ut ex eodem locum loco interpretemur: & si quando (quod frequentius quàm volumus nobis usu venit) senem illum Cœum non satis reddiderit, atque ab illius sententia recesserit, utriusque conciliandis studeamus, expunctis quæ calographorum incuria redundabant, aut additis, quæ desiderabantur; aut pro substitutis quæ vera germanaque sunt, restitutis.

## CAPVT I.

*Quæ anni tempora, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis, qualia corpora vel tuta, vel morbis opportuna sint: & quod valetudinis genus in quoque timeri possit.*

**I**GITUR saluberrimum ver est, proxima deinde ab hoc hiems, periculosior æstas, autumnus longè periculosissimus. Ex tempestatibus verò optimæ æquales sunt, siue frigida, siue calida: pessimæ, quæ variant maximè. Quod sit, ut Autumnus plurimos opprimat. Nam ferè meridianis temporibus calor, nocturnis atque matutinis simulque etiam vespertinis frigus est. Corpus ergo & æstate, & subinde meridianis



meridianis caloribus relaxatum, subito frigore excipitur. Sed  
 ut eo tempore id maximè sit, sic quodcumque euenit, no-  
 xium est. Vbi æqualitas autem est, tamen saluberrimi sunt  
 sereni dies, meliores pluuij, quàm tantùm nebulosi, aut *Pluuij,*  
 nubili, optimique hieme qui omni vento vacant: æstate qui- *Nebulosi,*  
 bus Fauonij perflant. Si genus aliud ventorum est, salubrio- *Nubili.*  
 res Septentrionales, quàm Subsolani, vel Austri sunt. Sic ta-  
 men, ut hæc interdum regionum sorte mutantur. Nam ferè  
 ventus vbique à mediterraneis regionibus veniens salubris, à  
 mari grauis est. Neque solum in bono tempestatum habitu  
 certior valetudo est, sed priores morbi quoque (si qui incide-  
 runt) leuiores sunt, & promptius finiuntur. Pessimum ergo  
 cælum est, quod ægrum fecit, adeo ut in id quoque genus,  
 quod natura peius est in hoc statu, salubris mutatio sit. Ætas  
 media tutissima est, quæ neque iuuentæ calore, neq. senectutis  
 frigore infestatur. Longis morbis senectus, acutis adoles-  
 centia magis patet. Corpus autem habilissimum quadra- *Corpus qua-*  
 rum est, neque gracile, neque obesum. Nam longa statura, *dratum.*  
 ut in iuuenta decora est, sic matura senectute conficitur.  
 Gracile corpus, infirmum: obesum, hebes est. Vere tamen  
 maximè quæcunque humoris motu nouantur, in metu esse  
 consuerunt. Ergo tum lippitudines, pustulæ, profusio san-  
 guinis, abscessus corporis, quæ ἀποσμήματα Græci nominant,  
 bilis atra, quam μαλαγχοχόλιαν appellant, insania, morbus co-  
 mitialis, angina, grauedines, destillationes oriri solent. Hi  
 quoque morbi qui in articulis, neruisq. modò vrgent, modò  
 quiescunt, tum maximè & inchoantur & repetunt. At æstas  
 non quidem vacat plerisque ab his morbis, sed adiicit febres,  
 vel continuas, vel ardentes, vel tertianas, vomitus, alui de-  
 iectiones, auricularum dolores, vlcera oris, canculos, & in cæ-  
 teris quidem partibus, sed maximè obscœnis, & quicquid  
 sudore hominem resoluit. Vix quicquam ex his in autum-  
 num non incidit: sed oriuntur eo quoque tempore febres *Febres in-*  
 incertæ, lienis dolor, aqua inter cutem, tabes, quam Græci *certa.*  
 φθίσιν nominant: vrinæ difficultas, quam σφραγισίαν appel-  
 lant: tenuioris intestini morbus, quem εἰλεον nominant. Fit  
 item



item lauitas intestinorum, quæ λειψτερία vocatur, coxæ dolores, morbi comitiales. Idemque tempus & diutinis malis fatigatos, & ab æstate tantum proxima oppressos interimit, & aliis nouis morbis conficit, & quosdam longissimis implicat, maximeque quartanis, quæ per hiemem quoque exerceant. Neque aliud magis tempus pestilentiae patet, cuiuscunque ea generis est, quamuis variis rationibus nocet. Hiems autem capitis dolores, tussim, & quicquid in faucibus, in lateribus, in visceribus mali contrahitur, irritat. Ex tempestatibus Aquilo tussim mouet, fauces exasperat, ventrem astringit, urinam suppressit, horrores excitat, item dolores lateris & pectoris. Sanum tamen corpus spissat, & mobilius, atque expeditius reddit. Auster aures hebetat, sensus tardat, capitis dolores mouet, aluum soluit, totum corpus efficit hebes, humidum, languidum. Cæteri venti quod vel huic vel illi propiores sunt, eo magis vicinos his illisve affectus faciunt. Denique omnis calor & iecur, & lienem inflammat: mentem hebetat: ut anima deficiat, ut sanguis prorumpat, efficit. Frigus modò neruorum distentionem, modò rigorem infert, illud σπασμὸς, hoc τέτανος Græcè nominatur: nigritiem in vlceribus, horrorem in febribus excitat. In siccatibus acutæ febres, lippitudines, tormina, urinæ difficultas, articulorum dolores oriuntur. Per imbres longæ febres, alui deiectiones, angina, canceri, morbi comitiales, resolutio neruorum, quam παραλυσιν Græci nominant. Neque solum interest, quales dies sint, sed etiam quales antè præcesserint. Si hiems sicca Septentrionales ventos habuit, ver autem Austros & pluuias exhibet, ferè subeunt lippitudines, tormina, febres, maximeque in mollioribus corporibus, ideoque præcipuè in mulieribus. Si verò Austri, pluuiæque hiemem occuparunt, ver autem frigidum & siccum est, grauidæ quidem <sup>\*tum</sup> foeminae, quibus dum adest partus, abortu periclitantur. Hæ verò quæ gignunt, imbecillos, vixque vitales edunt. Cæteros lippitudo arida, & si seniores sunt, grauedines, atque destillationes malè habent. At si à prima hieme Austri ad vltimum ver continuarunt, laterum dolores & insania febricitantium,



citantium, quam *φρεσίν* appellant, quàm celerrimè rapiunt. Vbi primò calor à primo vere orsus, æstatem quoque similem exhibet, necesse est multum sudorem in febribus subsequi. At si sicca æstas Aquilones habuit, autumno verò imbres, Austrique sunt, tota hieme quæ proxima est, tussis, destillatio, raucitas, in quibusdam etiam tabes, oriuntur. Sin autem autumnus quoque æquè siccus, iisdem Aquilonibus perflatur, omnibus quidem mollioribus corporibus, inter quæ muliebria esse proposui, secunda valetudo contingit: Durioribus verò instare possunt & aridæ lippitudines, & febres partim acutæ, partim longæ, & hi morbi, qui ex atra bile nascuntur. Quod ad ætates verò pertinet, pueri, proximique his, vere optimè valent, & æstate prima tutissimi sunt: Senes æstate, & autumnii prima parte: iuvenes hieme, quiq; inter iuuentam senectutemque sunt. Inimiciior senibus hiems, æstas adolescentibus est. Tum si qua imbecillitas oritur, proximum est, ut infantes, tenerosq; adhuc pueros serpentina vlcera oris (quæ *αφθας* Græci nominant) vomitus, nocturnæ vigiliæ, aurium humor, circa vmbilicum inflammationes exerceant. Propriè etiam dentientium gingivarum exulcerationes, distentiones neruorum, febriculæ interdum, alui deiectiones, \* maximeque caninis dentibus orientibus malè habent. Quæ pericula plenissimi cuiusque sunt, & cui maximè venter adstrictus est. At ubi ætas paulum processit, glandulæ, & vertebrarum quæ in spina sunt, aliquæ inclinationes: strumæ, verrucarum quædam genera dolentia (*αρεγχόρδορας* Græci appellant) & plura alia tubercula oriuntur. Incipiente verò iam pube, ex iisdem multæ & longæ febres, sanguinis ex naribus cursus. Maximeque omnis pueritia primum circa quadragesimum diem, deinde septimo mense, tum septimo anno, postea circa pubertatem periclitatur. Si qua etiam genera morborum in infantem inciderunt, ac neque pubertate, neque primis coitibus, neque in fœmina primis menstruis finita sunt, fere longa sunt. Sæpius tamen morbi pueriles, qui diutius manserunt, terminantur. Adolescentia morbis acutis, item comitialibus, tabique maximè obiecta est, fereque

H

iuuenes

\* maxil-  
læque



iuvenes sunt, qui sanguinem expuunt. Post hanc ætatem laterum & pulmonis dolores, lethargus, cholera, infania, sanguinis per quædam etiam velut ora venarum (*αιμορροΐδες* Græci appellant) profusio. In senectute spiritus & vrinæ difficultas, grauedo articulorum, & renum dolores, nervorum resolutiones, malus corporis habitus (*καχεξία* Græci appellant) nocturnæ vigiliæ, vitia longiora aurium, oculorum, etiam narium, præcipueque soluta aluus, & quæ sequuntur hanc tormina, vel læuitas intestinorum, cæteraque fusi ventris mala. Præter hæc graciles, tabes, deiectiones, destillationes. item viscerum & laterum dolores fatigant. Obesi plerunque acutis morbis, & difficultate spirandi strangulantur, subitoque sæpe moriuntur. Quod in corpore tenuiore vix euenit.

## ENARRATIO.

## Saluberrimum ver est.

CLARIUS Hippocrates ver saluberrimum, ac morbis qui mortem afferant minimè obnoxium pronunciauit: nam aliqui, si quis saluberrimum simpliciter & citra exceptionem, ut Celsus noster, dixerit; ex professo sibi ipsi contradicere videbitur: nam paulo post, omnes quotquot sunt morbi, ex fusione non solum sanguinis, sed reliquorum deinceps humorum, atque eos qui hæreditario iure soboles innadunt, statisque temporibus accessiones faciunt, verno potissimum tempore exacerbari dicit. Ita ut si aliis conferatur, Celsus non rectè saluberrimum, hoc est, minimè morbiferum dictum videatur; nisi saluberrimum, minimè morbiferum, quemadmodum Hippocrates quoque interpretatur, intelligamus. quanquam, si quis simpliciter ver saluberrimum, hoc est, minimè morbiferum, dicere velit; citra calumniam id facile possit: quando ver (ut Galenus latius libro suo De temperamentis docet,) temperatum, neque sicut quidam suspicabantur, calidum & humidum, sit. Ac proinde, quum ad morbi generationem, alicuius intemperiei excessus requiratur; ver (quod omnis excessus ac dyscrasia expers sit)

nullos ex se procreaturum morbos; verum si quod tandem genus morborum sit, quod verno tempore innadere atque accessiones suas potissimum facere dicimus; id non tam veri, quam corpori quod sortitur malè affectum & impurum, acceptum ferendum.

## Proxima deinde ab hoc hiems.

CONSTITUIT veri proximā hiemem, quod videlicet calor innatus tunc plurimus est; cuius substantia, ut auctor est Hippocrates, tempore æstivo dissoluitur atque dissipatur. quod & voluit idem senex Aphorismorum primo, sententia xv. Ventres hieme & vere natura calidissimos definiens: quare per ea quoque tempora alimenta copiosiora exhibenda esse; calorem etenim innatum tunc plurimum esse. Per ventres non solum ventriculum intelligens, verum etiam cavitatem totam, in qua intestina & alia instrumenta concoctioni seruientia, continentur. Quum igitur calor innatus, omnium operum naturalium causa sit, ut rectè monet Galenus, necessarium erit hyberno tempore in corpore animalis omnia rectè administrari. cibi enim in ventriculo optimè concoquantur, quod calor innatus plurimus



plurimus sit, superfluitatēque in somnis longioribus expurgantur, quæ quidem exquisitè extenuantur per cutem; quæ verò in vapores convertuntur, per expirationem; quæ verò sufficientem habent crassitudinem, per urinas: in his enim plus est sedimenti, quam per æstatem; præter id etiam, quod tota urinæ multitudo sufficienter augetur. Quæ omnia quamvis quam maxime ita sese habeant, videtur tamen ex diametro hisce contradicere Aristoteles libro Problematon primo, eā videlicet Quæstione quā rogat, Cur per hiemem, minus quidem quam per æstatem, sed perniciosius agrotatur: ubi hieme non nisi gravissimis quibusque de causis corpus affici dicit; æstate autem lenissimis: & per consequens, quo causæ graviores, eò morbos esse vehementiores; ac proinde quòd tempus anni vehementiores morbos inferat, eò etiā periculosius dicendum. Verum quando æstivi morbi ferè acuti sint, atque à putredine originem suam magna ex parte trahant (quoniam sint pauci admodum, qui hieme perniciosius affligant) rectè tamen æstatem hiemini postpositum Celsus: neque enim salubrem omnino definit hiemem, utpote quæ in humiditate & frigidityte excedat; sed æstati tantum prætulit, quòd videlicet calor innatus sub id tempus dissipetur ac dissolvatur. At autumnus, omnium periculosissimus est; idque sua inequalitate: nam meridianis temporibus calor, nocturnis atque matutinis, simul etiam vespertinis frigus est: Quare non iniuriā Hippocrates, autumnus acutissimos simul & exitiales morbos fieri auctor est; idque vel ob antedictas causas, vel quòd (ut docet Galenus) æstivum tempus subsequitur, in quo multis quidem humores absint, præterea vires debilitate: quibus omnibus cum autumnarum accedit, quòd quum verno ac æstivo tempore humores ad cutem movebantur, ac dissolabantur; ab ambientis iam aeris frigidityte, ad interiora trahuntur pellunturque retrorridi feròque suo spoliati à præcedente æstu.

Si genus aliquod ventorū est.

SALVBRITATEM aquiloni inter re-

liquos potissimum assignat ventos: quòd quum frigidus sit & siccus, omnes corporis superfluitates consumat, roburque addat ipsis instrumentis; eò quòd astringit ac in unum cogit, densando nimirum substantiam: quòd voluit Hippocrates, eo Aphorismo quo dicit, Quotidianas constitutiones aquilonias, corpora densare, contendere, bene mobilia reddere, coloratiora & melius audientia facere. Nam & ventres hiberno tempore melius concoquunt, ac naturalia munia rectius obtinent, calore innato auctiore reddito ab aeris ambientis frigidityte; qui dum cutim constringit, naturalem calorem repellit, & in profundo corporis concludit, atque adeò eundem roborat atque auget. Austri autem, cum ex diametro cum aquilone pugnet, insaluberrimus ut sit necesse est: nam qualis qualis tandem sit, hoc est siue humidus siue siccus sit, corpus resoluit ac spiritus dissipat. humidus enim austri sua spiritalitate putredini corpora obnoxia reddit; calida namque atque humida constitutio in corporibus potissimum putredines inducit: unde & fœtidi anhelitus causa Aristoteli Austri dicitur. Hippocrates quoque in Aphorismis ait, Austri auditum bebetantes, caliginosi, caput gravantes, pigri, ac dissolventes. Siccus verò austros humidis longè perniciosiores existimat Plinius, quòd propter raritatem, animalium corpora desiccant; unde contingat animalia ipso spirante minus esurire, reseratis nimirum poris cutis calore austrino. Neque dissonat quòd alibi scribit Hippocrates, Austri, inquiens, de similis nature locis spirat unde aquilo; videlicet de austrino polo; multaque nunc & glacie, & gelu vexat loca, quæ polis vicina existunt: quum verò per solis itinera, & per meridianam plagam transit, rarefcit desiccatus à sole, unde isthuc calidus & siccus necessariò peruenit, & proxima loca calescit & desiccatur necessariò; unde quæ terra isthuc eduntur, siccescunt, clanculūque isthuc homines desiccant: quum enim de mari, neque de fluminibus ullum humorem capere possit, de animalibus, & de terra natis omnem humorem exugit. Qualis igitur tandem sit Austri, hoc est



hoc est sine naturalis, sine à temperie innata declinet, perniciosus omnino est, & periculo non vacat. atque ab hoc quum parum differat Subsolanus, ab eius quoque militia non multum declinat: nam sicuti Eurus non raro in Notum, hoc est meridianum statum transit ob ipsam qualitatis calide similitudinem; ita frequenter eosdem quos Ausler, praesertim siccus, morbos inducit. Fanoniorum autem cur hic non meminerit Celsus, admodum miror: praesertim quando hic nonnihil addubitandum sit, sit ne Aquilo an Zephyrus salubrior: quum Aristoteles Homerum secutus non vereatur Fanonios ventorum omnium serenissimos & gratissimos vocare; quod nimirum ventorum omnium temperatissimi sint, & Vere maxime spirent; neque calidi sint, ut Ausler; neque frigidi, ut qui de septentrionibus eueniunt; sed medium calidiorum & frigidorum statum obtineant: unde consequi videtur ventorum omnium saluberrimos esse, ac proinde non recte à Celso praetermissos; idque potissimum quum Subsolani meminerit. Sed hoc studio quodam Celsum fecisse dicimus: quum enim inter calidum & frigidum temperati quodammodo sint Fanoij, hac parte meliores aquilonibus sunt: atque ita iam ante eas aestates laudauit, quae Zephyris quam maxime persentur. inferiores tamen septentrionalibus ventis aestimantur, propter humiditatis excessum. Roborat igitur naturales functiones tum ob frigiditatem, tum siccitatem Boreas: huic quam proximè accedit Zephyrus; & quò serenior fuerit, eò quoque melior: hanc ordine sequitur Subsolanus; ultimas tenet Notus.

### Sic tamen ut hæc interdum regionum, &c.

EXISTIMAT Plinius à natura legem quandam ventis attributam; ita ut quidam certis statisque tantum temporibus, idque praescripto sine, spirent: quidam etiam provinciales tantum sint, ac vni tantum provinciae communes. Sic Sciron loca tantum infestat circa Athenas; Iapyx Calabriam; Atabulus Apuliae grauis peculiariter dici-

tur. Quidam etiam sunt, qui quum praesentem flant, in una tamen aliqua regione non percipiuntur. quemadmodum de Austro memoria proditum reliquit Fabianus, quem in Aegyptum penetrare negat. & (quod magis admirandum est) sunt qui uno loco calidi; alio sint frigidi: ad id mirum non est, ventorum salubritatem variari pro regionum sorte. Nam & austrini venti hieme si perflant Africam, ei non minùs frigidi sunt (si Aristoteli credimus) quam regioni nostrati aquilones: ac rursus Boream idem testatur in Byzantio clauum & salubrem esse; in Thessalia verò imbidum & pluuiosum: illic enim perflant montes; hic arenas locaque calida. ergo sicut venti montibus aueruntur à quibusdam locis & cinitatibus; ita etiam spiraculis aut caernis quae sunt in montibus, ipsorum qualitates alterantur, ita ut vel calidiores, vel frigidiores, leniores vel impetuosiores spirent: sic qui à mari spirat ventus, nullius magna ex parte est grauisque; qui à mediterraneis, salubris ac serenus.

### At ætas media, &c.

ÆTATVM omnium iustissima media, quæ & consilens dicitur: est siquidem medio quodam loco posita inter omnes reliquarum ætatum excessus. Iuuenilis enim calere; senilis frigore excedit: quo fit etiam ut hæc longis frigidisque morbis magis obnoxia sit; illa acutis, febribus, pleuritidibus, & id genus aliis. Inter corporis autem constitutiones quadrata habilissima est, hoc est inter obesam gracilemque; inter longam & breuem media: cuiusmodi ferè temperata est; nam quæ intemperie aliqua infirma constat, circa mali alicuius suspensionem esse nequit: gracile enim corpus infirmum imbecilleque est; obesum hebes, hoc est ad actiones pigrum, nisi quis hebetudinem ad actiones animales quoque referre malit: quemadmodum Aristoteles Sanguineos magna ex parte stultos, stolidosque esse dicit. Longam autem staturam quum iuuenta nec indecoram nec inutilem, matura etiam senectute consui doceat; non vides quid Hippocratis senten-



sententiam secutus sit, qui eam senectū in-  
uilem, & paruitate detererem definivit:  
quod, ut docet Galenus, longi iam senescen-  
tes gibbi fiant, & vix possint onus porferre:  
quales cerē non admodum propriē maturē  
senescentes dicemus. Matura etenim sene-  
ctus vocatur, quę omnino perfectā & de-  
bitum tempus assecuta est; qualem longi in-  
ter reliquas corporis constitutiones optime  
consequuntur, quum temperiem calidam &  
humidam senectuti planē contrariam adepti  
sint: atque adeo tantum abest, ut aliquid  
vitiū huic longitudini ascribi possit, quin  
potius maximus annumerandum sit conmo-  
dis. Quamquam si quis Hippocratem cum  
auctore nostro conciliare studens, maturam  
senectutem pro ea quę ante tempus sit,  
(quemadmodum Cicero etatem maturri-  
mam pro ea quę festinatissima est, dixit,)   
accipiat; per me quidem integrum erit.

Vere tamen quæcun-  
que, &c.

RECTE docuit Hippocrates, morbos  
omnes omnibus fieri temporibus; quosdam  
verō magis in quibusdam ipsorum excitari:  
siquidem quum aeris temperatura nō solum  
sit morborum causa, verum etiam ipsa vi-  
ctus ratio; omnes omnibus temporibus mor-  
bos fieri clarum est. Verum quum aer nos  
ambiens non parum faciat ad alterationem  
naturę, rectē statis temporibus, exempli cau-  
sa, veri, æstati, hiemi & autumno, pecu-  
liares assignat morbos. Atque ij quidem, ut  
antē diximus, quos veri attribuit Celsus,  
non tam ratione veris, quàm corporis quod  
fortitur malē affectum ac morbidum, con-  
tingunt. Si enim, ut ait Galenus, aliquod  
corpus bonos habens humores, vernum tem-  
pus excipiat; hoc saluberrimum conseruat,  
nihil ex propria natura mutans. Compre-  
hendit autem breuiter, quotquot sunt, ver-  
nos morbos sub uno genere: quanquam, si  
numerum spectes, nulli difficilēque esse vi-  
deantur, quum morbos quicumque humoris  
motu nouantur, in metu esse dicat. atque in-  
ter hos quidem frequentissima sunt profusio-  
nes, aut profluvia sanguinis; sanguis enim

verno tempore maximē abundat, atque eo  
ipso tempore profunda corporis expurgantur  
a vitiosis humoribus, atque a parvis prin-  
cipalibus ad cuncti procelluntur. sic quoque  
pustulas oriri dicit Celsus: Hippocrates quo-  
niam easdem æstati attribuit, vere plurimas  
easque ulcerosis infestare dicit, æstate verō  
pauciores. Celsus tamen breuius & apho-  
risticis ita dicit: tantum conuertit, omit-  
tens τὸ ἐκαστὸς ὁ πλεῖστος: ut sub ijs  
etiam lepras, impetigines, vitiliginis Veri  
maximē familiares, quum ex fusione hu-  
morum oriantur, comprehendit. Nam  
pustula fortitur varia nomina pro humo-  
ris peccantis qualitate: siquidem psoa aut  
scabies dicitur, quum ex simplici cholera,  
aut pituita oriuntur pustule, heretq; in su-  
perficie cutis quiddam furfuris speciem rese-  
rens: penetrat enim bilis ad cutim exte-  
riorem, atque inibi pruritum facit, qui frictione  
sedatur. Qui verō a cholera adusta sit pru-  
ritus, scalpendo vix sedari potest, ac veluti  
squammens quiddam cuti adhæret. Dis-  
cernuntur autem biliosę pustule a pituito-  
sis, quod in his pruritus minor adsit, ac in  
latius fundantur; illę autem magis in altum  
attollantur: adhuc quod in pituitosis ani-  
malcula quedā nascantur, nonnullis Judæ-  
ica, alijs sirones dicti. Celsus tamen libro  
quinto Judæica pustule genus esse dicit  
durum ac subalicans. Quę limidiore sunt  
pustule, ex melancholia oriū habent; acro-  
res verō ex bile; ut rubicundiores ex san-  
guine; suppalida latęque ex pituita. Atque  
hęc hactenus de pustulis: quę ideo in me-  
diū proferre volumus, quod ipse Celsus libro  
quinto cap. 28. pustulas quidem omnes ver-  
nis temporibus potissimum oriri dicat, quum  
earum plura sint genera, quę ordine recen-  
set. Ceterum furores, airę biles, angine,  
morbi comitiales, quamquam, ut docet Ga-  
lenus, morbi autumnales sint; tussis, & gra-  
uedines, hyemales: eas tamen anginas verno  
tempore potissimum molestas esse dicemus,  
quę ex pituita fiunt, ut autumno biliosas;  
atque ita deinceps de lunatico morbo, gra-  
uedine & desillatione dicendum est. At ar-  
ticulorum dolores ex quibusvis humoribus  
sunt,



sunt, maximè tamen ex pituita bili commixta, inuadunt autem verno tempore, quod tum (ut diximus) sanguis & reliqui humores ad exteriora fundantur. Omnes igitur morbi quos hactenus Veri ascripsimus, corporis tantum exteriora petunt: atque eà fortè ratione inter atram bilem, hoc est morbos melancholicos, quartanas non numerant, quod videlicet hæc magis fiant compactis quodammodo ad interiora, quàm sapis ad exteriora humoribus: sunt siquidem febres etiam ex percussione ad interiora.

At quidem æstas non vacat, &c.

HIC Galenus eam æstatis partem, quæ ver excipit, intelligit, quum potius intelligendum sit, plerisque morbos veri ascriptos æstati proprios esse: cuiusmodi sunt omnes biliosi, ver enim omnibus temporibus communes habere diximus. Quotquot autem sunt æstivi morbi, quadrifariam possunt distinguì: nam aut ex bile sunt, aut ex adustione; atque id aut in siccis aut in particulis humidis, quarum humor calore æstatis foras trahitur: sic genitali, aut obsecnarum partium putredines annumerat. ubi Galenus miris modis sese torquet, hoc æstate humida adustinoque statu tantum contingere affirmans; quando Celsus (vbi etiam Hippocrates) de naturalibus anni constitutionibus loquatur. Per febres autem continuas, ardentes, tertianas, biliosos omnes morbos intelligit; iisque Hippocrates quartanas adiecit, eas videlicet quæ à cholera adusta sunt, sicut Celsus quoque cancos fieri docet. Vomitus etiam & alui profluvia, Galenus ad cholericos morbos refert: quum enim æstate bilis præsertim abundet, stomachum vellicando sursum lata vomitum; in intestinis verò derenta, acrimonia quâdam ad expulsionem excitans, alui profluvia facit, non tamen diuturna sed breuia. Hippocrates eadem ratione lippitudines adiecit, siccas videlicet, & quæ cum ingenti fiant rubore. Auricularum autem dolores, Galenus capitis repletioni attribuit; nos ipsi loco potius acceptas ferendas censemus, quod aures propria quadam natura bi-

liosæ sint ac sicca, biliosique excrementi receptacula: nam si quid acre in cerebro est, magna ex parte per aures expurgatur; quo fit ut biliosis morbis promptissimè corripiantur. Oris verò ulcera accidunt, quod carne sint tenera, & quæ bilis acrimonia facillimè cedat; bilis nanque proprium est ulcerare, præsertim si crassior sit, tenuis enim cutis superficiem, leni quadam inæqualitate fadat tantum; quemadmodum in herpete miliari accidit. Per sudamina autem biliosas & ulcerosas pustulas intelligit, quæ in corporis summa parte hærent.

Vix quicquam ex his.

AVTVMNVN sua inæqualitate morbum ferum diximus; certumque est eam autumni partem quæ æstatem excipit, æstivis morbis obnoxiam esse. Est autem autumnus, ut latius Galenus, temperie siccus euidenter; calore verò & frigore inæquali. continguntq; in eo non secus ac in æstate, quatuor morborum genera, ex cholera videlicet, ex cholera adusta, ex inæqualitate humorum, & eorundem corruptione. Erraticas igitur aut incertas febres, primo statim loco ponit, propter temperaturæ inæqualitatem, & victus erroneam rationem; intemperiem enim vitæ sequitur humorum & paroxysmorum inæqualitas. Degenerant autem hæc febres non rarò in quartanas; quarum origo atra bilis potissimum est; quo fit ut in longissimum quoque tempus protrahantur; quod & antè Hippocrates docuit, æstivas quartanas breues vocans, autumnales verò longas, maximèque quæ hiemem attingant. Rectius ergo seruasset ordinem Celsus, si febribus incertis, quartanas, frequentissimum in autumno morbum, subiunxisset. Quos Celsus lienis dolores vocat, Hippocrates excrecentias lienum dicere maluit: nam ob bilis atræ superfluitatem lienæ excrecent; unde & scirrhusi tumores generantur, iecinore videlicet eiusmodi humorem procreante, & ad splenem transmittente; vel potius liene ad se trahente, quum eo non secus ac proprio alimento delesteretur nutriaturque. Lienis tumorem sequitur corporis extenuatio, & nutri-



& nutritionis imbecillitas; quo fit ut statim post lienis dolores recenseat hydropisēs, quod ea videlicet scirrhusum lienis tumorem non raro concomitentur. Carcinoma autem cur omiserit, admodum miror, quum ex melancholico succo fiat, praesertim id quod nondum sit exulceratum; id enim autumno frequentissimum est. Tabi vero opportunissimus autumnus est; & si qui in eam inciderint, periculo non vacanti: est enim autumnus tabidis malus, siccus siquidem est, calore & frigore inaequalis. quum igitur contrariorum contraria sint remedia, ad phthisin arceudam requirebatur anni constitutio calida & humida: per tabidos autem non intelligit marcidos, qui calidi & sicci sunt; quamquam & ab his non omnino liber sit autumnus. Urinae vero difficultas (ut Galenus docet) fit, quoties vesica inordinatis, atque iisdem repentinis ad calidum vel frigidum permutationibus refrigeratur, & quae ex malis sunt humoribus acredines, ipsam molestant; tum praesertim quum facta ad frigiditatem fuerit permutatio, eos qui haecenus dissolabantur, & per sudores evacuabantur humores, ad vesicam converterit.

### Tenuioris intestini, &c.

VOLVULOS Galenus oriri credit, ab inflammatione alicuius partis intestinorum (voco autem voluulum aut eleon, ubi ciborum superfluitates, quae per alium excerni solebant, retinentur.) Ego tamen, ni quid tanti viri obset auctoritas, tam Celsum quam Hippocratem eos voluulos intellexisse crediderim, qui status comitari assolent. quae ratione sub hoc affectu etiam colicum dolorem frequentissimum autumno morbum comprehendit. Nam quum autumnus, ut auctor est libro Symptomatum Galenus, inter reliqua anni tempora statum generationi maxime sit obnoxius; verisimile est Celsum eum eleonem qui statum copiam subsequitur, potius quam qui inflammationem, subintellexisse siquidem eos voluulos qui inflammationem tenuiorum intestinorum subsequantur, subaudiamus; rectius eos de aestate aut veri ascripserimus; quum iis te nporibus

sanguis & bilis efflorescere soleant; lilis inquam aestate, sanguis vere. Et quantumvis auctor noster dicat aestivos fere omnes morbos in autunnum incidere; non ob id inferendum est, biliosos aut inflammationem subsequentes eleos hic intelligi; quando (ut ante est dictum) statulenti voluuli frequentius multo incidant, quam alij quinis: nisi forte quis aestate ad exteriora; autumno ad interiora humores propelli dixerit. quae ratione post eleos, lenitates quoque intestinorum subiunxisse videtur, excreciones videlicet per posticum sine aliqua ciborum transmutatione; idq; aut propter exulcerationem in summa parte ventriculi, aut intestinorum. Coxendicium autem dolores ex malignitate, & frigiditate materiae intelligit Galenus pulsus ad interiora: diximus etenim autumno proprium humores intro pellere; quemadmodum veri, ad exteriora trudere. atque hinc fit, ut veri podagricos; coxae autem dolores autumno attribuamus. Comitiales morbos à subita ad contraria transmutatione fieri putat Galenus: quanquam malim potius causam tribuere statulenta materia ventriculos cerebri occupanti; nam ob victus rationem erroneam fructuumque frequentem usum, autunmus status plurimos gignit; nec eos simplices tantum, sed & cum lentore quopiam dissoluti rebelles. Eodem referri potest quod dicit, Autunnum longis morbis pressos sua malignitate interimere. Quod autem pestifer sit autunmus, Hippocrates docuit; qui autumno morbos acutissimos, simul & exitiales, esse dixit, quod eodem die aliquando calorem, aliquando frigus obrineat; deinde quod aestivum sequitur tempus, quo virtus naturalis debilitata est; & quod humores qui primum ad exteriora cutimque movebantur ac dissolabantur, autumno ad interiora pellantur, inibi quae febres acutas, erraticas pestilencialesq; generent: quibus omnibus, tanquam autumnum quoddam, accedit victus incontinentia.

### Hiems autem &c:

TRIA fere sunt morborum genera quae hiemi peculiaria esse dicit Celsus: unum ex multitudine



multitudine sanguinis, qui hieme copiosius generatur; alterum a frigidityte externa; tertium ex copia seu excessu humiditatis frigida, & pituitosa. Primo igitur capitis dolores infestos esse docet; idq; pituita sua quantitate caput gravante: unde & vertigines sunt, vapore multo cerebri ventriculos obfideme. Tussis autem sunt à frigidityte externa, membris respirationi inferuentibus lassis, humorumque fluxu à cerebro in fauces concitato. Per laterum dolores pleuritida intelligit: hyberno namque tempore, calor & sanguis innatus plurimus est; quo fit ut inflammationes promptissime oriantur: Galenus tamen lateris dolores ex frigidityte intelligit. Per viscerum morbos, pulmonis (ni fallor) inflammationem seu peripneumoniam intelligit; quamquam reliquorum etiam viscerum inflammationes, non secus ac peripneumoniam, intelligere liceat. Hippocrates his omnibus adiecit apoplexias; quas auctor noster (vix etiam vertigines) sub capitis doloribus comprehendit: omisitq; animaliales aliquot morbos; quod ei suffecerat dixisse, astatem non vacare verbis morbis.

#### Ex tempestatibus autem Aquilo &c.

I AM ad tempestatum differentias digredimur: ac primum de quotidiana aquilonia constitutione, mentionem facit. Illud enim semel promouendum est, auctorem nostrum quoties mutationis aut tempestatum mentiunt, repentinas & vehementes tantum esse intelligendas; parvi siquidem excessus non tam facile in corpus nostrum agunt. Primum igitur de aquilonia constitutione sermonem instituimus; quæ, ut ante diximus, quemadmodum reliquis salubrior est, ita paucissimos quoque morbos gignit; & si quos procreat, eos non tam sua natura quam subiecti corporis quod impurum, vitiosisque succis plenum offendit, excuscit. Nam neque infans per se mouet aquilo, neque fauces exasperat; verum, si eadem præcesserint, adauget: quod Hippocrates segmento tertio Aphorismorum aphorismo 17 demonstrat,

Si pectus, inquit, dolor aliquis obfedit, auget. adeo ut plus longè commodi expectandum sit ab aquilonia tempestate sano corpori, quam incommodi; corpus enim expectatius mobilisq; redditur. Si tamen succi plenum corpus sit, superfluam illam humiditatem expurgare nititur exprimendo: unde tussis, fauciumque asperitates oboriuntur. Ventrem autem astringit, sua nimirum siccitate ventris humiditate exhausta: sic & urinam suppressit, vesica aquilonis flatu ob frigiditytem laesa: quum enim exsanguis sit, frigidis ex causis facillimè laditur, horroresq; excitat corporis poris spissatis & obstructis.

#### Auster aures hebetat, &c.

Astrum esse temperatura calida & humida dictam est: sed ea commodissime se habet ut cerebrum humectet, organa visus & auditus offuscans; sunt enim tenuissima, & passibilis maxime obria. Eadem quoque ratione tardat sensus; quod principio nervorum humectato necesse sit circa voluntarios motus pigrum euenire, & veluti in seipso dissolutum hominè apparere, calore innato ab Austri flatibus rarefacto. alium autem soluit tota corporis constitutione humidior reddita.

#### Ceteri venti, &c.

POSVIT Aquilonem & Austrum tantum exemplar & canonem ad quos aliorum ventorum tonitatem vel malignitatem expendamus. nam quum Eurus à Notu quàm minimè differat, non raro in Notum degenerat, atque austrinis affectibus quàm simillimos gignit: sic quoque de Favonio & septentrionalibus ventis dictum volumus. Ceterum hic iure aliquis miretur, quum ventus nihil aliud sit, nisi motus in aere exhalatio, unde tam diuersæ qualitatum differentias suscipiat: exhalatio enim quando semper sibi sit similis, est calida & sicca; ventique (ut dictum est) alij frigidi, alij humidi, alij calidi, alij sicci sunt. Quibus responsum volumus, alterationes illarum qualitatum ventis inesse accidentaliter: prout siquidem



siquidem loca calida, aut frigida, humida aut sicca, amana aut foetida persunt; ita illorum qualitatibus afficiuntur, atque illas tanquam proprias recipiunt. De hac præclare Ptolemæus 1. quadripart. cap. 11. Ipsi venti, inquit, quum à quatuor spirent cardinibus, ipsorum quoque cardinum qualitates suscipiunt: ctenias angulum eum mundi qui ad orientem est, quum solem, qui caloris est auctor, singulis ad nos diutius afforat, calidum quidem; & quia sol inde asiduum venit, sic cum quoque esse par est. Adversum verò huic, adverso modo, humentem atque frigentem; quod solem ipsum terris auferat: è cuius abitu frigus sequi necesse est; cuius rei nox ipsa indicio est. Atque ut à calore diurno siccitas, sic nocturno à frigore humiditas sequatur necesse est. Subsolanus igitur qui ab oriente fiat cardine, perinde erit ut dies ipse, ut regio à qua fertur. huic contrarius Favonius, quod noctis naturam, quod occasus qualitatem sequitur, erit contrario modo affectus. ut enim aduentus solis ac præsentia calorem; sic recessus atque absentia, frigus facit; atque ut illius incrementis comes est siccitas; sic huius humiditas est socia. Septentrionalis autem cardo, ab utroque cardine surgentis atque cadentis solis singulas tantum qualitates sibi convenientes sumit: nam si ab eo sol abest cardine, frigescere admodum illum oportet; porro nimij frigoris comes est siccitas. ergo ab orientis solis cardine siccitatem, ab occiduo frigiditatem mutabitur. Ad oppositum verò huic cardinem, hoc est ad meridiei plagam, quam sol sit ei maxime familiaris, ob hanc ipsam solis familiaritatem, plaga vehementius concalescit; unde stirantes inde flatus, à finitimo cardine, atque à solis vicinia calorem accipiunt: quum autem parte ab altera hac ipsa plaga meridionalis declinet ad occasum; ab ipso quoque occasu mutatur humiditas. Haecenus ille.

### Denique omnis calor.

Id potissimum sibi faciendum ob oculos hic posuit Celsus: ut qua sparsim ac fusim alibi ab Hippocrate dicuntur, per capita qua-

dam eum locos communes distingueret. Postquam igitur singularum tempestatum morbos affectisque numeravit; nunc calidi frigidi que incommoda enarrat, per frigidum aut calidum, balneum aut calentem frigentem aquam intelligens. Sic Hippocrates calidum, ubi quis eo viatur sepius, carnum effeminationem, nervorum incontinentiam, mentis torporem, profluvia sanguinis, animique defectionem generare dicit. Mentem igitur hebetat balneum calidum, spiritus dissolvendo: & si verum est, quod quantum quisque habet humiditatis, tantum habeat & stultitiae, procul dubio frequenti usu humidorum tepidorum, humectato cerebro spiritus dissolvuntur, ac mens hebetatur. quo factum est ut sanguineos formososque solidos dixerit Aristoteles, melancholicos contra ingeniosos. Sub mentis autem hebetudine nervorum incontinentiam comprehendit Celsus: nam quantumcunque balneum ea tenuum dicatur elicere, quæ inter cutem & carnem sunt, eius tamen qualitas ad nervos quoque pertingit, quos sensim humectat, ac laxos dissolutosque reddit, spiritibus dissolutis. fit etiam nonnunquam ut anima deficiat: quanquam Galenus id paulo generalius intellexisse videatur, quum profusiones sanguinis defectus animi sequi docet; eos nimirum defectus animi intelligens, qui ex nimio sanguinis fluore oriuntur: quod certe (vel Hippocrate & Celso tacente) quinis conicere posset; quum non solum ex nimio sanguinis profluvio, verum etiam alia quavis purgatione immodica, animus facile deficiat. Quod autem iecur & lienem calido dicit inflammari, clarius est quam ut longiore interpretatione egeat; nimirum calida qualitate balnei ad viscera penetrante: ac proinde quum calida à vicinis fere partibus alliciant humores, facile fiet ut sanguine ad alterutrum viscus repente, inflammatione corripatur. Verum quum aer cibique calidi corpus nostrum alterent, nolim negare quin hæc quoque ad cibos ac aërem referri possint. Nam & Hippocrates ipse aërem non solum corporis constitutionem, sed & mores quodammodo efformare auctor est. Sic in Asia



feliciora ingenia; in Europa fortiora corpora inueniri docet. In Asia enim aer præterquam quod calidus est, insigniter quoque siccus est: unde & cerebrum immodicis superfluitatibus expurgat, & ingenium acuit.

### Frigus modò neruorum distentionem, &c.

VIDETUR hic potius de balneo quam victu sermonem facere, quum veteribus ex balneo calido descendit: mos fuerit in solium frigidum ire, ubi aqua frigida aspergebantur. Spasmodum tetano opponit Galenus, quod hic musculis extendentibus, ille contrahentibus affectis oritur: verum quemadmodum calidum diximus resolueri nervos; ita frigidum quoque eosdem contrahere censuimus. Afficiuntur autem potissimum frigore, quæ natura frigida sunt & exanguia; nam (ut in Aphorismis Hippocrates) frigidum ossibus, dentibus, nervis, cerebro, spinali medulle inimicum est. Nigritiem in ulceribus, aut (ut Hippocrates) liuores excitat frigus, introrsum frigida affusione regurgitante sanguine puriore. Eodem referri possunt horrores in febrilibus: nam & qui rigent, liuidi magna ex parte efficiuntur; vel quod (ut auctor est Aristoteles) sanguis impulsu frigida gelascit, gelatinque nigrescit, propter caloris inopiam. Rectius ergo Hippocratem secutus Celsus non horrores, aut rigores qui in febrilibus fiunt (habent etenim hi vix plurimum causam calidam coniunctam) sed febriles, hoc est illi qui in febrilibus fiunt similes, dixisset. frequens enim est frigore nimio nos rigere, & præ horrore quodammodo concuti. quare, nisi quid obstat, & in febrilibus commutari in & febrile. n.

### In siccitatibus acuta, &c.

ANTE, ubi de ventorum natura egimus, satis dictum est siccitate superfluas humiditates dissolui; per imbres intra corpus collectas putrescere, nisi quis singulis diebus collectas exercitiis expurget: qua ratione etiam aquilonem omnium ventorum saluberrimum definiuimus. Nam & Hippocrates ex anni constitutionibus siccitates imbr-

bus salubriores, minusque mortiferas dixit; non tamen simpliciter à morbis pronuncians immunes, sed lippitudinibus (sicis videlicet) obnoxias, atque iis quæ ex reliquis sanguinis biliosi oriuntur. Sic etiam acuta febres, non ratione accidentium, sed motus humorum, infestant. Tormina autem siue difficultates intestinorum, ex corrosione bilis acidunt. Sicca enim constitutione bilis magis luxuriatur, quam quauis alia. Vocat autem Celsus, sicuti etiam Plinius, tormina, ea quæ Græci dysenterias nominant. Quod autem urina difficultates dicit; Hippocrates strictius paulo stillicidia urinae dixit, atque hic quidem, ut de torminibus, in causa inquisitione admodum se torquet Galenus: dicit enim, urinae stillicidia fieri, aut propter urinae acrimoniam, aut propter vis expulsiue, quæ est in vesica, imbecillitatem; quæ rursum imbecillitas ex intemperie contingat: ac porro solam intemperiem siccam non generaturam stillicidium, nisi ea quoque calida fuerit. Quamquam, si rem propius intueamur, frigiditas siccitati coniuncta potior causa censenda sit, dictum enim difficile sit, frigidior ne an siccior (est enim neruea) sit vesica. Neque enim temere urinae stillicidio articulorum dolores subinungit; sed quod ex eadem causa (frigida nimirum & sicca intemperie) oriuntur. Notum est satis superque Hippocratis Aphorismus, quo frigidum ossibus ac nervis inimicum dicit: ubi omnes totius corporis partes immodica intemperie affici docuit; frigidam præsertim à frigida, siccam à sicca. Sicca igitur constitutioni articulorum dolores, urinaque difficultates attribuit, vesica nimirum & articulis siccis ab intemperie sicca facile affectis. Non negauerim tamen articulorum dolores, urinaque stillicidia referri posse ad biliosos affectus, bilioso videlicet defluxu aut ad vesicam aut ad articulos lato. Atque hos quidem morbos, tanquam siccitatis proprios & peculiare, auctori nostro enumerasse sat fuit: quum tamen unus ab Hippocrate inter alios recensitus, sit eidem constitutioni maxime familiaris: In siccitatibus animi, ait, tabitudines, lippitudines, articulorum



articulorum dolores &c: ubi statim inter initia tabundines enumerat, tanquam frequentissimè accidentes, & periculosissimè affligentes. Neque id iniuria, quamvis Galenus hic miris sese excruciet modis, per tabem eam tabis speciem qua oculos infestat, intelligens. Corpora etenim sicca simili constitutione de facili offenduntur: sic iam ante autumnum sua inaequalitate & siccitate tabidis malum esse diximus. quare si cui hic tabes lippitudinibus in hunc modum (In siccitatibus acutæ febres, lippitudines, tabes, tormina &c.) liberit subingere, parum ab Hippocratis sententia aberravit.

### Per imbres longæ, &c.

Ex multitudine humiditatis febres longas fieri contendit Galenus. Mirum igitur minimè est, per imbres febres longas oriri: siquidem quum agrotis ad morbi solutionem cruditis concoctione opus sit, plures superfluitates, non nisi longo tempore concoqui poterunt. quibus accedit, quod frigidi ac pituitosi sint humores, qui in pluviarum multitudine generantur, sicuti in siccitatibus biliosi. Rectè ergo pluvio tempore longas febres, sicco acutas, hoc est breves, & quæ citò terminentur, assripit. Demum enim, exempli causa, duas esse febres eiusdem speciei pluvio calo; in longius protrahentur tempus, quod corpus pluvie granetur: adeo rectè Galenus naturas corporum patientium considerandas docet. Ceterum non oportet per imbres, aut aërem pluvium, intelligere quemvis aërem humidum; sed magnum tantum humiditatis excessum: nam & Hippocrates alibi Austrum pluvium & serenum distinxit. Alui autem profluvia, non secus ac longæ febres, à superflua oriuntur humiditate: pituitosus enim humor, & frigidus diarrhæam seu fluxum humoralem, ut vocant (de quo Celsus nunc est sermo) facit; protrahiturque nonnunquam hic morbus in longum tempus, idq; quod materia peccans uberior sit. Per anginas, non quasvis, sed pituitosas tantum, intelligit: nam si eas quæ ex sanguine sunt putasset, addidisset etiam

plenitides: sunt enim non raro ex superfluitatibus copia ad fauces collecta angina; uti etiam frequenter ex fluxionibus seu catarrhis à capite ad fauces. Et quod fluxiones quæ quidem à capite sunt, pluvio tempore contingant potissimum, quæquæ ex præcedentibus satis clarum sit, nititur tamen tanquæ exemplo quodam apertius redere, quum nervorum resolutiones, & morbos comitiales pluvio tempore in periculo esse dicit, quos ex cerebri & spinalis medulla intemperie humida, & pituitosa oriri certum est. Per cancros fortè putredines intellexit: sic ex Hippocrate Galenus ostendit humidam calidam constitutionem quibusdam carbunculatos; & multis articulos decidisse.

### Si hiems sicca, &c.

BREVIUS alterationes quæ in tempestatibus sunt edocet: ac primum quidem de hieme sicca & aquilonia, & vere pluvio & australi sermonem facit. quæ sanè alterationes proximè insequente æstate humiditas, tenerasque particulas, facile afficient; unde oculorum lippitudines dicit oriri Celsus: nam quum naturâ humidi sint oculi, Verisque pluvij præcedentis humiditate, humoris nonnihil eis accesserit, calore subsequenti æstatis facile inflammationem suscipient. Verum quoniam quæ hic Celsus, & in Aphorismis Hippocrates de Vere pluvio scribit, eadem in libro De aëre, aqua & locis finissimè declarat idem senex; eius verba subiungam: Si, inquit, hiems quidem sicca & aquilonia fuerit, ver autem pluvium & Australe, necesse est æstatem abundare febribus, & lippitudinibus, & difficultates intestinorum oriri. Quando enim æstate æstus repenti supervenient, & terra madida ex pluvio vernalibus, & ab Austro fuerit, necesse est æstum duplicari, & à terra madida atque calente & à sole comburenti, non astrictis hominum ventribus, neque exsiccatō cerebro. Neque enim possibile est tali Vere existente, non putrefieri, & humectari corpus & carnem; unde febres accidunt non simplices, sed acutissimæ, tum reliquis omnibus, tum præcipuè mulieribus, & quibus corpora



corpora sunt laxiora, & pituitosiora. Verum quoniam quammaxime hac uase habent, uidetur tamen præter rationem tormina adieciſſe, idq; poſitiſſimum, quod quum inſtina ſicca quodammodo ſint & neruoſa, uere pluuio ſeſe optime habitura, ac proinde torminibus quam minime obnoxia futura ſint. Hinc Galenus, Non quoniam, inquit, ſed ſeminas tantum & uiros qui humidior conſtitutione præditi ſunt, tormina apprehendunt; ſiquidem quantumuis temperis ſicca per ſe ſint; per accidens tamen, & conuulſum excrementorum deſluxum humiditatem aliquam nanciſcuntur.

### Si uero aſtri pluuiæque.

INTELLIGIT hic, ſicut in precedentiibus quoque, mutationes hiemis & ueris non ſubitas, ſed quæ ſenſim & paulatim ſiant: nam ſi de repentinis etiam ei ſermonem fuiſſe dicamus, non ſolum hos, ſed & quoniam alios morbos produxerint. Notus eſt enim Hippocratis Aphoriſmus: Mutationes temporum poſitiſſimum pariunt morbos, & in quibusdam temporibus magnæ mutationes aut frigoris, aut caloris aut alia pro ratione, eodem modo. Itaque quum moderata conſtitutio hiemis ſit, ut idem ſenex libro De aere, aqua & locis docet, quæ mediocriter frigida & humida (dicit enim, Hiems frigore id quod opportunum eſt non excedat: & rursus, Hiems moderata ſit, non ualde ſicca, ſed mediocriter humida,) uer quoque temperatum eſſe iam plus ſatis inculcatum eſt, utriusque temporis, hoc eſt ueris & hiemis contranaturales diſpoſitiones non paruas, ſed uehementes proponit; eas uidelicet quæ hieme ad calorem, at uere ad ſiccitatem & frigiditatem declinent. Unde gravidas quibus iam adeſt partus, abortu periclitari docet: coyletones etenim aut acetabula hiemis immodico humore relaxate, infantulum diutius retinere nequeunt. Neque id mirum, quum aëris temperiem corpore ſuſcepti conſtitutio ſequatur: unde corpora noſtra aëris nos ambiētis uitio corrumpi contingat, ac temporum quotidiana conſtitutioni uelut compati. Sic hieme plu-

uia non ſolum coyletones relaxantur, ſed & matris inſto humidior redditur, unde abortus periculum imminet; præſertim ſi ad intima penetrante uerno frigore, embryo inſuetio aëris frigore percuſus, pedibus ac manibus (ut Hippocratis uerbis utar) calcitrans, ſecundas quam par eſt & molliores & laxiores diſrumpat; atque à coyletonibus (quibus non ſecus ac poma arboribus, utero alligabatur) decidit. Et quod aer quidem terminum ſit partium, & quantumuis intima noſtri corporis penetrare poſſit, uel hinc clarum ſit, quod quum quis frigeat, uentre & inſeſinis doleat. Si quis ampliores abortus cauſas deſideret, cenſiones noſtras conſular. Ceterum ſi iam contingat gravidas ad legitimum uſque tempus ſatium utero continere ſtatque tempore parere, imbecilles & morboſos, aut qui ſtatim aliqui pereant infan- tulos excludunt; idq; aut quod non ferant ſubitam ad contraria tranſmutationem, aut propter dolores quos perpetimur dum in lucem prodeunt. Ceteros lippitudo arida inſeſtat, hoc eſt (ut uult Galenus) ea quæ ſine fluxu eſt: Par enim eſt, inquit, calidis & ſiccis naturis, in ſicca & frigida conſtitutione quæ calidam & humidam excipit, tales lippitudines fieri; caput enim prius repletum eſt calida & humida conſtitutione hiemis, frigisque ueris ſupercueniens, ueluti manus quedam extrinſeca, capiens ac premeſ (quandā ueluti ſpongiam) cerebrum, exprimit illam quæ in ipſo continetur humiditatem: atque quum oculi ex natura ad patiendum ſint habiles, lippitudines accidunt; atque ea arida, quod ex ipſis nihil eſſat ad exteriora, propter aëris ambiētis frigiditatem denſantis ſuperficiem exteriori: & ſi ſeniores ſint, grauedines ac diſtillationes malè habent; per ſeniores ualde ſenes, non tamen derrepitos, intelligens. Per diſtillationes autem non ſolum uidetur intelligere deſluxus, qui à capite per aſperam arteriam ad pulmocem ſunt; ſed omnes alias quæ per uenas ad partes inferiores delabuntur. Atque hoc eſt quod uoluit Hippocrates libro De aere, aqua & locis; cum dicit: Valde ſenibus diſtillationes, propter raritatem &



tem & venarum colligationem contin-  
guunt, ita ut repente intereant. quosdam  
verò contingit dextra aut sinistra parte fieri  
stupidos. Hinc quoque auctor noster, grave-  
dines (hoc est distillationes eas quæ a capite  
ad naves feruntur) aphoristicam alioqui bre-  
uitatem, cuius maxime amulus est, non ob-  
servans, superflue posuisse videtur; quin  
omnes defluxus species quæ a capite per ve-  
nas ad partes inferiores detrahuntur, sub di-  
stillatione intelligi posse dixerimus. Verum  
Celsus proprietati fermonis studens, distilla-  
tiones eas tantum proprie vocanti, quæ ad  
os vel fauces ferantur: quæ quum citò non-  
nunquam interimant, ab iis quæ in naves  
fluant distinxit; ita ut omne defluxionum  
genus (quale tandem id fuerit) tali tempo-  
rum constitutione molestum dixerit. Hippo-  
crates autem iam antedictis passionibus, dif-  
ficultates intestinorum seu tormina adiicit:  
quæ Celsus noster, (forte mendi suspicionem  
subesse arbitratus, quum dysenterias idem  
senex contrarie anni constitutioni ascripse-  
rit) omisit; quum tamen à torminibus non  
omnino immunis aut libera sit hiems au-  
strina, verque æquilonium; veris siquidem  
frigiditate humiditates quæ in cerebro au-  
strino, hiemis statu, ac reliquis corporis par-  
tibus contractæ sunt, ad intestina deferuntur,  
atque inibi tormina excitant.

#### At si à prima hieme.

OMNES tempestatum differentias quæ  
ab Hippocrate scribuntur, dixisse non con-  
tentus Celsus, alias insuper adiecit; idq; ut  
lectorem in singulorum morborum indaga-  
tione attentorem redderet, atque exercita-  
torem: Si igitur, inquit, à prima hieme  
Austri ad ultimum ver continuaverint, la-  
terum dolores phrenitidesq; quàm celerrime  
rapient: Austri etenim calidissimus ventus  
quum sit & modice humidus, sanguinem  
copiosissimum generabit (quando, ut docet  
Hippocrates libro De natura humana, à plu-  
viis & diebus calidis augetur sanguis) qui  
frigiditate hiemis intro pulsus, inflamma-  
tiones, cuius modi phrenitides sunt & pleu-  
ritides, pariet: siquidem & austrina tem-

pestates (Galeno teste) si diutina sint, pu-  
tredines inducunt; atque id potissimum, si  
humide etiam sint. Vnde si austrinam hanc  
constitutionem primo statim vere calor ad-  
fixem usque æstatis subsequatur, sudor mul-  
tus in omnibus quidem febribus, præcipue  
tamen synochis, supererexit; calore videlicet  
humilitate quæ ab austrino statu in corpore  
congesta est, foras eliciente. Hippocrates  
posteriorem hanc periodon paulo aliter quàm  
hic enarrat: Si quando æstas, inquit, sit veri  
similis, sudores in febribus expectare conven-  
iet; nullius in Vere excessus ad caliditatem  
mentionem faciens.

#### At sicca æstas, &c.

IAM æstatem eam describit, quæ relicto  
calore, à siccitate & frigiditate vitatur.  
Huiusmodi autem distillationum omnes spe-  
cies concitabit: sunt autem hæ triplices genere;  
sunt enim ad naves meatibus colatoris ob-  
structis, Grauedines dictæ, ὀξέζες Græcis.  
Raucedines autem (quas iudem βέρυξες  
nominant) vocantur, ubi ad asperam arte-  
riam defluit humor: sub quibus tussis quo-  
que comprehendere potuerat Celsus; sunt  
etenim hæ, aut ob intemperiem frigidam à  
capite ad asperam arteriam defluentem; aut  
alioqui ob humorem aliquem in pulmonibus  
aut thorace detentum; unde potissimum  
in peripneumonia, tabe, pleuritide tussis  
oriuntur. Neque mirum est his anni con-  
stitutionibus, proximè insequente hieme ta-  
lia enervare pathemata, immodica humiditate  
repleto capite: quæ quum per æstatis adsci-  
titiam frigiditatem densetur, cerebrum gra-  
nat atque distendit, & dum eam humidi-  
tatem foras per insensiles meatus propellere  
nequeat, per venas ad inferiora fluxiones  
molitur; unde fit ut iis quoque qui naturâ  
ad tabem proclives sunt atque propensi, iis-  
dem corripiantur: tales autem potissimum  
sunt, qui angusto strictoque sunt pectore, ac  
cello oblongo: nam quo strictius pectus fue-  
rit, consequens quoque est vasa pectoralia  
esse angustiora ac proinde difficiliore ex-  
purgationes per strictum quàm amplum  
meatum; idque potissimum; si idem quoque  
longus



longus sit : nam antequam id quod nocet, commodè expurgare possit, tum ob angustiam, tum ob longitudinem meatuum, iam iteratò in locum affectum recidit : quo fit ut à capite fluxionibus per tracheam arteriam latis ad pulmonem, in quibusdam tabes oriantur. Nolim tamen negare, huiusmodi anni temporumque constitutiones, non semper, neque necessariò, prædictos morbos inferre : nam, ut docet Galenus, par est non solum quosdam non incipere agrotare talibus constitutionibus; verùm & immodica siccitatis per æstatem habere remedium non mediocriter, eam quæ facta est in autumno humidam constitutionem.

#### Sin autem autumnus, &c.

PER molliora corpora non solum muliebria, sed & omnia pituitosa laxaque intelligit. Hæc igitur quum temperie humida sint, ex opposita temporis constitutione, quæ sicca est, in contrariam partem trahendo, ad medium bonumque habitum perducuntur. Eo igitur ipso tempore, ut ait Aristoteles, optimè valent, nisi quid vltro ipsi perperam agant, aut humidi ad hiemem ita denentiant, ut fomitem quendam & incitabulum frigori subministrant. Notus est in hanc sententiam Hippocratis Aphorismus: Si autumnus aquilonius & siccus fuerit, iis quidem qui humida sunt præditi temperie, & formis utilis est.

#### Durioribus verò instare.

DURIORA corpora, compactiora, qualia sunt aut biliosa aut melancholica, vocat: hæc autem tantum abest ut aquilonio autumno bene habeant valeantq; , quum potius variis, atque iis gravibus morbis corripiantur; quòd videlicet corpus eorū ac temporis habitus ad idem vergant, atque ita velut ignis igni adiciatur : quum enim, ut ait Aristoteles, eorum corpora exsiccentur, quantumque in his dulcedinis erat sit evaporatum, atq; vehementer incalcescant; necesse est, ut dum humor consumitur, arida lippitudines oriantur; residuoque, quod biliosum est, remanente, atque eodem incalcescente, febres acuta, (vix potest quæ ex sincera

sint bile) innuant. Quòd si id quoque non solum recalescere, sed & aduri contingat, iam non acutas sed longas, quales sunt potissimū quartana, febres pariet; sicuti etiam insanias aliosq; ex atra bile morbos. Ceterum hic annotandum est Celsum rō ἡρόναι, quod ad coryzas refert Hippocrates, τῆς πυρετοῦς non prorsus malè accommodasse, quum non solum acutas, sed & longas febres tali constitutione in metuisse conveniat, ut ex Aristotele iam retulimus.

#### Quod ad ætates verò, &c.

NUNC ad quas anni constitutiones optimè se ætates habeant, edocet : naturarum enim (ut habet Hippocrates) hæc quidem ad æstatem, hæc verò ad hiemem bene malè se habent: Morbi quoque alij ad alia bene malè se habent, & quædam ætates ad tempora, & loca & victus genera. Nam temperatura similes malè afficiuntur à similibus; contrariæ dissimiles à similibus bene: sic calida natura malè se habent ad æstatem ac ad hiemem bene, frigidaq; modo contrario se gerunt. Sed neque hoc simpliciter citraque exceptionem aliquam sic intelligendum est : nam cholericis non semper æstate laborant; sit enim nonnunquam ut nati in regione calida, in eiusdem temperiei provincia rectius valeant; similia enim similibus servari plusquam ritum axioma est. verum quòd hic dicimus naturam dissimilibus bene affici, id intelligendum est de modo & qualitate, ut loquuntur; nam & omnes repentina mutationes pariunt morbos, & omnes magni excessus non vacant periculo: solentq; hoc Hippocratis & Celsi dictum ita limitari, ut sanitatem temperaturarum frigidarum solidiorem esse hieme dicant, apprehendi tamen facilius à morbis: alij temperaturam quidem bene se gerere simili anni constitutione, corpus verò nequaquam. Verum ut ut est, id tantum voluit Celsus, quòd frigide temperaturæ æstate minus à morbis imperantur. Sed hoc ei si quàm maximè ita esse concedamus; non tamen sequetur pueros, & qui hos sequuntur, Vere optimè valere, siquidem (ut Galenus auctor est) naturis, regionibus,



regionibus, & aetatibus optimè temperatis, ver, (ut quod in temperie aequalitatem servat) optimum est, quando enim quo prædita sunt habitum non permutari, sed conservari desiderant. Ac proinde quum puerilis ætas non omnino temperata, atque omnis excessus media sit, perperam aut saltem non satis appositè à Celsò dictum eandem ætatem verno tempore optimè se habere; præsertim quod qui ætate adhuc florent, ætate ætatis vocant, aut qui media ætate sunt, reliquis magis sunt temperati, ac proinde verno tempore optimè se habituri sint. Non negaverim tamen ea veris parte qua astatem excipit, optimè valituros pueros, reliquisque omnibus aetatibus ac temperaturis ver indifferens (ut quod omnis excessus sit medium) futurum.

### Tum si qua imbecillitas, &c.

QUATVOR sunt genera morborum infantilium, seu recens natos pueros infestantium: Primum siquidem ex humiditate, alterum à cibi qualitate, tertium ab eiusdem quantitate sit, quantumque accidentale omnino est; sub quo umbilici inflammationes aut inflationes comprehendere licet. Quum igitur lacte ad dentitionem usque nutriendi sint infantes, qualitates eiusdem inquirende sunt: nam & qualitatem & quantitatem infantilium morborum causam diximus. Lac igitur omne triplicis est substantia: alia est butyrosa, alia caseosa, alia serosa; atque hæc rursum bifariam dividitur, in eam videlicet quæ biliosa est, atque eam quæ aquosa est. Quum ergo diversis omnino qualitatibus, aut substantiis præditum sit lac, merito diversorum symptomatum causa erit, inter quæ & φθῶς statim annumerat, sic enim vocamus ulcuscula quæ summam oris partem occupant, idque ob molliem instrumentorum, quæ neque tactum neque lactis sustinent qualitatem; siquidem quum non parum serosæ substantiæ (quam aut biliosam aut aqueam esse diximus) contineat lac muliebre, sit ut, si quidem bilis acrimonia particeps sit, abstergerendi exulce-

randoque facultatem non mediocrem obtineat. Vomitiones autem sunt propter lactis, quod ingerunt, copiam. Per nocturnas vero vigilias nisi insomnia intelligamus, sensus non constabit, præsertim quando vigilia pueris parum sint assuetæ, ut qui maiorem temporis partem dormiant; nam & somni abundantia puerulis secundum naturam maximè adest, idque tum ob cerebri humiditatem, tum ob multitudinem cibi quem assunt. Galenus autem eas vigilias fieri arbitratur ob pueriles morbos; quæ ratione omnibus etiam aetatibus communes essent vigilie. Rectius ergo insomnia intellexerimus: promptissimè enim idque ex natura, somnis pueri vexantur, idque quod lac corruptum aut nidorosum effectum iam, evaporationibus suis cerebrum quam occisimè petat. neque enim huic dissonat, quod Hippocrates vigiliis paiores statim subiunxit.

### circa umbilicum inflammationes.

CELSVS hic Hippocratem secutus ομφάλου φλεγμονας, hoc est, umbilici inflammationes dicere maluit, quam inflationes: quanquam raro admodum & per se infantulis umbilici inflammatio contingat: siquidem quum pueris sanguis omnis in nutritione cedat, non videtur is usque admodum abundare, ut inflammationem pariat; præsertim quum plus quam tritum sit, inflammationes omnes ex sanguine oriri. Inflationes autem umbilici ut frequentes sunt, ita ex lenissima quavis aeris alteratione fiunt. Galenus umbilicorum inflammationes non multò antè præcisorum intelligit.

### Propriè etiam dentientium.

TRIPLEX univèrsim morborum genus dentientibus ascribitur: Unum ex molestia, quam prodeuntes dentes inferunt; alterum ex corruptione humorum; tertiumque ex humore collecto in partibus durioribus, quæ antè molliores erant quam ut talem humorem susciperent. Gingivæ igitur ulcerationes, aut, ut Hippocrates, dentium pruriginis fieri



nes fieri intelligimus, sicuti Galenus umbilici inflammationes: siquidem perforata gingiva à dentibus prodeuntibus facile ulceratur; idq; præcipue, caninis dictis dentibus prodeuntibus, sunt enim hi reliquis acutiores. Sed neque solas pruriginis dentes orientes parant, verum totum etiam corpus multis afficiunt incommodis; nervorum enim distensiones, seu (ut Hippocrates) convulsiones, in metum sunt; eæ videlicet, quæ unam aliquam partem tantum occupant, quas Galenus aut ob inflammationem, aut propter erudum alimentum, aut quod partes nervosæ nondum robustæ sunt, fieri dicit: ita enim noxium humorem de facili suscipient, & muscoli in tumorem exurgent. Per febriculas, diarias intelligit; dolor enim ex gingivarum prurigine concitatus, facile diariam fecerit. Alui autem deiectiones sunt non secus ac in priore etate vomitus: nam quum illic stomachus usque ad eam imbecillis esset, ut cibum nulla ratione ferre posset, per superiora eundem regurgitabat; iam autem aliquanto robustior effectus, ad inferiora excrementa remittit, aliiq;que profundia parit. quod voluit Galenus, quum dixit, alui profundia fieri, quod citius non bene concoquatur ac distribuitur. Quod autem subingit Celsus, pericula hæc plenissimo eniis, & qui astricta sit alno subesse; Galenus de convulsionibus, seu distensionibus nervorum intelligit.

### At ubi ætas paulum proceffit.

NUNC de morbis secundæ pueritiæ sermo est: qui quum voraciores sint, & quofnis, quantumvis solidos, cibos deglutiant, facillime crassorum humorum coacervant multitudinem, qui plurimorum morborum causa existunt. Nam glandule, & vertebrarum inclinationes ex crasso & lento humore sunt; per glandulas eas quas Hippocrates Tonsillas vocat, intelligens, quas Galenus tumores glandulosarum partium, inflammationesq; locorum isthæm tenentium esse dicit, inflammationis vocabulo improprie usus.

### Vertebrarum quæ in spina sunt, &c.

CELSVS vertebrarum quæ in spina sunt luxationes fieri dicit: quum tamẽ Hippocrates, luxationes carum quæ in occipitio sunt ad interiora posuerit. sed ita vitio transcribentis mihi factum videtur: ea namque quæ in occipitio sunt vertebra, facillime & lenissima quavis de causa afficiuntur; quæ verò in spina, non tam facile lesionem senserint: unde quæ in occipitio sunt, malim legere. Luxantur igitur vertebra fractæ aut à musculis inflammationem patientibus, aut tumoribus vicino loco natis. struma & verruca, ex crasso & pituitoso sanguine sunt, suntque vitiosa multitudinis ad exteriora & cutem repetitis germanæ passionibus.

### Incipiente verò iam pube.

DVPLEX pueritati ascribit morborum genus: prius ex acrimonia humorum, cuius generis sunt febres; alterum ex multitudine sanguinis, cuius enim sanguinis ex naribus, aut à copia aut tenuitate eiusdem oriuntur. Longas autem febres, non simpliciter longas, sed respectu earum quæ secundæ pueritiæ accidunt, vocavit: nam Hippocrates *ποτὴν τὴν πάλαι, καὶ πρὸς ἡλικίαν*, hoc est, & horum quidem nonnulla, & diuturna magis febres accidunt, inquit; ita ut non sine comparatione locutus fuisset videatur.

### Maximeque omnis pueritiæ.

OSTENDIT quomodo in pueritiæ diuturnæ passionibus terminentur, aut quibus potissimum temporibus periclitentur: siquidem nonnulla passionibus in quadraginta diebus, alia septem mensibus, nonnulla etiam septennio indicantur; nam quidam morbos longos intelligit, vel hinc clarum est, quod dies quadragimus, primus eorum est, ex quibus morbi diuturni indicantur; ultimus autem illorum qui acutos ex incidentibus indicant. Quicumque verò hunc transcendunt numerum, secundum septi-



dum septimana rationem, habent iudicium; non quidem à septem diebus, sed primum à mensibus, deinde annis: & quidem quod qui hoc tempus transcendunt, ad decimum quartum annum perveniunt, manifestum est, ut docet Galenus.

### Si qua etiam genera morborum, &c.

QVOD si quos, inquit, contingat decimo quarto anno (tum enim magna ex parte puberes redduntur pueri) infantilibus morbis non solui, longum, & qui cum illis ferè senescat, ac tanquam hereditarium morbum incurruni: siquidem pubertatis tempore morti magna ex parte solvuntur, quod natura tunc sese, quoad fieri potest, expurget, in mulieribus quidem per menstrua; in iuuenibus per pilos. Sic Hippocrates, Quicumque, inquit, iuvenes morbo comitiali laborant, mutatione locorum, & temporum, & victuum quoque liberantur, quod videlicet humor crassus, calore iuvenilī, loco & victus ratione calidiore dissipetur.

### Adolescentia morbis acutis.

TRIA sunt morborum genera que adolescentia attribuit: primum quidem ab acrimonia humorum; alterum ab incidentibus; tertium à pravis succis. Per morbos igitur acutos, febres acutas intelligit, à sanguine bilioso ortas. Sanguinis autem spuitiones, ut arbitrat Galenus, ab accidente extraneo sunt, videlicet aut quia vulnerantur, aut quia salium frangunturque, aut clamant vehementer, aut propter aliquam huiusmodi causam: quamquam non inopè omnino ob plenitudinem, & sanguinis abundantiam vas ruptis sanguinis spuitiones fieri posse dixerimus; atque hunc esse Celsi & Hippocratis gentium sensum. Ceterum quod iuvenes ferè esse dicit, qui sanguinem expiunt, ex sanguinis acrimonia hoc fieri intelligemus; nisi Celsum verbum verbo ex Hippocrate reddidisse dicamus, qui τοῖσι δὲ νεύροις, iuvenes vertit: sub qua tamen dictione, idem senex adolescentia æquè ac iuventute comprehendisse videtur: siqui-

dem is segmento 5. Aphorism. aphorismo 9. Φθίσις, inquit, γίνεται μάλιστα ἡλικίᾳ τῆσι ἀπὸ ὀκτακαιδέκα ἐτῶν μέχρι πέντε καὶ τεσσαρτά: quod est, Tabes maximè sunt in iis etatibus, ab anno nimirum decimo octavo usque ad trigésimum quintum. Quo Aphorismo Hippocrates tam adolescentiam quam iuventutem complexus, utriusque tabes in metu esse dixit: quemadmodum etiam de expuitione sanguinis censendum est. Iuvenes enim sanguinis acrimonia erosus vas; adolescentes contrà, eiusdem copia gravati, eum expiunt: quare in adolescentibus potius, ac frequentius, hæc sanguinis reiectiones expectarim; ut in iuuenibus tabes, corpore videlicet exhausto à nimia sanguinis expuitione in adolescentia, & eiusdem acrimonià bronchiis pulmonis corrofis: Sanguinis igitur expuitiones subsequuntur tabes. Verum quod morbos comitiales ascribat, admodum mirandum videtur; præsertim quum iam antè dixerimus, multos morbos mutatione ætatis terminari: è quorum numero, ex Hippocrate, comitiales quoque retulimus. atque hoc quidem quāvis ita se habeat, adolescentes tamen (ut qui ita intemperanter vivunt ut qui maximè) facili in comitiales inciderint; quando non tantum victus ratione erronea utantur, sed & aliis qua ab ipsis aguntur operibus abutantur, dum humi cubant, & soli imbribusque se exponunt.

### Post hanc ætatem.

QVATVOR in summâ hîc recitat morborum genera: Primum à cholera, excipit enim consistens ætas iuventutem; alterum ex cholera adusta; tertium à succo melancholico; postremum à pituitoso humore. Primum igitur biliosos, seu ex sanguinis adustione, enumerat: cuiusmodi sunt, pleuritides, pulmonis dolores, dehinc eos qui his quàm maximè oppositi sunt, qualis Lethargus est, Vererum Latini dicunt; estque marcor quidam, & inexpugnabilis dormiendi necessitas, cum rerum omnium oblivione, originem à pituita trahens, quæ frigore nimio, ac humore cerebrum imbuat, &

K.

in somnum.



in somnum impellit. Per insaniam autem, & melancholiam & maniam complectitur, hoc est eam qua ex fece melancholica, & cholera adusta mentem occupante fit. Ex eadem quoque causa hemorrhoides fiunt, iecinore sanguinem melancholicum & seculentum ad eas reponente. Cholera autem est mortuus acutus admodum & anceps; estque ventriculi immodica perturbatio, infra & supra per vomitum facta, acciditque ob multam cruditatem, qua nonnunquam est magna alimentorum prauitate; interim ex vitioforum humorum copia oboritur.

### In senectute spiritus.

PER senectutem extremum senium Galenus intelligi vult. hæc autem quum insigniter sit frigida & sicca, similes procreabit morbos: sed nec hos tantum, verum etiam eos qui ex pituitoso humore fiunt: nam quum innatus calor, & virtutes naturales debiles sint, quantumvis calidos & boni succi cibos assumant, in debitum alimentum non alterant; verum in excrementis quid conuertunt, qua ratione pituitosos quoque morbos annumerat Celsus. Vnde quum cerebrum natura frigidum sit, si quid humidi in eo sit, exprimit, ac distillationes cum rursus facit; ex quibus rursus distillationibus asthmata & crebri anhelitus oriū habent, quantum à proprio quodam humore, qui instrumenta respirationis obstruat, fieri possint. Hæ igitur prædictæ affectiones (sicuti etiam articulorum dolores) vrina stillicidia, ac dif-

ficulantes, à frigidityte oriuntur. Malus autem habitus (quem ὁ ἀσθενὴς Græci appellant) à virtutum naturalium debilitate fit, natura iustum alimentum non sortita. At alui vitia qua enumerat, à recrementis & pituitoso humore generantur: siquidem quantumvis partes corporis in senibus sicciores fiant, multitudinem tamen superfluitatum pituitosam coacervant: atque hæc si aggrementur, senes somnolentos efficiunt; sin minus, vigiles: nam vigilia quas senes infestare dicit, à siccitate fiunt.

### Præter hæc graciles.

VT nihil orationi deesse, postquam ætatibus proprios morbos dixit, temperaturas quasdam bene vel male ad hos vel illos morbos se habere ostendit. Graciles enim, & qui stricto sunt pectore, hoc est biliosi, promptissimè in tabes ex ulcere pulmonis incidunt; quemadmodum etiam in distillationes, laterisque dolores. Obesi autem morbis acutis fere periclitantur: angusta enim sunt eorum vena ac arteria; atque ob id paucū omnino sanguinem spiritumque habent: adeo ut quum ætate processerint, citissimè, atque leuissima quavis de causa calor innatus eos destituat, atque ita citò facillè strangulentur. Per acutos morbos, anginam, apoplexiam, & id genus alios, qui ratione accidentium potius quàm materia, acuti dicuntur, intelligit. quod & Hippocrates innuit, quum dicit, naturā admodum crassam citius interire, quàm graciles.

## CAPVT II.

\* notis

### De \* signis aduersæ valetudinis futuræ.

**A**NTE aduersam autem valetudinem (vt suprā dixi) quædam notæ oriuntur, quarum omnium commune est, aliter se corpus habere, atque consuevit, neque in peius tantum, sed etiam in melius. Ergo si plenior aliquis, & speciosior, & coloratior factus est, suspecta habere bona sua debet. Quæ quia neque in eodem habitu subsistere, neque vlti-



ultrà progredi possunt, ferè retro, quasi ruina quadam, reuol-  
uuntur. Peius tamen signum est, vbi aliquis contra consue-  
tudinem emacruit, & colorem decoremque amisit, quoniam  
in his quæ superant, est quod morbus demat: in his quæ  
desunt, non est quod ipsum morbum ferat. Præter hæc pro-  
tinus timeri debet, si grauiora membra sunt, si crebra vlcera  
oriuntur, si corpus supra consuetudinem incaluit, si grauior  
somnia pressit, si tumultuosa somnia fuerunt, si sæpius exper-  
giscitur aliquis, quàm assuevit, deinde iterum soporatur, si  
corpus dormientis circa partes aliquas contra consuetudi-  
nem insudat, maximeq. circa pectus, aut ceruices, aut crura,  
vel genua, vel coxas. Item si marcet animus, si loqui & mo-  
ueri piget, si corpus torpet, si dolor præcordiorum est, aut to-  
tius pectoris, \* aut, qui in plurimis euenit, capitis: si saluæ ple-  
num est os, si oculi cum dolore vertuntur, si tempora astricta  
sunt, si membra inhorrescunt, si spiritus grauior est, si circa  
frontem intentæ venæ mouentur, si frequentes oscitationes,  
si genua quasi fatigata sunt, totumve corpus lassitudinem sen-  
tit. Ex quibus sæpe plura, nunquam non aliqua, febrem an-  
tecedunt. In primis tamen illud considerandum est, nun-  
quid sæpius horum aliquid eueniat, ac ideo neque corporis  
vlla difficultas subsequatur. Sunt enim quædam proprietates  
hominum, sine quarum noticia non facilè quicquam in fu-  
turum præfagiri potest. Facilè itaque securus est in his ali-  
quis, quæ sæpe sine periculo euasit. Ille sollicitari debet, cui  
hæc noua sunt, aut qui ista nunquam sine custodia sui \* tuta \* tutò  
habuit.

\* alias, aut  
in plurimis  
venis capi-  
tis.

## ENARRATIO.

**H**OC & reliqua quæ de signis sequun-  
tur capita, auctor noster ex Hippocra-  
tis tum prædictionibus virisque, tum quarto  
Aphorismorum desumpsit: quare si quis co-  
pioforem horum desideret interpretationem,  
ad Galenum recurat; nobis sat erit breuiter  
locum loco per capita reddidisse, ac sicubi  
scrupulus aliquis urgeat, eum pro ingenioli  
nostri modulo truisse, & si qua typogra-

phorum incuria vitata videbuntur, quàm  
poterimus maxime pristino restituisse nitore.  
Itaque quod omnes in peius vel melius mu-  
tationes suspecta sint, hic declarat, & antè  
ab Hippocrate definitum est, exemplo ab  
athletis sumptum. Athletarum enim consti-  
tutiones bonæ quum in extremo fuerint, pe-  
riculosa; neque enim possunt in eodem per-  
manere aut quiescere: quum verò non con-  
sistunt

K 2

sistunt

sistant aut quiescant, iam in melius proficere haud possunt: reliquum est igitur, ut decedant in deterius. Sed de his latius Galenus. Ceterum quum facilius sit pleno corpori aliquid adimere, quam exhausto addere, hinc maius periculum imminuere certum est.

### Præter hæc protinus, &c.

Quæ immodicas exercitationes excipit lassitudo, sanorum symptoma est, quæ verò sine his consistit, mortuosum: lassitudines enim spontaneæ, ut inquit ille, prænuñciant morbos. Fit autem triplex in lassitudine sensus, autore Galeno libro De Symptomatum causis: Ulcerosus est, quum ulcerum sensus per corpus transcurrere videtur; id verò motis magis accidit quàm quiescentibus, nisi magna admodum fuerit lassitudo; ac putant ita affecti perinde se pungi, ac si complures ipsis acus sint infixæ, nam à rodente humore hoc symptoma nascitur. At cum tendi videtur corporis moles citra aliquam manifestam causam, affectus huiusmodi lassitudo tensiva, spontanea nominatur, euenitque potissimum ob multitudinem continentis partes distendentem, adeò ut ipsam continere non possit. Per tertium autem lassitudinis genus, quo animi osium se saigatione teneri, ne minimum quidem motum laborantes tolerare possunt, manifestusque in ipsis est calor sensus, neque tensionis mordicationisve; quippe magna vitiatorum humorum copia per totum animalis corpus transmittitur. Prima igitur species lassitudinis, quum ex vitiatas humoribus ortum habeat atque ex plenitudine, tertiæque ex utrisque simul mixtis; non mirum, sicuti accidant adversam valetudinem prædicere. Ulcera autem suspecta esse contingit, tum propter qualitatem, tum quantitatem humoris peccantis. Et quæ quidem de ulceribus hic scribit Celsus, ex secundo Hippocratis Aphorismorum transsumpsisse videtur, ubi dicit: Sicubi fauces male habent, aut in corpore tubercula enascuntur, excrementa intueri convenit: nam si biliosa fuerint, corpus simul agrotat; si verò sanis similia enadem, liberum erit corpus nutrire. Celsus

quoniam omnes quæ in peius vel melius fiant mutationes suspectas habet, excrementorum ne meminisse quidem voluit, quæ alioqui consideranda monet Hippocrates.

### si corpus supra consuetudinem, &c.

NON solum repentinus, & præter consuetudinem eueniens calor, suspectus est; sed etiam frigus: quemadmodum reliquæ ad unum omnes repentine mutationes; nam quum sanitas symmetria quedam sit, ac commoderatio calidi, frigidi, humidi & siccici, necessum erit eorundem excessum morbos parere, ac prænuñciare. sic Hippocrates qua parte corporis calor aut frigus sit, ibi iam morbum esse dicit. Per dictionem autem supra consuetudinem, intellexit excellentem aliquem aut ingentem excessum.

### si grauior somnus.

PER grauiorem somnum, enim intellexit, quem Hippocrate laboriosum vocat: is autem quum in morbo malum sit signum, rectè si ante eisdem contingat, futuros præfagit. Naturalis autem somnus ac moderatus, sit ex euaporatione alimenti: siquidem vapor suavis & utilis ex nutrimento exhalans, cerebrum petit, & ab eodem refrigeratus & in humorem coactus, destitit in cerebro, & meatus sensuum & nervorum motuum obstruit. Quum igitur somnus naturalis propter suaves halitus cerebrum petentes fiat, accidit ut in eo seniores placidè quiescant: immoderatus verò immoderatusque somnus quum ex mala cerebri intemperie, ac plus satis frigida ac humida oriatur, morbo us est; signum videlicet & causa morbi. Vigilia contra immoderatam siccitatem portendunt, tumultusque insomniæ, acritus & nidorosis vaporibus cerebrum perit indicio est.

### si corpus dormientis, &c.

NON solum futurum morbum in aliqua parte corporis sudor, virgula pectore, cervice, aut alia quavis parte, præfagit: sed eundem iam adesse significabit. notus est enim Hippocratis



postratis Aphorismus : Qua parte corporis sudor, ibi morbus. Verum auctor noster id in presentiarum non videtur voluisse; sed quod alibi ab eodem sene dictum est, nempe quod sudor multus à somno factus absque causa manifesta, corpus vii pluri cibo significet: quodq; si cibum non accipienti hoc accidat; scire oportet quod euacuatione indigeat. Neque enim abs re Celsus noster initatus Hippocratem, corpus dormientis dixit; quippe quum naturales omnes facultates in somno sua munia obeant validius, atq. adeo inutilia ab utilibus separent, nihil mirum statim à somno quum sanguis & spiritus ad exteriora corporis reuertuntur, simul etiam excrementa ad cutim deferri, atque per sudorem expelli. Calor enim per somnum fortior factus, ad exteriora materiam per sudores idoneam secum facilius effert. Sudor igitur si multus fuerit, copia humorum corpus grauari significat: per sudorē etenim tenuia excrementa quum excernantur, crassiora in corpore manere consentaneum est. Oitationes ac pandiculationes continent ali-quam in unsculis humiditatem vel vapo-rosū spiritum significant, quo grauati hu-iusmodi motus conciliant. Inhorrescunt au-tem membra prauis humoribus per cutim discurrentibus. Reliqua ferē quae subiicit, ex

his & antedictis peti possunt, praterquam quod hic quoque transcribentium vitium esse videatur, qui corpus torquere pro torpere posuerint, & vii facilis lapsus fuit in literarum transpositione, sic melius qua-drabit lectio, si corporis torporem marcori animi opponamus.

### Inprimis tamen illud considerandum.

CONSVETUDO Aristoteli Altera Na-tura dicta est: nam & Galenus ipse in idem se-ē incidere Consuetudinem & Naturam dixit. sic libro Sanitatis tuerde, Consuetu-dinem, assuetitiam acquisititiamque natu-ram in corporibus gignere docet, adeo ut Hippocratis oraculo quae longo tempore as-suerunt sint, etiam si deteriora sint, minus in-si-eis, quantumvis melioribus, molestare di-dicerimus. Huc quoque respexit Galenus in secundum Prognosticorum comentario, Con-suetum bonum, atque insuetum malum, pro-nuncians. Verum Celsus ipsam non solum consuetudinem considerandam monet, sed corporum etiam quorundam proprietates: sunt enim, ut inquit, quaedam proprietates hominum, quae quum talis sint maxime esse-nt; illis propria ac familiares sunt quodam modo.

### CAPVT III.

#### Quae bona in egrotantibus signa sint.

**V**BI verò febris aliquem occupat, scire licet non pericli-tari, si in latus aut dextrum, aut sinistrum, ut ipsi visum est, cubat, cruribus paulum reductis: qui ferē sani quoque iacentis habitus est: si facili conuertitur, si noctu dormit, si interdium vigilat, si ex facili spirat, si non conflictatur, si circa vmbilicum & pubem cutis plana est: si praecordia eius sine vllo sensu doloris aequaliter mollia in vtraq. parte sunt: quod si paulò tumidiora sunt, sed tamen digitis cedunt, & non do-lent, haec valetudo, ut spatium aliquod habebit, sic tuta erit. Corpus quoque quod aequaliter molle & calidum est, quod-

que æqualiter totum insudat, & cuius febricula eo sudore finitur, securitatem pollicetur, quando iam ad sanitatem venit corpus. Sternutamentum etiam inter bona indicia est: & cupiditas cibi, vel à primo seruata, vel etiam post fastidium orta. Neque terrere debet ea febris, quæ eodem die finita est: ac ne ea quidem, quæ quamuis longiore tempore euauit, tamen ante alteram accessionem ex toto quieuit, sic ut corpus integrum quod εἰληκνὲς Græci vocant, fieret. Si quis autem incidit vomitus, mixtus esse ex bile & pituita debet, & in urina subsidere album, læue, æquale, sic ut etiam, si quæ quasi inbeculæ innatarint, in imum deferantur. At venter ei qui à periculo tutus est, reddit modò mollia, figurata, eodem ferè tempore, quo secunda valetudine assuevit: modò conuenientia his quæ assumuntur. Peior cita aluus est. Sed ne hæc quidem terrere protinus debet, si matutinis temporibus coacta magis est, aut si procedente tempore paulatim contrahitur, & ruffa est, neque foeditate odoris similem aluum sani hominis excedit. Ac lumbricos quoque aliquos sub fine morbi descendisse, nihil nocet. Si inflammatio in superioribus partibus dolorem tumoremque fecit, bonum signum est. Sonus ventris inde ad inferiores partes euolutus, magisque etiam si sine difficultate cum stercore excessit.

## ENARRATIO.

**O**PTIMVS in agrotantibus habitus is est, qui valentibus quàm simillimus est: ut pessimus & exitialis, qui quàm maximè contrario similis. febriciens igitur si in laus dexterum, aut sinistrum, aut ut ipsi visum est, paulū reductis cruribus, cubet (qui ferè benè habentium dum cubant est habitus,) non periclitatur: neque enim poterit, aut in laus, aut ut ipsi visum fuerit cubare, citra robur facultatis per musculos firmantis corpus; atque ita quoque fiet ut facillè conuertatur.

## si noctu dormit:

HOC enim natura robur indicat, atque eam quàm minimè à naturali constitutio-

ne recedere, dies enim vigiliis ut nox requiei data,

## si ex facili spirat.

FACILIS spiratio, inquit Hippocrates, in omnibus acutis morbis, in quibus febris copulatur, quique intra quadraginta dies indicari solent, magnum ad salutem habet momentum: significat enim neque thoracem, neque cor ac pulmones, neque septum transversum doloris quandam habere affectionem; vti nec partes iis adiunctas, cuiusmodi sunt stomachus, lien, iecur: ex etenim aut inflammata, aut alio quouis modo affecta, dum per respirationem moventur, dolore afficiuntur.

## si circa



si circa umbilicum, &c.

SIGNIFICAT enim refecti corpus; nam omnis extenuatio, ut alibi Hippocrates, laxat cutem, deinde intendit; refectio contra. Rngostas igitur corporis concidentis & extenuationem patientis; extensio vero refecti signum est.

si prae cordia eius.

QVOD videlicet omnis suspicio affectus hepatis aut lienis absit: nam si dextrum praecordium tendatur, ab hepate fluxiones fiunt; si sinistrum, ad lienem. Notum in hanc sententiam primo Prognosticon Hippocratis locus: Praecordia saluberrima sunt, quum dolore vacant, si mollia & aequalia sint dextra & sinistra parte. Quod si paulo tumidiora esse contingat, sed tamen digitis cedant, neque doleant; hac quidem valetudo ut spatium aliquod habeat, sic tuta erit: quod videlicet, sicut inflammationem nullam subesse denotat, sic defluxum aliquem humorum qui quantitate magis quam qualitate peccent, eo defluxisse demonstrat. qui quidem humores ut omnis ferè extraneae qualitatē exortes sunt; ita nisi distendant praecordia, dolorem aliquem concitare nequeunt, quando ad doloris procreationem requiratur tensio alicuius particulae, aut acrimonia materia peccantis. Porro humor hic quem ad alterum praecordium defluxisse dixi, licet extraneae alicuius qualitatē expers sit, iustum tamen ad eiusdem evacuationem spatium requirit: quare auctor noster valetudinem hanc tutam quidem esse pronunciat; sed ita, ut spatium aliquod habitura sit.

Corpus quoque, &c.

AQUALITER calidum corpus dici potest; quod citra intemperiem calidum est; id enim aqualiter, hoc est uniuersum erit calidum, quum procul mota omni caliditatis externa suspicione, insito calore corpus totum aqualiter caleat, ac proinde morbi omnem suspensionem amoueatur: ante enim dictum est, quod qua parte corporis calor aut frigus, ibi morbus est; particula videlicet illa intempe-

rie aliqua grauata. De sudoribus etiam dictum est. at quod ij boni sint à toto corpore, si febris eisdem soluitur, non semper verum est: nam qui criticis diebus contingunt, ut securitatem semper pollicentur; ita qui diebus paruis accidunt, morbum quidem soluere videntur, sed grauius periculum a recidua minantur; febricitantem enim nisi diebus imparibus febris reliquerit, solet recidivare.

Sternutamentum etiam, &c.

STERNUTAMENTVM, bonum signum est, in morbis praesertim capitis, ut distillatione, gravedine, & similibus: fit autem sternutatio maximis inspirationibus praegressis, & efflatione celerrime subsequente: habet enim cerebrum has duas facultates, per quarum alteram superfuitates in anterioribus ventriculis excernit ad seipsum contritas; per alteram vero nasi alas expandit, & spiritum attrahit: quum itaque à spiritibus grauatur, tunc ipsum excernit per contractionem sui; si vero in naribus viis obturatis, impeditur excernere grauante spiritum aut mucum, tunc violento motu ad sternutationem procedit, depellere conans ea quae meatui obturant, unde sternutationes in capitis affectibus non solum bona indicia dicimus, sed eosdem sanare, quemadmodum omnes ferè affectus circa cerebrum existentes. Sic Hippocrates mulieri quae uterinis molestat, aut quae difficulter parit, superuenientem sternutationem bonum esse signum dixit: quia videlicet naturam ostendit, & propriarum meminisse actionum, & quae prius erat emorua, renouiscere atque excitari, quando aliquam eiecit superfuitatem.

& cupiditas cibi.

FAMES, ut docet Galenus, est suctionis sensus: perit vero sensus is, quum ventriculus nimio humore madens (crasso praesertim & lento) se inaniri minimè percipit; vel tum etiam, quum per vehementes affectus sopita ac ferè prostrata est illius sensus vis, ut in vehementissimis intemperaturis & magnis



Et magnis fluxionibus plerumque accidere solet. At verò ipsa sectio fieri desinit, vel ob nimiam plenitudinem vasa occupantem; vel cum nimia sit parvum dissolutio, parvis utique impleri minimè indigentibus, quare in morbis vel à primo servata, vel post fastidium orta citi appetentia, bonum erit: quod ab Alexandro quoque Aphrodisco prædictum est libro secundo Problematum: dicit enim, qui februnt, sitire quidem ob febrilem calorem; famem verò non sentire, quoniam multam vitiosam materiam in stomacho continent: Convalescentes autem iam famere, quod febres latè humores consumpserint. Quæquam, si quis aphoristicas sternutamentum & citi appetentiam accipiat; per hanc quidem naturalium facultatum consistentiam robrique (siquidem Galeno teste hæc tota actio quum nec sit animalis sed naturalis, haud aliter in animalibus quam in plantis perficitur,) vti per illam animalium facultatum vim intelligemus.

### Neque terrere debet

ea febris, &c.

TACITE videtur hic intermittentes tum continuis conferre; quasi dicat: Intermittentes febres omnes, periculo magis vacant quam continuæ; atque inter has magis quæ ex toto ante alterum paroxysmum quiescunt. Atque, ut ad huius veram cognitionem deveniamus, continuarum & intermittentium discrimen enarrandum est. Interdum jactur in genere carnosum, (hoc est in meatibus & venulis per totam carnem dispersis) quum ibi solita corporis excrementa ob cutis astrictionem delinuntur, putrescunt: putrescunt enim quia non dissoluntur, perveniuntque febrem intermittentem; nam resolutio in prima accessione putri humore, remanet veluti focus quidam, in quo vel postero vel alio quovis sequente die rursus putrescat humor, qui partim relictus ex priore accessione erat, partim ex maioribus vasis in minora confluerat, ob cutis videlicet constipationem detentus; sitq; nova accessio serius ac tardius pro humorum conditione. In vasis verò aut aequaliter omnibus, aut in magnis

(cuiusmodi sunt iecoris, ventris, pulmonis, & quæ inter alas & inguina existunt) continuam febrem accendunt: ut merito tum ratione loci affecti, tum humoris copia continua intermittentibus & seniores & periculosiores sint; quod ab Hippocrate quoque prædictum est: Febres enim quacunque non intermittentes, inquit, tertia die fortiores fiunt, magis periculosa; quocunque autem modo intermiserint, maius periculum abesse significant. Sed hic quoque difficultas oriri posset, quamnam intermittentium periculo maximè vacet, cæne quæ quotidie, an quæ de quarto in quartum, an quæ de tertio in tertium accessiones suas faciat? De quotidiana quidem Galenus statim sententiam profert: Longa (inquit) est, & periculo non vacat, est autem non solum longa, quod in longius tempus producat, sed & quod longas habeat accessiones, atque eas quotidianas. Vnde de hac Celsum non fuisse locutum, satis constat: siquidem tum ob antedictas causas periculo non vacat, tum etiam quod habitum corporis refrigeret, ac calorem innatum extinguat, gignatque magnum recrementorum in corpore pronuntium. At intermittentium brevissimam simul & tenuissimam, tertianam dicit Galenus; quartanam longissimam quidem, sed tamen quantum in se est; nam quamvis longissima sit, breviores tamen, puriores, & longiore intervallo repetitas accessiones facit quam quotidiana: quo sit, ut & natura tempus longissimum relinquatur, in quo concoctioni continuatum humorum, ac corpori alendo refarciendisque virilis vacet, quare si quis Celsum de quartanis locutum putet, per me sane integrum erit: quanquam de tertianis intelligere malim; eas etenim mansuetissimas rectè nominat Galenus, non quod graviter non infestent (urgent enim & caloris vehementia, & siti, & id genus alii symptomatis,) sed quia omnino vacant periculo, & minus malignæ sint; & quod ratione humoris peccantis à natura facile vinci possint. Quanquam sermo simpliciter sic intelligi posset, ut continua, cæteris paribus, intermittentibus periculo minus vacent: exempli



empli causa, quotidiana continua intermit-  
tentibus; continua tertiana iisdem intermit-  
tentibus; quartanaq; continua iisdem inter-  
polatis: siquidem propter continuos atque se-  
inmicem excipientes paroxysmos, non relin-  
quitur tempus ad morbi maturationem, ma-  
teriaque peccantis expulsionem, aut medi-  
camenti propinationem; dehinc quod acces-  
sionum iugi exacerbatione corpus atque vi-  
res acri fatiscere atque deficere contingat.  
Quod de diariis febribus dicit, clarius est  
quam ut expositione egeat, quando ex in-  
guinum tumoribus febres orta omnes male  
sunt; sola autem diaria inter has periculo  
vacant.

### Si quis autem incidit vomitus.

SINCERÆ omnes deiectiones aut pur-  
gationes, mala sunt: appello autem sin-  
ceras, quæ duntaxat unum aliquem, qui  
excernitur, humorem ceteris impermixtum  
habent. quare rectè laudant Celsus vomit-  
tum, si quis incidat, qui ex bile & pituita  
mixtus sit: nam qui purè biliosus est, caloris  
copiam; pituitosus, frigoris maximam in-  
temperiem denotat.

### & in vrina subfidere album, &c.

QUALITATIS aut quantitatis vrina  
non meminit, satis rarus contentorum men-  
tionem fecisse. Vrina igitur quæ absque  
contentis omnino visuntur, magnum defe-  
ctum concoctionis demonstrant. Sunt autem  
contenta, superfluitates quædam tertie con-  
coctionis. quod si igitur hæc minus inspiciantur,  
ostendunt concoctionem illam deficere;  
siquidem ubi fit concoctio, etiam superflui-  
tatis alicuius sequastratio obitur. Virtutem  
igitur sanam in tertie concoctione, contenta  
mediocriter alba, lenia, & aqualia, & quæ  
in unum deferantur, hoc est quæ cohæreant,  
demonstrant. Ratione enim cognitum est,  
ut ait Galenus, sanguinem ad album colo-  
rem verti, quum de colore suo mutatur le-  
gibus naturæ alteratus atque transuersus. at-  
que huius quoque rei fidem faciunt, tum lac

ipsum, tum semen; quæ de sanguine puriore  
in album transmutantur colorem. Verum,  
ut securitatem omnino polliceatur hyposta-  
sis, non requiritur intensa admodum albedo  
(eiusmodi enim imperfectam adhuc conco-  
ctionem, copiamq; crudi ac pituitosi humoris  
indicat: vocaturq. humorale sedimentum:) sed  
neceesse est, ut subalba sit; ut laevis, ut  
æqualis, ut sibi bene coherens, cen in pyra-  
midem a surgat, eamque semel atq. iterum  
ita apparuisse non suffecerit, quum reliquo  
morbi decursu crudum incoctumque ferè ap-  
paruerit lorium, crudum quendam humo-  
rem, hypostasi non dissimilem, in se conti-  
nens: sed ut toto morbi tempore præsertim  
à statu tale conspiciatur. quod voluit Hip-  
pocrates per eam particulam quam adiecit:  
per omne tempus, dum morbus  
iudicetur. tum enim securitatem pol-  
licetur, morbumque sine periculo esse, atque  
integrè exoluendum, ita ut non sit præterea  
repetiturus. Nubecularum aut eneorema-  
tum eadem est ratio. sunt enim hæc quoque  
ut de sedimento dictum est, superfluitates  
tertiæ concoctionis. si ergo nubecula quæ in  
vrina circumfertur, candida sit atque in  
unum deferatur, bona quidem est; sed mi-  
norem concoctionis elaborationem quam hy-  
pостasis alba, significat. Omisit sedimen-  
subrubrum & læue in vrina subrubra; quod  
etiam salutare, sed diuturniorem morbum  
portendit Hippocrati: idq; forè quod quæ  
perfectam morbi solutionem atque concoctio-  
nem indicarent, Aphoristica breuitate con-  
tentus, satis dicta putaret.

### At venter ei qui à periculo tutus est, &c.

QVEMADMODVM facultatis quæ in  
iecinore & venter est indicia ex vrina su-  
muntur; ita facultatis quæ in ventre, ex iis  
quæ quotidie deiciuntur. Facit autem opti-  
ma deiectionis dignotionem, à qualitate &  
tempore quo eadem excernuntur, & ab as-  
sumptorum convenientia. Dictum est autem,  
omnem habitum qui à sanorum natura  
quàm minimè variat, salubrem esse. Ven-  
ter igitur agroti si suo fungatur munere,

L

ac talia



ac talia reddat, qualia sanus reddere solet, periculo vacat. huiusmodi autem sunt, non dura sed mollia, non tamen quæ extremè mollia sunt, sed quæ constantia permancant, debitoque tempore excernantur; & quorum copia ex ratione ingesti cibi sit; & in summa, quæ neque graviter oleant, neque adscitum quid habeant. Cita autem alius peior est, quod è iccore a. quæ liens fluxionem fieri ad ventrem denotet.

### Ac lumbricos quoque, &c.

LUMBRICI in febribus & citra febres, tum multitudine, tum magnitudine, tum colore, tum temporibus differentes sunt: circa initia enim morborum generati, substantiam suam ex subiacente corruptione accipiunt; circa vigorem, ex morbi malitia; si cuti circa declinationem, ex permutatione omnium in melius: qui sanè citius separantur: Natura enim ipsos reliquorum excrementorum instar foras propellit: atque id voluisse Celsus videtur. Verum quum tres univèrsim sint lumbricorum differentia, an de una aliqua tantum, an de omnibus in genere dixerit, considerandum est. Omnes autem quotquot sunt ex cruda, crassa, pituitosaque materia originem habent, quæq; putredini quàm maximè sit obnoxia: unde & pueros, & eos qui voraces natura sunt, contingit iisdem abundare. Lumbricus igitur qui latus appellatur, in febribus rarè conspicuus est; in diuturnis longisque morbis, frequentius apparet. Est autem lumbricus latus (si ita dicere liceat,) permutatio adnatæ pelliculæ interioris, intestinorum membranæ in corpus quoddam vitum quod morsus infert, quod sæpè totum redditur incredibili longitudine; adeo ut interdum intestini totius longitudinem æquet. à quibusdam fasciæ (ob id quod his similes sint) tenuisque vocantur; frequentius tamen pars ipsius quàm totum excernitur. Verum auctor noster non videtur de istis verba fecisse; quanquam bonum quoque sit hos excernisse. At qui teretes dicuntur lumbrici, ut aliis omnibus sunt

frequentiores; ita formam omnibus conspiciam habent: consistuntq; magna ex parte in gracilibus intestinis, atque superiores ventriculum subeunt: & ideo per os frequenter reiiciuntur; quemadmodum nonnulli per nates etiam reddere contingit. Peculiare vitium infantibus admodum est, maximèque si febricula innadat: ac de iis Celsus (sicut & Hippocratem) pronuntiatum reliquisse verisimile est; quod videlicet lumbrici teretes, eunte in indicationem morbo si descenderint, idoneum bonumque sit: satius est enim eos cum reliquis recrementis per anum expurgari quàm per vomitum reiici.

### Si inflammatio in superioribus partibus.

OMNES tumores ex æquo quibus dolor feruorq; adest, Inflammationes Latini vocant, Græci φλῆγμονας. Verum quum sanguis probus ac crassitie mediocris in partem aliquam univèrsim confluxerit, ac propter copiam compactus haerit, inflammationes propriè nominata nascuntur; de quibus sub morbi finem apparentibus Celsus locutus videtur. Atqui cur eas in superioribus, quàm inferioribus magis probaris, nondum satis assequor: nisi per superiores partes, extrema aut superiora ipsius inflammationis intelligere lubeat.

### Sonus ventris, &c.

SI flatu, inquit Hippocrates, sine sonitu, crepitūque excernatur, optimus est; melius verò est quoties erumpit cum sonitu, quàm si condatur ac reuoluatur: sed is qui cum sonitu sit, aut prorsus copiam flatuosi spiritus, aut angustias orificiorum indicat. At verò quoties spiritus copia non admodum fuerit, & item orificia per quæ excernitur laxiora, tantisper sine sonitu in talibus flatu excernatur oportet. Unde non tam bonum quàm malum signum Hippocrati ventris sonus videtur: nam optimum flatum, si sine crepitu sonituque excernatur, dixit; cum tamen qui cum sonitu emittitur, non simpliciter



citer bonum, sed meliorem eo quem pudore  
circumstantium intro recondimus atque re-  
uolumus: nisi forte hinc bonum signum di-  
camus, quod à superioribus ad inferiores par-  
tes denotatur, atque adeo robur virtutum  
naturalium indicet.

## CAPVT IIII.

*Mala signa agrotantium.*

**C**ONTRA, grauis morbi periculum est, vbi supinus æger iacet, porrectis manibus & cruribus, vbi residere vult, in ipso acuti morbi impetu, præcipueque pulmonibus laborantibus. Vbi nocturna vigilia premitur, etiam si interdiu somnus accedit. Ex quo tamen peior est, qui inter quartam horam & noctem, quam qui matutino tempore ad quartam. Pessimum tamen est, si somnus neque noctu, neque interdiu accedit: id enim ferè sine continuo dolore esse non potest. Æquè verò signum malum est, etiam somno ultra debitum vrgeri, peiusque quo magis se sopor interdiu, noctuque continuat. Mali etiam morbi testimonium est, vehementer & crebrò spirare, à sexto die coepisse inhorrescere, pus expuere, vix excreare, dolorem habere continuum, difficulter ferre morbum, iactare brachia & crura, sine voluntate lacrymare, habere humorem glutinosum dentibus inhaerentem, cutem circa vmbilicum & pubem macram, præcordia inflammata, dolentia, dura, tumida, intenta: magisque si hæc dextra parte, quam sinistra sunt: periculosissimum tamen est, si venæ quoque ibi vehementer agitantur. Mali etiam morbi signum est, nimis celeriter emacrescere, caput & pedes, manusque calidas habere, ventre & lateribus frigentibus, aut frigidas extremas partes acuto morbo virgente, aut post sudorem inhorrescere, aut post vomitum singultum esse, vel rubere oculos, aut post cupiditatem cibi, postve longas febres hunc fastidire, aut multum sudare, maximèque frigido sudore: aut habere sudores non per totum corpus æquales, qui que febrem non finiant, & eas febres quæ quotidie tempore eodem reuertantur, quæue semper pares accessiones habeant, neque tertio quoque die leuentur, quæue continuant, vel per accessiones

L 2

increscant,



increſcant, per diſceſſiones tantum molliantur, nec vnquam integrum corpus dimittant. Peſſimum eſt, ſi ne leuatur quidem febris, ſed æquè concitata continuat. Periculoſum eſt etiam poſt arquatam morbum febrem oriri, vtique ſi præcordia dextra partē dura māſerunt, ac dolentibus his læua. Nulla acuta febris leuiter terrere eos debet: neque vnquam in acuta febre, vt à ſomno non eſt terribilis neruorum diſtentio. Timere etiam ex ſomno, mali morbi eſt. Itemque in prima febre protinus mentem eſſe turbatam, membrumve aliquod eſſe reſolutum. Ex quo caſu quamuis vita redditur, tamen id ferè membrum debilitatur. Vomitus etiam periculoſus eſt ſinceræ pituitæ, vel bilis, peiorque, ſi viridis, aut niger eſt. At mala vrina eſt, in qua ſubſidunt ſubrubra, aut liuida: deterior, in qua quaſi fila quædam tenuia, atque alba: peſſima ex his, ſi tanquam ex furfuribus factas nubeculas repræſentat: diluta quoque atque alba vitioſa eſt, ſed in phreneticis maximè. Aluus autem mala eſt ex toto ſuppreſſa. Periculoſa etiam quæ inter febres fluens, conquieſcere hominem in cubili non patitur: vtique ſi quod deſcendit eſt perliquidum, aut albidum, aut pallidum, aut ſpumans. Præter hæc periculum oſtendit id quod excernitur, ſi eſt exiguum, glutinoſum, læue, album, idemque ſubpallidum, vel ſi eſt aut liuidum, aut bilioſum, aut cruentum, aut peioris odoris, quàm ex conſuetudine. Malum eſt etiam, quod poſt longas febres ſincrum eſt.

## ENARRATIO.

**H**IC (vt in alijs omnibus) lectorem admonitum oportet, ne quid temerè pronunciet, niſi primum probè perſpectum habeat, ſi ne conſuetus ita cubare aut facere. Aperte omnia autem mirari hic ſubuenit, cur Celfus ſupinam cubationem inter mala ſignā & ea que periculum minentur, nominarit, quum Hippocrates non omnino malum aut bonum, ſed minus bonum tantum, reſpectu videlicet eius qua in alterutrum laus fit cubationis, pronunciarit: dicit enim: Supinum cubare manibus & cruribus exten-

sis, minus bonum. ita vt talis iacentis habitus extremè bonis aut malis ſignis annumerandus non ſit, ſed vtriusque: vt que nec ad ſanitatē vim habeant inſignem, nec ad mortem; ſed aut integrè media ſint, aut parum ad alterutrum tendentia. Rectius ergo Celfus minus bonam appellaret quàm periculoſam, quanquam ſi quis Celfi præſcriptum vellet, ſupinum decubitus malum dicere poſſet, quod ferè reſolutionem quampiam præ ſe ferre videtur.

dolorem



## dolorem habere continuum.

PRIORA hac magnitudinem morbi indicant; brachiorum autem & crurum iactationes, inquietationem (ut ait Hippocrates) significant: conflantur enim quous iacentis habitu, ita ut alium ex alio frequenter immutent. Non spontanea autem lachryma, circa exceptionem non omnino mala sunt: siquidem quae a causis externis, ut si festuca aut aliud quippiam simile in oculum ceciderit; aut quae oculi palpebrarum asperitate coningunt, mali omnino nihil praesagunt. quae autem in febribus aut aliis morbis citra manifestam aliquam causam voluntarie oboriuntur lachrymae, mala sunt; praesertim si ob imbecillitatem facultatis reventricis acciderint: quod hinc fieri cognoscemus; si reliqua etiam signa perniciosa sint; nam aliqui sanguinis ex naribus profusum potius praesagirent, ut sexto Epidemion docet Hippocrates: dicit enim, Quibus in febribus lachrymae, atque iis praesertim acutis & ardentibus, praeter voluntatem emanarint, his sanguinis ex naribus profusum expectandum: idque si reliqua se non male habuerint; in quibus vero male se habent, his non sanguinis eruptionem, sed mortem potius portendit.

## habere humorem glutinosum, &amp;c.

Hippocrates tum Aphorismorum quarto, tum sub finem quarti Epidemion, in febribus huiusmodi lentores circa dentes, augmentum aut fortitudinem febrium significare docet; quod videlicet (ut auctor est Galenus) lentores huiusmodi circa caloris multitudinem pituitosam humiditatem exiccantem nasci non possint. Philothemus tamen censet eos fieri propter humores frigidos in ventriculo contentos, à quibus vapores sursum & ad dentes delati concreverunt. Non tamen semper magnitudinem morbi circa dentes lentores huiusmodi significabunt; sed in febribus tantum, ut docet Hippocrates: nam citra febres etiam nonnumquam nascuntur, propter lactis, aut alienius cibi qui

dentibus adheret, usum, nihil mali (praesertim unde periculum immineret) significantes.

## cutem circa umbilicum.

QUEMADMODUM praecordia saluberrima sunt, quae dolore vacant, mollisque & aequalia sunt dextra & sinistra parte; ita si aliqua parte temperiem excesserint, insalubria sunt. Quare si praecordia inflammantur, aut aliqui tumida, aut imbuta sunt, rectè malum praesagire docet, ut quae à naturali temperie recedant atque declinent. Intenduntur autem, ut docet Galenus, sine inflammatione propriè vocata, aut propter vehementem siccitatem, non solum illa parte, sed etiam in septo transverso, costis, membranis, aut etiam propter inflammationem in ipsis membranis musculorum costis succingentium consistentem. Considerandum autem docet Celsus, in utraque parte inaequaliter sunt affecta: si enim in dextera parte sit, maius inuinebit periculum propter visceris subiecti, nempe iecoris, nobilitatem. Quod si & vena ipse in praecordiis vehementer agitentur, periculosum & id est: perturbationem enim (ut ait Hippocrates) aut delirium significat. Cutis autem circa umbilicum & pubem macra, humiditatis naturalis defectum denotat.

## Mali etiam morbi signum.

REPENTINAS omnes mutationes ante ex Hippocrate malas diximus. Non mirum igitur, si ex morbis corpus celeriter contabescens & macie correptum, mali & magni morbi signum sit: siquidem quum naturalis macies calidam & seccam temperiem significet, ea etiam quae in morbis celeriter evenit, magnum intemperiei excessum, aut aliqui virium imbecillitatem demonstrabit. Notum est in hanc sententiam Hippocratis Aphorismus: Eorum qui non omnino leniter febricitant, perire, aut nihil comminui, aut magis quam ratio exposulat extenuari corpus, malum: alterum enim morbi diurnitatem; alterum virium imbecillitatem significat,



significat, quæ magna ex parte cutis raritas & humoris tenuitatem consequatur.

ventrem continentur, uri; exteriora algere contingit.

### Caput & pedes manû- que calidas, &c.

OPTIMUM omnino est, si corpus omne æquè calidum molleque est: id enim optimam corporis indicat affectionem. At si pedibus manibusque & capite calentibus, venter inus & thorax frigat; malum omnino & exitiale signum: nam (ut secundo Prorethicon Hippocrates) summa sine extrema corporis partes, si celeriter in utranque conditionem, hoc est calidum vel frigidum, permittuntur, malum. Hæc autem permutatio contingit in malignis admodum morbis (Galeno teste) hora vnius spacio: efficitur autem, quum propriam non habuerint caliditatem, atque à febrili calefiant; qui à corporis medio incipiens, flammæque similis, totum corpus depascens, confertim ad artus seu extrema, relictis interioribus, rapitur; atque ea calefacit, interioribus frigentibus.

### aut frigidæ extremas.

EXTREMAS partes vocat, caput, pedes, manus, aures. Acuti autem morbi quot qualisque genere sint, iam antè dictum est: sed de quibus pronuntiandum reliquit Celsus, considerandum est: nam & Hippocrates frigiditatem extremarum partium (sicuti hic quoque Celsus) in morbis acutis malum dicit: alio etiam loco clariùs non nihil: Si, inquit, in febrili non intermittentibus, partes exteriores frigida; interiores vero urantur & sitim habeant, lethale. Vbi non sine adiectione in omnibus acutis, sed febrilibus non intermittentibus tantum lethale; idque non in quibusvis continuis, sed in ardentibus perniciosissimis tantum & lipyris: sunt enim hæc ex internarum partium viscerumve inflammationibus. Malum igitur est signum, quod inflammationem viscera occupantem adeo adurentem, & vehementem significet, ut calore suo non secus ac cucurbitula quædam, à toto corpore sanguinem trahat; unde interna, hoc est, ea quæ intra thoracem &

### aut post sudorem in- horrescere.

HIVS rationem iam reddidimus, ubi rigores qui sexto die fiunt, malos definitivum: nam, ut rectè docet Hippocrates secundo Epidemion, signa indicatoria non indicantia, nonnulla mortem, aliqua verò recidivam portendunt: in quorum albo horror sudorem subsequens ponendus est; siquidem materiam ante crisin nondum protè expurgatam significat.

### aut post vomitum singultum esse.

SEPTIMI segmenti Aphorismos aliquot ordine recenset: inter quos hic quoque unus est; nam illic à vomitu singultum & oculorum ruborem malum definitivum: utrunque enim magnum, cerebri aut ventriculi inflammationem significat; quamquam per se citraque ruborem oculorum, singultus vomitum subsequens malus censendus sit: nam & convulsiones ex inanitione, medicina illa parens antiquissimus, lethales declaravit. Singultus autem quum non secus ac convulsio, ex repletione & inanitione fiat; non temerè is qui vomitum sequitur, malus erit. Quare si quis Celsum sequitur, singultum à vomitu, aut ruborem oculorum malum dixerit, à vero nihil aberrabit: quamquam si quis ex Hippocrate locum hunc restituere velit, pro disunctima copulatione ponens; per me quidem integrum erit: ita enim sententia de sola inflammatione intelligitur; siquidem rubri redduntur oculi dum materiam excipiunt: unde de ea potissimum inflammatione intelligendum moner. Galenusque cerebrum obsedit.

### aut post cupiditatem cibi, &c.

CIBI fastidium, concoctricis facultatis imbecillitatem significat: atque hæc quum imbecilla sit, nutrirî corpus non potest, sed indies magis magisque declinat, atque imbecillius.



cilins redditur: quo fit, ut viribus destituti agri, morbi insulsum & longitudinem perferre nequeant. Sicut autem in hanc sententiam Hippocratis varij Aphorismi, difficultates intestinorum pro exemplo reliquorum morborum ponentis: In diuturnis enim intestinorum difficultatibus, inquit, cibi fastidia malum portendunt; atque si cum febre, peiora. & alio item loco: In diuturno morbo cibi fastidium & sincera deiectiones, mala. & sectione secunda Aphorismorum: Magna ex parte, inquit, omnes qui male se habent, initio cibum capientes, nec quicquam proficientes, in fine rursus non appetent, nec cibum capient: qui vero principio vehementer à cibo abhorrent, postea autem probe appetunt, & capiunt cibum, hi melius degunt. Recte ergo post cibi cupiditatem, aut post febres longas, fastidium per se malum dixit: nam, ut docet Galenus, in iis qui à talibus morbis sunt evasuri, contrarius affectus, hoc est ciborum appetentia, requiritur.

aut multum sudare, maximeque, &c.

ANTE quâ parte corporis sudor sit, ibi morbum esse dictum est; nunc autem multum sudare malum in morbis signum: neque id perpetuo; eos etenim sudores bonos dicit, qui febrem finiant: quales sunt qui tertio die, quinto, septimo, nono, undecimo, decimoquarto, decimoseptimo, vigesimo, vigesimo septimo, & trigesimo quarto fiunt; hi etenim sudores, ut ait Hippocrates, morbos indicant. Et rursus bonus sudor est (ut in prædictionibus docet,) qui ex toto manat corpore, facitque ut ager facilius ferat morbum: si vero nihil tale efficiat, inutilis est, atque malus; eoque deterior, quo fuerit copiosior; atque hoc rursus peior, si sudor qui prodit, frigidus sit; si quidem crassitiam materie, & quæ non facile discuti possit, aut calore vinci, præ se ferat, atque adeo longitudinem morbi præfagit. calidi contra sudores, ut vult Galenus, materiam calidam tenuemque, & quæ facile discuti possit, portendant; atque hæc ratione Hippocratem fri-

gidos sudores, cum acuta quidem febre morrem; cum mitiore vero, morbi longitudinem significare dixisse in Aphorismis. Et in primo quoque Prædictionum: Pessimus, inquit, sudor est, si frigidus excediatur, aut circa caput tantummodò, vultum, cernicem: hic enim cum acuta quidem febre, morrem; cum mitiore, morbi longitudinem significat: nam in acuta quidem febre, indicat ex nimia caloris febrilis adustione, caloris innati extinctionem, unde sudor frigidus non solum unicam causam sibi vendicare, (nempe materie crassitiam) videtur, sed & aliam quandam accidentariam à calore febrili ortam: necessum est enim humoribus qui in vasibus sunt putrefactis, calore innato solida corpora gubernante iam extincto aut extinctioni proximo, quæ ex iis emanantur excrementa (ut sunt sudores) frigida esse.

& eas febres, quæ quotidie.

Hoc non tam perniciem, quam morbi longitudinem (ut bene monet Galenus, & Philotheus indicat;) nam apud Hippocratem, unde auctor noster hæc transtulit, dictio δὲ σφοδρὰ, non difficile malumque iudicium significat, sed idem quod δὲ σφοδρὰ sonat, hoc est quod difficulter atque tardè solvatur; morbi longitudinem, materieque peccantis lentorem ac tenacitatem hac dictione intelligens: siquidem si non frigida, saltem crassa erit materia, quæ eadem horâ paroxysmos concitabit. quanquam non dubitem Galenum dicere, id eo fieri, quod materia febrem faciens, fixa & stabilita quodammodò in loco sit: nam fixa & firmata, ut docet, magnam vim demolientem deposcunt longo tempore, & per fortiora, & per plura facta auxilia; verum si ita intellexerimus, de continuo tantum locutus videretur: nam quum in intermittentibus humor extra vasa pellatur, non poterit proprie in uno fixus loco vocari: unde si Galeno subscribamus, nec Celsus, nec Hippocrates de iis locutus sit; quum quibuscunque accessiones fiunt, quacumque hora febris dimiserit, si eadem



si eadem eras occupaverit, indicium habere difficile dicitur.

### neque tertio quoque die leventur.

NON videtur loens hic absque transcribentium vitio legi; siquidem coherencia disinxit: Hippocrates enim, Quacumq. febres non intermittentes tertio quoque die validiores reddunt, periculose existunt; quoquo autem modo intermiserint, periculum abesse, significant: ita ut ex iam citato Aphorismo in hunc modum locus sit restituendus. neque tertio quoque die leventur, atque continent. Nam alioqui, ut recte docet Galenus, non absque ratione eas quae in quietem febre vacanti desinunt, esse absque periculo inquit Hippocrates; ut quae non ex inflammatione aliqua, aut maligna humorum putredine originem habeant. Igitur quales sunt haec febres, quae & continent simul & tertio quoque die accessiones suas exacerbent, considerandum est: id namque omnibus peculiare non est, semiterianis certe frequens admodum (est enim ea, teste Galeno De februm differentia secundo, ex numero continuatum); nam quum ex tertiana intermittente, & quotidiana componatur, utriusq. accessiones ut imiterur consequens est: unde & tertio quoque die accessiones exacerbari contingit, licet nunquam ad inregritatem aut infebriationem (ut dicunt) perveniunt. quod clarissime ostendit Hippocrates primo Morborum vulgarium libro: Febres, inquit, horrida, continua, acuta omnino, non intermittentes: forma autem erat semiteriana, uno die leniores, altero gravius invadentes; & in summa acutiores evadentes. Non mirum igitur, si has (quum continue affligant, atque infebriatione non admittant, ac tertio quoque die exacerbentur) periculosas dixerit: tantum enim temporis, aut quietis natura non conceditur, ut collapsas vires restituere possit: quibus accedit, quod, ut monet Galenus, non solum stomachum & nervosam eius partem attingant, sed etiam lethargos & catochas interficiant.

### vel per accessiones crescant.

Hoc sane longitudinem tantum morbi significat, si in intermittentibus contingat: quemadmodum si in continuis, moriem; nam, ut ait Galenus, tanto longior est futurus morbus quanto eius accessio maior fuerit, quam tertiana exquisita.

### per discessiones tantum molliantur.

Hoc quoque morbi longitudinem omnino denotare videtur: siquidem humoribus qui morbum faciebant nondum probe purgatis, contingit nonnunquam lenari, atque discessiones moliri morbum; sed quum superfuitates aliqua adhuc reliquae sint, laborem conciliant, neque unquam corpus integrum relinquunt, atque adeo morbi longitudinem, aut abcessus futuros in parte dolorifica praesagiunt. Notus est in haec verba Hippocratis Aphorismus: Quibus resurgentibus ex morbis pars aliqua dolnerit, illic abcessus sunt.

### Pessimum est, si, &c.

ANTE continuas quae tertio quoque die ingraesunt, periculosas dixit; nunc quae non leuantur, sed aequae concitata permanent, pessimas vocat. huiusmodi autem sunt exquisitae ardentes; haec etenim quum omnia alia seruent tertiana exquisita indicia, eo solo differunt, quod neque cum rigore invadunt, neque ad infebriationem desinunt, ut auctor est Galenus secundo Crisimum. At quod pessima periculosissimaq. sint, vel hinc satis liquet, quod propter paroxysmorum saevitiam, non suppetat remediis tempus; & quod aut cito interimant, aut non raro in febres besticas, aut marasmodos migrent: quemadmodum insinuat Galenus 10. meth. Therap.

### Periculosum est etiam.

ARQVATVM nominat, quem alij Morbum regium, aut Ariginem; Graeci *ἰκτερί* (a similitudine ad animalculum quod *ἰκτερί*, id est, vinerra vel muscicula *σύνεστis* appellatur.



latur, quæ auricolores oculos habet) dicunt. Est autem duplex: aut enim à iecore fit, ubi per totum corpus flava bilis diffunditur; aut à liene, ubi uniuersim per venas dispersa bile atq; corporis miscella, atro quodam colore imbitur. Quod si igitur post febres orietur aurigo quum non semper periculosa sit; (nam quæ septimo, nona, undecimo & decimoquarto superuenit, Hippocrate teste, bona est; magna etenim ex parte morbum soluit) quomodo periculosam à bona, nulla habita diutina ratione, distinguere possimus (nam & Hippocrates arquaturn qui ante septimum diem contingit, malum dixit) edocet; atque id ex alterius hypochondrij dolore aut duritie: nam si præcordia dextera parte dura fuerint, fete nimirum acuta præcedente, ac doluerint, hepatis inflammationem significabunt, nam aliqui etiam de eiusdem visceris obstructione, aut scirrroso tumore sententiam proferre liceret: hi etenim affectus ut periculo omnino non vacant, ita etiam minus mali sunt, & remediis (si rectè adhibeantur) facile cedunt: adeo ut Plinius, & medicus ille Auerrohis, Hippocratem criminari ausi fuerint, quod arquaturn qui in febribus ante septimum diem accidit, malum (atque id cum maxima ratione) dixit; quum omnia signa indicantia, imperfecte ac sine signis indicantia, iam plus satis dictum sit mala esse. Quod autem de inflammationibus locum hunc putem intelligendum, facit Celsus propria quadam atque usitata phrasibus; qui doloris, aut tumoris vocabulo non raro φάσμασιν Græcis dictam intelligit; atque ideo subiungit: ac dolentibus his lævia; volens dolere simul, & dura esse, dextrique hypochondrij dolorem, durities iam & dextreri præcordij communem: ita ut tum demum à febre periculosus sit arquaturn, si liene aut obstructo, aut in scirrhum obdurato, etiā inflammatione vexetur hepar. Nam aliqui qui ex sola lienis inflammatione contingit arquaturn, nō usque adeo periculosus est: quanquam si cui hic mendum subesse videatur, per me sanè integrum est; facilis enim lapsus fuit pro diutina copulatiua ponere coniunctionem.

### Nulla acuta febris leuiter terrere.

ACVTI enim morbi præterquam quod celeriter indicant, magnitudinē etiam morbi adiunctam habent, & in omnibus serò acutis sunt febres continue coniunctæ; præter eos tamen qui ex obstructione crassorum & lentorum humorum contingunt; quales angina, & ij quos apoplecticos vocamus, sunt. Ceterum sicuti illi paroxysmorum ingi imperu, atque uehementia, & morbi magnitudine nos meritò exterrēt; ita hi dum tenacibus viscosissq; humoribus meatus infarciunt atque obstruunt, periculum suffocationis inferunt.

### nequē vnquam in acuta febre, &c.

CONVULSIONES in acuta febre etiam si somnum non subsequantur, semper male sunt; siquidem satius est febrem conuulsioni superuenire, quam febri conuulsionem, quod uidelicet magnam inanitionem nervosarum partium ac siccitatem significat: atque ideo alibi in acutis febribus Hippocrates conuulsiones, & circa viscera fortes dolores, malum dixit. verum si ex somnis in febribus conuulsiones oriri contingat, periculosum quidem & id est; sed non æquē: nam copiam humoris pituitosi ac lentii infarciētis cerebri ventriculos, significat.

### Timere etiam ex somno.

IN febribus ex somnis timores malum, inquit Hippocrates: indicat enim ingentem melancholicorum humorum copiam, caput per somnum grauaturn ac repletum. Videtur autē Celsus paulò liberalius quam Hippocrates, omnes paiores qui somnos in morbis sequuntur, malos dixisse: nam is Aphorismo iam citato eos tantum malos dixit, qui febres, (atque eas non quasuis, sed acutas tantum) concomitantur: suntque hi periculosiores quam ij qui in aliis morbis accidunt; quanquam quales quales ij tandem sint, qui à somno in morbis sunt paiores, periculo non vacant: siquidem, ut iam dictum est, in quo morbo

M

morbo



morbo somnus laborem facit, malum. nam si is qui lenare ac lenire morbum deberet, corpus aggrauat; malum mehercules signum censendum est.

### Itemq. in prima febre, &c.

CONTRARIUM huic est quod Hippocrates dicit, In quouis morbo rationē ipsam constare atque valere, bonum est: & ubi somnus delirium sedat, bonum; id enim significat calorem naturam morbosas causas vicisse, atque adeo vires esse validas. Contra si in morbis mentem aut somno turbari, aut delirare contingat, id aut humorum prauitatem aut fluxiones ad cerebrum multiplicari, aut febres intendi, aut dolores excitari, aut crecere inflammationes, aut vires alioqui deficere indicat. Verum id in febribus potissimum periculosum est; atque ijs imprimis, quas arduas vocant, quod materiam furiosam admodum denotet. Nam, sicut Galenus primo De morbis vulgaribus docet, arduas febres oriuntur, ubi in ventris aut iecinoris, aut pulmonis venis bilis effervescat. hae igitur si quando ad solidas corporis particulas perveniat, atque eas permeet, vigores concitabit; sin in cerebrum eiusque membranas sit impacta, phrenitides inducet: verum priusquam inhaereat perfluens venas in ijs sitas, non phrenitidas, ceterum quae in vigoribus sunt febrium, deliria efficit, ac proinde bilis quae primo arduae febris causa fuerat, ad cerebrum delata, phrenitidis aut delirii causa erit: unde non immerito inter pessima numeratur signa, atque protinus in principio febris; nam sicut Hippocrates in Praedictionibus auctor est, in febrium principiis si delirium acceperit, periturum hominem significat: nam praeterquam quod difficilem in statu fore indicationem minetur, materiam quoque admodum virulentam denotat: atque sic Hippocrates libro Epidemion plerosque febribus arduis laborantes, atque a phrenitide correptos, mortuos scribit.

### membrum aliquod esse resolutum.

DE paraplegiis & hemiplexiis loqui

Celsum certum est: & quod ea in febribus omnibus male sint, iam ante dictum est, & auctoritate Hippocratis satis liquet, qui in principiis febrium siderationes mortales dixit. Accidant autem paraplegia proprie dictae, si altera corporis parte crasis, lentis frigidisque humoribus nervos per quos motus voluntarii obveniunt, infarciuntibus, obstructio orta fuerit: sitque interdum ut non totum litus, sed unam tantum aliquam particulam occupet. Sic Hippocrates attonito cuidam crus enasisse memoria prodidit. Verum quemadmodum ita affecti vitam non raro recipiunt (siquidem origo mali ad animalium facultatum principium nondum pervenit, spinali tantum medulla affecta) sic non citra iacturam membri quod resolutum fuit, vitam deinceps transigunt.

### Vomitibus etiam periculosus est, &c.

POSSYMVS huc varias ex Hippocratis Aphorismis, Praedictionibus, Prorrheticisque sententias in medium proferre: nam 2. Prorrheticon, Vomitiones, inquit, sincere atque implacidae, male: & Praedictionū 2. Vomitus vilissima, si pituita ac bile quam maxime permixta est, si non multa, si non crassa est: sincerior enim deterior est: Si vero vomitus fuerit porraceus, aut humida & nigra, quicumque ex his fuerit color, malus censendus est: limida si male olet, citissimam habet abolitionem. Sinceras autem vomitiones vocamus, quae dumtaxat unum qui excernitur humorem alius inpermixtum habent; haec igitur quum magnum aliquem excessum, intemperis quoque significant, exitiales merito dicuntur. Nam qui biliosus sincerum vomitus excernitur, caloris atque adeo bilis copiam; qui pituitosus, frigoris denotat. Viridem autem colorem vocat eum, qui praesinus aut porraceus dicitur. gignitur siquidem in corpore, quemadmodum crocea bilis, per naturam habentibus; ita altera praeter naturam a porri similitudine porracea dicta, constatque: ut haec saepe numero in ventriculo gignatur, propter quorundam esculentorum cruditatem; ut sunt olera, brassica, beta,



fica, beta, porrum, cape; ac si hinc quidem huiusmodi vomitus consequi contingat, non usque aded inter perniciosos censendi sunt, quum potius robur virtutis expulsiua significant. Verum si eneniat talibus nequaquam ingestis, ratione agrotationis tales humores in venis gigni, ac decumbere in ventrem superiorem, perniciosum omnino signum; si quidem summum calorem significat, qui bilem quodammodo asser. Nigri vero vomitus non solim mali, sed plane lethales sunt. quare si quando tales contingant, a medicamento abstinendum suadet Hippocrates: dicit enim, Nigra vomentes, cibos fastidientes, deliros, in pube parum dolentes, quibus oculus ferox clausisque, purgare non oportet: perniciosum enim est. In cuius sententia commento Galenus vel nigram vomitionem sufficere auctor est, quod inter perniciosissima censetur signa; etiamsi aliis non aduiscatur; ex aduisione enim innati caloris extinctionem denotat.

#### At mala vrina est.

CORPORIS omnia excrementa, quae *ta anteriora*, hoc est abeuntia, vocat sexto Epidemion senex ille medicina parens antiquissimus; unde nimirum ceperint, aut ubi cessarint, quatenus dissipant, colores quoque eorundem, caliditatem, salsuginem, tenuitatem, dulcedinem, crassitudinem, equaliterque, an inaequaliter sese habeant, cognoscenda monet, sub excrementis sudores, urinas, egestionem vomitionesque comprehendens; de vomitu, spuito, sudore hactenus, nunc de urinis pauca quidem, si verba numeres; multa si sensum spectes, dicturus. Sed et, Galeno teste, non solum si naturalia instrumenta male affecta sint, inspicienda; sed in omnibus etiam thoracis, ventris, pulmonis, animaliumque instrumentorum affectibus. Nam si bona appareant, multum valent ad salutem; ut si male, amplificant quoque agri periculum. Vocat autem eam urinam malam, in qua subsidunt subrubra, quam alibi Hippocrates non ut omnino malam vituperavit, sed ut salubrem commendavit, diuturnitatemque morbi portendere

tantum dixit. Si vrina, dicit, fuerit subrubra, ac sedimentum subrubrum ac leue, diuturnior quidem hic morbus quam primus, sed admodum salutaris est. quo fit ut inter neutra seu mediocria signa potius annumerandum sit sedimentum subrubrum, quam malum dicendum: nisi hic quoque mendum subesse suspicemur, ac pro subrubris, rubra legamus: ea enim passim apud Hippocratem in prorrheticis suspecta sunt; atque aded aberrationem mentis, aut delirium renuuntque inflammationem portendere dicit. Limida autem tam vrina, quam contenta, ut post subrutra ponuntur, ita etiam peiora sunt: nam ab excessu frigidiatis, extinctionem seu consumptionem facultatis visificae significant.

#### deterior in qua quasi fila quaedam tenuia.

SIVE per fila capillos cum vrina excretos (sunt enim tenuibus albisque filis similia) sine araneorum telis simile quid innatans intelligamus; parum refert: sed si hoc modo acceperimus, legendum erit: deterior in qua quasi fila quaedam tenuia atque alba desuper natant. tunc enim Hippocratis 32. Aphorismum libri Secundi Prædictionum imitatus videbitur. Si pingue desuper natans, araneorum speciem referat, damnandum est; indicat enim consumptionem: etsi de capillis qui una cum vrina redduntur, intelligere malim; idque quod non temere quicquam immutandum putemus, atque quod (Galeno De locis affectis auctore) indicent exulcerationem renum, atque aded materiam crassam & lentam renum cavitatibus infartam, calore praeternaturali exustam: nam & Hippocrates ipse, huiusmodi filamenta a renibus excerni, auctor est.

#### Pessima ex his est, si tanquam.

HOC quoque facit ut precedentem sententiam de passione in qua tanquam capilli quidam alti (capillitium vocant) excernuntur, intelligamus: nam alioqui haec in qua

M 2

furisura



furfurea subsidentia subsidunt, nihilo minus periculosa essent quam ea, quae aranearum telus simile quid innatis habent, quod, ut diximus, talem quodammodo aut colliquationem corporis significant. Haec autem in quibus furfurea, (hoc est speciem farinae crassioris referentes) subsidentia apparent, quemadmodum imbecillioribus agrotantibus, viribusque desitibus perniciose omnino sunt atque cito interimentes; ita viribus robustis, morbi duntaxat diuturnitatem significant: sic Hippocrates libro Epidemion tertio, de eo qui in Dealcis orto iacebat, ita scriptum reliquit: Urinae tenues, varie, habentes sublimamenta aut nubes in instar farinae crassioris &c: quadragesimo autem die iudicatus est. Ceterum per hypostases furfureas non solum eas quae furfuri similes sunt, brevitati studens, intellexit; sed eas quoque quas orobas ab orobi similitudine, aut laevineas, aut similaceas vocant; differunt enim haec omnes secundum maius & minus tantum. Quod si igitur in urina crassa, citraque febrem prodeant, Hippocrate teste, scabiem vesicae significant (crassam autem urinam hic vocamus, quae aliqua ex parte concocta sit & mediocriter consistentia); verum si eas excerni contingat in febre cum urina tenui, hoc est cruda, colliquationem totius corporis atque citam mortem, non constantibus viribus, praesagunt. Excernuntur autem eiusmodi quod febris in habitum totius corporis transmigravit, quodque calore extraneo solida partes corporis depascantur.

#### diluta quoque atque alba vitiosa.

DILUTAM Hippocrates pellucidam; Plinius à crystalli similitudine, crystallinam vocat; alij aqueam dicunt. At quod haec semper mala sit, satis constat: nam virtutis concoctricis atque expultricis imbecillitatem crassitiemque, ac crudelitatem materiae peccantis significat: unde in quartanis non raro tenues, hoc est dilutae atque albae, urinae excerni videmus, humore melancholico sua crassitie meatuum urinariorum obstruente. In ardentibus febribus ut longe aliam originem

habet, ita maius periculum portendit: si quidem quoniam ætatem ex bile originem trahat, consequens est visca, atque adeo totum corpus bilioso humore affici, unde & urinae tingi & igneas in canis corffici fere visum venit: quod si minus id fiat, indicium est bilem lenitate sua relictis vasibus cerebri petere; ac proinde, nisi iam adsit, omnino imminere phrenitidem; quemadmodum, si innascent, mortis subesse periculum, neque enim sperandum est, naturam cerebri incolumem servatam iri, ut quae à bili graviter lacessatur, crucietur, eiusque acrimonia mordeatur. Non immerito igitur Celsus sequitur Hippocratem, urinas tenues in phreniticis exitiales dixit, atque perniciosas; nam omnino interimunt, nisi statim subsequatur tincta; ea enim (Aetnario teste) patientem liberat, alioqui periclitantem.

#### Aluus etiam mala est, &c.

Id enim secam intemperiem, aut ieiunioris, aut meserae, aut ventris, vel icturni vel intestinalium, vel lienis (teste Galeno De ratione victus in morbis acutis) significat: quanquam ideo quoque intercepta aluus mala sit, quod repleta excrementa putrescunt, ut unde acres atque patres vapores superiora petentes, ventriculum nonnunquam subvertunt, capitis gravedinem innescunt, cordisque palpitationem inducunt, atque in summa omnes quotquot sunt capitis affectiones ascripta aluus auget, & deteriores reddit, quantumcumque non sit signum affectionis cerebri. Sic Hippocrates, Capite dolentes, cum catocoe delirantes, intercepta alius, scire in opisthotonum incidere, auctor est.

#### Periculosa etiam quae inter febres.

PERLIQVIDAM deiectione aut aluum, vocat eam quam Hippocrates aquosam: haec autem malam esse, 2. Praedictionum docet: Si, inquit, admodum aquosa deiciatur, aut candida aut admodum crocea, aut strumans deiciatur; haec omnia mala: siquidem aquosae deiectiones crudelitatem significant; concoctio enim (ut docet Galenus libro secundo De ratione



lione vict. in morbis acutis) omnia cogit atque increpascit: quo fit ut corpulenta esse debeat deiectione, qua morbo eunte in indicationem redditur. Albe autem seu candidae deiectiones fieri, non defluente ex hepate in ventrem bile, aut propter restrictionem canalus eius qui bilem ad ventrem deferit, sicuti usu venire videmus iis qui regio morbo laborant: aut propter vehementem ardorem, qui in superioribus partibus iecinis existens sanguinem una cum bile sursum rapit; atque ideo in Prorethetis Hippocrates albas deiectiones, non secus ac urinas pellucidas, in phreneticis malas esse dixit: & alibi, in acutis biliosis, albicantes spumantesque deiectiones reprobat, atque in his hepar laborare docuit. At ea deiectione quae semper fluit, neque quietis tempus ullum admittit, mala est; nam (ut ait Hippocrates) deiectione madens ex usu est, si nec crebro neque paulatim excernatur; frequens enim desidendi labor insomnium facit: at si vniuersim, & saepe deiciatur, periculum deiectionis animae imminet, spiritibus una cum deiectione exolutis. Et libro De ratione victus acutorum: Quum aliquid in febribus quinta die terrisum fuerit, vel venter repente liquida deiecerit, & animae defectus praeberit, vel vocis priuatio, vel conuellatur aeger, vel singuliat, ex his angi, grauitergue affici consuevit, sudoresque circa tum mustacem, tum faciem, tum ceruicem ab occipito esse consueverunt: qui autem haec patiuntur, spirituos paulo post moriuntur. Spumosa quoque deiectione mala est; quod aut caloris copiam indicet, aut spiritum flatuosum humori permixtum esse, qui solutu quoque difficilis sit: atque hinc Hippocratem deiectiones in spumosas sincerasque desinentes exacerbare solitas, dixisse.

Præter hæc periculum, &c.

HÆC quæ subiungit signa, exitiosa omnino sunt, ac mortem iam pro foribus portendunt: nam, ut Hippocrates, exitiosior est deiectione si nigra, aut opina, aut fetida aut limida est. Nigra enim deiectione ab atra bile sincera tingitur, mortemque (eodem sene teste) indicat: verum quam varia sint nigrae deiectionis species, Galeno De atra bile auctore, eò sunt periculosiores, quo qualitates magis inordi contigerit; alia siquidem ad nigram bilem proximè accedunt; alia neque erodunt in deiectionibus, neque odorem facit dum præ se ferunt: multa etiam in medio inter hæc ordine constituntur. At glutinosa deiectione (quam opinam Hippocrates vocat) deicitur, quoties pinguedo ab ignito calore absumitur. Grauiolens consummata putredinis nota est. Mera autem & sincera & biliosa deiectiones, graues secum ferunt offensas: nam præcordiorum excitant ardorem, inquietationemque membrorum, & iactationem brachiorum faciunt, sedemque exulcerant.

Malum est etiam, quod &c.

SYNCERAS deiectiones eas vocari dixi, quæ unum aliquem reliquis impermixtum humorem in se continent: & quod hæc semper mala sint, non citra additionem intelligendum est: siquidem fieri potest, ut cocta paulatim affectione in qua talia excernebantur, conquiescat aeger, atque adeo bonam crisin consequatur: quo fit ut post longas febres sinceras deiectiones Cornelius noster vituperet, quod copiam vnius alicuius humoris peccantis (quæ morbi longitudine profratis ægri viribus euinci atque superari nequeat) significet: sic autem quoque in morbo longo fastidium cibi & meracas deiectiones ex Hippocrate malas diximus.

## CAPVT V.

*De signis longæ valetudinis.*

POST hæc indicia, notum est longum morbum fieri. Sic enim necesse est, nisi occidit. Neque vlla alia spes in malis magnis est, quàm ut imperum morbi trahendo aliquis effugiat, porrigaturque in id tempus, quod curationi locum præstet. Protinus tamen signa quædam sunt, ex quibus colligere possumus morbum, & si non interemerit, longius tamen tempus habiturum. Vbi frigidus sudor inter febres non acutas circa caput tantum, & ceruices oritur: aut vbi febre non quiescente corpus infudat: aut vbi corpus modò frigidum, modò calidum est, & color alius ex alio fit: aut vbi quod inter febres aliqua parte abscessit, ad sanitatem non peruenit: aut vbi æger pro spatio parum emacrescit. Item si vrina modò liquida & pura est, modò habet quædam subsidentia, si læuia, atque alba, rubræque sunt, quæ in ea subsidunt, aut si quædam quasi maculas repræsentat, aut si bullulas excitat.

Vrina.

## ENARRATIO.

PRÆCEDENTE capite quæ essent mala in agrotantis signa, docuit: sed horum quædam magnitudinem morbi, aliæque crisi imperfectam; atque iterum nonnulla materia peccantis malignitatem; uti etiam multa cum virium robore eiusdem crasitatem atque lentorem, atque aded morbum longum, sed qui tandem soluitur, portendere diximus. At qualia tandem ea signa sint, quæ longam valetudinem, hoc est morbum longum (nam in viroque significato valetudinis nomen accipi satis notum est) indicent, iam explicare nititur, vniuscuiusque signi vim perdiscendâ monens: nam vnum aliquando signum forte atque fidum, plura signa non fida ac debilia vincit. Sic perniciofa præter rationem, hoc est sine signis criticis lenantia, mortem tamen significare dixit Hippocrates: & rursum non formidan-

da mala quæ præter rationem eueniunt: Neque enim statim terrere debet, si quis ante indicationem die, grauiora accidentia patiantur; id siquidem ferè perpetuum est, ut crises præcedens nox gravis sit: Nam quibus crisis sit, inquit Hippocrates, iis nox gravis ante accessionem; quæ verò subsequitur, magna ex parte lenior. siquidem quum crisis sit subita ad sanitatem, vel mortem permutatio, Galeno De crisis auctore, atque ea fiat cum subitis quibusdam excretionibus, aut effatu dignis abscessibus, non immeritò symptomatum concursus atque vehementia, longitudo, ac exacerbatio accessionis, præcedentem crisin noctem grauem efficiunt: quod voluisse videtur Cornelius noster, quum dicit: Sic enim necesse est, nisi occidat: tanquam incertam omnino & infidam pronuncians acutorum morborum indicationem, qui



nam, qui non perfectè indicantur: hi enim si non interimunt, sepe in longum protrahuntur ac recidunt. notus est enim Hippocratis Aphorismus: Quæ relinquuntur in morbis à crisi, recidivas (seu reversiones, ut sequente libro auctor noster vocat) facere consueverunt: idque ideo, quod tum vel ipsa materia ad expulsionem fuit minus idonea, vel ipsa natura imbecilla admodum per morbum effecta, omnes humores noxios expellere non potuit.

### Neque vlla alia spes.

ACVTI morbi non ideo tantum periculosi sunt, quod vehementes sint; sed quod paroxysmorum se inuicem excipientium ingi assultu, exhibendorum remedium occassionem nullam præbeant: adeo rectè ab Hippocrate dictum est, Occasio præceps. Quod si igitur in magnis morbis (quales sunt ij quos acutos vocari diximus, non ob citam in peius vel melius mutationem, sed potius ob morbi magnitudinem, atque paroxysmorum insultus vehementiam) statim, hoc est, in principio atque una cum morbis signa quadam infida atque imperfecta appareant, nisi interimant, indicationem protrahunt in, longitudinemque morbi præsentiant: ac proinde proposito metu, spem tamen vite aliquam superesse, quæ curationi temporis non nihil concedatur.

### Vbi frigidus sudor inter feb.

SVDOR, inquit Hippocrates, pessimus est, si frigidus egreditur, ac circa caput tantummodo, vultum ac cervicem: hoc enim cum acuta quidam febre mortem; cum mitiore verò, morbi longitudinem significat. Et, Frigidi sudores in acuta quidem febre facti mortem; cum mitiore autem, morbi longitudinem significant. Frigidos autem sudores appellamus, eos, qui ad tactum quorumvis tales sentiantur, quique à corpore tales emanant, non ab accidente aliquo extraneo frigefacti. verum unde generentur, & quod morbi longitudinem significant, iam ante dictum est.

### aut vbi febre non quiescente.

SVDOR multus, inquit in Prorethica Hippocrates, si cum febris acuta fiat, inuitis. & in Aphorismis: Febricitanti si sudor sape accidit, febre non desiciente, malum: prærogatur enim morbus, humiditatemque multam denotat; quæ ut dissolvatur, atque à natura emincatur, longius tempus requirit, unde si multum quoque sudare contingat, non solum longitudinem morbi, sed mortis quoque periculum periculis; exolutis agri viribus multo sudore.

### aut vbi corpus modò frigidum.

VBI vniverso corpore, inquit Hippocrates, mutationes sunt, & modò corpus frigescit, modò calefit, aut color alius ex alio fit, morbi longitudinem significat: hæc siquidem caloris atque frigoris vicissitudines, variarum in corpore dispositionum nota sunt; quas sanè esse diuturniores, quàm quæ vnus sit modi satis constat, quum natura non possit breui tempore varias dispositiones consicere: quomodo autem hæc alterationes calidi in frigidum fiant, perpendendum est; siquidem quantumcunque varij atque diuersi humores (exempli gratia, bilis & pituita) eo loco sint, atque sibi inuicem innati, non statim varias se mutuo excipientes dispositiones, atque subitas calidi in frigidum, frigidique in calidum mutationes, sed confusas potius, & quæ mixtum quid ex virisque habeant, concitabunt. Sin autem diuersos variosque humores separatim in corpore contineri contingat, tum demum singuli pro qualitate proprios exercent effectus; idque potissimum si ab interioribus, hoc est, à venis ad exteriora ferantur: siquidem huiusmodi alterationes facilius concitabit materia agitata atque mota, quàm quieta. Caterum quod subiicit: & color alius ex alio fit; id iam dictum non omnino dissimile est: nam variorum in corpore humorum dominium significat; humores enim superabundantes ex colore debemus coniectare,



clare, nisi in profundum rãcesserint; color enim similis efflorescit humoribus, si non ro- gurgitauerint.

### aut ubi quod inter febres,

NON solum si quod abscessit, ad sanita- tem non pervenit, morbi longitudinem de- notat; sed etiam si à febrilibus abscessus orian- tur: Nam, ut Hippocrates, quibus febres longa, iis tubercula, vel labores in articulis sunt: siquidem quum in febrilibus adhuc vi- geant vires, atque robustæ sunt (si quidem hæ à multitudine, vel crassitie, vel frigidi- tate humorum fiant, neque probè à naturâ materia concoqui aut dissipari possit) con- tingit non raro in eiusmodi à principaliori- bus membris, ad articulos atque ignobiliores particulas superfuitates decumbere, & tu- bercula seu abscessus oriri. Quando autem huiusmodi abscessus in febrilibus expectare de- beamus, audiamus Hippocratem 4. De ra- tione victus acutorum loquentem. Consue- nerunt, inquit, febres hæ protrahi, in quibus inter initia urina tenues; atque abscessus habere, si aurium cervicisque inferna partes frigida fuerint; quòd si frigida non fuerint, profecto mutationes habent. Quum igitur ex his iam satis constet, eas febres qua in abscessus terminantur, longas esse; consequens quoque erit eas in longum tempus protrahi, si ortis abscessibus mortus non solvatur. nam & Hippocrates in febrilibus abscessus qui ad primas indicationes non solvunt, morbi lon- gitudinem significare dixit. Abscessus autem hoc loco vocamus, quoties nulla præcedente phlegmone, humor aliquis in parte quapiam coëgitur; Græci ἀποσπασμα vocant.

### aut ubi ager pro spa- cio, &c.

HUNC locum quia præcedente capite satis exposuimus, verbum non amplius unum.

### Item si urina modò liquida.

LIQUIDAM vocat eam urinam, quam dilutam, aut aqueam dicunt. & quòd hæc morbi longitudinem præfagiat, satis notum

est: quum ob humorum cruditatem talis ex- cernatur. Puram autem appellat, quæ syn- cera est: qualis erit, si intensè rubra, aut tenuis, aut alba tenuisque sit; utraque enim hæc, quum cruditatis signa portendat, mor- bum quoque longum desiniet, Hippocrate multis locis teste. At quid per maculas in- telligat, dubium admodum est: ego sanè aut de nigris nebulis quæ in urina non raro con- spiciuntur, morbum solum difficilem (ut quæ ex humore melancholico fiant) signifi- cantibus intellexerim; aut de iis urinis, in quibus sedimina quedam crassioris farina similia conspiciuntur; ea etenim (ut vult Hippocrates) morbi diuturnitatem signifi- cant: aut potius de pingui in urina desuper natante, araneorum speciem referente: didi- cimus enim ex Hippocrate id damnandum; quando indicet consumptionem, si diu perse- ueret, morbiq; longitudinem, ac vitalis facultatis debilitatem, si parumper tantum suat: id namque Celsum nostrum voluisse, omnino coniiciendum est; quando Galenus pingue id in lotio supernatans assimilet iis, quæ pinguioribus insculis refrigerascentibus innatent; Actuarii punctis quibusdã velut ex oleo iniectis: quæ utraque si in urina superficie conspiciantur, maculas representa- bunt. Lævia autem atque alba subsiden- tia, vocat tenuia, quæ nullam corpulentiam præ se ferant, spumaq; quodammodo similia sunt; generantur enim hæc à spiritu flatuoso permixto tenacius semicocto humorum ex- cremento. Rubra verò hypostasies si læ- ues quoque & æquales sunt, ut disturnum morbum, ita salutarem omnino præfagiunt. monendus interim lector est, pro subrubris non satis rectè rubras hypostasies legi: ratio- nem habes præcedente capite, ubi utramque hypostasim expendimus.

### aut si bullulas excitat.

QVIBVS in urinis, inquit Hippocrates, supersunt bullæ; iis morbum renum, & lon- gum fore significant: sunt autem huiusmodi bullæ, ut vult Galenus, ab humiditate quæ à spiritu flatuoso circumextenditur: unde si in urina conspici bullas contingat, spi- ritum



ritum flatuosum in causa esse constat; qui autem de iis que de urinis retulimus, ex-  
quum sit frigidus, ac solutu contumax, citius iudicium requirat, secundum Aëtianū  
morbum longum præfagiet. Quod si quis De iudiciis urinarum consulat.

## CAPVT VI.

*De iudiciis mortis.*

**S**ED inter hæc quidem proposito metu spes tamen superest.

Ad vltima verò iam ventum esse testantur, nares acutæ,  
collapsa tempora, oculi concaui, frigida languidaque aures, *Habes de his*  
& imis partibus leniter versæ, cutis circa frontem dura & in- *iudiciis Hip-*  
tenta, color aut niger, aut perpallidus, multoque magis si ita *ocratici ipsi*  
hæc sunt, vt neque vigilia præcesserit, neque ventris resolu- *in primo*  
tio, neque inedia. Ex quibus causis interdum hæc species ori- *Prognosti-*  
tur, sed vno die finitur. Itaque diutius durans mortis index *côn, unde*  
est. Si verò in morbo vetere iam triduo talis est, in propinquo *hec auctor*  
mors est: magisque si præter hæc oculi quoque lumen refu- *desumpsit,*  
giunt, & illacrymant, quæque in ijs alba esse debent, rubef- *ut alia mul-*  
cunt, atque in ijsdem venulæ pallent, pituita que in ijs innatans *ta in hoc se-*  
nouissime angulis inhærescit, alterque ex his minor est, *cundo libro.*  
hi que aut vehementer subsederunt, aut facti tumidiores sunt:  
perque somnum palpebræ non committuntur, sed inter has  
ex albo oculorum aliquid apparet: neque id fluens aluus ex-  
pressit: eademque palpebræ pallent, & idem pallor labra &  
nares decolorat. Eademque labra & nares oculique & palpe-  
bræ & supercilia, aliquavē ex his peruertuntur, isque propter  
imbecillitatem iam non audit, aut nō videt: eadem mors de-  
nuntiatur, vbi æger supinus cubat, ei que genua contracta  
sunt. Vbi deorsum ad pedes subinde delabitur. Vbi brachia  
& crura nudat, & inæquabiliter dispergit, neque his calor  
subest. Vbi hiat, vbi assidue dormit: vbi is qui mentis suæ  
non est, neque id facere sanus solet, dentibus stridet. Vbi vl-  
cus quod aut antè, aut in ipso morbo natum est, aridum, &  
aut pallidum, aut lividum factum est. Illa quoque mortis in-  
dicia sunt, vngues, digiti que pallidi, frigidus spiritus, aut si  
manibus qui in febre & acuto morbo vel infania, pulmo-

N

nīve

\* febre acu-  
to mor.



nīsve dolore, vel capitis, in veste floccos legit, fimbriāsve dī-  
 ducit, vel in adiuncto pariete, si qua minuta eminent, carpit.  
 Dolores etiam circa coxas & inferiores partes orti, si ad visce-  
 ra transierunt, subitoque desierunt, mortem subesse testan-  
 tur, magisque, si alia quoque signa accesserunt. Neque is ser-  
 uari potest, qui sine villo\* tremore febricitans, subito strangu-  
 latur, aut deuorare saliuam suam non potest. Cuiue in eodem  
 febris corporisque habitu ceruix conuertitur, sic vt deuorare  
 æquē nihil possit. Aut cui simul & continua febris, & vltima  
 corporis infirmitas est: aut cui febre non quiescente, exterior  
 pars friget, interior sic calet, vt etiam sitim faciat: aut qui fe-  
 bre æquē non quiescente simul & delirio, & spirandi diffi-  
 cultate vexatur: aut qui epoto veratro exceptus distentione  
 neruorum est: aut qui ebrius obmutuit. Is enim febre, adie-  
 cta neruorum distentione consumitur, nisi aut febris\* acces-  
 sit, aut eo tempore, quo ebrietas solui debet, loqui cœpit.  
 Mulier quoque grauida, acuto morbo faciliē consumitur: &  
 is cui somnus dolorem auget, & cui protinus in recenti mor-  
 bo bilis atra vel infra, vel supra se ostendit, cuiue alterutrum  
 modò se prompsit, cū iam longo morbo corpus eius esset  
 extenuatum & affectum. Sputum etiam biliosum & puru-  
 lentum, siue separatim ista, siue mixta proueniunt, interitus  
 periculum ostendunt. Ac si circa septimum diem tale esse  
 cœpit, proximū est, vt is circa quartumdecimum diem de-  
 cedat, nisi alia signa meliora, peiorāue accesserint: quæ quo  
 leuiora, grauiorāue subsecuta sunt, eò vel feriore mōtem,  
 vel maturiorem denuntiant. Sudor quoque frigidus in acu-  
 ta febre pestiferus est, atque in omni morbo vomitus, qui  
 varius, & multorum colorum est, præcipueque si malus  
 in hoc odor est. Ac sanguinem quoque in febre vomuisse, pe-  
 stiferum est. Vrina verò rubra, & tenuis\* in magna cruditate  
 esse consuevit, & sæpe antequam spatium mature scat, homi-  
 nem rapit. Itaque si talis diutius permanet, periculum mortis  
 ostendit. Pessima tamen est, præcipueque mortifera, nigra,  
 crassa, mali odoris. Atque in viris quidem & mulieribus talis  
 deterrima est. In pueris verò quæ tenuis & diluta est. Aluis  
 quoque

\* alij tu-  
more, alij  
timore

\* abscessit,

\* in ma-  
gna crudi-  
tate, subau-  
diendum est  
morbi.  
Sic in Pro-  
gnost. Hip-  
pocr. lib. 2.  
Vrina quo-  
ad rassa te-  
nuisq. appa-  
ruerit, cru-  
dum mor-  
bum signi-  
ficat.



quoque varia pestifera est, quæ strigmentum, sanguinem, bilem viridem, aliquid modò diuersis temporibus, modò simul, & in mistura quadam, discreta tamen repræsentat. Sed hæc quidem potest paulo diutiùs trahere. In præcipiti verò iam esse denunciat quæliquida, eademque vel nigra, vel pallida, vel pinguis est, utique si magna foeditas odoris accessit. Illud interrogari me posse ab aliquo scio: Si certa futuræ mortis indicia sunt, quomodo interdum deserti à medicis conualescant, quosdamque fama prodiderit in ipsis funeribus reuixisse? quinetiam vir iure magni nominis Democritus, ne finitæ quidem vitæ satis certas notas esse proposuit, quibus medici credidissent: adeò illud non reliquit, ut certa aliqua signa futuræ mortis essent. Aduersus quos ne illud quidem dicam, quòd in vicino sæpe quædam notæ positæ, non bonos, sed imperitos medicos decipiunt. quod Asclepiades funeri obuius intellexit, eum viuere, qui efferebatur, ne protinus crimen artis esset, siquod professoris sit. Illa tamen moderatius subijciam: Coniecturalem artem esse medicinam, rationemque coniecturæ talem esse, ut cum sæpius aliquando responderit, interdum tamen fallat nos. Siquid itaque vix in millesimo corpore aliquando decipit, id notam non habet, cum per innumerabiles homines respondeat. Idque non in his tantum, quæ pestifera sunt, dico: sed in his quoque quæ salutaria. Siquidem etiam spes interdum frustratur, & moritur aliquis, de quo medicus securus primò fuit. Quæque mædendi causa reperta sunt, nonnunquam in peius aliquid conuertunt. Neque id euitare humana imbecillitas in tanta varietate corporum potest. Sed est tamen medicinæ fides, quæ multo sæpius, perque multo plures ægros prodest. Neque tamen ignorare oportet, in acutis morbis fallaces magis notas esse, & salutis & mortis.

Medicina  
certitudo.

## ENARRATIO.

NECESSE est, inquit Galenus, cuiusque signi naturam præcognoscere, ut ex vi uniuscuiusque, præcognitionem faciamus: nam & Hippocrates disciplinam tra-

didit, secundum vires eorum, nomina indens; alia bonis signis annumerans, alia rursus malis: perniciofa etiam & graviora signa dixit; ut etiam grauior, grauiusina;

N. 2.



simia; & minus graua, & magis graua; atque non raro, prauum, prauius, prauissimum, & mortiferum: quod Celsus noster initatus, primum instantis morbi indicia, deinde qua bona in morbis essent signa, scribens: atque his statim subiungit qua difficilem morbum significarent: mox ea qua magnum longumque portendunt subiciens. iam postremo pestifera, hoc est qua imminuentem iam mortem indicent, enumerat; ita ut cum de omnibus in genere morborum signis sermonem absoluerit, gradatim ad ea qua in quouis morbo sigillatim bona malaue signa sunt progrediatur, hic sane, si non superior, saltem per omnia Hippocrati similis.

Ad vltima verò iam ventum esse, &c.

QVAE diximus ferè omnia signa spem aliquam pra se ferunt; sed qua iam enarrabimus, exigua admodum, aut nullam futurae salutis relinquunt, nisi sese ex insperato deus aliquis propitius auxiliarem offerat. Talia autem sunt, nares acutae, collapsa tempora, aliisque deinceps testimonia, qua ex Hippocrate coniungit; primum quidem rationem faciei habens: Nam (ut Hippocrates sexto Epidemion) si in magnis morbis facies bona sit, signum bonum; in parvis autem contraria bona significans malum: & libro Praedictionum primo (vnde hac auctor noster desumpsit) idem senex ita scriptum reliquit: Considerare conuenit per morbos acutos in hunc modum: Primum vultum egroti, siue similis bene valentium, potissimum si iuxta enim optimus erit: si verò contrarius quam maxime simili sit, exitiosissimus est: Nares compresse, oculi caui, ascripta tempora, aures frigida contractaeque, & fibræ earum versa, & item cutis circa frontem dura, intenta, arida, & color totius corporis viridis, aut niger. Si igitur talis inter initia fuerit vultus, necdum scrutari de aliis signis possibile sit; interrogare oportet, num vigilauerit homo, an alius soluta admodum fuerit, an fame affectus: & si quid horum comprobeat, minori cum periculo est. indi-

cantur verò talia per diem & noctem, si ob has causas talis fuerit vultus. Si verò nullum horum dixerit, neque praedicto tempore desierit, signum esse exitiosum admodum censendum est. Si verò in morbo vetere, iam triduo talis vultus fuerit, de iis interrogare oportet, quibus antea monui: alia quoque signa esse considerata qua in toto corpore, atque etiam oculis existant. Hactenus Hippocrates prolixè multisque verbis, praeter consuetudinem alioqui, declarans, quod Celsus noster breuiter & dilucidè expressit, dum inquit: multoque magis, si hæc ita sunt, ut neque vigilia praecesserit, neque ventris resolutio, neque inedia. siquidem ita affecti etsi non omnino periculo vacent; nequaquam tamen iam instantem mortem praesagienti: nam ut perniciosum omnino dicamus, requiritur ut inter initia acutorum morborum, aut alioqui post longos morbos, biduum aut triduum continuo citra aliquam exteriorem causam, talis se exhibeat facies: quam sanè à sanorum accidentium concursu Hippocraticam nominare solent, quod indubitatam omnino mortem praesagiat: significat enim principis alicuius partis affecta ob insignem quampiam intemperiem, facultatem imbecillam. Alioqui si in morbis acutis post principium appareret, acrem febris calorem portenderet: vnde qui exuperant in corpore tenues humores, per insensiles meatus expurgari contingit, ac corpus extenuari viribusque destitui. Igitur haec, quas in praesentiarum recenset, faciei constitutiones, facultates principes affectas (atque eam potissimum qua animalis dicitur) denotant: Nares siquidem acutae (ut rectè docet Galenus) in iis apparent, qui aut longiore morbo extenuantur, aut praedolore cōstillantur, aut quouis modo exoluntur, aut animo alioqui deficiunt. Cutis autem circa frontem dura, hoc est sicca (est namque à siccō inseparabilis durities, siquidem Galenus libro De temperamentis, id quod siccum est durum prorsus esse testatur) immodico calore febrili omnem humorem exhaustum significat. Atque non solum si circa frontem cutis sit arida & intenta, mortis imminuentis



imminentis erit signum; sed etiam si universum per totum corpus circumtendatur cutis, notus siquidem est quinta sectionis Hippocratis Aphorismus: Quibus cutis obiectur arida & sicca, sine sudore moriuntur; quibus vero rara & laxa, cum sudore intereunt. Et sexto morborum vulgarium idem senex in eadem verba huiusmodi protulit sententiam: Quibus, inquit, cutes circumtenduntur, arida & dura, sine sudore moriuntur. Verum hic tantum meminit cutis Celsus, qua circa frontem intenta esset, vel quod minimum carnis subiectum habeat, ac proinde in ipsis morborum principiis ab excellentie aliqua intemperie consumpto humore, facile indurescat intendaturque; vel quod singula tantum qua in vultu perniciose sint, voluerit recensere. Eadem ferè ratio est, cur tempora collabantur: hæc enim quum reliquum caput carne careat, sola reliqui capitis musculos habent; quos, quum parvi admodum sint, febrilis calor facile consumpserit. Oculi concavi eandem ferè originem sortiuntur. Coloris autem in nigrum mutatio pessima est: ea enim contingit sanguine refrigerato, ac proinde calore naturali aut extincto, aut extinctioni proximo. Subiectis autem statim post nigrum, pallidum, quod is minus vitiosus sit; significat enim imperfectam adhuc extinctionem, aut consumptionem viciis caloris. Vocat autem pallidum, quem veteres Græci χλωρόν. siquidem (ut rectè monet Galenus tum primo, tum secundo Predictionum) veteres ita nonnunquam viridem, nonnunquam etiam pallidum colorem nominare solebant; adeo ut το χλωρόν, & τὸ χλωρόν non raro confunderent. Sic Hippocrates sexto Epidemion ὁποχλωρόμελας καὶ ὁποχλωρόν, hoc est eos quibus flava seu pallida bilis permixta est cum atra, eosque qui pallide rubent, vocavit: & ὁποχλωρόν suppalidos, aut ut Celsus perpalidos, quasi λευκοχρόνους dixit. Ceterum quod in morbo veteri huiusmodi facies in propinquo iam esse moriem indicet, satis clarum est: significat enim quicquid est caloris innati, morbi tum vebementia, tum longitudine exhaustum esse.

### Magisque si præter hæc oculi.

MULTA hic ordine ex primo Predictionum libro auctor noster transtulit. Verum ea qua de oculis nunc in medium proferi, summe consideranda monet: siquidem summus ille medicus, Si oculi, inquit, tui peruersi est, reliquum etiam corpus nequam erit: tanquam ex oculis non solum temperiem, mores, constitutionemque totius corporis, verum etiam vires atque imbecillitatem conicere possimus: quod Epidemion libro Hippocrates aperit edocet: Nam oculi, inquit, ut robur habuerint, sic quoque corpus; color etiam in peius aut melius mutatur: insani est exim, ut quemadmodum se habuerit nutrimentum, ita & exteriora. Nam quum oculi, ceteris paribus, membris reliquis plus animalis spiritus contineant, nemo optico magis concavitatem, in qua maxima eius copia contineri possit, sortito id demonstrante: consequens quoque erit, visoria facultate affecta, aut aliqui debilitata, reliqua quoque membra animali spiritu destitui atque debilitari. Itaque quod qui lucem effugiant oculi, perniciosi admodum sint, docet in Predictionibus Hippocrates: Si oculi, ait, lucem effugiant, aut nolentes illachryment, aut peruertantur, aut alter altero fiat minor; aut candidum rubrum habeant; aut limides, aut nigras venulas; aut pituita appareat circa obtutum; aut sublimes tumidusve oculi vel cavi admodum fuerint: vel totius color euariet vultus: hæc omnia mala esse, atque exitiosa admodum, censendum est. Et libro Epidemion: Lachryma, inquit, in acutis morbis malè habentibus vltro manantes, bonum; non vltro verd, malum. Arque eandem sententiam eisdem ferè verbis Aphorismorum quarto, tum Epidemion sectione quarta repetit; ac alibi quoque: Quibus in febribus acutis, ardentibus præsertim, præter voluntatem lachryma manarint, his sanguinis ex naribus profusum expectandum est; idque si reliqua se malè non habuerint: in quibus verd malè se habent, his non sanguinis missionem, sed mortem potius portendit. Porro

illachry-

N 3



illachrymāt in acutis oculi, propter imbecillitatem retentricis facultatis, lumenque refugunt, atque auersantur, propter debilitatem visoria facultatis ex se ipsa affecta. Color etiam in peius, hoc est in rubrum mutatur, id quod album esse debebat, sanguine cerebrum, eiusque membranas replente: quo fit ut aut qualitate aut quantitate molestus, venulas, atque adeo album oculorum rubidum reddat. Pallent autem venule (ita enim rursus το χαλκον vertit) aut liuent, extinctis spiritibus animalibus. At quæ in angulis pituita inhaerescit, accidit propter imbecillitatem naturalis facultatis regentis oculum. Et si iam alterum quoque oculum maiorem esse contingat, eandem facultatem extinctam prorsus & emortuam esse praesagit: sed hæc obiter. si quis interim ampliore enarrationem desideret, Galenum ex professo fusiussimè hæc tractantem consulat.

perque somnū palpebræ non committuntur, &c.

HIPPOCRATES in Prædictionibus, Considerare etiam oportet, inquit, suspensiones oculorum per somnum: si quid enim candidæ partis subapparet commissus palpebris, nec alui fluor, aut medicamentum in causa est, nec ita dormire assuevit, vitiosum indicium exitialeque omnino est: nam caloris innati facultatūque animalium & vitalium extinctionem indicat. Pallorem autem palpebrarum iam antè dictum est propter frigus accidere. Adiecit autem hic ex Hippocrate Celsus: neque id fluens aluius expresit; ut hæc signa citra ullam exteriorem causam ita apparentia indicemus: nam alioqui, propter immodicas evacuationes, vires exolui non raro contingit.

Eademque labra & nares.

SI peruertatur, inquit in Prædictionibus Hippocrates, aut liuida palpebra est, aut labrum, aut nasus cum aliquo alio signo, moriam prope esse censendum est. & quarto Aphorismorum: In febre non intermitte, si labrum vel palpebra, vel oculus, vel na-

sus, vel supercilium peruertatur, vel non videat, vel non audiat iam debili existente corpore; quicquid horum euenierit, mors proxima est. Et primo quoque Prorrheticon: In ardentibus febribus cum aliquantula perfrictione, deiectionibusque aquosæ bilis multisque oculorum peruersio, malum signum, tum aliàs, tum si catochi fiant. Et alio quoque loco: Hebetatus oculus, vitiatūque si fuerit ac concretus, immobilisque, ac tenebricosus, malum. Quum igitur partes prædictæ peruertuntur ac disserquentur, tensionem quandam convulsoriam, aut musculorum resolutionem esse oportet, Galeno testē; quorum hæc quidem imbecillitatem, illa dueros tumores ac siccitates immodicasque frigidiates significat. Quod si ergo ex siccitate oriatur, sicuti in acutis morbis febribusque ardentibus (de quibus hætenus locutus auctor noster videtur) non raro contingit; exitiale omnino est: nam ea quæ inactivationem sequitur convulsio, lethalis est. atqui si ex frigidiitate fiat, calore innato extincto, vires resumī nequeunt; unde perniciosum quoque esse constat.

vbi æger supinus cubat.

SUPINUM decubitum per se non omnino malum desinit: Galenus, mediūque quodammodo ponit inter salubres & perniciosos, neutriusque (nisi alia quoque mala signa adsint) annumerat. Quod si igitur sic cubantem, genua quoque contrahere contingat; tensionem quandam convulsoriam significat, quæ exhausto humido radicali à calore febrili facta. quanquam si quis ad mentis alienationem, Galenum sequimur, eiusmodi decubitum referre velis; per me intergrum est: atque tum idem, quod Hippocrates in Prædictionibus, dixit. Si crura supini cubantis admodum reducta distinctaque sint, exitiosum.

Vbi deorsum ad pedes.

HIPPOCRATES in Prædictionibus, Si verò procliuor est ac deorsum latitur, subinde ad pedes maiore cum periculo est; significat enim extinctionem regentis corporis facultatis,



cultratis, deliriis, catochis, phreniticis mentēque laborantibus frequens admodum.

### Vbi brachia & crura.

HIPPOCRATES in Prædictionibus huius quoque causam subiicit: Nam si nudos, inquit, habeat pedes, nec admodum calidos; ac manus, collum, ac crura dispergat inæqualiter, malum est: significat enim inquietationem. consistantur namque quous iacentis habitu, aliumque ex alio mutant. Adiecit autem particulam, neque his calor subest; ut morbum denotaret: nam præcedente quoque capite, acuto morbo urgente, extremas corporis particulas frigiditas, malas designimus: significant enim calore febrili principes partes depasci; unde etiam fiat, ut natura cum æstro quodam percita, statim priorem habitum ad alium transmutet: nam aliqui, nisi clausulam hanc addidisset, inter periculorum indicia prognosticon hoc tantum annumerandum esset, quum malitiam humoris tantum significet.

### Vbi hiat.

HIPPOCRATES in Prognosticis: Si verò hians dormiat ore, exitiosum omnino est: id enim imbecillitatem facultatum animalium denotat; nam à debilitate claudens os musculorum oriuntur.

### vbi assidue dormit.

QVOD ultra modum somno urgeri malum sit, diximus: at quod in morbis acutis lethale sit magna ex parte, audies: quotquot enim sunt quorum in Epidemiis Hippocrates somno detentorum meminit, ad unum omnes interierunt. Nam hic affectus ferè sit ob vires imbecillas, atque adeò ferè emortuas, ut apertas genas servare non possint.

### vbi is qui mentis suæ non est, &c.

HIPPOCRATES primo Prædictionum: Si quis frideat dentibus, non consuetus à pueritia id efficere; infania significatur, ac mors: sed in utrisque futurum prædicere periculum, est necesse. Si verò mentis com-

motus id efficiat, admodum exitiosum iam est. Et in Proretheticis: Dentium stridor quilibet non est sanitatis tempore afflictus, suffocatio quoque in his valde mala est. Celsus nos ter quoniam hoc capite instanti mortis signa enumerare tantum statuit, delirij in stridore dentium nullam facit mentionem, id tantum contentus dixisse, quod in delvis mortem iam imminuentem indicet; ostendit enim communem nervorum originem affectam, siquidem musculus masticatorius & temporalibus communis sit stridor dentium.

### Vbi vlcus quod aut antè, &c.

QVEMADMODVM antè generatim colorem totius corporis inspicendum monuit, ut ex eo peccantem conuenienter humerem; ita nunc idem in ulceribus ex Hippocrate observandum monet; siquidem is primo Prædictionum, Vlcus, inquit, si antè exstitit, vel existat, in morbo considerandum est: si enim moriturus ager est, ante mortem, aut lividum, & sicum, aut pallidum & sicum erit; sicum autem, ut docet Galenus, evadit, quoties nutriendi facultas debilis est; cui si biliosus humor ulcers causa efficiens accedat, pallidum quoque erit; quemadmodum si bilis atra, lividum.

### Illa quoque mortis indicia.

NON immerito mortis instantis indicium erit, si summa corporis particula pallide sint, calore innato (siquidem huius interitum mortem appellamus) iam quasi exhausto: nam si huius pars aliqua supersit adhuc, ad principes partes, potissimumque ad eorum vira principii recurrit: quo fit, ut quum extrema particula eo destituantur, sanguine quoque qui innati huius caloris domicilium est, careant; unde fieri videmus, ut ungues imprimis (sunt enim hi inter reliquas corporis particulas maxime exangues) atque post hos digitum quoque, atque ita deinceps relique in extremis corporis constitutæ particule, pallescant.

### Frigidus



## Frigidus spiritus.

SPIRITVS, inquit Hippocrates in Epidemiis, irruentes, intrantes, & exeuntes considerandi sunt: nam, sicuti in Prædictionibus dicit, Si frigidus de naso, atque ore exspiretur, admodum exitiosus est. quod, ut vult Galenus libro De difficultate respirationis, perfrigerari respiratorii organæ palam permiciosum est; cum isthic cor situm sit, quod principium, & fontem caloris innati esse scimus. Per spiritum autem, hic universam spirationem intelligimus.

aut si manibus quis in feb.

HIPPOCRATES primo Prædictionum: De gesticatione manuum ita agendum est: qui in febre acuta, aut delirio, aut peripneumonia, aut capitis dolore, manus subinde ad os fert, aut frustra venatur muscas, aut colligit festucas, aut de veste vellit pilos, aut de pariete stipulas carpit, id omne malum exitialeque est; indicat namque cerebrum noxiis admodum humoribus molestari: unde contingit spiritum visorinum ob auras vaporum fuligines offuscari, atque inibi visa pro natura humoris consistere; ita ut nonnunquam quadam musca ob oculos volitare; non raro pili quidam aut flocci oculis nostris sese offerre videantur. Contraxit autem auctor quædam ab Hippocrate fusius dicta; alia rursum parvò latius enarravit: siquidem ubi Hippocrates in febre tantum acuta dixit, Cornelius etiam quemvis alium acutum morbum adiecit, ratus fortè hic Hippocratem, ut in aliis multis, acutam febrem pro exemplo posuisse reliquorum acutorum morborum.

## Dolores etiam circa coxas.

Hoc & sequente capite coxarum dolores pro lumborum doloribus transulit ex Hippocrate: videturque transcribentium vitio annula quodammodo esse lectio, vti dicit: magisque, si alia quoque signa accesserunt: nam quemadmodum signi nomen neutrum omnino est, & indifferens, ita bonis æquè ac malis accommodari potest.

Quare, ut omnem scrupulum amoveamus, hunc in modum restituendum locum putavim: magisque si alia quoque mala signa accesserunt. nam Hippocrates secundo Prædictionum dicit: Dolores qui cum febre affligant circa lumbos, & inferas sedes si præcordia attingerint, inferas relinquentes sedes, exitiales admodum sunt. Itaque consideranda alia signa: nam si quod horum prænum extiterit, æger desperandus est: si verò remaneat in septum transversum morbo, alia signa non prænum extiterint; talem fore purulentum, expectandum est. Exitiale igitur signum est, si aliis quoque perneris signis adiungatur: quod significet contra consuetudinem nature materiam (idque ob prævitatem) ab ignobilioribus ad principaliora rapi. Reliqui autem huius exemplum quoddam notandum in Protheticis Hippocrates, ubi quandam syndromen malorum symptomatum enumerat: Ex lumborum, inquit, dolore ad os ventriculi recursiones febiles cum horrore, aquosa & multa renouentes, mente aberrantes, voce prinati, nigra vomentes moriuntur: & sexto Epidemion lumbis dolentibus recursus ad latus, & tuberculum quod sepos vocatur, malum.

Neque is servari potest qui sine vlllo tremore.

QUOTQVOT hætenus Celsi exemplaria videre comigit, sæpe discrepant, neque genuinum auctoris sensum exprimunt: alia namque sine vlllo tremore; alia rursum sine vlllo tremore legunt: idque (ut mihi quidem videtur) non citra mendæ suspicionem; siquidem Hippocrates quarto Aphorismorum: *ἢ ὡς πρὸς τὴν φέρονται, πρὶν ἐκείνους ἰσχυρὰν εἶναι τὴν φέρονται*: hoc est, Si febricitanti, nullo existente in faucibus tumore, strangulatio subito accedat, omnino lethale est: id siquidem Celsum nostrum voluisse credendum prorsus est. quo sit ut hanc in modum pristina vitori restituendum putemus: neque is servari potest qui sine vlllo tumore circa fauces conspicuo, febrici-



febricitans, subito strangulatur, aut deiorare saluam suam non potest. Ita enim de angina quæ ex gutturis inflammatione oritur, intelligitur; ex qua plerumque ægros strangulati videmus: nam quum angustii admodum & præclusi quodammodo sint meatus per quos spiritus ducitur, fit ut si qui angine si animo linquant, statim intereant: quod Hippocrates in Prognosticis quoque declarat: Angina, inquit, gravissima est, ac celerissime interimit, quæcumque nec in cervice, nec in faucibus conspicuum aliquod efficit; plurimum verò doloris inferi, ac spirationis difficultatem: hæc enim eodem die & secundo, & tertio, & quarto strangulat.

### Cuius in eodem febris.

HÆC quoque sententia effugiat, ut eo quo diximus modo legamus: nam Hippocrates in Aphorismis, Si à febre habito, inquit, collum perneritur, & vix potest deiorare sine ulla tumore conspicuo, lethale est. Et alibi, Collum perneri non posse & deglutire non posse, lethale est. significat enim, ut auctor est Galenus, magnum excessum febrilis caloris; qui exhausto humido innato excedentem siccitatem pariat; unde collum perneri contingit, & deglutendi difficultas accedit.

### Aut cui simul & continua febris.

ALLVDIT ad Hippocratis Aphorismum quartæ sectionis, ubi inquit, Si rigor incidit febre non desiciente, ægro iam debili, lethale. Neque mirum est desinito iam ferè viribus ægro acutum supervenientem mortuum lethalem esse: nam quantumcunque robustos invadunt, non omnino certa habent indicia salutis aut mortis, idque aut quod ingi inactionum assiluit, aut magnitudine alioqui morbi, materięque peccantis malignitate vires quantumvis firmas prosternant, ac precipites agant.

### aut cui febre non quiescente.

ANTE ex Hippocrate retulimus in non intermittentibus febribus si exteriores partes

frigida fuerint, interiores verò urantur, & sitim faciant, lethale esse; ac proinde eas febres esse eiusmodi, quæ aut ex internarum partium, viscerumve inflammatione oriuntur, quales lypurias, aut quæ ex pulmonis, ventriculi, aut iecoris, hoc est partium quæ inter thoracem & ventrem sita sunt, erysipelate nascuntur, ardentes perniciosissimas vocant. Sed & alio quoque loco vituperat Hippocrates mutationes celeres in utranque conditionem summarum partium, si sitis quoque bis accedat. Id enim rebus caloris præternaturalis, imbecillitatemque nativi significat.

### aut qui febre æquè non quiescente.

DIFFICILEM spirationem vocat, quæ magna sit, multoque internallo exspiratur: hæc autem, Hippocrate in Prædictionibus auctore, delirium significat. Si igitur, febre non quiescente, magna & rara spiratio fiat, atque adsit delirium, exitiosum omnino signum: significat enim cerebrum & instrumenta respirationis, hoc est musculos pectorales læsos esse: atque adeo conveli à nimia siccitate; unde raras quoque spiritus reddit consequens est.

### Aut qui epoto veratro.

DIXIT aliàs Hippocrates elleborum album sanas carnes habentibus perniciosum: facit namque convulsiones. & rursum, Convulsionem quæ ex elleboro fiat, lethalem esse. quod quum duabus potissimum de causis fiat convulsio, hoc est ab inanitione & repletionem nervosorum corporum, hæc quidem ut purgatione eius quod redundat curatur; ita illa (quando facilius sit demere quam addere) difficile admittit curationem, ferèque lethalis est; qualis quæ epoto veratro accidit est: ea namque oritur ob immodicam quam elleborus efficit vacationem; attractivo enim sua facultate, quæ in nervis est, ad se attrahit humiditatem, eorūque substantiam vehementius exiccat; unde sic orta convulsiones rectè lethales dicuntur: quemadmodum alibi quoque Hippocrates, ex superflua purgatione



gatione convulsiones, aut singulis superuenientes lethales dixit.

aut qui ebrius obmutuit.

HIC rursum ab Hippocratis sententia auctor nosse enarrat: unde dubium non esse puto in his, quæ hæcenus ipsis excusæ extant, exemplaribus locum hunc corrupte mendoseque legi. siquidem præterquam quod Hippocratis sententiam non satis explicuerit, dissonantia etiam, neque satis coherentia dixisse videtur, nam et adiecta febre, à siolo quodam suppositum videtur; siquidem statim subiungit: nisi aut febris accessit (cuius videlicet calore vapores dissoluantur) aut eo tempore quo ebrietas solui debet, loqui cœpit. Sic quinta sectionis Aphorismo quinto Hippocrates: Si quisquam ebrius de repente obmutuerit, convulsus moritur, nisi febre corripiatur, aut ubi ad horam pervenerit qua solvuntur crapula, vocem recuperet. Et libro secundo De morbis: Si quis ex ebrietate voce priuetur & sanæ febris ipsum corripiat, sanus sit; si vero non corripuerit, tertia die moritur. Obmutescunt autem ebrii ob vinum immodicè sumptum cerebri ventriculos replens; unde & convelluntur quoque. Nam quemadmodum Galenus libro De temperamenti auctor est, vinum ubi plus bibitur, quam ut vinci possit, tantum abest ut animal calefaciat, ut etiam frigidiora vitia gignat; quippe apoplexia, cavi, convulsiones & tetani immodicum vini potum concomitantur: quare si ebrius quis obmutescat ac convellatur, nisi qualitate vini calida humores cerebri ventriculos insarcientes dissolvantur, hoc est nisi eo tempore quo crapula solui debet, loqui cœperit, aut si febris alioqui superveniens calore suo eosdem discutiat, periculum est ne distentione correptus moriatur; idque suffocata animali facultate. Paulus Aegineta ad catochos nescio quam apposuit hunc Aphorismum libro tertio transferi: Qui ex ebrietate, inquit, vitium hoc contraxerint, crapula dissoluta humidior cibo tractandi sunt, qualis est prisana cremor: præterea caput inunctionibus congruis

inungitur, per astatem quidem frigiliter; per hiemem egelidis: si nequaquam crapula solvatur, neque ad sobrietatem reditus est, tanquam deplorata valetudinis hominem vitare oportet.

Mulier quoque gravida, &c.

QUVM due sint indicationes in victu gravidarum, acuto morbo laborantium, altera videlicet quæ à fœtu sumitur; altera quæ à morbo; illa quidem pleniorum victum præscribit, quo febris incrementum ac vires accipit, atque agrotans occiditur: hæc contra, cuius summa habenda est ratio, nisi matrem una cum fœtu perimere mens sit, summe tenuem victum desiderat; unde inedia consumpto infansulo abortus ac vite periculum imminet. Restat igitur ex Hippocrate dixit, mulierem gravidam acuto aliquo morbo corripi, lethale esse. Quod autem somnus in declinatione morbi, præsertim dolorem faciens, lethalis sit, iam antè dictum est.

& cui protinus in recenti morbo.

IAM sæpius dictum est, quod perniciose imperfectè indicantia mala sunt: sub quorum albo sunt, si cruda (qualia fere in morborum principis sese exhibent) non tam motu natura, quam malicie materia peccantis excerni contingat. quod voluit Hippocrates, dum dicit: Morbis quibuslibet incipientibus, si atra bilis infra vel supra exierit, lethale est: nam si per inferiora sese exeat, periculum est ne dysenteriam efficiat, ac acrimonia sua intestina corrodat; unde mortem subsequi certum est, quando ea quæ ab atra bile fiunt dysenteria Hippocrati lethales dicantur. At si sursum feratur, idem quoque in ventriculo quod in intestinis, efficiet, cerebrumque ac gulam perat.

cui alterutrum modò se prompsit.

OBSCURE admodum quarta sectionis Aphorismum 23. cum brevitati studeat, Cel-  
sus reddi-



sus reddidisse videtur: Quibusque mor-  
bis acutis aut diuturnis, vel ex vulneribus,  
sive quouis alio modo extenuatis nigra bilis,  
sive uti sanguis niger, exierit, postmodum mor-  
tiantur. Nam acutorum morborum ne me-  
minit quidem, quod forte suspicaretur longos  
ferè esse mortos qui aut à cholera adusta aut  
à succo melancholico fierent. Nam qui à  
sanguine aut bile oriuntur, breues admo-  
dum sunt, qui ex pituita, in longius tempus  
protrahuntur; uti etiam illi qui ex melan-  
cholia, in longissimum. Quare Celsus bilis  
atra reiectionis, longo morte extenuato cor-  
pore, lethales dicit: est enim in talibus, ut  
vult Galenus, natura admodum imbecillis;  
adeo ut non possit concoquere, neque discer-  
nere, neque excernere que ita prava existunt.  
Sub bile autem atra, melancholiam ex cho-  
lera adusta, & succum melancholicum (qui  
est qualis sanguis niger) complectitur: nam  
à alterutrum ad id infra vel supra  
se ostendit; neco quidem iudicio, referen-  
dum est.

### Sputum etiam biliosum & purulent.

HIPPOCRATES secundo Prædictionum,  
Quæcunque, inquit, suppurantur dum screa-  
tio biliosa est, exitiosa admodum sunt, sive  
viciis bilis ac pus, sive simul excernantur,  
potissimum verò quoties suppuratio excerni  
ab eiusmodi sitatione septimo die agrotatio-  
nis inceptit, sitientem verò talia, mori deci-  
moquarto die, sperandum est; nisi bonum  
aliquod illi acciderit, indicatur enim, ut in-  
quit Galenus, humor ferocissimus, qui na-  
tura ad concoctionem parata non cedit, quod  
frigitur expunctiones tales septimo die fieri  
contingat, ferè decimoquarto, intereunt:  
nam critica signa que critico die conti-  
nuant, nisi morbum leuent, atque una adsint  
alia perniciofa signa, mortem ferè præsa-  
gunt: quo fit ut si septimo die huiusmodi  
appareant, decimoquarto interimant; est  
enim septimus decimiquarti index.

### Sudor quoque frigidus.

QUID si frigidus sudor, aut unde oria-

tur, ante dictum est; & quod is lethalis sit  
in febribus morbisque acutis, ante quoque ex  
Hippocrate declaratum est: nam pessimum  
sudorem is dicit si frigidus egrediatur, &  
circa caput, tantummodò vultum & cerni-  
cem: hic enim cum acuta febre, mortem;  
cum mitiori, morbi longitudinem significat.

### atque in omni morbo vomitus, &c.

SI idem homo, inquit Hippocrates, om-  
nes vomat colores, exitiale admodum est.  
Vomitio liuida si granè olet, ocysimam ha-  
bet abolitionem; omnisque suppuris ac fæ-  
tidus odor in omni vomitione malus est. Et  
in Prorethetis: Vomitus cum varietate  
mali tum alias, tum si mutuo sese conse-  
quantur, varietas etenim multas in corpore  
variasque affectiones difficiles significat:  
que si græve quoque olent, eò deterior est,  
quod his putredinem quoque adiunctam  
denotet.

### Ac sanguinem quoque in febre.

HIPPOCRATES tum quarta, tum septi-  
ma Aphorismorum sectione, non pestiferum,  
sed malum tantum dicit: nam illic inquit,  
Sanguis qualiscunq. sursum elatus, malum;  
si verò deorsum, bonum: hic verò, Quicun-  
que euomuerint sanguinem, si sive febre  
quidem, salutare est; si verò cum febre, ma-  
lum est: is siquidem sanguinis vomitus qui  
cum febre sit, inflammationem in iis parti-  
bus unde vomitus deferitur, significat; que  
tantum abest ut minuatur aut sibi similis  
maneant, quam calore febrili augeatur, ac  
foneatur, interioraque sensim depascatur; unde  
mortem quoque consequi ratio postulat.

### Urina verò rubra ac tenuis.

TENVEM rubramque urinam non sim-  
pliciter perniciosam dicit; sed que temporis  
spatio (quum cruda sit, atque in morbi cru-  
ditate excernatur, atque adeo longitudinem  
temporis moramque ad concoctionem effla-  
gitet;) hominem consumat: præter enim

O. 2.

color



color tenuisque substantia, cruditatem materie denotant: nam, ut Hippocrates, Dum urina ruffa fuerit ac tenuis, crudam significat agrotationem: ubi morbus diutius fuerit, urina verò talis excreuitur, periculum est ne eger durare possit quoad morbum concoquatur.

### Pessima tamen est, præcipueque, &c.

EXITIOSIOR (inquit Hippocrates) est urina, si aquosa fætida, nigra crassaque est. Quæ consistentia sit aquosa, colore alba, nullam omnino mentionem fecit Celsus, vel quod malam ante præsertimque in phreneticis dixisset, vel quod eam sub urina ruffa ac tenui comprehensam voluit, quando alba tenuis quàm ruffa tenui coniuncta maiorem cruditatem denotet. Græneoler autem urina propter putredinem, quæ à calido extraneo agente in humidum fit: Crassa verò redditur, tum ob humoris abundantiam, tum ob nature cum eisdem pugnam. Nigra propter extinctionem caloris vivifici; à frigore quidem, ut voluit, si lividus color præcedat; à calore, si viridis.

### Atque in viris quidem & mulieribus.

IN mulieribus & viris, inquit in Prognosticis Hippocrates, urina nigra; in pueris aquosa, deterrima est. Nam quum pueri multam habeant naturalem humiditatem, calorémque nativum plurimum, ac multum edant, (sunt etenim voraces natura) consequens est eos secundum naturam lotium reddere parum à subaureo croceoque declinans, substantia crassum, hoc est consistens, atque cum multa hypostasi: cui quum maximè contrarium sit dilutum ac tenue, rectè inter perniciofa recensuit. Nigra autem urina,

sicuti Galenus docet, in omni etiam ætate pessima est.

### Alius quoque varia pestifera, &c.

HIC iterum transcribentium lapsus fuit: siquidem rò viride, quod ad aliquid referri debebat, lili ascripserunt, non intelligentes omnes pericholas deiectiones periculo non vacare. Nam, ut Hippocrates de ratione victus acutorum, Deiectiones omnes puræ, biliosæ, grænes habent offensas, neque enim hypochondriorum extinguunt ardorem, sed excitant, inquietationemque, & membrorum iactationem faciunt, intestina enim sedemque exulcerant. Et in Prædictionibus: Exitiosior, inquit, est deiectio si livida aut nigra, aut opima est: si verò versicolor, disturnior quidem, sed nihilominus exitialis: hæc strigmenta habebit, ac biliosa erit; cruenta, porracea nigraque, quæ nonnunquam simul interdum interpositis vicibus excrenuntur: Quas omnes qualitates, si rò viride ad aliquid referamus, sub bile biliosa atraque excrementa comprehendentes, clarè explicaverit Celsus: de quibus quoniam satis iam antè dictum est, ad alia progrediemur. Nam quæ ad finem usque capitis sequuntur, quoniam ad semeiotionem parum conducunt, & per se ipsa clara satis sunt, volentes præterimus: satis enim superque à doctissimo viro Ioanne Manardo suis in Artem parvam commentariis demonstratum est sine scientia, an coniecturalis tantum ars medicina: de quo qui plura desiderat, aut Manardi doctissimos commentarios, aut Aponensis Conciliationes legat. At quod acutorum morborum non sunt omnino certa prænuntiationes salutis aut mortis, quando cum ceteri indicatione magnitudinem quoque morbi adiunctam habeant, antè quoque diximus.



## CAPVT VII.

*De notis, quas aliquis in singulis morborum  
generibus habere possit.*

SED cū proposuerim signa quæ in omni aduersa valetudi-  
ne communia esse consueuerunt, \* ea quoque transibo, vt \* ad ea  
quas aliquis in singulis morborum generibus habere possit  
notas, indicem. Quædam autem sunt, quæ ante febres,  
quædam quæ inter eas, quid aut intus sit, aut venturum sit,  
ostendunt. Ante febres, si caput graue est, aut ex somno  
oculi caligant, aut frequentia sternutamenta sunt, circa ca-  
put aliquis piritæ impetus timeri potest. Si sanguis aut ca-  
lor abundat, proximum est, vt aliqua parte profluuium san-  
guinis fiat. Si sine causa quis emacrescit, ne in malum habi-  
tum corpus eius recidat, metus est. Si præcordia dolent, aut  
inflammatio grauis est, aut non toto die concocta fertur vri-  
na, cruditatem esse manifestum est. Quibus diu color sine  
morbo regio malus est, hi vel capitis doloribus conficiantur,  
vel terram edunt. Qui diu habent faciem pallidam, & tu-  
midam, aut capite, aut visceribus, aut aluo laborant. Si in  
continua febre puero venter nihil reddit, mutaturque ei co-  
lor, nec somnus accedit, ploratque is assidue, metuenda ner-  
uorum distentio est. Frequens autem destillatio in corpore  
tenui longoque, tabem timendam esse testatur. Vbi pluri-  
bus diebus non descendit aluus, docet aut subitam deiectionem,  
aut febriculam instare. Vbi pedes turgent, longæ de-  
iectiones sunt. Vbi dolor in imo ventre & in coxis est, aqua  
intercutem instat. Sed hoc morbi genus ab ilibus oriri solet.  
Idem propositum periculum est his, quibus voluntas desi-  
dendi est, venter nihil reddit, nisi & ægre & durum, tumor  
in pedibus est, idemque modò dextra, modò sinistra parte  
ventris inuicem oritur atque finitur: sed à iocinore id ma-  
lum proficisci videtur. Eiusdem morbi nota est, vbi circa  
vmbilicum intestina torquentur (σφοδόν Græci nominant)

O 3

coxaque



coxæque dolores manent, eaque neque tempore, neque remedijs soluuntur. Dolor autem articulorum, prout in pedibus, manibusve, aut alia qualibet parte sic est, ut eo loco nervi contrahantur, aut si id membrum ex levi causa fatigatum æquè frigido calidoque offenditur, *ποδάγραν χειράγραν* ve, vel eius articuli in quo id sentitur, morbum futurum esse denuntiat. Quibus in pueritia sanguis ex naribus fluxit, dein fluere desijt, hi vel capitis doloribus conflictentur necesse est, vel in articulis aliquas exulcerationes graues habeant, vel aliquo morbo etiam debilitentur. Quibus foeminis menstrua non proueniunt, necesse est capitis acerbissimi dolores sint, vel qualibet alia pars morbo infestetur. Eademque his pericula sunt, quibus articulorum vitia, dolores, tumoresque sine podagra similibusque morbis oriuntur & desinunt. Vtique si sæpe tempora iisdem dolent, noctuque corpora insudant, frons prurit, lippitudinis metus est. Si mulier à partu vehementes dolores habet, neque alia præterea signa mala sunt, circa vigesimum diem, aut sanguis per nares erumpet, aut in inferioribus partibus aliquid abscedet. Quicumque etiam dolorem ingentem circa tempora & frontem habebit, is alterutra ratione cum finiet, magisque si iuuenis erit, per sanguinis profusionem, si senior, per suppurationem. Febris autem quæ subito sine ratione, sine bonis signis finita est, ferè reuertitur. Cui fauces sanguine & interdum & noctu replentur, sic ut neque capitis dolores, neque præcordiorum, neque tussis, neque vomitus, neque febricula præcesserit, huius aut in naribus, aut in faucibus vlcus reperietur. Si mulieri ex inguine febricula orta est, neque causa apparet, vlcus in vulua est. *Vrina.* Urina autem crassa, ex qua quod desidet album est, significat circa articulos, aut circa viscera dolorem, metumque morbi esse. Eadem viridis aut viscerum dolorem tumoremque cum aliquo periculo subesse, aut certè corpus integrum non esse testatur. At si sanguis aut pus in vrina est, vel vesica, vel renes exulcerati sunt. Si hæc crassa carunculas quasdam exiguas quasi capillos habet, aut si bullat, aut malè olet, & interdum quasi arenam, interdum quasi sanguinem trahit,



trahit, dolent autem coxæ, quæque inter has, superque pubem sunt, & accedunt frequentes ructus, interdum vomitus biliosus, extremæque partes frigescunt, urinæ crebra cupiditas, sed magna difficultas est, & quod inde excretum est aquæ simile, vel rufum, vel pallidum est, paulum tamen in eo leuamenti est, alius verò cum multo spiritu redditur, utique in renibus vitium est. Aut si paulatim destillat, vel si sanguis per hanc editur, & in eo quædam cruenta concreta sunt, idque ipsum cum difficultate redditur, & circa pubem inferiores partes dolent, in eadem vesica vitium est. *Calculosi.* Calculosi verò his indicijis cognoscuntur: Difficulus vrina redditur, paulatimque, interdum etiam sine voluntate destillat. Eadem arenosa est, nonnunquam aut sanguis, aut cruentum, aut purulentum aliquid cum ea excernitur. Eamque quidam promptius recti, quidam resupinati; maximeque hi qui grandes calculos habent, quidam etiam inclinati reddunt, colemque extendendo, dolorem leuant. Gravitatis quoque cuiusdam in ea parte sensus est, atque ea cursu omni que motu augentur. Quidam etiam cum torquentur, pedes inter se subinde mutatis vicibus implicant. Fœminæ verò oras naturalium suorum manibus admotis scabere crebro coguntur. Nonnunquam si digitum admouerunt ubi vesicæ ceruicem is vrgit, calculum sentiunt. At qui spumantem sanguinem excreant, his in pulmone vitium est. Mulieri grauidæ sine modo fusa alius elidere partum potest. Eidem si lac ex mammis profluit, imbecillum est quod intus gerit. Duræ mammæ sanum illud esse testantur. Frequens singultus, & præter consuetudinem continuus, iecur inflammatum esse significat. Si tumores super vlcera subito esse desierunt, idque à tergo incidit, vel distentio neruorum vel rigor timeri potest. At si à priore parte id euenit, vel lateris acutus dolor, vel insania expectanda est. Interdum etiam huiusmodi casum, quæ tutissima inter hæc est, profusio alui sequitur. Si ora venarum, sanguinem solita fundere, subito suppressa sunt, aut aqua inter cutem, aut tabes sequitur. Eadem tabes subit, si in lateris dolore orta suppuratio, intra quadraginta dies purgari non



Vrina.

gari non potuit. At si longa tristitia cum longo timore & vigilia est, atræ bilis morbus subest. Quibus sæpe ex naribus fluit sanguis, his aut lien tumet, aut capitis dolores sunt, quos sequitur, aut quædam ante oculos tanquam imagines obuersentur. At quibus magni lienes sunt, his gingivæ malæ sunt, & os olet, aut sanguis aliqua parte prorumpit. Quorum si nihil euenit, necesse est in cruribus mala vlcera, & ex his nigra cicatrices fiant. Quibus causa doloris, neque sensus eius est, his mens labat. Si in ventrem sanguis confluxit, ibi in pus vertitur. Si à coxis, & ab inferioribus partibus dolor in pectus transit, neque vllum signum malum accessit, supurationis eo loco periculum est. Quibus sine febre aliqua ex parte dolor, aut prurigo cum rubore, aut calore est, ibi aliquid suppurat. Vrina quoque quæ in homine sano parum liquida est, circa aures futuram aliquam suppurationem esse denuntiat. Hæc verò cum sine febre quoque vel latentium, vel futurarum rerum notas habeant, multo certiora sunt, vbi febris accessit, atque etiam aliorum morborum tum signa nascuntur. Ergo protinus insania timenda est, vbi expeditior alicuius, quam sani fuit, sermo est: subitaque loquacitas orta est, & hæc ipsa solito audacior: aut vbi raro quis & vehementer spirat, venasque concitatas habet, præcordijs duris & tumentibus. Oculorum quoque frequens motus, & in capitis dolore offusæ oculis tenebræ, vel nullo dolore substantie somnus ereptus, continuataque nocte & die vigilia, vel prostratum contra consuetudinem corpus in ventrem, sic, ut ipsius alui dolor id non coegerit: item robusto adhuc corpore insolitus dentium stridor, insaniæ signa sunt. Si quid etiam abscessit, & antequam suppuraret, manente adhuc corpore insolita febre subsedit, periculum affert primum furoris, deinde interitus. Auris quoque dolor acutus, cum febre continua, vehementi que, sæpe mentem turbat, & ex eo casu iuniores interdum intra septimum diem moriuntur, seniores tardius: quoniam neque æquæ magnas febres experiuntur, neque æquæ insaniunt: ita sustinent, dum is affectus intus versatur. Suffusæ quoque sanguine mulieris mammar, furorem ven-



rem venturum esse testantur. Quibus autem longæ febres sunt, his abscessus aliqui, aut articulorum dolores erunt. Quorum faucibus in febre eliditur spiritus, instat his nervorum distentio. Si angina subito finita est, in pulmonem id malum transit, idque sæpe intra septimum diem occidit. Quod nisi incidat, sequitur, ut aliqua parte suppuret. Deinde post alui longam resolutionem, tormina: Post hæc intestinorum læuitas oritur. Post nimias destillationes, tabes. Post lateris dolores, vitia pulmonum: post hæc, infania. Post magnos feruores corporis, nervorum rigor aut distentio. Vbi caput vulneratum est, delirium. Vbi vigilia torset, nervorum distentio. Vbi vehementer venæ supra vlcera moventur, sanguinis profluuium erit. Suppuratio verò pluribus morbis excitatur. Nam si longæ febres sine dolore, sine manifesta causa remanent, in aliquam partem id malum incumbit, in iunioribus tantum: in senioribus ex eiusmodi morbo quartana ferè nascitur. Eadem suppuratio fit, si præcordia dura dolentia ante vigesimum diem hominem non sustulerunt, neque sanguis ex naribus fluxit, maximeque in adolescentibus: utique si inter principia aut oculorum caligo, aut capitis dolores fuerunt, sed cum in inferioribus partibus aliquid abscedit. At si præcordia tumorem mollem habent, neque habere intra sexaginta dies desinunt, hæretque per omne id tempus febris, tum in superioribus partibus fit abscessus: ac, si inter ipsa\* vlcera non fluit, circa aures erumpit. Cumque omnis longus tumor ad suppurationem fere spectet,\* magis eò tendit is, qui in præcordijs, quàm is, qui infra est. Si lassitudinis etiam sensus in febre est, vel in maxillis, vel in articulis, aliquid abscedit. Interdum quoque vrina tenuis & cruda, sic diu fertur, ut alia salutaria signa sint, exque eo casu, plerumque infra transuersum septum (quod *Διάφραγμα* Græci vocant) fit abscessus. Dolor autem pulmonis, si neque per sputa, neque per cucurbitulas, neque per sanguinis detractionem, neque per victus rationem finitus est, vomicas aliquas\* interdum excitat, aut circa vigesimum diem, aut circa\* quadragesimum, nonnunquam etiam circa sexagesimum.

\* viscera,  
al. initia

\* Alias,  
magis se  
tendit.

\* intus  
exci.

\* xxx,

P.

mum.



mum. Numerabimus autem ab eo die, quo primum febricitavit aliquis, aut inhorruit, aut gravitatem eius partis sensit. Sed hæ vomicæ modò à pulmone, modò à contraria parte nascuntur. Quod suppurat ab ea parte, quam afficit, dolorem, inflammationemque concitat, ipsum calidius est: & si in partem suam aliquis decubuit, onerare eam ex pondere aliquo videtur. Omnis etiam suppuratio, quæ nondum oculis patet, sic deprehendi potest: Si febris non dimittit, eaque interdum leuior est, noctu increscit, multus sudor oritur, cupiditas tussendi est, & pæne nihil in tussi excreatur, oculi calui sunt, malæ rubent, venæ sub lingua inalbescunt, in manibus fiunt adunci vngues, digiti, maximeque summi\* pallent, in pedibus tumores sunt, spiritus difficilius trahitur, cibi fastidium est, pustulæ toto corpore oriuntur. Quod si protinus initio dolor, & tussis fuit, & spiritus difficultas, vomica vel ante, vel circa vigesimum diem erumpet. Si serius ista cœperint, necesse est quidem increscant, sed quò minùs citò affecerint, eò tardiùs soluentur. Solent etiam in graui morbo pedes cum digitis vnguibusque nigrescere. Quòd si non est mors consecuta, & reliquum corpus inualuit, pedes tamen decidunt.

\* calent,

#### ENARRATIO.

POSTQVAM instantis morbi signa, atque adeò eo urgente, quæ vel spem, vel metum significarent, explicauit; iam ad aliud genus signorum progreditur: ex quibus qualis tantò morbus sit futurus, liceat coniecturare; præsertim ab hoc capite dicturus quæ cognito morbo, spem aut metum polliceantur.

Ante febres si caput graue est, &c.

NOTA eam capitis grauedinem aut oculorum caliginem intelligit, quæ in febribus præcedente inflammatione die; sed quæ ante paroxysmorum exacerbationes in ipso morbi principio fit; tum enim huiusmodi accidentia impetum aliquem pituitæ deferri ad caput significabunt. Grauiatur namque caput

propter multitudinem pituitæ, unde contingat quoque transitum vaporum, & humorum obstruari: his accedit dolor ac tensio quædam panniculorum cerebri; quo fit ut violento motu natura ad sternutationem procedat, depellere tentans ea quæ meatui obstruant. De caligatione autem dictum est.

Si sanguis aut calor abundat.

ANTEA ubi frigidi & calidi incommoda enarrauimus, inter reliqua quæ calorem subsequuntur, sanguinis profusio posuimus. Abundante autem sanguine, eadem quoque consequutura ratio efflagitat, vasorum oris apertis dum nimia copia grauantur, atque distenduntur. Porro sanguinem redundare



redundare dicimus, si (quod ad aetates attinet) adulescens sit, tempusque vernum, ac anni constitutio calida & humida, his quoque si adsit tensio vasorum omnium in oculis, atque manifesta pulsatio in temporibus, faciei & corporis reliqui color rubicundus, roseus, ac floridus ac splendens ex rubro atque albo mixtus.

### Si sine causa quis emacrescit.

NUTRITIO est perfecta assimilatio, vel vacuari repletio: fitque quoties is qui nutrit cibum corpori quod alit assimilatur. Ceterum quando id quod probe nutrir debet, (ut libro De symptomatibus vult Galenus) oportet ad se trahere peculiare propriumque alimentum, deinde retinere ipsum quousque alteratum sibi assimilet, ac deinde excernere id quod redundat excrementum, necesse est, quum duplex sit excrementi genus (aut enim qualitate aut quantitate peccat eam omnino partem quae non alitur, aut in uno eorum quae dicta sunt, peccare, aut in pluribus: sic autem dicitur, quae & ὑπερσπασμός, οὐρελμία & χύμος φλεγματώσις dicitur, hydropis species, ubi tota corporis miscella in tumorem quempiam seu spongia attollitur, accidere solet: sic ἀσπασμός, ita enim vocant Graeci quando corpus non alitur, & naturaliter semper aliquibus decedentibus, nullis vero in eorum locum subuenientibus summa macies oboritur: sic malus corporis habitus (κακὸς ἥλιος dicitur) quoties alimentum corrumpitur; accidit: quod ferè fit, ut sequente libro auctor noster edocet, quoties longo morbo vitata corpora, etiam si illo vacent, refectorem non accipiunt: nam, ut Hippocrates Aphorismorum secundo, non pura corpora quanto plus nutrities, tanto magis laedes; corrumpitur enim adueniens alimentum (Galeno in Commento eiusdem loci teste) corpori malos humores habenti, ita quod ipse quidem quantitas augetur, qualitas verò seruetur: Fit autem hoc potissimum quando ventriculus visiosus quibusdam humoribus plenus fuerit.

### Si praecordia dolent, &c.

QUANQUAM sub doloris vocabulo non raro inflammationem intelligat, hic tamen distinxit praecordia dolentia ab inflammatione vexatis, quae φλεγματώσις vocat Hippocrates; quod videlicet haec ferè à calida materia originem suam habeant, atque calidi morbi sint, cuiusmodi herpes sunt, erysipelates & carbunculi: illa autem, sicuti varios doloris sensus inferunt, sic varias quoque causas sortiuntur; nam si in alterutro latere obstructio sit, doloris sensus varios concitabit pro materia peccantis differentia. Siquidem si à vaporosis crassisque flatibus alterutrum hypochondrion, hepar dico aut lienem, contingat obstrui, non gravitatis solum in altero praecordio sensus, sed & tensionis oborietur. At si à crassis, lentis, ac viscosis humoribus talis obstructio accadat, tum quoque pro humorum differentia cum dolore, gravitatis, eiusque aut obusa aut vehementis, sensum inferet; idque aut cum febre, aut sine febre. Per gravem autem inflammationem eam intellexit, quae gravem doloris sensum inferret: cuiusmodi in principii exhibent ferè quotquot sunt inflammationes. Ceterum quod de urina cruda subiicit, facit ut potius de dextero praecordio dolente aut inflammato, quam sinistro locum hunc intelligam, idque gibba iocinoris pars affecta: Nam quum gibbam iecoris diueticis rectius, quam catharticis obstructione liberaveris, consequens quoque est, ut eadem patiente, concoctionis aut cruditis indicium ex lotio faciamus. Quanquam ad utriusque visceris obstructiones rectè hac possint accommodari: nam Hippocrates τὰ ἀπέρτα, hoc est excrementa omnia in morbis consideranda monet: & Galenus, in thoracis, pectoris & reliquarum corporis partium morbis locum contemplandum asserit.

### Quibus diu color sine morbo regio.

COLOR in corporibus similis efflorescit humoribus: sic ubi flava bilis per uniuersum corpus effusa contingit, auriginis certissimè



risima nota est: atque si ea non apparente color malus sit, exempli causa mixtus ex albo & limbo, aut plumbens idem appareat, limbus in summa cute emicet, crudos succos subesse argumento est: unde aut dolores capitis urgent, aut rerum seclorum appetitum, atque à natura abhorrentium, quales lapides, terra & carbones sunt, tenentur: quemadmodum mulieres quoque quadragesimo à conceptu die pro varietate vitiosi humoris peccantis, varia ac peregrina edulia appetunt: nonnulla enim salsa, quaedam acida, alie terram, aliqua rursum testas, aut exintitos carbones estant; quem affectum picam aut citam vocare consueverunt. Ceterum quæ de malo colore hic scribit Celsus, transsumsi ex secundo Prorrheticon Hippocratis, ubi sic habet: Quibus coleres dum inuenies sunt, ad nullum tempus prauis sunt, & continenter, non tamen regij morbi modo; hi siue viri sint, siue femina, caput dolent, ac lapides ac terram comedunt, & hamorrhoides habent. Pallidi vero cum virore coleres, qui diuturni sunt, & morbus regius vehemens non est, alia quidem eadem facere solent: verum pro lapidum ac terra carbonumque esu, præcordiis hi magis quam superioribus confistuntur.

### Qui diu habent faciem pallidam.

HIC, ut in precedente paragrafo, multa ex Hippocrate succidit Celsus: siquidem illic tantum doloris capitis, aut quod terram edant, meminit; & quod hamorrhoides habeant, silentio præterit: hic autem singula disingit, eaque quæ coniunctim inuadere Hippocrates dicit, Cornelius noster sigillatim tantum metienda dicit; siquidem iam citato loco inquit Hippocrates, Quicunque vero multo tempore pallidi apparuerint, & facies in tumorem eleuatas habent, eos dolere caput sciendum est, aut circa viscera dolorem aliquem habere, aut in sede malum aliquod in seipsis. Ex his autem apparentibus plerisque non unum aliquod horum malorum apparet, sed plerumque multa, aut etiam omnia.

### Si in continua febre puer, &c.

PER pueritiam eam quæ usque ad septimum annum protrahitur intelligemus: nam, ut Hippocrates tertio Prædictionum, Pueris accidit convulsio, si febris acuta fuerit, nec alium deliciat; ac vigilent, paueant, lugeant, colorem mutant, & crocum aut limbum aut rubeum trahant. Hac igitur nuperime editis pueris promptius accidunt ad septimum usque annum: Adultiores vero pueri virique non in febre prehendantur convulsione, nisi aliquid indicium exitit validissimum ac deterrimum, qualia per delirium accidunt. Neque enim mirum est, Galeno teste, lenissima quavis de causa nervorum distensione corripere pueros, quum una eademque sit omnibus victus ratio, nempe lac: quod, quum sicuti non raro sua qualitate, ut si insto crassius sit, ita etiam frequenter sua quantitate, ut si copiosius quam natura flagitat sumperint (sunt enim natura voraces pueri adeo ut etiam intempestinè exhibitum cibum non respuant) molestum sit, seletrem concitaret, atque adeo necruoso genere quod hac ætate imbecillissimum est, affectu convulsiones excitat: cuius quidem future cœu causa sunt, si paueant, vigilent, illachryment, atque alius nihil reddat, signum vero ad has causas, si color præter naturam euariet, indicans humorum prauitatem, ex quibus convelli soleant.

### Frequens autem destillatio.

SEQUENTE libro auctor noster tres tabis species ponit, quoniam videlicet, *αἰσθητική*, & *νεφελική*: sed posteriores duæ improprie tantum & per accidens, tabis nomen sortite sunt, quod in iis videlicet, non secus atque in phthisi, ex pulmonis ulcere corpus contabescat. Porro rabes, quæ & phthisis dicitur, ferè oritur, quoties à capite in pulmonem, tenuis, acris, atque erodens humor distillat, qui sensim dum meatuum angustia per spiritum expelli non potest, pulmones exulcerat; unde & lenes quædam febricula inuadunt, quæ etiam quum quiescerint, tamen potest repetunt.



petunt. Si igitur in tenui longoque corpore diffillat frequens sit, periculum tabis imminet: nam, ut ait Hippocrates, Qui a phthisi probe liberari vult, ut quam minime tenuis sit oportet, pectusque quadratum ac hircum habeat, & os ipsius paruum sit, & robustè carnosum. Nam qui oblongo atque eodem angusto strictoque sunt pectore, non tam facile pulmones dilatare possunt, noxiosque qui illapsi sunt humores expellere.

### Vbi pluribus diebus non.

NAM si alius plena multum quod affigit habeat, periculum est, ne ex ipso morbus aliquis fiat, si alicubi se firmer id quod affigit, aut ad latius, aut ad viscus, aut alicubi aliquam partem concalescat, quo quam primum simul humorem illum turbet. Vnde si febrem, aut visceris alicuius inflammationem subterfugerint sic affecti, ex intestinorum cum flava bilis folliculo compressione, contingit fundi bilem, intestinisque bilis acrimonia iritatis fluxum subsequi.

### Vbi pedes turgent.

SI quid hic rursum mihi condoneatur, lectionem nonnihil immutauero, interposita unica dictione, videlicet: Vbi pedes turgent, vbi longæ deiectiones sunt, vbi dolor in imo ventre & coxis est, aqua inter cutem instat. ita enim cum Hippocrate secundo Prædictionum concordabit: vbi sic scribit: Aqua inter cutem omnis si ex morbo acuto existat, mala est; non enim sedat febrem, sed dolorem admodum infert ac mortem, sequeque incipit ex parte inani ac lumbis iecoreque. Si quibus ergo ex parte inani existit, pedes intumescunt, & alius diutius fluor sit, neque exolvens dolorem, qui ex inani parte afficit ac lumbis, neque molliens ventrem. Nam quod pedes intumescant, omni hydropi commune est; & quod dolor in imo ventrem infestet, in causa est inflammatio, ieiunum lætescens, iasestans: quibus quum venæ debiles sint, ut bene monet Galenus, per quas iecur ad se alimentum trahit, sit ut nequaquam visceri subseruiant ad diductionem, neque maneat in

ieiunio tenuioribusque intestinis alimentum. Et si ab eo grauentur, vitæ debiliores, id omne statim pellant deorsum, unde alii fluor longæque deiectiones molestæ sunt. Oritur autem hic morbus ex ilibus, siue ex tæneis, verum per consensum coactæ hepate: neque enim (sicuti arbitrabatur Erasistratus, ut secundo De naturalibus facultatibus admonet Galenus) ob solum hepatis scirrhum sit hydrops; sed vel ex diuturnis hæmorrhoidibus suppressis, vel immodica exundem profusione, vel ex menstrua purgationis cessatione omnimoda, ac eiusdem superflua vacuatione ad extremam frigiditatem hepatis temperiem ducentibus oriri solet: quemadmodum etiam hic auctor noster ex Hippocrate ab ilibus originem sumere dicit: Est tamen prima & continens hydropis causa, vbi sanguificationis officium intercidit; etenim, ut auctor est Galenus, sicuti in ventriculo concoquuntur esculenta, pari ratione in iecore & venis, præcoctum in ventriculo alimentum. Quinetiam ut in ventriculo interdum minus intercidit concoctionis officium, interdum magis, ita in iecore: nonnunquam enim iecur afficitur ex sua vi, sicuti etiam ventriculus per consensum aliarum partium, quibuscum societatem habet, propter communes nervos, venas, ac alia receptacula; unde fit ut quum intestinis, lien, ventriculoque ex magnis venis copuletur, facillimè iis læsis coafficiatur.

### Idem propositum periculum est.

QUANQUAM non nisi iecore affecto oriri possit hydrops, quadam tamen discrimina ponit, primariè an per consensum laboret. Est autem, ut diximus, aqua intercutis, vitata hepatis functio, quæ gignendo sanguini parum valet; quo fit ut in alienam quandam substantiam mutato succo, alendo corpori usui esse non possit: atque sic eodem reiecto in vastum tumorem universam corporis miscellam attollit: ac primum quidem ignobiliores seu imbecilliores particulas, vitiosa pedes, occupat; deinde ventrem & viscera in magnam altitudinem attollit.



tollit. Sed his quibus à iecore aqua intercus incipit, ut docet Hippocrates, tussire quidem cupiditas est; verum nihil excreant commentatione dignum: pedesque intumescunt, ac venter non deicit, nisi dura, ac pro necessitate: atque etiam circa ventrem tumores fiunt, qui modò in dextra, modò in sinistra parte desinunt, consistuntque. Quam quidem sententiam ad verbum expressisset Celsus, nisi pro tussendi cupiditate, de fidenti voluntatem substitueret: quod cerè an rectè fecerit, indicent alij; ego tum Hippocrate & Galeno tussendi cupiditatem legere malim: nam hepate affecto solet ferè oriri exigua quadam tussis, aliisque suppressi, nisi intestina inflammatione vexentur. Tumores autem qui in alterutra ventris parte innicem oriuntur, & finiantur, Galenus referre videtur ad foveas quas digiti impressione efficiunt: nam si tumores bosce digito comprimant, cedunt quidem, ac tanquam foveam quandam referunt: sed statim ad pristinam redeunt conditionem: unde innicem quoque oriri & finire putat, vel quòd dum nondum absoluta, atque in fieri sit hydrops, tumores hi quidem incipientes consistant; sapenumè etiam finiantur, ita ut integrè desisse videantur, mox tamen reuertantur; atque ita variis vicissitudinibus hominem tandem consumant.

#### Eiusdem morbi nota est.

HIPPOCRATES Aphorismorum sectione quarta: Quibus, inquit, torsiones, & circa umbilicum labores, & lumborum dolor, qui neque à medicamento neque aliter soluitur, in aquam intercutem siccam finitur: neque enim omnis in genere aqua intercutis future praesagium afferent torsiones circa umbilicum, quae medicamenta respuunt; sed eius tantum quam siccam Hippocrates vocat, hoc est quae à sono ad tympani similitudinem tympanites dicitur; haec etenim aquoso humore aqualiculum totamque corporis compagem non distendit, sed flatuoso quodam spiritu, in altum attollit. unde veterum quidam, sicuti Demetrius Erophili sectator, vanum atque intellectu carens esse sine ullo

humore superfluo laborantem hydropem vocare, dixerunt: quòd alludens quodammodo Galenus, atque Hippocratem secutus, improprie vocari hydropem tympanitem arguit: nam sicuti nullus aquam siccam esse, & sine collatione alterius proprie loquendo dicere audeat; ita si proprietatem sermonis spectes, nemo rectè hydropem aut aquam intercutem, Tympanitem (vixita quae sicca sit & omnis ferè aquosi humoris expertis) dixerit. Si tamen corporis eadem spectes; non absurde respectu aliarum, ascites videlicet, & anasarca, siccam (ut quae stultum spiritu non secus atque alie in altam molem corpus subleuat) aquam intercutem vocarè adde quòd non omnis humoris expertis sit, solet enim flatibus humiditas quadam accedere. Caeterum torsiones haec circa umbilicum quae remediis non leniuntur, ob flatuosum spiritum qui exitum non habeant, fiunt: atque hic quidem circa initia tenuis est, ut omnes per se inflationes esse solent, sensim autem inspissatur, ac velut nubilus redditur: unde, sicut dixi, cum flatu utriusque quidam humor commiscetur, & magna oritur circumscriptio, (flatuoso videlicet humore intra peritoneum dictam pelliculam & intestina collecto) tumoreque ad femora usque & coxas protenditur.

#### Dolor autem articulorum.

Si quis ischie, podagra, cheiragra, gonagra definitionem animo perpendat, quam sit planus hic locus facile percipiet, siquidem quum fluxione humorum nervosa partes, ad quas materia peccans delabitur, attollantur; consequens est, ut eo quoque loci nervi contrahantur, ac rursum, quum non semper ex eadem pendeant causa podagra, & cheiragra, sed variam fortiantur originem, in genere tamen potiorem causam humoris multiundinem sortita sint, sit ut hi non solum quantitate, sed & qualitate peccent, hoc est aut frigidi sint, aut calidi; unde & calido frigidoque lenissimè offenduntur; calido quidem ubi caliditas, frigido ubi frigiditas in causa est.

Quibus



### Quibus in pueritia sanguis.

QVAM sit sagax industriaque natura, vel hinc conicere licet, quod sponte sua superabundantem humorem pellat, atque expurget; idq; variis modis: nam si sanguis abundet, eundem redundantem per nares citra noxam aliquam euacuat; sin is magis melancholicus sit ac fœculentior, per hæmorrhoides dictas venas eundem reicit: fœmina etiam statim temporibus per menses expurgantur. Capiti quod fontem pituita quidam rectè dixerunt, colatoria quedam adiecit, per qua si humore pituitoso graueatur, excrementa expurget, atque hinc non raro videmus, fluxiones à capite in nares, in oculos, aures, faucesque fieri. Ac postremo quoniam interdum usu venit vniuersum corpus molestrari serosis quibusdam humoribus extra vasa pulsis, ne quid spontanea expurgationi deesset, toti corpori poros addidit, per quos exudaret, atque excerneret (tanquam per incerniculum) quicquid serosi illius humoris reliquum esset: ac proinde quum eiusmodi expurgationibus subleuetur homo, rationi consonum est cessantibus eisdem, ex meatuum obstructione naturam grauari, ac varios morbos in metu esse. Sic suppressis mensibus, sicuti paulo post dicetur, non vnum morborum genus in periculo erit, aliisque, quas sponte sua naturam moliri dixi, interceptis purgationibus, aliter in periculo esse corpus, prout quæuis purgatio esse solet. Atque ita quum sanguis is qui in pueritia fluere solebat, sanguineam admodum temperiem denotet, par erat fluorem illum non suppressi ante quadragesimum annum, citra ingens aliquod periculum: Inuenus enim, (Hippocrate in Prædictionibus auctore) sanguinis fluori opportunissima est, tum propter sanguinis copiam, tum propter facultatem robustam atque calorem exuperantem. Si igitur in pueritia solitus fluere sanguis ante iuuentutem sistatur, fluereque desinat, ex sanguine morbos imminere periculum est, quales sunt capitis dolores, graues in articulis orta exulcerationes; sanguine videlicet illuc,

tanquam ad imbecilliores seu ignobiliores particulas, prorumpente.

### Quibus fœminis menstrua, &c.

MATRICE affecta propter affinitatem facile coarctatur stomachus: huic rursus caput. quo fit ut obstructis vasorum oris per qua sanguis menstruus expurgari solebat, sursum regurgitentur humores, atque ventriculum petant, caputque acerbissimis doloribus grauent, ac siderationis periculum portendant. Necessum igitur est, ut suppressis mensibus caput affligatur, aut quæuis alia pars morbo infestetur. Sic Hippocrates Aphorismorum sectione quinta Aphorismo 57. deficientibus mensibus ex utero fieri morbos auctor est: quod, ut inquit in commento Galenus, compressis, ac obstructis venis per quas ad uterum sanguis menstruus ferri consueuerat, necesse sit, aut uterum inflammatione infestari, aut cancro, aut duro tumore, aut erysipellate, cui sensim totum compatiatur corpus.

### Eademque his pericula sunt.

AN articulorum dolores, tumoresque qui sine podagra, & similibus morbis oriuntur desinuntq; capitis dolorem portendant, vehementer dubito: at quod iisdem desinentibus, neque per suppurationem, neque alio quouis modo resolutis, necessarium sit aliò materiam recurrere, atque inibi morbum facere, notum cuius arbitror: quare cuiusvis potius visceris quàm capitis dolores hic expectabimus.

### Vtique si sæpè tempora.

PAVLO antè dictum est, Qua parte corporis dolor, ibi morbus: quod, ut docet Hippocrates, ab his que naturam mutant, atque corrumpunt, dolor excitatur. Plato in Timæo pathos præter naturam violenter & affatim incidens dolorem conciliare auctor est, atque huius communem esse causam; ac proinde quum circa tempora potissimum ac frontem dolores inuaserint, consequens est materiam peccantem caput obsidere: cuius argumentum quoque exhibent nocturna exsudationes, ac fron-



ae frontis pruritus; is etenim, sicuti in scabie quoque fieri videmus, à vitiosis salisque humoribus oritur, atque eam potissimum partem affligit, in quam materia peccans decubuit; cuiusmodi hinc nobis cerebri anterior pars ob oculos ponitur: quae dum sese expurgare nititur, ad oculos vixit viciniores, & imbecilliores quicquid est nocui transmittit: unde lippitudines, ex ingenti dolore, sanguinis affluxu factae oriuntur.

### Si mulier à partu vehementes, &c.

NESCIO an hunc locum ex tertio Praedictionum paululum censeam immutandum, ita ut pro si mulier à partu, legamus similiter caput: sic enim de verbo ad verbum sententiam Hippocratis reddiderit; is enim loco iam citato ita habet: Capitis dolor vehemens, & continuus cum febre, si quod ex indicibus extiterit vitiosis, lethalis admodum est; si vero sine talibus indicibus fatigans dolor, vigesimum transeat diem, & febris detineat, expectare oportet sanguinis è naribus eruptionem, aut alium abscessum ad inferiores sedes: sed quoad dolor fuerit recens, expectare oportet sanguinis ex naribus eruptionem, aut suppurationem si dolor aliqui circa tempora, aut circa frontem affligat, hactenus ille. quanquam non negaverim priorem quoque lectionem constare posse: nam quia dolores quae gravidas à partu molestant, à sanguine magna ex parte originem ducant, consentaneum est ut iidem, praesertim si circa tempora dolores sint, per sanguinis è naribus fluorem (nullis aliis existentibus lethalius signis) indicantur, aut aliqui puris per eadem loca, ac antea eruptionis, aut etiam per abscessum ad infernas partes. Expectanda tamen magis erunt sanguinis eruptiones è naribus, si iuvenes sint, & circa tempora frontemque ingentibus doloribus excrucientur. neque enim mirum est à partu suppressis roxiis, variis fuliginibus ac vaporibus peti caput; quibus sanguinis è naribus fluore (quanquam id rariū sit accidens) confestim lenabitur.

### Febris autem quae subito, &c.

VBI de febribus quae in abscessus terminantur loqueremur, omnino intactam reliquimus hanc sententiam: repetiturque variis locis ab Hippocrate: nam Aphorismorum secundo, Quae relinquuntur in morbis post indicationem, recidivam facere consueverunt. itemque planius paulo sexto Epidemion: Quae relinquuntur, inquit, post indicationem, recidivam faciunt. Primum itaque lieus tumor sit, nisi in articulos decumbat, aut sanguis ex naribus erumpat, vel dextri precordij distensio, nisi urina copiosa effluxerit, haec enim utrorumque est interceptio, ut recidivae merito fiant. Abscessus igitur eorum non factos fieri oportet; factos autem declinare. Eos vero qui tales, quales esse decet; & quae oportet praevenire, excipere convenit: quicunque autem non satis exierint, eos inuare; qui vero prorsus inutiliter procedunt, hos anertere, maxime eos qui adhuc futuri sunt, consultum est: si vero non, saltem eos qui paulo ante ceperunt: hucusque Hippocrates nos aperte docens quae imperfectam indicationem (de qua hic Celsus loquitur) subsequi soleant, lieus tumorem inter alia statim subsequiturum affirmans; nisi, aut deorsum tendentibus humoribus abscessus inibi faciant, aut maiore calore sursum sublevari, sanguinis eruptiones ex sinistram nare faciant.

### Cui fauces sanguine.

HIPPOCRATES non usque adeo manifeste ulcus, aut in naribus, aut in faucibus subesse dicit: sed videndum, an ulcus, aut hirudo in dictis locis appareat: nam, Quod si cuquam, inquit, fauces implentur sanguine, saepe singulis diebus, ac noctibus, cum neque caput antea doluit, & qui neque rufum habuit, neque febre correptus fuit, neque dolorem habuit, nec pectoris nec dorfi, huius consideranda sunt fauces, & nares, an ulcus aliquod habere compareat in hoc loco, an hircinam. Manifestum nanque est sanguinem huiusmodi, si non ex una aliqua praedictarum



prædictarum canfarum oriatur, ex aperi-  
tione vene alicuius, aut in faucibus, aut in nari-  
bus fieri: quare ulceris in eisdem locis merum  
subesse auctor noster dicit; hircinorum men-  
tionem nullam faciens; vel quod indignum  
putaret, id quod cuius etiam manifestum est,  
ascribere (amens enim omnino sit, qui hau-  
sam hircinam faucibus naribusque inha-  
rentem exurgentemque continuo sanguinem  
non sentiat) vel quod putaret continua in-  
gigue tractione ac vellicatione sufficulam  
aliquam suborituram.

### Si mulieri ex inguine febricula.

HIPPOCRATES Prædictionum aut  
Prorrheticon secundo, ubi fecunditatis steri-  
litasque signa enarrat, inter alia quæ con-  
ceptionem remorantur, ulcus in utero fa-  
ctum enumerat. Dicit autem, Quibus ulcus  
factum fuerit in utero, siue ex parte, siue  
ex uterulo, siue ex alia quadam causa,  
his febres ac inguinum tumores succedere  
necesse est, & dolores in his locis: si vero  
& puerperij purgamenta fuerint simul in-  
tercepta, hæc mala si fuerint omnia, mera-  
ciora sunt, & diuturniora, & ad hæc præ-  
cordiorum & capitis dolores. Ulcere autem  
facto & sanato, locum hunc leniorem &  
duriorem fieri necesse est, & minus concipi-  
pere posse. Celsus quoniam de notis tantum,  
quas in singulis morborum generibus habere  
possumus, hic differit, reliquorum quæ Hip-  
pocrates commemorat oblitus, febricula ex  
inguine orta nulla manifesta apparente cau-  
sa, ulcerisque in vulva tantum mentio-  
nem facit.

### Vrina autem crassa.

QUONIAM præcedentibus capitibus,  
multa de urinis quæ huc referri possunt,  
dicta sunt; paucis tantum perstringemus  
quæ hic proponuntur. Urina igitur, ut se-  
cundo Prorrheticon Hippocrates, crassa al-  
bam subsidentiam habens, aut circa articulos  
dolorem aliquem, aut tumorem significat,  
indiciu enim est humoris crassi in corpore  
abundantis: qui si in articulos decumbat,

dolorem tumoremque conciliabit; si circa vis-  
cera, hoc est pulmonem, hepâr, lienem, hy-  
pochondria, intestina (ea enim solet Celsus  
viscera appellare) maiora ac inuentia red-  
duntur, ut docet Hippocrates: Nam quibus,  
ut inquit, circa articulos dolores fiunt, &  
tumores, & sedantur non podagrico modo;  
in his comperies viscera magna & subsi-  
dentiam albam. Alio tamen loco idem senex,  
multam albam urinam & crassam absces-  
sum aliqui futurum ad articulos soluturam  
dicit. nam quarto Aphorismorum, Quiluz,  
inquit, speratur abscessum futurum ad arti-  
culos, urina multa, crassa & alba facta,  
qualis in laboriosis febribus quibusdam in-  
cipit fieri, liberat: si vero ex naribus fluxe-  
rit sanguis, breui admodum solutio fit. quod  
famulo Amphigenis sexto Epidemion acci-  
disse memorat Hippocrates.

### Eadem viridis aut visce- rum dolorem, &c.

NON iniuria urina viridis viscerum  
dolorem cum periculo corporis non integrum  
esse testatur: sit enim talis à commissione  
pinguis colligati, quod in oleaceum colorem  
mutatum est, à circumueniente febre aut  
calore extraneo.

### At si sanguis.

SANGVIS aut pus in urina, non sem-  
per indicium erit exulcerationum renum aut  
vesicæ, sed nonnunquam etiam (ut secundo  
Prædiction. monet Hippocrates) nihil mali  
significat; idque potissimum, quum citra do-  
lorem aliquem manifestum & febrem ex-  
cernitur. Nonnunquam etiam coniungit pus  
per lotium excerni disrupto abscessu in aliquo  
aliorum locorum; quare Galenus dicit consi-  
derandum (Aphorif. 73. sectionis quartæ)  
an multis diebus, ac mensibus pus aut san-  
guis, vel utraque simul in urina mingan-  
tur: tunc enim exulcerationem renum aut  
vesicæ omni dubio semoro significabunt. Ex-  
ulcerantur enim facile renes aliique uri-  
narij meatus à lapidis aspredine: atque ita  
intelligendum voluit Hippocrates Aphorif-  
mum, si sanguinem aut pus mingat, aut re-  
num,



num, aut vesica exulcerationem significat. Nam alioqui (ut rectè monet Galenus, aut quicumq. auctor est libri De dignotione passionum qua in renibus sunt) quum urina excernitur cruenta, signum erit commune; quòd videlicet, aut apertio vasorum sit, aut ruptio, aut erosio, aut imbecillitas, aut dilatio, aut aliud quicquam, quia ruptionem exquisiti, & confertim egesti sanguinis vacuatio sequitur.

### Si hæc crassa.

SENTENTIAM hanc paulo antè, ubi de capillitis ageremus, explicauimus. Galenus autem de locis affectis libro sexto capite tertio, Efficacissima, inquit, exulceratorum renum coniectura est, si cum urina exiguae quadam caruncula excernantur, vitioque quas renum essentia partes, easq. ob vehementem ulceris erosionem anulas esse constet. Sic quoque Hippocrates quarto Aphorismorum, unde totam hanc periodon desumpsit: Quibus in urina crassa existente, caruncula parua, aut veluti capilli una excernunt, iis à renibus excernitur.

### aut si bullat.

BULLÆ à frigido flatuosisq. spiritus sunt: ac proinde quum frigidi omnes morbi longi sint, longitudinem quoq. morbi præsagient, ut rectè monet Hippocrates sectione septima Aphorismorum: Quibus in urinis superflant bulla, iis morbum renum, & longum fore significat.

### aut malè olet.

HINC satis constat, quanto studio nifus fuerit Celsus non satis coherentia, ex Hippocrate connectere: siquidem graucolentiam in urina renibus nequaquam acceptam fert Hippocrates, sed vesica potius; idq. quum vesica sit urina receptaculum, sit ut qua in ea putrescant, grauiorem fetorem præferant, quanquam non negem in renum exulceratione, putidam nonnunquam excerni urinam: verum quum rarius id sit, atque ex vesica confertim, magisque graucolens pus emittatur, vesica potius ascribendam

putauimus putidam urinam; idq. Hippocratis quarto Aphorismorum auctoritate: Si sanguinem & pus & squamulas mingat, grauisque odor fuerit, vesica significat exulcerationem.

### & interdum quasi arenam.

HÆC potius ex sexto Epidemion quam Aphorismis transsumpsisse videtur: siquidem illic inquit, In renem dolor grauis, quando cibo replentur, pituitamque vomunt: quum verò dolores superabundauerint, eruginose, & leuiore sunt, soluntur quum cibo vacuantur, arenula ruffe subsident, cruentum mingunt, supor eius femoris quod è directo est. in Aphorismis autem vesica potius arenulas ascribit: quod Philotheus idem Hippocratem fecisse suspicatur, quod potius in ea propter capacitatem quam in renibus, generentur. Auctor tamen libri De dignotione affectuum, qui in renibus consistunt, signum proprium, & incommutabile esse dicit, quod sine medio affectum (nempe lapidem in renibus) ostendit, si arena in calice subsidant; tum enim exactè cognosci, quod lapis in renibus subsit. Est tamen discrimen aliquod arenularum, quæ à renibus excernuntur, ab iis quæ à vesica; siquidem si quæ à renibus excernantur arena subsident, rubicundiores ferè sunt; quæ à vesica, albiore. De sanguinolento lotio iam antè dictum est.

### dolent autem coxæ, quæque, &c.

HOC quoque ex iam citato Hippocratis loco desumpsit, stuporem cruris quod è directo est, in coxarum dolorem conuertens. Est autem ea ratio, quod vena & arteria à vena dicta caua, & magna arteria deferantur ad renes; quæ rursum ab iis per femora ad crura coxæque diducuntur: quo fit ut affectis renibus non solum crura, coxæ, femoræque, sed & interfemineum totum per consensum coafficiantur.

### & accedunt frequentes.

HIC rursum Cornelius noster nusquam sibi dissimilis, ex Hippocrate pro pituita vomitu,



vomitu, ructus frequentes; & pro aruginosa vomitione, biliosam substituit: quam mirum nimirum sit ante aruginosorum biliosorumve vomitionem frequentes esse ructus, acrimoniâ bilis vellicato stomachi orificio. Per biliosas autem vomitiones non eas intelligit quæ sincera atque ex mera bile sint, sed quæ aruginis aut porri præ se similitudinem ferant: tales enim frequenter per superiora reiciuntur, quum in ventriculo potissimum generentur, tum ob inediam, tum ob vigilias corrupto cibo; siquidem & Galenus ipse tum alibi, tum libro De atra bile, porraceam aruginosam, & vitelli speciem referentem bilem vocare solitus est.

### extremæque partes frigesunt.

AN id proprium signum sit affectorum renum, alius indicet; ego cerè, cuius etiam visceri affecto ac dolenti commune putarim, doloris videlicet vehementia calore innato ad interiora, atque adeo partem dolorificam, reliquis extremis partibus, repente: renum tamen inflammationi, quam aliis quibusvis eiusdem visceris affectibus, familiarius.

### urinæ crebra cupiditas.

ID sanè calculi in renibus indubitissimum signum est: nam arenule quamvis ad excretionem vellicant, obstruunt tamen melius urinarios: unde & urinam quoque circa obturationis principium, paucam, & aquosam excerni contingit; post verò, perfecta iam obstructione, omnino supprimitur: quod in principis quoque accidere frequenter, auctor est Trallianus.

### alvus verò cum multo spiritu.

NON citra difficultatem exoneratur alvus, lapide aut in renibus, aut in vesica contento, quod ex distentione vitridum & vesica anus comprimitur: atque hinc quoque antè diximus ex Hippocrate, augeri quidem dolores quoties cibo impleatur, solutisque quum eodem vacuantur; per cibum, ut docet

Galenus, ciborum excrementum in intestinis contentum intelligens.

### Aut si paulatim destillat.

LOCVS hic paululum immutandus videtur, ita ut in hunc modum legatur: At si paulatim destillat, & si sanguis per hanc editur, & in eo quædam cruenta concreta sunt, idque ipsum cum difficultate redditur, & circa pubem inferiores partes dolent, in eisdem aut vesica vitium est. Nam Hippocrates Aphorismorum quarta sectione, Aphorismo octuagesimo; & septima, Aphorismo 39. Si quis, inquit, sanguinem mingat & grumos, & urina stillicidium habeat, dolorque ad anum ventrem, pectinem, & interfemur incidat, ea quæ circa vesicam sunt, laborant. Neque enim, Galeno auctore, ita intelligendus est hic Aphorismus (sicut Celsus fecisse videtur) ut soli vesica congruere dicamus hos casus; sed potius communes esse omnibus quæ vesica serviunt instrumentis, vesica, renibus urinariisque meatibus: quod sanè Hippocrates per hæc verba, τὰ πρὸ τοῦ κόβου, hoc est ea quæ circa vesicam sunt, voluit. nam sectione quinta Aphorismorum, non solum renibus aut vesica affecta, urina stillicidium accidere dicit, sed etiam recto intestino aut utero inflammationem patientibus, idque facultate retentrice vesica imbecilliore reddita, tum ex tumore aliquo, tum ex intemperie prædictarum partium.

### Calculosi verò his indiciis, &c.

IAM antè, ubi de renum affectibus disseruimus, singula ferè expendimus: nam de urina stillicidio, idque nonnunquam præter voluntatē, de arenosis subsidentis, de cruento quoque lotio antè dictum est: illud tantum subiungendum est, quod arenosa quæ subsident non sunt semper unius ac eiusdem coloris: alia namque ruffa, alia flava, alia rubra, aut nigra, aut alba sunt; idque tum ob caliditatem remissiore aut intensiore, tum etiam ob materiæ diversitatem.

Q 2.

nonnun-



### nonnunquam aut sanguis aut cruentum.

Dictum autè est, non omnino proprium signum esse calculo laborantium renum, sanguinis mistum; est enim commune signum (ut ex auctore libri De dignotione affectuum qui in renibus consistunt, vetuli) vasorum videlicet apertionis, ruptionis, erosionis, vel dilatationis, vel imbecillitatis, vel alterius cuiusque: Apertionis quidem, si paulatim feratur, & sanguis qui emanat cruentam urinam efficiat: imbecillitatis autem vasorum, si quocunque tempore & momento sanguis egeratur: dilatationis verò, si una cum sanguine aliæ quoque crassitudines excernantur. Aquosus autem si promanet sanguis, manifestò certoque indicabit lapidem in renibus consistere. Porro in lithiasi excernitur sanguis aut pus, propter renum, aut vasorum exulcerationem à lapidis erosione. Varios autem hos meiendi habitus, quos hic describit Celsus, ex Coacis Hippocratis prænotionibus mutuatus est.

### Grauitatis quoque cuiusdam in ea parte.

Ex stupore cruris quod à rene secundum lumbum porrigitur, (inquit auctor libri De affect. renum) cognoscere poteris quis ren laboret: nam si dextrum crus stupor occupabit, dexter ren aegrotat; si laevum, sinister. Est verò stupor sentiendi & mouendi in aliqua parte difficultas, quæ in crure fit, quia vena quæ ad inferiora demissa est, triplici ramo dividitur: quorum unus cum arteriis ad testiculos & vasa seminalia vadit; alius renes ingreditur; tertius ad crura porrigitur. Quum igitur in renibus lapis generatur, una tum afficitur vena quæ ad crura descendit; sunt enim amba ab una sobole cana vena quam inferis partibus natura distribuit. Igitur vena quæ ad crura porrigitur, repletur: qua turgente stringuntur nervus & musculus; quum stringitur nervus, animale spiritum ad crus non transmittit; unde sensu crus priuatur, & provenit stupor. Hactenus ille: cuius integram periodon hic

ascripsi volui, quod ad loci explanationem plurimum facere putarem. Nam Celsus (suo more grauitatis cuiusdam in ea parte sensum, pro stupore cruris quod è directo est, dixit.

### Fœminæ verò oras naturalium, &c.

Id famineo sexui, non secus quam virili, usui venit, quod dum lapis subest, creatur quedam veluti titillatio, naturæque ad eius quod molestat expulsionem stimulat; spiritus statim occurrunt: quibus irrumperibus in fistulosam pudendorum partem, ipsam immaniter contendunt: atque hinc autè, nonnullos dum colem extendunt, doloris lenamen aliquod sentire, auctor est Celsus. Mulieres autem viris facilius lapidem vesicæ cervicem urgentem digito sentiunt, propter breuitatem & amplitudinem colli vesicæ.

### At qui spumantem sanguinem.

HIPPOCRATES Aphorismorum sectione quinta, Quicumque spumantem sanguinem excreant, his de pulmone fiteductio: est enim, sicut Galenus docet, sanguis qui à pulmone educitur, spumans & visceri similis: nam & spumante quodam humore pulmo nutritur, qui carne eiusdem continetur, ut Commento 39. sectionis quintæ Aphorismorum idem testatur. Caterum Celsus nosmet ipse ἀνατρώσκει, non expuunt, aut respuunt, verum excreant verius; ut indicaret omnem educationem qua ex pulmone fit, vel cum lenicula tussi, vel cum secretionem fieri.

### Mulieribus grauidæ sine modo.

NON solum alui fluxus, sed & omnes immodica vacationes abortum facient. sic Hippocrates Aphorismorum sectione quinta, Mulier, inquit, utero gerens, sanguine missò ex vena abortit; & magis si fetus maior. & paulo post, Mulieri utero gerenti si alui plurimum profusum, periculum est ne abortiat.



tiar. Neceſſe eſt autem ſi ſine modo ſuſa ſit alius, hoc eſt in vehementibus alui proflu- niis, abortus metum ſubſeſſe, quòd citius, alià- que corporis alimenta, ad iecur reliquaque nutritioni inferuentia inſtrumenta non diſtribuantur; unde conſequentis eſt ex ali- menti defectu atque penuria, virium quo- que imbecillitatem conſequi: quarum in gravidis, ſi uſquã alibi, ſumma habenda eſt ratio. Ceterum quod ad textum attinet, pro elidere partum poteſt, ſolet legere malim.

### Eidem ſi lac ex mammis.

NON modo ſi lac ex mammis ſuat, ſed & ſi eadem præter conſuetudinem ſtaceſcant in gravidis, atque attenuentur, fœtus imbecillitatem atque adeò abortus periculum mi- nantur. Nam, ut Hippocrates, Mulieri utero gerenti ſi mamma graciles repen- tiant, abortus: & ſi mulieri utero gerenti altera mamma fiat gracilis geminos habenti, alterum abortit: & ſi quidem dextera mamma gracilis fiat, marem; ſi ſiniſtra, fœ- minam; idq; quòd ob alimenti penuriam fœ- tus imbecillior reddatur, atque nonnunquam perimatur. Quæ autem de ſnore lactis ex mammis dicit, Galenus clariſſimè explicat de uſu partium libro decimoquarto. Nam contrariis, inquit, affectibus, neceſſarium eſt comprehendi mammæ, replevi quidem lacte ante tempus in fœtus imbecillitate: ita enim Hippocrates dicebat, Mulieri gravis, ex mammis lac multum fluens, fœtum imbecil- lum denotat: cen. ad mammæ ſuperſtuo uniuerso aſcendente quod in uenis reliquit fœtus, non potens præ imbecillitate, quan- tum ei ad commodatam nutritionem erat ſatis, trahere.

### Duræ mammæ.

HIPPOCRATES Aphorismorum ſectio- ne quinta, Aphorismo 52. Mulieri gravis ſi lac ex mammis plurimum eſſuat, imbecillum eſſe fœtum ſignificat: ſi uero ſolidæ mamma fuerint, ſaniores fœtum eſſe ſigni- fican, ubi Celfus ἀντι τῶν σπέρων μακρόν neſcio quàm. propriè οὐδὲν, hoc eſt duras

ſubſtituit: nam σπέρων μακρόν, hoc eſt ſolidas mammæ, Galenus mediæ quodam- modo conſiſtentia inter renitentes propter nimiam repletionem; & molles ac laxas propter defectum ſanguinis ponit; οὐδὲν, au- tem (quanquam fœtus robur denotent) nun- quam citra mali alicuius ſuſpicionem deſi- nere: ſiquidem quum ob multitudinem ſan- guinis irruentis dureſcant, reponit rur- ſum natura ad quaſdam partes materiam inuilem: unde gravidæ, dolores aut mam- marum, aut oculorum, aut coracum aut ge- nium inſeſtare ſolent, auctore Hippocrate.

### Frequens ſingultus.

HIPPOCRATES Aphor. ſect. quinta Aphor. 58. Recto inteſtino aut utero in- flammationem patientibus, renitēſque paru- lentis, urina ſtillicidium accidit: ſi uero iecur inflammatione laborat, ſingultus ſuccedet. Accidit autem ſingultus hepate inflam- mationem patiente, propter ventriculi conſen- ſum (eſt enim hepar ventriculo connexum) & neruorum communicationem, non qui- dem ſemper, ſed quando ad maximam ac- tollitur inflammationem: atque idè alio loco Hippocrates, ex hepatis inflammatione ſin- gultum malum pronunciat.

### Si tumores ſuper ulcera.

QUIBUS tumores, inquit Hippocra- tes Aphorismorum ſect. quinta Apho. 65. in ulceribus apparent; q̄ raro conualluntur, neque inſaniunt: ſi uero repen- tē euaneſcunt, iis quidem quibus à tergo ulcera fuerint, conuulſiones & diſtentiones accidunt; qui- bus uero ex anterioribus partibus ulcera fue- rint, mania aut lateris dolor acutus, aut ſuppuratio, aut dyſenteria, ſi rubri fuerint tumores. Celfus hic pro dyſenteria alui pro- fuſionem, quæ anteaſtis accidentibus ſuſior ſit, ſubſtituit, uerius forè tormina dicere, vel quòd hæc non citra falſi ſuſpicionem tutiora reliquis dici poſſe putaret; vel quòd Hippocratem aliud dyſenteria genus (ut rectè etiam monet Galenus) ſubintellexiſſe putaret. Siquidem quum tres uniuerſi ſint dyſenteria differentia, non eam quæ pro- priè



prie sic dicitur (quam auctor noster cum Plinio tormina vocare solet) sed quæ sanguinea vocatur intellexit; regurgitante videlicet sanguine per venas ex rubicundis illis tumoribus ad intestina, atque eo absque aliqua exulceratione, tanquam per crisi vacuato (solent namque in morbis acutis vehementissimi etiam casus crises operari) sic difficultatem intestinorum à furore, bonum esse dicit: & alio loco lienosis dysenteriam supervenientem morbi solutionem polliceri auctor est Hippocrates. Rectè igitur Celsus reliquis tantum symptoma profluvium alui dixit. Cæterum nervorum distentiones (ita enim *σπασμους* seu convulsiones convertere maluit) & rigores, seu *τέτanos* posterioribus ulceratis, atque evanescentibus tumoribus potius accidunt, quod postica pars nervosa magis sit; materia videlicet ad principalem aliquam nervosarum partium lata. Si autem in anteriori parte id enenerit, lateris dolores acuti, hoc est, vera pleuritis (quæ nihil aliud est, quam membrana costas succingentis inflammatio) & insania accident: est namque anterior pars tum arteriosa, tum venosa; unde & inflammationibus oportunitissima est, si sanguis ad principales aliquas partes reput: lateris quidem, si ad thoracem; panniculorum cerebri, si ad caput. Quod autem dicit subito esse defierunt, hoc est, sine manifesta aliqua causa, ut indicet humorum ad alias corporis partes dilationem: solent enim nonnumquam sensim, & paulatim evanescere tumores, nihil alioqui mali ominantes; idque aut medicamento quod discutienti resoluendique potestate præditum sit, resolutis humoribus noxiis, aut alio quovis modo, ut sanguinis excretionem.

#### Si ora venarum, sanguinem solita, &c.

HIPPOCRATES Aphorif. sect. sexta Apho. 12. Diuturnas sananti hæmorrhoides, periculum est aquam intercutem aut tabem succedere, nisi una servetur: tabem quidem copia vitiosorum humorum à iecore ad pulmones propulsorum; aquam autem intercu-

tem, sanguinis generatione frustrata, hepate obstruito, ac calore innato suffocato atque extincto ob multitudinem humorum crassorum ac seculentorum retentorum, qui alioqui per hæmorrhoides (ora venarum vocat Celsus) expurgari solebant. Aëlius terrab. 4. Sermo. 2. cap. 5. paulo aliter hunc Aphorismum intellexisse videtur: neque enim requirit, ut post longas hæmorrhoides una reseruetur aperta, sed ut conveniente victus ratione, & opportuna missione sanguinis post omnino suppressas hæmorrhoides regatur patiens. Dicit autem, Convenit igitur recta diæta, ac venæ sectione præmissa hæmorrhoidum extirpationem moliri, & nullam penitus relinquere; quemadmodum quibusdam visum est: possibile est enim, incolumes evadere, optimique finem curationis assequi post hæmorrhoidum extirpationem, eos qui opportuno tempore venæ sectione, & conveniente diæta semper utuntur, quemadmodum Hippocrati placet: inquit enim, Hæmorrhoidas inveteratas sanant, si non adseruetur, periculum est tabem aut hydropem succedere. Non enim, velut quidam opinantur, si non una fuerit adservata hæmorrhoidis ad sanguinis excretionem; sed dixit, Si non adseruetur, hoc est, si non conveniente utatur diæta. Quod autem sic velit Hippocrates, ipsa Aphorismi ostendit distinctio: ait enim, Hæmorrhoidas inveteratas sanant: est autem sanatio liberatio perfecta, & curatio legitima: quare, iuxta Hippocratem, non oportet aliquam hæmorrhoidem relinquere, sed omnes exstinguere, & post perfectam ipsarum curationem, per convenientem, velut dictum est, diætam, ad naturalem statum corporis reducere, incidereque cubiti venam tempore opportuno, quo videlicet coarctatus in corpore sanguis enascetur. hæc Aëlius. Cæterum interpretatiſſime rectè fuerit, an ad suam sententiam magis torserit Hippocratem, indicent alij; ego sanè ad subterfugiendum aquæ intercutis & tabis periculum, unam hæmorrhoidem reservare cum conveniente diæta malim, ut seculentus ille sanguis natura duce expurgetur: neque enim frustra Hippocrates

ad pñ



ἢ μὴ μία διαφυλαχθῇ, hoc est, nisi una adseruetur, dicit.

### Eadem rabes subit, si in lateris, &c.

QUI CUNQUE, inquit Hippocrates, morbo laterali laborantes, in quatuordecim diebus non purgantur, ij ad suppurationem vertuntur: & qui iam à pleuritide suppurantur, si intra quadraginta dies à quo fit ruptio per superiora purgantur, lenantur: si verò non, in tabem abeunt. & in Coacis Prænotionibus: Quibus in pulmone tubercula sunt, pus educunt ad dies quadraginta post ruptionem: hos verò transgredientes, plerumque tabidi fiunt, purulenta videlicet materia in pulmones delata, atque eosdem exedente & exulcerante.

### At si longa tristitia.

HIPPOCRATES Aphorismorum sectio-  
ne sexta, Si meus & mæstitia longo tem-  
pore perdurauerint, melancholiam signifi-  
cant. neque enim mirandum est, ut monet  
Galenus libro De sympt. caus. quinto, quod  
atra bilis rationalis animæ arcem occupans,  
timorem, tristitiam & mortis expectatio-  
nem inducat, quum videamus in rebus ex-  
ternis, nihil magis quam tenebras nos ex-  
terrefacere. Si igitur quicquam simile tene-  
bris rationali parti animæ circumfundatur,  
hominem semper timere necesse est, utpote  
qui semper timoris causam circumfert: quod  
enim extrinsecus nobis accidit, quum am-  
biens nos aer vastissimis tenebris fuerit ob-  
scureatus, id melancholicis ab intimo corpore  
erumpere videtur, occupante cerebrum, vel  
succo melancholico, vel atra bile: qua ra-  
tione Celsus noster vigilias quoque adieciſſe  
videtur.

### Quibus sæpe ex nari- bus sanguis.

HIPPOCRATES secundo Prædict.  
Quicumque dum neque febricitant neque  
decolores sunt, sæpe & verticem & rem-  
pora dolent, si non alium manifestum ha-  
buerint abscessum in facie, aut graniter lo-

quantur, aut dentes doleant, his sanguinem  
erupturum per naves expectandum est: qui-  
bus verò ex naribus sanguis fluit, hi eſi alio-  
qui sani esse videantur, hos autem, vel sple-  
nem in tumorem elenatum habere compe-  
ries, vel caput dolere; & splendicans quid-  
dam ipsis ob oculos versatur. Plerisque  
verò horum simul & caput & splen hoc  
modo sese habent. Gingivæ vitiatæ, &  
ora graueolentia his sunt, quibus splenes ma-  
gni. Quicumque verò habent splenes ma-  
gnos, & neque sanguinis eruptiones ipsis  
contingunt, neque oris graueolentia; horum  
tibiæ ulcera prava habent, & cicatrices ni-  
gras. hucusque Hippocrates. Sed hic non è  
quantis nare fluor sanguinis aut dolorem ca-  
pitis manifestabit, aut lienis aliqui tumo-  
rem: sed si è sinistra tantum nare is fluat,  
lienii affecti nota erit: ut si è dextera, hepa-  
tis. Quare unice considerandum monet Ga-  
lenus, ex vira nare is fluat, ad loci affecti co-  
gnitionem. Capitis autem dolores, vel ex  
vitræ nare fluens sanguis indicabit, idq;  
aut propter plenitudinem oculis vasorum  
oneratis, aut propter eorundem imbecillita-  
tem, aut acrem aliquam qualitatem eadem  
corrodentem: unde & quedam imagines  
ob oculos versantur, fuliginosis nimirum  
vaporibus à splene ad cerebrum per venas  
& arterias latis. Magnos autem lienes  
vocat non scirrhosos, aut ex intemperie hu-  
mida frigidaque cum laxitate tumentes,  
(consuevit nanque splen si humida admo-  
dum intemperie detineatur, adeo excrescere  
ut hepar & ventrem pertingat) sed ex san-  
guinis melancholici, qui ad eius nutritio-  
nem distribuitur copia, in tumorem citra du-  
riciem, seu sensibilem aliquam magnitudi-  
nem dislentis: substantia nanque splenis  
laxa est & rara promptissimaque ad susci-  
piendum crassum humorem; etenim, ut de  
usu partium quarto Galenus, fecem, ac velut  
limum sanguinis ex hepate ad se trahit, hoc  
modo sanguinem repurgans: ex qua secca  
confecta & attenuata per magnas in ipso  
arterias & venas, seipsum nutrit. Quod si  
copia eundem distendi contingat, non raro  
per naves sanguis effunditur: quod si minus  
id succe-



id succedat, impuriore illa fece sanguinis (nam subtiliori melancholici humoris portione nutrirī dictum est) ad os & gingivas per communes venas regurgitante, gingiva aut mala sunt, aut os graviter olet: ac si ne id quidem contingat, tum tibiurum ulcera maligna, cicatrices nigrae, melancholici humoris vestigia relinquentia, expectanda sunt: de quibus latius in commentariolo nostro De magnis Hippocratis lienibus, ubi ex professo locum hunc exposui.

### Quibus causa doloris.

HIPPOCRATES Aphorismorum sectione secunda Aphor. 6. Quicumque dolentes parte aliqua corporis, omnino dolorem non sentiunt, iis mens agrotat. Celsus non simpliciter dolentes, ut Hippocrates prioriter, sed quibus causa doloris est, inquit, intelligens magnam aliquam offensam: atque id Hippocratem quoque intellexisse auctor est Galenus in libro de Hippocratis & Platonis placitis: Nam dolentes, inquit, Hippocrates hic nominat eos, qui aliqua in parte ita offensi sunt vehementer, ut nisi delirio premererentur, dolerent.

### Si in ventrem sanguis.

HIPPOCRATES Aphorif. sect. sexta, Apho. 20. si in ventrem prater naturam sanguis effunditur, necesse est suppurari. Celsus Hippocratem sequens, ventrem omnem cavitatem appellavit; ut recte tum in commento huius Aphorismi, tum Aphorismo 13. sectionis primae Galenus. & rursus τὸ ἐν τῷ κοίτῃ religiose admodum (id est, prater consuetudinem) in pus vertitur transiit; neque omnino male: quanquam clarius paulo dixisset, si corrumpitur scripsisset: nam sanguis qui extra vasa lapsus est, non solum suppuratur, sed & in aliam quamvis prater naturam qualitatem corrumpitur: ita namque τὸ ἐν τῷ κοίτῃ Hippocrates (si Galeno commento 17. sectionis secundae Aphorismorum credimus) usurpat.

### Si à coxis & inf.

Hic Celsus mala signa omittens, quid dolores circa lumbos seu coxas incipientes,

ac ad septum transversum, seu superiores partes desinentes portendunt, declarat. Nam si mala adsint signa, omnino periculo non vacant: siquidem, ut Prædictionum primo Hippocrates, Quibus circa lumbos tenues dolores diuturni, ad præcordium se revolventes, & ciborum fastidium inducentes una cum febre, his ad caput dolor intentus progressus repente consiliorio modo occidit. Et in Coacis prædictionibus: Quibus in febribus dolores circa lumbos & infernas partes fientes, septum transversum contingunt, infernas partes relinquentes, perniciosi sunt, tum alias, tum si aliud quoddam signum primum accedat: si verò alia signa non fuerint prava, suppuratum fore timore est.

### Quibus sine febre

#### aliqua ex.

QVOD dum conficitur pus in aliqua parte, dolores intenduntur, auctor est Hippocrates: nam, Dum pus conficitur, inquit, dolores accidunt magis, quam in iam confecto. sit autem dolor exientia simul ac calefacta prater naturam inflammata particula: prurigo autem cum rubore, aut calore, ex quadam quasi ebullitione sanguinis atrii ac biliosi sit.

### Vrina quoque quæ in homine sano parum.

QVAM vocet liquidam urinam, antè dictum est: excernitur autem talis in diuturnis morbis (nam id quoque per parum sanum intellexisse videtur Celsus) ob imbecillitatem virium atque materia peccantis tum crassitiem, tum multitudinem: quam quum natura expellere nititur, absolutam crisin absolvere non potens (ut qua morbi longitudine prostrata sit) à principalioribus partibus ad aures, articulos, aut alias quasvis ignotiores derivat; atque ibi abscessus facit: ad aures quidem, si supra septum transversum dolores, ac materia contenta fuerit; ad articulos autem, si infra septum: nam, ut Hippocrates in Coacis prænotionibus, Urina cruda multo manens tempore, alius signis



gnis salutaribus, abscessum, & dolorem significat, & magis in paritis sub septo transverso: si vero dolores in lumbis oberarint, ad coxam & in febre, & sine febre.

### Ergo protinus infania.

OMNIS præter consuetudinem subita feroxque mutatio mentem laesam indicat: adeo rectè ab Hippocrate dictum est: Præter morem aliquid facere, velut præponere sibi aliquid, aut expectare sibi aliquid prius non consuetum, aut è contrario, malum est, & mentis alienationi proximum. Rectè ergo infania metum subesse dicit, ubi expeditius solito quis loquitur; garrulùsque subitò sit; expeditum sermonem vocans eum, qui ab Hippocrate dicitur *ἄρσενος*, huiusmodi enim vox ubique mala est: nam interdum vesaniam, interdum etiam cum vehementi furore mortem portendit, ut Hermozugi uxori idem senex contigisse mentit.

### & hæc ipsa solito audacior.

EX composito modisq; homine ferox responsio, mala est, inquit Hippocrates: & quibus vox acuta est, intrò præcordia tracta sunt: Siquidem, ut commento eiusdem sententia auctor est Galenus, cui propria natura composita est, is non solum quia incompertus despicit, perniciosam habere affectionem demonstrat; verum quoque & cum ferocitate respondens propè ad phrenitidem accessit.

### aut ubi rarò quis & vehem.

IN Coacis Prænotionibus, magnus spiritus, & per multum tempus, delirium, aut commotionem significat. in Præsagiis autem, Spiritus frequens, aut doloris, aut inflammationis supra septum transversum indicium est. Magna respiratio & ex longis intervallis, delirii indicium est. fit enim (ut in Commentariis De dyspnœa auctor est Galenus) spiritus rarus & magnus, propter offensionem mentis, quasi obliuiscens actionem ægro, ut nesciat quando cobitere eam, aut quando aspiciari debeat.

### venasq; concitatas habet.

ADDVBITO vehementer rectène hætenus hic locus lectus fuerit; neque enim semper venæ concitate præcordiis duris, & tumentibus insaniam portendunt, nisi & crebrò oculi moucantur, quare frequentes oculorum motus citra disimtionem, cum duris præcordiis, venisque tumentibus coniungendos putarim; atque sic legendum: ubi rarò quis & vehementer spirat, venasque concitatas habet, præcordiis duris & tumentibus, oculorum quoque frequens motus adest. Nam Hippocrates libro Præsagiorum, talium oculos conspiciendos dicit: dicit enim: Si verò pulsus in præcordiis insit, perturbationem aut delirium significat: verum oculos talium conspiciari oportet; si enim crebrò obuius mouetur, expectanda infania est. Et in Coacis Prænotionibus, Pulsus in præcordio cum tumultu, mentem eripit, & magis si oculi mouentur.

### & in capitis dolore offusæ.

IN capitis dolore offunduntur oculis tenebræ, tum ob bilis acrimoniæ exiccatas humoribus; tum ob eiusdem fuliginosos vapores redditus tanquam puluerulentis oculis. quod sanè non solum insaniam portendere, sed & pessimum esse signum auctor est Hippocrates: Nam ex vomitu grani (inquit in Prædictionibus) fastidiosusque, vox clangorosa oculique concretum pulvisculum habentes, vesaniam ostendunt: & paulo post, Hebetatus oculus, vitiatùsque & concretus, immobilisq; & tenebrosus si fuerit, malum.

### vel nullo dolore substante.

PESSIMUM, inquit in Præsagiis Hippocrates, si neque interdiu, neque noctu dormiat: quod, ut docet Galenus, qui ex labore aut dolore contenduntur, y neque interdiu, neque noctu dormiunt; atque y etiam qui delirare incipiunt: nam id quoque insomnium committit ob temperamenti in cerebro siccitatem. quare necessum est, ut ere-

R

pins



pius somnus, nullo substantie dolore, vesani-  
am pericadat.

### continuataque nocte ac die.

RECTE continuatas vigilas dixit: si-  
quidem non omnis statim vigilia insaniam  
portendit; sed ea tantum quæ dies aliquot  
& noctes ita continuatur; idque tum quod ce-  
rebrum temperies sicciore reddatur, tum sanguis  
ipse seipso biliosior efficiatur. adde recte in  
Aphorismis ab Hippocrate dictum est, In  
vigilia convulsio, vel desipientia. & in Pre-  
dictionibus, Quibus alius liquida, lasundo,  
capitis dolor, sitis, vigilia, obscuritas &  
impotentia fuerit, hi ut mente moveantur  
spes est.

### vel prostratum præter consuetudinem.

TALIS enim cubantium habitus absurdus  
omnino & à ratione alienus est: unde nisi  
dolor aliquis ventrem infestet, (eligunt nam-  
que acri talem decubitus figuram ad doloris  
lenamen) periculum est errare mentem, ac  
phrenitidem & delirium imminere: sicut recte  
in Prasagiis Hippocrates: Si quis cubet in  
ventrem, nequaquam solitus ita dormire quo  
tempore sanus fuit, malo est; delirium enim  
aut dolor circa ventris sedes significatur.

### item robusto adhuc cor- pore insol.

HIPPOCRATES in Coacis Prænotio-  
nibus, Dentes collidere ac stridere, quibus non  
familiare id est à pueris, furiosum ac le-  
thale est; si vero delirans hoc faciat, peritius  
lethale. Et in Prasagiis: Si quis strideat  
dentibus, non consuetus à pueritia ita effice-  
re, insaniam significatur ac mors; sed in utris-  
que futurum prædicere periculum necesse est:  
si vero mente commotus ita efficiat, admo-  
dum exitiosum id est: strident enim dentes  
musculus masticatorius & temporalibus con-  
vulsorio modo affectis; unde & principem  
anima seidem affici necesse est.

### Si quid etiam abscessit, & antequam.

LOCVS hic propter malè posita com-  
mata, & insolita, suspensos admodum  
dum nos tenuit: ita ut quid veller, aut unde  
tandem desumpisset, planè ignoraremus:  
nisi tandem in mentem venisset, alius planè  
verbis paulo antè eandem sententiam repe-  
titam: dicit enim, Si tumores super  
ulcera subito esse desierunt, idque  
à tergo incidit; vel distentio nervo-  
rum, vel rigor timeri potest. At si  
à priore parte id eueniat, vel lateris  
acutus dolor, vel insaniam expectan-  
da est. Quare locum hunc paululum mu-  
tatis distinctionibus, ita legendum censuero:  
Si quid etiam abscessit, & antequam  
suppuraret, manente adhuc corpore  
in solita febre, subsedit, periculum  
affert primùm furoris, deinde in-  
teritus. Sic enim Hippocratis in Prasagiis  
sententiam planè expresserit, ubi sic habet:  
Si abscessus deletur, ac rursus repetit, nequa-  
quam secreta secretionis, ac febre detinente,  
difficilis morbus est; periculum enim delirii  
mortisque imminet.

### Auris quoque dolor acutus.

CONSEVERVNT antiqui aurium do-  
lorem nominare, auctore Galeno, quoties in  
profundo ex auditorio meatu doloris sensus  
affligat; tantisper enim ipse afficitur audito-  
rium nominatus meatus, non ex longo inter-  
uallo cerebro copulatus: unde factum est,  
ut Celsus noster sequens Hippocratem non  
simpliciter quæmus aurium dolorem, sed  
eum tantum qui acutus, & cum febre ve-  
hementi sit (qualis magna ex parte ardens  
est, quæ tum ob alias causas, tum ob cerebri  
inflammationem fit) delirium portendere di-  
xit; sicuti etiam passim Hippocrates, tam  
in Predictionibus, Si in ardente febre au-  
rium sonitus cum caligine fuerit, prouene-  
ritque in naribus grauitas, mente ex melan-  
cholia aberrant. & in Prasagiis: Aurium  
dolor acutus cum febre continua, ac vehe-  
menti,



menti, difficilis est: periculum enim delirij abolitionisque imminet. Quia igitur fallax hoc argumentum est, citò etiam animadvertere omnia alia testimonia à primo die necesse est. Nam iuniores septimo die, aut citius intereunt; natu vero maiores, multo tardius: febris enim ac delirium in eis infestant, & aures in eis antè suppurantur.

### Suffusa quoque sanguine.

GALENUS unum ex iis quæ raro accidunt, in commento Aphor. quarti, sectionis quintæ (Quibuscumque mulieribus ad mammas sanguis colligitur, furorem significat) ac sese nunquam vidisse affirmat; & si quando contingat fieri ob sanguinem tum biliosum, tum feruentem, quem quum mamillæ per adenes in lac transmutare non possunt, diffunditur per venas in caput ac uniuersum corpus, unde & furoris causam præ se fert.

### Quibus autem longæ.

CAUSAM huius reddis Galenus Aphorismorum quarto, quod propter multitudinem vel crassitiam, aut frigiditatem humorum efficientium febres, in longum tempus morbi extendantur, quum longum tempus exigant ad concoctionem: par igitur esse, & tubercula fieri, & ad articulos superfluitatem decumbere.

### Quorum faucibus in febre.

IN febrilibus, inquit Hippocrates, spiratio subsistens, aut offendens alidensue, malo est; Convulsionem enim significat; Spirationem subsistentem, vel alidentem vocans, quæ in medio sui interrupta subsistit: significat autem imminere convulsionem, quod oriatur musculus & nervus thoracem mouentibus calore febrili plus iusto exsiccatis.

### Si angina subito finita est.

ANGINA ob materia crassitiam, & frigiditatem subito resolui non potest. quare necessum est, si subito malum finiat, in pulmonem vitium decumbere: ac tum qui-

dem intra septimum diem ægrum suffocari nonnunquam visu venit, quod si minus contingat, ad suppurationem veniat consequens est. Transsumptus est locus hic ex decimo Aphorismo sectionis quintæ.

### Deinde post alui longam.

PER alui longam resolutionem, *diag- gōiā* Græcis dictam intelligere videtur. siquidem (ut in septimo Aphorismorum Hippocrates) à diarrhæa dysenteria, hoc est tormina, superveniunt. & paulo antè, A syn-cera detractione difficultas intestinorum malum. Subsequuntur autem tormina longam alui resolutionem abasis intestinorum acrimonia.

### Post hæc intestinorum læuitas.

A dysenteria seu difficultate intestinorum læuitas intestinorum seu lieenteria succedit; læsis siquidem intestinis (ut sexto Aphorismorum Galenus) à transitu vitiosorum humorum, & vis eorum laborat, & temperies nativi caloris abolitur.

### Post nimias destillationes tabes.

SI destillationes quæ à capite in pulmonem fluunt, acres atque erodentes sint, pulmonem (nisi per spiritum excreentur) exulcerant: qui quum in perpetuo motu sit, & non nisi per tussim expurgari possit, difficilem aut nullam admodum admittit curationem; sed sensim extenuato corpore mors subsequitur. quod ex Hippocrate Celsus noscitur voluit.

### Post lateris dolores.

HIPPOCRATES Aphorismorum septimo: A morbo laterali inflammatio pulmonis, & à pulmonis inflammatione phrenitis malum. diximus autem iam antè horum causam.

### Post magnos feriores capitis.

CONVULSIO & distentio, ut monet Hippocrates, aut à repletionem fieri, aut ab inanitione:



anitione: & ea quidem quæ à repletionem, curabilis; quæ verò inanitionem sequitur (qualis potissimum est quæ post magnos feriores corporis, exiccatis nervis fieri consuevit) lethalis magna ex parte est. quare clariùs quàm Celsus noster, in Aphorismis Hippocrates locutus est, Ab astibus fortibus conuulsio & distentio, malum est.

### Vbi caput vulneratum.

NISI quis synecdochicis hic continens pro contento accipiat, nescio quàm appositè Celsus noster in suam sententiam Hippocratis Aphorismum transtulerit: siquidem is non simpliciter in capitis ictu obstupescentiâ, aut desipientiam sequi docet; sed si ex capitis ictu alterutrum superveniat, malum esse. Neque enim quodvis capitis vulnus desipientiam pariet; sed quod cranio praefracto ad cerebrum usque pervingat. quo fit ut rectius Hippocrates, ex capitis vulnere malum, quàm Cornelius noster ex capitis vulnere delirium subsequi dixerit.

### Vbi vigilia torfit.

HIPPOCRATES septimo Aphorismo, In vigilia conuulsio, vel desipientia. Huius si quis ampliorem enarrationem desideret, antedicta consulat.

### Vbi vehementer venæ, &c.

MOTVM venarum super ulcera, pulsus vocat: nam ita quoque septimo Aphorismorum Hippocrates, A vehementi in ulceribus pulsus copiosam sanguinis eruptionem futuram praesagit. siquidem pulsus is vehementis, non in quibusvis ulceribus, sed iis tantum quibus phlegmone accedit, excitatur.

### Suppuratio verò pluribus morb.

LACONICIS admodum, atque abruptè multa Hippocratis verba complectitur; & si sensum spectes, nihil ab eo dissonat, nisi quòd dum brevis esse laborat, obscurus fiat: Siquidem Hippocrates Praesagiorum libro primo, Si qua febris, inquit, prorogatur saluè affecto

homine, nec dolore decinente, nec ob inflammationem, aut ob aliquam causam evidentem, expectari oportet abscessum cum tumore, aut dolore, qui in articulos maximèque inferiores decumbat. Talis abscessus magis ac minore tempore evenit natu minoribus tricesimum annum agentibus. Considerandus statim abscessus est, virum vicefimum diem detinens febris transscendat. Natu verò maioribus per febres longiores, minùs accidunt. Oportet autem expectari abscessum per febrem continuam, in quartanam verò discessuram, quoties intermittat, prehendaque errabilem modum, atque ita agendo autumno propinquet. Quemadmodum in minoribus natu tricesimum agentibus annum, abscessum consistunt: ita quartana potius annum agentibus quadragesimum, aut etiam senioribus accidunt. Hac Hippocrates. Videndum hic est cur in febribus longis abscessum periculū potius quàm in aliis subesse dixerit. & ratio in promptu est, quòd quum à materia crassitie, & frigidityte protrahantur, necesse est humores, quum lentore suo non facili subsequantur, ad ignobiliores partes propelli. si natura robustior sit, ut in iunioribus fere accidit: quare in iis quoque potius fieri abscessus dicit: nam aliqui si vires imbecilliores sunt, sicut in senibus esse solent, in corpore vasisque dum excernuntur, relinquuntur: quo fit ut dum tempus longum flagitent, in senioribus in quartanas abscedant.

### Eadem suppuratio fit, si.

LOCVS hic quum paulo obscurior sit, ac neque citra mendis sufficionem legi videatur, primū Hippocratis verba unde hac mutuo sumpsit auctor noster, transferribimus; deinde singula quàm possumus brevisimè expendemus. Dicit autem in Praesagiis, Tumor in praecordis durus ac dolens, pessimus est si in omnibus fatiget; si verò altera parte infeslet, sinistra minori cum periculo est. Talis vero tumor ab initio brevis morrem fore significat: si verò tricesimum transscendat diem & febris decineat, & tumor non desistat, in suppurationem ventri con-

tingit.



tingit. Accidit his in prima circumsione sanguinis è naribus fluor, atque admodum inuat. Sed requirendum est num doluerint caput, an hebetudines subeant oculorum: si quid enim horum fuerit, eò tendit. Sanguinis fluorem in iunioribus potius quintum & tricesimum annum agentibus expectare oportet: si verò mollior tumor est, nec dolet, & pressus digitis cedit, diuturniorem efficit indicationem, ac minori cum periculo est: si verò pratereat sexagesimum diem, & febris detinet, nec desistit tumor: fore suppurationem hoc in loco, & reliquo ventre, significat. Hucusque Hippocrates, nullam superiorum, aut inferiorum partium mentionem faciens, nisi quòd in molliore tumore, & qui sexagesimum transeat diem, in loco edematoso, & reliquo ventre suppurationem expectandam dicit: in altero verò, nempe duro, cui capitis quoque dolor, & hebetudo oculorum accedant, eò tendere, quasi dicat ad eas partes decumbere humores, ac inibi, nisi sanguinis è naribus fluor fiat, abscessus facere. quod & Celsus voluisse videtur, dum dixit: ac, si inter ipsa ulcera non fluit, circa aures erumpit: vlcera, ni quid me fallat, (quamquam non satis propriè) locum tumidum appellans. quare parua dictionum metathefi ita restituendum censuero hic Celsum nostrum: ut Hippocratem (unde sumpsisse ostendi) referat: Eadem suppuratio fit, si præcordia dura, dolentia, ante viceesimum diem hominem non sustulerunt, neque sanguis ex naribus fluxit, maximeque in adolescentibus: utique si inter principia aut oculorum caligo, aut capitis dolores fuerint, sed tum in superioribus partibus fit abscessus: ac si inter ipsa ulcera non fit, circa aures erumpit. Aut si præcordia dura tumore mollem habent, neque habere intra sexaginta dies desinunt, hæretque omnino id tempus febris, sed tum in inferioribus partibus aliquid abscedit. Non negancrim tamen in Coacis Prænotionibus Hippocratem abscessus in supernis par-

tibus timendos dicere, si præcordia molliora, & sine dolore persistant; in infernis autem, si circa eadem inflammatio fatiget. verum si sic Celsum nostrum accipiamus, quorsum quæ de auribus dicit, referemus?

### Cumque omnis longus tumor.

RATIONEM huius reddit Galenus, quòd præcordia ventre calidiora sint: quo fit ut quanto remotior à præcordiis locus fuerit, tanto difficilius suppuretur: quemadmodum de tumoribus quoque qui subter umbilicum sunt, videre licet. hi etenim raro in pus conuertuntur. Sunt autem qui loco & magis eò tendit, & is magis se tendat, legendum existimant.

### Si lassitudinis etiam sensus.

IN febrilibus in quibus lassitudinis sensus est, in articulis & maxillis (inquit quarto Aphorismorum Hippocrates) præcipue abscessus sunt: & quibuscunque resurgentibus ex morbis, si quid laborauerit, illic abscessus sunt. Accidit enim, ut nonnumquam humores morbum facientes, quum non satis fuerint expurgati, sed superfluitates quasdam reliquerint, eas ad ignobiliores particulas, quales sunt articuli, derrudunt. quo fit ut quum latiora ipsorum spacia promptè se habeant ad eas, & neque possint ad alias corporis partes excrementa propellere, abscessus inibi faciant.

### Interdum quoque vrina cruda.

SENTENTIÆ huius passim meminit Hippocrates: nam in Coacis Prænotionibus, Vrina, inquit, cruda multo tempore manens, aliis signis salutaribus, abscessum & dolorem significat. & magis in partibus sub septo transuerso: si verò dolores in lumbis obstraxerint ad coxam, & in febre & sine febre. Et in Prasægnis: Qui tenuem crudamque diutius urinam mingunt, si cætera ut in conualitibus indicia fuerint; in it abscessum ad inferas præcordiorum sedes expectare



potare oportet: necesse est enim, ut aut recidinet mortuus (quod ferè sit, si alia etiam figna, urina existente cruda, non secundum rationem se habeant) aut in abscessum terminetur. Dixit autem Celsus Hippocratem sequutus, non simpliciter crudam; sed quæ tenuis quoque sit: nam alibi (ut antè quoque demonstratum est) idem serex urinam crassam, quibus sperabatur ad articulos abscessum futurum, liberare dicit.

### Dolor autem pulmonis.

QUICUNQUE, inquit in Prasagiis Hippocrates, dolor in pulmonis morbo costarumque vitis affigit, non desinens neque scæationis purgatione, neque ventris subductione, neque vena incisione, ac medicamento, ac victus ratione, in suppurationem verti sciendum est. Celsus hic pro purgatione, cucurbitulas substituit: quod an studio fecerit, verius medicamentorum purgantium qualitatem, an transcribere tum vitio factura sit, admodum dubito. Nam non se us atque aliquis catharticum inter: periem calidam hic damnet; ita alius inflammationi vehementiori, & à materia biliosa oria, non temerè cucurbitulas (præsertim eas quæ cum copiosiora flamma assignantur, propter excitationis periculum) admisit: sed de his in subsequenibus latius. Notandum interim hic est nonnullos loco tæu vomicas aliquas interdum excitat legere intelis excitat: ita ut empyema aut similem aliquam vomicam subintelligere videantur.

### aut circa vicefimum diem, &c.

HIPPOCRATES in Prasagiis: Alia suppurationes ferè rumpuntur in vicefimo die, & tricesimo & quadragesimo, & ad sexagesimum deveniunt. Considerare oportet suppurationes fore, colligentes initium à die quo primum homo febricitavit, quoque rigor eum prehendit: & si dixerit pro dolore sibi inesse pandum in loco in quo dolor afficiebatur; hæc enim accidunt inter initia suppurationis. Ex hoc igitur tempore, expectare puris fore eruptionem prædictis tem-

poribus oportet. Hæc ille. Rumpuntur autem alia tardius, alia ocyns, tum propter loci situm, tum propter ætates, tum propter humorum qualitates: ut si calidi frigidi, humidi aut siccissimi, crassi, lenti, rari, ac fluxiles. His etiam monendus lector est, inter se variare exemplaria: alia namque Hippocrati sequentia, ante quadragesimum, tricesimum ponunt.

### Quod suppurat.

SI suppuratio, inquit Hippocrates in Prasagiis, in alterutro latere tantummodò fuerit, vertere atque eliscere convenit in his, utrum in altero habeat latere dolorem, & utrum quam alterum calidius sit; atque eo in alterum cubante latus, requirere oportet num aliquod desuper oris illi pendere videatur: si enim id fuerit, suppuratio in altero latere fatigat. Galenus rationem huius in commento abundè reddit.

### Omnis etiam suppuratione quæ, &c.

VIDES quàm multa ordine quodam hoc & sequenti capite auctor noster ex Prasagiorum libro transtulerit; adeò ut totum ferè illum in duo hæc capita relegisse videatur: siquidem præcedenti sententia statim subiungitur: Omnes agnosci purulentos his indiciis convenit. Principio si febris non dimittit, sed interdum tenuior, noctu vehementior est: si copia sudoris elicitur, ac tussendi cupiditas est, neque quicquam tamen dignum commentatione expiunt: si oculi cani redduntur; maxillæ verò ruborem contrahunt, & ungues manuum curvantur, digiti verò, potissimum summi, calefcent; atque in pedibus tumores exsunt: neque cibum appetit, ac pustule circa corpus erumpunt. In Coacis quoque Prænotionibus isdem ferè verbis eandem sententiam repetit: Qui suppurat, inquit, finit, maximèque ex plenitudo ac peripneumonia, eos calores comitantur; interdum tenues; noctu vehementiores: & nihil memoratu dignum expiunt: ac circa collum, & claviculam sudant: & oculi cani fiunt; maxillæ verò rubent. Digiti summi.



summi deterius caleſcunt, ac aſperantur, ungues curvantur, ac perſiſcuntur, & circa pedes tumores habent, & circa corpus puſulas, & abſtinent à cibis. In libro tamē De locis in homine, pedes ea parte magis intumefcere dicit, qua prius continetur: nam paulo ante dictum eſt, in alterutra tantum parte ſuppurari. Celiuſ noster hic per omnia Hippocratem reddidit; niſi quod ſpiritus diffidentem (quem paulo poſt Hippocrates ſignum breui ſuppuratiōis dicit) veraque albeſcentes ſub lingua, adhecerunt: quod jamē cur ſecetur, nondum ſatis aſſequar; nam quum genere rubeant propter intem periem calidam pulmonis, ac continuam tuſim, conſequens quoque eſt, eadem ratione, & venas ſub lingua naturalem ſervare calorem. Niſi forſidē quis albeſcere venas led dicat, quod depreſſis ſpiribus & humoribus, calor febrilis ſolius particulas exolat, atque depaſſatur: quod heuicis (de quibus, ut docet Galenus, hoc loco loquitur Hippocrates) familiare admodum eſt.

### Quod ſi protinus initio dolor.

SVBIUNGIT ea quæ deinceps de ſuppuratiōe præſignis reliquit Hippocrates; dicit autem: Quacumque ergo ſuppuratio citius ac tardius rumpitur, talibus cognoscatur ſignis oportet. Si dolor inter initia extitit,

& item difficultas ſpirandi, necnon tuſſedo, atque etiam ſcreatio perſeueret, viceſimo die, aut etiam antea expeſtari eruptionem oportet. ſi verò continentior fuerit dolor, & alia omnia in his fuerint ex ratione, poſtea expeſtari oportet eruptionem. ſed ſiue neceſſe eſt, & dolorem & ſpirandi difficultatem, & ſcreationem aut equam prius excernatur. Celiuſ hic verum difficultatis ſpiritus meminit; idq; non temere: neceſſe eſt enim ante ſuppuratiōem, ſive eruptionem puris, præcedere ſpirandi difficultatem, ſive ea treceſimo, ſive quadragefimo, aut etiam ante fiat: ut recte, tum loco citato, tum in Coacis Prænotionibus monuit Hippocrates.

### Solent etiam in graui morbo, &c.

ET hoc quoque ex Præſignis tranſmiſſiſſis: nam illic ſcriptum reliquit Hippocrates: Si corpus adeo grave eſt ut ungues quoque & digiti lindi ſint, expeſtanda mors continuo eſt. Si digiti ac pedes omnino nigreſcunt, minus peſti ſunt quam ſi lineant. Sed alia ſigna conſideranda ſunt: ſi enim facile ferro in alium appareat, & ali-quod aliud fuerit ſalubre ſignum, morbum verti ſignificat ad abſceſſum; ita ut æger ſit conualeſcens; corporis verò nigredo caſura. Indicat namque extinctam iam aut extin-ctioni proximam, facultatem vitalem.

## CAPVT VIII.

### Quæ nota in quoque morbi genere, vel ſpem, vel pericula oftendant.

SEQUITVR, ut in quoque morbi genere proprias notas explicem, quæ vel ſpem, vel periculum oftendant. Ex ve- Vrina. ſica dolente, ſi purulenta vrina proceſſit, inque ea læue & album ſubſedit, metum detrahit. In pulmonis morbo, ſi ſputo ipſe leuatur dolor, quamuis id purulentum eſt, tamen æger facile ſpirat, facile excreat, morbum ipſum non difficulter fert, poteſt ei ſecunda valetudo contingere. Neque inter initia



•federur.  
al. redda-  
tur.

initia terreri conuenit, si protinus sputum mistum est ruffo quodam & sanguine, dummodo statim\* edatur. Laterum dolores suppuratione facta, deinde intra quadragesimum diem purgata, finiuntur. Si in iocinore vomica est, & ex ea fertur pus purum & album, salus ei facilis. Id enim malum in tunica est. Ex suppurationibus verò, hæ tolerabiles sunt quæ in exteriorem partem feruntur & acutuntur. Et ex his quæ intus procedunt, hæ leuiiores, quæ contra se cutem non afficiunt, eamque & sine dolore esse, & eiusdem coloris, cuius reliquæ partes sunt, sinunt esse. Pus quoque quacunque parte erumpit, si est læue, album, & vnius coloris, sine vilo metu est, & quo effuso, febris protinus conquieuit, desieruntque vrgerè cibi fastidium, & potionis desiderium: si quando etiam suppuratio descendit in crura, sputumque eiusdem factum pro ruffo purulentum est, periculi minus est.

Sputi indi-  
catio.

At in tabe eius qui saluus futurus est, sputum esse debet album, æquale totum, eiusdemque coloris, sine pituita, eique etiam simile esse oportet, si quid in nares à capite destillat. Longè optimum est febrem omnino non esse: secundum, est tantulum esse, vt neque cibum impediat, neque crebram sitim faciat. Alius in hac valetudine ea tuta est, quæ quotidie coacta, eaque conuenientia his, quæ assumuntur, reddit. Corpus id, quod minimè tenue, maximeque lati pectoris atque serosi est, cuiusque cartilago exigua, & carnosæ est. Super tabem si mulieri quoque suppressa menstrua fuerunt, & circa pectus atque scapulas dolor mansit, subitoque sanguis erupit, leuari morbus solet. Nam & tussis minuitur, & sitis atque febriculæ desinunt. Sed iisdem ferè, nisi redit sanguis, vomica erumpit, quæ quo cruentior, eo melior est. Aqua autem inter cutem minimè terribilis est, quæ nullo antecedente morbo cœpit, deinde quæ longo morbo superuenit. Vtique si firma viscera sunt, si spiritus facilis, si nullus dolor, si sine calore corpus est, æqualiterque in extremis partibus macrum est, si venter mollis, si nulla tussis, nulla sitis, si lingua ne per somnum quidem inarescit, si cibi cupiditas est, si venter medicamentis mouetur, si per se excernit mollem, &

Alui indi-  
catio.

figurata,



figurata, si extenuatur, si vrina & vini mutatione, & epotis aliquibus medicamentis mutatur: si corpus sine lassitudine est, & \* morbum facile sustinet. Siquidem in quo omnia <sup>\*motum</sup> hæc sunt, is ex toto tutus est: in quo plura ex his sunt, is in bona spe est. Articulorum verò vitia, vt podagræ, chiragræque, si iuvenes tentarunt, neque callum induxerunt, solui possunt, maximeque torminibus leniuntur, & ex quocunque modo venter fluit. Item morbus comitalis ante pubertatem ortus, non agrè finitur, & in quo ab vna parte corporis venientis accessionis sensus incipit, optimum est à manibus pedibusve initium fieri, deinde à lateribus, pessimum inter hæc à capite. Atque in his quoque ea maximè profunt, quæ per deiectiones excernuntur. Ipsa autem deiectio sine <sup>Deiectio sine vlla noxa.</sup> vlla noxa est, quæ sine febre est, si celeriter desinit, si contra-cto ventre nullus motus eius sentitur, si extremam aluum spiritus sequitur. Acræ tormina quidem periculosa non sunt, si sanguis & strigmenta descendunt, dum febris cæteræque accessiones huius morbi\* absint, aded vt etiam grauidæ mu- <sup>\*adsint.</sup> lier non solum reseruari possit, sed etiam partum reseruare. Prodestq; in hoc morbo, si iam ætate aliquis processit. Contra intestinorum læuitas facilius à teneris ætatibus depellitur, vtique si\* fieri vrina & ali cibo corpus incipit. Eadem ætas <sup>\*ferri</sup> prodest & in coxæ dolore, & humerorum, & in omni resolutione neruorum. Ex quibus coxa si sine torpore est, si leuiter friget, quamuis magnos dolores habet, tamen & facile & maturè sanatur, resolutumque membrum, si nihilominus aliter fieri sanum potest, oris resolutio etiam, alio cita finitur. Omnisque deiectio lippienti prodest. At varix ortus, vel per ora venarum subita profusio sanguinis, vel tormina, insaniam tollunt. Humerorum dolores, qui ad scapulas vel manus tendunt, vomitu atræ bilis soluuntur. Et quisquis dolor deorsum tendit, sanabilior est. Singultus sternutamento finitur. Longas deiectiones suppressit vomitus. Mulier sanguinem vomens profusis menstruis liberatur. Quæ menstruis non purgatur, si sanguinem ex naribus fudit, omni periculo vacat. Quæ locis laborat, aut difficulter partum edit,

S

sternuta-



sternutamento leuatur. Aestiuā quartana fere breuis est. Cui calor & tremor est, saluti delirium est. Lienosis bona tormina sunt. Denique ipsa febris (quod maximè mirum videri potest) sæpe præsidio est. Nam & præcordiorum dolores, si sine inflammatione sunt, finit, & in iocinoris dolore succurrit, & neruorum distentionem rigoremque (si postea cœpit) ex toto tollit, & ex difficultate vrinæ morbū tenuioris intestini ortum, si vrinam per calorem mouet, leuat. At dolores capitis, quibus oculorum caligo, & rubor cum quadam frontis prurigine accedunt, sanguinis profusione vel fortuita, vel etiam petita summouentur. Si capitis ac frontis dolores ex vento, vel frigore, aut æstu sunt, grauedine & sternutamentis finiuntur. Febrem autem ardentem (quam Græci \* *καυσώδη* vocant) subitus horror exoluit. Si in febre aures obtusæ sunt, si sanguis è naribus fluxit, aut venter resolutus est, illud malum desinit ex toto. Nihil plus aduersus surditatem, quàm biliosa aluus potest. Quibus in fistula

\* *apices* vrinæ vti minuti \* abscessus (quos *φύματα* Græci vocant) esse cœperunt, ijs vbi pus ea parte profluxit, sanitas redditur. Ex quibus cum pleraque per se proueniant, scire licet inter ea quoque\*, quæ ars adhibet, naturam plurimum posse. Contrà, si caput febre continenti dolet, neque quicquam reddit, malum atque mortiferum est: maximeque id periculum est pueris à septimo anno ad quartumdecimum. In pulmonis morbo si sputum primis diebus non fuit, deinde à septimo die cœpit, & vltra septimum mansit, periculosum est. Quantoque magis mistos, neque inter se diductos colores habet, tanto deterius. Et tamen nihil peius est, quàm sincerum id edi, siue ruffum est, siue cruentum, siue album, siue glutinosum, siue pallidum, siue spumans: nigrum tamen pessimum est. In eodem morbo periculosa sunt tussis, destillatio, etiam (quod aliàs salutare habetur) sternutamentum. Periculosissimumque est, si hæc secuta subita deiectio est. Ferè verò quæ in pulmonis, eadem in lateris doloribus, & mitiora signa, & asperiora esse consueuerunt. Ex iocinore si pus cruentum exit, mortiferum est. At ex suppurationibus hæc pes-



hæ pessimæ sunt quæ intus tendunt, sic vt exteriorem quoque cutem decolorent. Ex his deinde, quæ in exteriorem partem prorumpunt, quæ maximæ, quæque planissimæ sunt. Quodd si nè rupta quidem vomica, vel pure extrinsecus emissio febris quieuit, aut quamuis quieuerit, tamen repetit: Item si sitis est, si cibi fastidium, si venter liquidus, si pus est liuidum & pallidum, si nihil æger excreat nisi pituitam spumantem, periculum certum est. Atque ex his quidem suppurationibus, quas pulmonum morbi concitarunt, ferè senes moriuntur: ex cæteris iuniores. At in tabesputum mixtum purulentum, febris assidua, quæ & cibi tempora eripit, & siti affligit, in corpore tenui periculum subesse testatur. Si <sup>Vrina</sup> quies etiam in eo morbo diutius traxit, vbi capilli fluunt, vbi vrina quædam araneis similia subsidencia ostendit, atque in his odor fœdus est, maximeque vbi post hæc orta deiectio est, protinus moritur. Vtique si tempus autumnus est, quo ferè, qui cætera parte anni traxerunt, resoluuntur. Item pus exspuisse in hoc morbo, deinde ex toto spueri desisse, mortiferum est. Solent etiam in adolescentibus ex eo morbo vomica, fistulæque oriri, quæ non facillè sanescunt, nisi si multa signa bonæ valetudinis subsecuta sunt. Ex reliquis verò minimè facillè sanantur virgines, aut hæ mulieres, quibus super tabem menstrua suppressa sunt. Cui verò sano subitus dolor capitis ortus est, dein somnus oppressit, sic vt stertat, neque expergiscatur, intra septimum diem pereundum est: magis si eum aluus cita non antecesserit. Si palpebræ dormientis non coeunt, si album oculorum apparet. Quos tamen ita mors sequitur, si id malum non est febre discussum. At aqua inter cutem, si ex acuto morbo coepit, ad sanitatem rarè perducitur, vti que si contraria his quæ supra posita sunt subsequuntur, æquè in ea quoque tussis spem tollit. Item si sanguis sursum, deorsumque erupit, & aqua medium corpus impleuit. Quibusdam etiam in hoc morbo tumores oriuntur, deinde desinunt, deinde rursus assurgunt. Hi quidem tutiores sunt, quàm qui supra comprehensi sunt, si attenduntur, sed ferè fiducia secundæ valetudinis opprimuntur. Illud



iure aliquis mirabitur, quomodo quædam simul & affligant nostra corpora, & parte aliqua tueantur. Nam siue aqua inter cutem quem impleuit, siue in magno abscessu multum puris coijt, simul id omne effudisse æquè mortiferum est, ac si quis sani corporis vulnere factus exanguis est. Articuli verò qui sic dolent, vt super eos ex callo quædam tubercula innata sint, nunquam liberantur: quæque eorum vitia vel in senectute cœperunt, vel in senectutem ab adolescentia peruenierunt, vt aliquando leniri possunt, sic nunquam ex toto finiuntur. Morbus quoque comitialis post annum quintum & vigesimum ortus agrè curatur: multoque acrius is, qui post quadragesimum annum cœpit: aded vt in ea ætate aliquid in natura spei, vix quicquam in medicina sit. In eodem morbo si simul totum corpus afficitur, neque antè in partibus aliquis venientis mali sensus est, sed homo ex improviso concidit, cuiuscunque is ætatis est, vix sanescit. Si verò aut mens læsa est, aut neruorum facta resolutio, medicinæ locus non est. Deiectionibus quoque si febris accessit, si inflammatio iocinoris, aut præcordiorum, aut ventris, si immodica sitis, si longius tempus, si aluus varia, si cum dolore est, etiam mortis periculum subest, maximeque si inter hæc tormina vetera esse cœperunt. Isque morbus maximè pueros absumit vsque ad annum decimum. Cæteræ ætates facilius sustinent. Mulier quoque grauida eiusmodi casu rapi potest, atque etiam si ipsa conualuit, partum tamen perdit. Quinetiam tormina ab atra bile orsa mortifera sunt, aut si sub his extenuato iam corpore subito nigra aluus profluxit, aut intestinorum læuitas. Periculosior est, si frequens deiectio est, si venter omnibus horis & cum somno, & sine hoc profluit. Si similiter noctu & interdiu. si quod excernitur aut crudum est, aut nigrum, & præter id etiam læue, & mali odoris sit: si sitis vrget, si post potionem vrina non redditur, quod euenit, quia tunc liquor omnis non in vesicam, sed in intestina descendit, si os exulceratur, si rubet facies, & quasi maculis quibusdam colorum omnium distinguitur, si venter est quasi fermentatus, pinguis atque rugosus, si & cibi cupiditas non est.



est. Inter quæ cum euidentis mors sit, multo euidentior est, si iam longum quoque id vitium est, maximeque si etiam in corpore senili est: si verò in tenuiore intestino morbus est, vomitus, singultus, neruorum distentio, delirium, mala sunt. At in morbo arquato durum fieri iecur perniciosissimum est. Quos lienis male habet, si tormina prehenderunt, deinde inuersa sunt, vel in aquam inter cutem, vel in intestinorum læuitatem, vix vlla medicina periculo subtrahit. Morbus intestini tenuioris, nisi resolutus est, inter septimum diem occidit. Mulier ex partu, si, cum febre, vehementibus etiam & assidujs capitis doloribus premitur, in periculo mortis est. Si dolor atque inflammatio est in his partibus, quibus viscera continentur, frequenter spirare signum malum est. Si sine causa longus dolor capitis est, & in ceruices ac scapulas transit, rursusque in caput reuertitur, aut à capite ad ceruices scapulasque peruenit, perniciosus est, nisi vomitum aliquam excitauit, sic ut pus extussiretur, aut nisi sanguis ex aliqua parte prorupit, aut nisi in capite multa prurigo, totòve corpore pustulæ ortæ sunt. Aequè magnum malum est, vbi torpor atque prurigo peruagantur, modò per totum caput, modò in parte, aut sensus alicuius ibi quasi frigoris est, eaque ad summam quoque linguam perueniunt. Et cum in ijsdem abscessibus auxilium sit, eò difficilior sanitas est, quò minùs sæpe sub his malis illi subsequuntur. In coxæ verò doloribus si vehemens torpor est, frigescitque crus & coxa, aliudque nisi coacta non reddit, idque quod excernitur mucosum est, iamque ætas eius hominis quadragesimum annum excessit, is morbus erit longissimus, minimeque annuus, neque finiri poterit, nisi aut vere aut autumnò. Difficilis æquè curatio est, in eadem ætate, vbi humerorum dolor, vel ad manus peruenit, vel ad scapulas tendit, torporemque & dolorem creat, neque bilis vomitu leuatur. Quacunque verò parte corporis membrum aliquod resolutum est, si neque mouetur, & emacrescit, in pristinum habitum non reuertitur, eoque minus, quo vetustius id vitium est, & quo magis in corpore senili est. Omni que resolutioni neruorum ad me-

S 3

dicinam



\* parer,  
\* emarcue-  
runt,

dicinam non idonea tempora sunt, hyems, & autumnus: aliquid sperari potest vere & æstate. Isque morbus mediocris vix sanatur, vehemens sanari non potest. Omnis etiam dolor minus medicinæ \* patet, qui sursum procedit. Mulieri gravidæ, si subito mammæ \* emarcuerunt, abortus periculum est. Quæ neque peperit, neque gravis est, si lac habet, à mensuris defecta est. Quartana æstiva brevis, autumnalis ferè longa est, maximeque quæ coepit hyeme appropinquante. Si sanguis profluxit, deinde secuta est dementia cum distentione neruorum, periculum mortis est. Itemque si medicamentis purgatum, & adhuc inanem, neruorum distentio oppressit, aut si in magno dolore extremæ partes frigent. Neque is ad vitam redit, qui ex suspendio, spumante ore, detractus est. Aluus nigra, sanguini atro similis, repentina, siue cum febre, siue etiam sine hac, perniciofa est.

#### ENARRATIO.

**N**IMIS quàm brevis hic est Celsus nosser: nā quæ spem promittit, præter capitis huius institutū tantum enunciat; quæque periculum portendunt, volens omisisse videtur. quod sanè ei condonandum foret. si eandem hic quàm in sequentibus methodum ad dicendi rationem seruasset: in illis enim studio quodam conualescentia signa tantum enarrat; deinde longo intervallo, ordine singula quæ securitatem adimant explicauit. Itaque quæ hic de vesica dolente ascripsit, sumpsisse videtur ex libro Præsagiorum Hippocratis: ubi is sic scriptum reliquit: Si vesica dura est, ac dolore vexatur, difficilis omnis ac exitialis est; exitiosissima verò quæcumque cum continua febre affligit: qui enim ex ipsa vesica affligit dolor, interimere hominem potest; & alius in talibus nil nisi durum, & pro necessitate excernit. Si verò mingitur urina purulenta, candidum ac leue obtinens sedimentum, solutio accedit ægritationis: Si verò neque concedat urina, neque vesica mollescat, ac febris cont inua fiat, primis circuitionibus morbi aboleri eam qui dolore afficitur, expectandum est. Hæc for-

mula potissimum attingit pueros à septimo ad quatuordecim annuum. Hactenus Hippocrates. Celsus neque ætatis (cuius postmodum non semel mentionem facit) neque duriciæ cum dolore, neque febris meminit: idque ea fortassis ratione ductus, quod quum quemcumque vesica dolorem ad hominis internecionem sufficere Hippocrates dixerit; is explicandum tantum puer, quæ metum detrahant: qualis certè est urina purulenta, in qua leue & album subfedit; indicans nimirum inflammationem nonnihil remisisse, ac ad maturationem tendere: quando in urina & sedimento ipso, concoctionis quoque indicia appareant.

#### In pulmonis morbo.

**I**N omnibus purgationibus tam spontaneis quàm arte factis summè intentus esse debet natura minister medicus, si leniter ferantur, atque circa difficultatem ægri fiant; ita enim conferunt. Quod & Hippocrates, initio Aphorismorum, inculcatum voluit, de vomitibus & aliis spontè factis evacuationibus, & passim aliis locis, de reliquis quæ na-

INTA



cura duce sunt excrementorum reiectioni-  
lus in eandem sententiam pronunciata reli-  
quit. quod considerans auctor noster, in pul-  
monis morbo facilitatem spiritus atque ex-  
creationis, & ex eadem consequuntur lena-  
men aliquod, ad salutem satis esse dicit; idq;  
auctoritate Hippocratis, qui non uno loco in  
Praesagiis in hanc rem sententias reliquit:  
Siquidem omnis, inquit, creatio, mala est,  
quæ non sedat dolorem; quæ verò sedat dolo-  
rem, melior est. Et paulo antè: Spiratio-  
nis facilitatem existimari oportet, perquam  
magnam vim habere ad salutem in omni  
morbo acuto, qui cum febre inest, &  
quadragesimo die indicetur. Et rursum:  
Creatio in omni dolore qui affligit circa pul-  
monem & costas, citò prompteque creetur  
necesse est, permixta enim appareat flava  
bilis admodum creatione oportet. Neque  
enim facilis potest esse spiritus, ubi cor, tho-  
rax, aut septimum transversum dolore aliquo  
afficiantur: & iterum spiritum quod citò  
prompteque excreatur, non potest non circa  
omnem doloris suspicionem excerni; adeò ut  
dolorem minuat, & metum omnem eximat.

### Neque inter initia ter- reri convenit.

HIS quæ iam antè ex Hippocrate retu-  
limus, non omnino dissonat quod hic subiun-  
git; siquidem is citam creationem vocat,  
quæ statim in morborum initiis obitur, ut  
rectè monet Galenus. Quò respiciens Celsus  
noster, non solum inter initia, sed & dum-  
modo protinus & statim edatur, di-  
xit, appellantiq; mixtum quoddam  
ex rusto & sanguine, quod idem senex  
flavum cum modico sanguine (hoc est crea-  
tionem quæ ex sanguine & flava bile mixtis  
constat) vocavit. Dicit autem in Praesagiis  
Hippocrates: Creatio flava non multo per-  
mixta sanguine, in pulmonis morbo, si inter  
initia excernitur, salutaris admodum est; si  
septimo die pigriusve, minus secunda est.

### Laterum dolores suppura- tione facta, &c.

LATERALEM morbum vocat quem

Græci πλεογῆν. hic autem acutus quum  
sit, decimoquarto die indicari solet. quod se-  
minus accidat, in suppurationem vertitur: ac  
rursum si qui ex morbo laterali suppurantur,  
ut quinto Aphorismorum Hippocrates, si in  
quadraginta diebus purgantur à qua sit ru-  
ptio, liberantur: si verò non, ad tabem  
transeunt: nisi enim per spiritum purulenta  
materia excreetur, sensim pulmonem ipsum  
coarctat, atque exedit: siquidem pulmo  
quum rarus, & laxus sit, facillimè à putri-  
dis noxiisque humoribus exulceratur atque  
eroditur; unde tabem consequi necessum est.

### Si in iccore vomica est.

QUI iccore suppurato, ut septimo  
Aphorismorum Hippocrates, uruntur, aut  
secantur, si quidem pus purum effluerit  
veluti amurca est, intereunt: significat enim  
hoc alteratricem facultatem imbecillam esse,  
& corruptionem usque ad iccoris substantiam  
pervenisse. Pus autem albumque pus, ut  
rectè monet Philotheus, alteratricis virtutis  
robur indicat, & inflammationem extra  
iecur (nempe eius membranam quam perito-  
neum vocant) pervenisse.

### Ex suppurationibus verò.

SUPPURATIO, inquit in Praesagiis  
Hippocrates, ita consideranda est: quæ enim  
foras vertitur, optima est, si parva est, maxi-  
mèque egreditur, & in sublime affurgit: si  
verò magna est & lata, minimèq; in mu-  
cronem suæ gibbi subducitur, pessima est.  
Consentaneum est, ut docet Galenus, quod quæ  
natura studeat interdum purulentam mate-  
riam, per idoneos quosdā meatus cen aque-  
ductus expellere; suppurationem eam & le-  
niorem & indulgentiorem esse, quæ foras  
non intro tendit, atque ex his ipsis quæ non  
ampliorem sedem prehendant in latitudinem  
extensa, sed in gibbi formulam acnatur, at-  
que in sublime feratur: id enim robur foras  
expellentiæ facultatis indicat.

### Et ex his quæ intus proce- dunt, hæc leuiorès.

QUAMVIS hæc sententia ab Hippo-  
crate



erate his verbis statim subiungatur, Quæ  
verò inrumpatur, optima est, si cum  
exteriore sede nihil communicat, sed con-  
tacta est, nec dolet, & omnis exterior locus  
unicolor apparet. Tamen fuerunt quæ ha-  
tenuis me suspensum habuerunt; ita ut di-  
minandum hic potius mihi fuerit, quam certi  
aliquid pronuntiandum, cum quid per se con-  
tra se cutem non afficiant, nisi Oedipus  
quispiam rectè non coniecerit: Nam quan-  
tumvis hic mendum subesse suspicemur, ta-  
men quid pro subiturnis restituendum sit,  
nondum satis assequimur: quare ut amicam  
aliquam interpretationem comminisceremur  
erat necesse: Ita ut id Celsum voluisse di-  
camus per suppurationem quæ contra se-  
cutum non afficit, quod Hippocrates per  
eam quæ cum exteriori sede nihil commune  
habet: ita videlicet ut exteriora, & interio-  
ra contraria dicamus, atque ita si intellexerim-  
us, sententiam paulo planiorem, quam  
Hippocrates, reliquerit. Neque enim sup-  
puratio ea optima est, quæ cum exteriori  
sede nihil communicat: sed quum bona sit, de-  
terior tamè est, quam quæ foras rumpitur.  
quare appositè admodum leniores huiusmodi  
suppurationes vocari Celsus.

#### Pus quoque quacunque parte erumpit.

HIPPOCRATES in Prasagiis, Pus opti-  
mum est si candidum, æquale lenæque, &  
quamminimè fœtidum est: maximè con-  
trarium huic, deterimum est. Et paulo post:  
Ex purulentis ij potissimum supersunt, quos  
febris eodem dimiserit die, ac cibum cuius  
appetunt. nam quum pus omne ex sanguine  
qui feminalem habeat transmutationem, or-  
inum habeat; optimum erit quod semini pro-  
lisco quam simillimum erit, hoc est, quod  
leuè, album & æquale & quamminimè  
grauolens sit, & quo emissio febres desinam;  
consumpta videlicet materia & ignea cali-  
ditate, quæ sanguini ebullienti (unde pus  
generari diximus) merat.

#### si quando etiam suppuratio.

HIPPOCRATES in Prasagiis: Abscessus

si in cruribus erumpit in pulmonia vehe-  
menti, ac periculosa omnis utilis est: opti-  
mus verò si per secretionis mutationem iam  
existat, & creatio pro flana, purulenta ex-  
istat, ac foras excernatur; ita securissimè su-  
pererit homo, ac ita abscessus ocyssimè circa  
dolorem desisset. At si creatio non rectè  
excernatur, nec urina videatur habere bo-  
num sedimentum, periculum clauditis in  
articulo, vel multum negotij imminet. At-  
que id quidem mirum minimè cuiquam vi-  
deri debet, quum idem sanex Epidemion se-  
cundo inter bonos abscessus securissimos di-  
cat, si deorsum & quam longissimè ab agro-  
tatione absistant; atque id potissimum si cum  
concoctionis signis statim erumpunt: Conco-  
ctio enim celerem indicationem, & securam  
sanitatem promittit: quod Cornelius nosse  
voluit dum dicit, spurumque eiusdem  
factum pro ruffo purulentum.

#### At in tabe eius qui sal- uus, &c.

HIPPOCRATES secundo Prædictio-  
num: De tabescentibus, quod ad spiritum, ac  
iussim attinet, eadem dico quæ de pectore  
suppuratis scripsi. Oportet enim eum qui  
prole liberari vult, facile spiritum per iussim  
deicere, & id esse album & æquale, &  
eiusdem coloris, & ab inflammatione alie-  
nari. Quod verò à capite defluit, ad nâres  
conuerit, febrem autem non innadere, ut, ne  
à canis probibeatur, neque sujat, venter  
autem egerat quotidie, & id quod egerat sit  
durum, copia pro ingestorum ciborum ra-  
tione. Hominem vero, quamminimè senem  
esse oportet, quadrangulum & hirsutum, &  
os ipsius paruum sit, robuste carnosum: qui-  
cunque enim hæc omnia habuerit, superstes  
erit. Celsus omnia hæc fidelissimè reddidit,  
nisi quod inflammationis non meminere, quod  
eum sub febre comprehendisse satis putarit,  
& quod de defluxu qui à capite in subiectas  
partes fit, non satis pronuntiatur reliquerit;  
siquidem Hippocrates necesse esse dicit, ut si  
quid à capite defluat, per nâres id expurge-  
tur: nam aliqui si in fauces aut pulmonem  
decumberet, non circa summum periculum  
id foret.



id feret: quod Celsus noster non videtur animadvertisse, dum si quid à capite destillat, album aequaleque ut sit, opus esse dicit; quasi dicat distillationes, non solum quæ à capite in nares, sed etiam quæ in fauces sunt, tabides literare, immo similes sint bonæ per spiritum excreationi. quare hic quoque legere malim eique etiam simile esse oportet siquid à capite destillat, idque in nares fluat.

### Super tabem si mulieri quoque supp.

Hic dum brevitati nimis studeat, obscurus admodum est, neque satis Hippocratis sententiam reddidit: siquidem is paulo post iam citatum locum, in hunc modum scripsit: Cæterum ex aliis minus superstitres manent, & virgines & mulieres quibus ex suppressis mensibus tales oborta est. Si verò aliqua virgo, aut mulier evasura est, & aliorum signorum bonorum multa accedere oportet, & menses splendide ac pure apparere, aut nulla spes est. Qui verò ex sanguinis eruptione pectore suppurati sunt, & viri & mulieres & virgines non minus evadunt, verum signis omnibus tum suppuratorum, tum tabescentium collectis, & superstitem futurum, & perituum prædicere oportet. Maxime verò evadunt ex sanguinis eruptione hi quibus dolores sunt utriusque, & in dorso, & in pectore, & qui post eruptionem minus desunt: nam & tussis non vix insuper accedunt, & febres pleraque persueverant sitim facile ferentes. At reversiones eruptionis sanguinis maxime fiunt his, si non abscessus succedunt, optimi sunt abscessus sanguinolentissimi. Celsus dum ultima primis connectit, tabem quæ ex menstruorum defectu, cum ea quæ ex sanguinis eruptione fit, ac muliebrem cum virili affectu confundit; idque quam rectè, penes alios in dicium esto.

### Aqua autem inter cutem.

HIPPOCRATES secundo Prædictionum, Eum qui ab hydropo, sine aqua inter cutem correptus est, & superstes esse volet,

bonis visceribus esse oportet; ita ut natura sese exerat, simulque facile conoquat, & bene speret, sique sine dolore, & totum corpus æqualiter tepidum habeat, & non circa extremas partes colligatum. Melius est autem ut tumores potius habeat in extremis partibus: Optimum verò est neutrum horum habere; nam molles ac graciles esse convenit extremas partes, itemque ventrem ad contactum mollem. Tussim verò non adesse oportet, neque sitim neque linguam refficiari, tum reliquo tempore, tum post somnum, quando hæc valde fieri solent. At cibos libenter accipere oportet, & ubi multum satietis comedit, non affligi. Alium verò ad medicamenta quidem celerem habere, reliquo autem tempore egere recrementum molle efformatum. Viram autem apparere convenit, pro studiorum ratione & virorum mutatione transeuntem. Laborem verò ferre oportet facile, & lassitudinis exertem esse: ac optimum quidem est, hominem per omnia ita dispositum esse. & sic securissime sanus quidem fieri poterit, si minus, plurima ex his habeat, nam spes erit ut superstes evadat. Quæ quum Celsus breviter & dilucide reddiderit, non est quod duntius immoremur. Nam quod dicit lenissimam eam esse aquam intercutem quæ nulli præsertim acuto morbo subit, ex subsequenteribus clari evadet.

### Articulorum verò vitia.

DE podagricis, inquit in Prædictionibus Hippocrates, hæc dico: Quicumque aut senes sunt, aut circa articulos callos rosaceos concretos habent, aut arumatos vident, aut siccam alium habent, hi omnes sani fieri non possunt humana arte, quantum ego novi. Sanant quidem hos optimè dysenteria, si successerint; sed & alia eliquationes valde profunt, si ad inferiores locos repunt. Qui verò iuvenis est, & circa articulos rosaceos callos concretos nondum habet, & accuratè vinit, & laboris amans est, & alium bonam habet studiorum rationem, hic sanè medicum intelligentiam habentem auctum, sanus fieri poterit. Celsus neque victus rationis, neque exercitij laborisne, quæ tum ad discutiendos

T.



d sentiendos hosce callos, tum præcaven-  
dos non parum momenti habent, ne meminit  
quidem, sed torminibus aut alio quouis ven-  
tris fluxu articulorum dolores leniri dixit,  
materia videlicet peccante ad alium locum  
delata: quanquam podagricis tormina flu-  
xâ se alius frustra superuenerit, si improba  
velut ratione immoderatoque exercitio tra-  
tur æger.

### Item morbus comitialis.

MORBVS comitialis qui ante puberta-  
tem ortus est, facilis solutus est; idque variis  
modis: nam, ut sectione secunda Aphorismorum  
ait Hippocrates, Pueros qui comitali  
morbo laborant, mutationes potissimum æta-  
tis, victus, & locorum liberant. & primo  
Morborum vulgariū: Puerorum morbi  
comitiales unâ cum pubertate mutationes  
habent. & aliās: Siquidem qui facer mor-  
bus à frigida lentâque potissimum causa ori-  
ginem trahat, mirum minime videri debeat,  
si quum huiusmodi materia sors sit victus  
intemperantia, huius mutatione ad meliorem  
statum redacta, sensim materiam resolui,  
atque à morbo liberari: quod etiam accidit  
mutationibus ætatis puerilis in iuuentutem,  
quæ calida & sicca est; & locorum frigidorū  
in siccos.

### & in quo ab vna parte corporis.

QUANQVAM in sacro morbo affectus  
locus sit cerebrum eiusdemque ventriculi,  
contingit tamen interdum primariò; sapenu-  
merò etiam per consensum ipsa affici: sicuti  
puero cuiādam, libro De locis affectis, accidisse  
meminit Galenus: qui quum cœu lentē quan-  
dam auram à genu sensim superiora pen-  
tem sentiret, tandem in comitalem incidit:  
Non parum igitur discrimen est primariò-  
ne ac per se, an per accidens afficiatur cere-  
brum; nam quanto nobilius est membrum à  
quo mali origo serpit, tanto etiam maius pe-  
riculum conuenire solet. Quod ex Hippo-  
crate hic ostensum voluit Celsus: siquidem  
is libro Prædictionum, Comitiales, inquit,  
morbi si à capite initium capere videntur,

aut à latere, aut à manu, aut à pede, faci-  
lius curantur: verum differunt etiam hæc  
morbi genera. Qui enim à capite initium  
sumunt, ex his gravissimi sunt: deinde qui  
à latere: qui autem à manibus & pedibus,  
maximè sanari possunt. Ceterum curam  
agredi oportet medicum, qui medendi mo-  
dum novit, si homines fuerint iuvenes &  
laboris amantes, nisi mens mali aliquid ha-  
buerit, aut quis stupore aliquo attonito fide-  
ram fuerit: nam hæc animalaria menti  
anotiones non sunt conducibiles. Alij vero  
qui ad infernas partes conuertuntur absces-  
sus, boni sunt; longè vero optimi hi sunt qui  
sanguinolentissimi. Celsus pro abscessibus non  
ominino male deiectiones subtrahit: æque  
enim materia peccans à loco affecto per pur-  
gationem educitur, ac per abscessus.

### Ipsa autem deiectio.

HIPPOCRATES secundo Prædictio-  
num, Alii profluvia quæ sine febre sunt, &  
breui tempore durant, & mitia existunt: aut  
enim eluta sedabuntur, aut spontè. Prædi-  
cere autem oportet excretionem subito erum-  
pentem desiccatam esse, quum tangenti ven-  
trem manus nullus motus occurrerit, & in  
fine egestionis fluxus penetrarit.

### Acria tormina quidem periculosa.

SECUNDO Prædictionum Hippocrates:  
At quæ dysenteria commoda sunt, hæc mala  
non inducunt; verum sanguine & ramentis  
egestis desierunt septimo die, aut decimo-  
quarto, aut vigesimo, aut quadagesimo, aut  
intra hæc tempora. Huiusmodi enim ege-  
stiones etiam eos qui prius sunt in corporibus  
morbi sanant; antiquiores quidem diutius  
tempore, recentiores autem in paucis die-  
bus removere possunt. Nam & quæ ven-  
trem gestant, & ipse etiam evadunt super-  
stites, ad parvum, & ex partu, & sæpius  
conseruant, sanguine & ramentis egestis.  
etiam per multos menses, nisi dolor ipsis as-  
suenerit, aut aliud quoddam malum signum.  
Hactenus Hippocrates, semis ætatis quam  
summe in hoc morbo prodesse auctor noster  
docet)



docet) nullam faciens mentionem : quod tamen non cura rationem fecisse videtur ; siquidem si (ut paulo ante inquit idem senex) ex dysenteria maxime moriuntur pueri quinquennales. & seniores adhuc steriles, reliquaque etate, minus, non parum momenti attulerit in dysenteria ad sanitatis recuperationem senilis etas.

### Contrà intestinorum lenitas.

DYSENTERIA seu intestinorum lenitas grauius inuadit seniores, ut secundo Prædictionum inquit Ili poocrates. vehementer etiam vitæ. reliquis autem etatibus minus. Quisquis autem neque in etatibus his est, quas male tractari ab hoc morbo dixi, & paucissima ex seors habet que mala scripsi, hic securissime deperitus est. Indiget autem euacuatione hic morbus, donec urina pro ratione eius quod acceptum est procedat, & corpus ab ingestis cibis augmentum capiat, & a malis colicibus liberatum fuerit. Celsus neque euacuationis neque mutationis coloris ad meliorem statum ullam facit mentionem, quod perfectam nutritionem corporis, etiam color bonus subsequi soleat; sicuti imperfectam deprauatus, quemalmodum in atrophis videre licet. Pueri autem non usque adeo suspecta est intestinorum lenitas, quanquam ob nimiam voracitatem frequentius in eam incidere solent, quod videlicet calore innata plurimum vigeant, qui euacuata materia peccante facile ad pristinum habitum naturam reduxerit. Dysenteria contra eisdem perniciofa est, quod ob caloris copiam, & humoris redundanciam, non solum leuamen aliquid non consequantur, sed multo maius periculum hinc imminet.

### Eadem etas prodest, &c.

COXENDICVM morbus à quadragesimo anno usque ad sexagesimum maxime affligit : atque de eo ita considerationem facere oportet, inquit Hippocrates : Nam inueniens non minus quidem doloris inducit, quam senibus coxendicum morbus ; verum breuior est : nam quadragesimo die liberan-

tur ; sed neque torpores vehementes accedunt, neque perfrigerationes crurum ac lumborum. Quis autem hic morbus est qui idem in lumbis ac cruribus, non autem affligit adeo ut decumbat, considerare oportet an alicubi sint collectiones in coxa, & interrogare an ad inguen dolor progrediatur ; si enim ambo hæc habet, diuturnior sit morbus. Interrogandum etiam est, an in femore torpores insint, & ad popliteum progrediatur : & hæc si constiterint, rursum interrogandum an & per tibiam ad summum pedem procedant. Qui inque enim pleraque horum confessi fuerint, his dicendum est quod crura ipsis aliquando calida, aliquando frigida sint. Quod si morbus in lumbos relinquitur, aliquotus ad infernas partes vertatur, eos confidentes esse iube. Celsus præterquam quod omnia exactè satis reddidit, non ultra rationem nervorum resolutiones adiicit : nam quum affectus hic constetur à multis crassis usque viscidis humoribus, nervos per quos motus voluntarij obveniunt obstruantibus, calore iuuenili idem optimè discentiuntur.

### resolutumque membrum.

QVOD alii deiectione resoluta omnia membra qualia tandem sint, si medicas aliqui admittant manus, inueniuntur, ex antea dictis satis manifestum est. Nam quum ex multitudine humorum fiat resolutio, subueniet statim eorundem purgatio, aut spontè proneniens, aut medicamento purgante irritata : quid voluisse videtur Hippocrates dum ait : At verò in facie distorsiones, si nulli alij corporis parti communicent, citò sedantur, aut sua spontè, aut ad necessitatem coactæ : Coactas vocans eas, quæ aut natura duce aut arte expurgatis humoribus peccantibus in iustam debitamque formam redigantur. Quod & alluisse Celsum verisimile est : illi siquidem nonnumquam handquaquam est, dum sub umbra Hippocratis delitescit, sua studiosius inferere.

### Omniſque deiectio lip- pienti prodest.

LIPPIENTEM alii profusio corripit bonum est

T 2



num est, ut sexto Aphorismorum Hippocrates; quod videlicet biliosis humoribus sanguini mixtis, qui sepe inflammationis oculorum causa est, ad inferna delabitur, ac per alium expurgatur.

#### Aut varix ortus.

HIPPOCRATES sectione sexta Aphorismorum xxi. Melancholicis & venum malis affectis, hemorrhoides succedentes bonum sunt. & xxi. eiusdem sectionis: Infantilibus si varices, aut hemorrhoides supervenerint, melancholia solutio sit: Infantiles vocans illos, ut docet Galenus, quos Græci propriè *μαλὰ γαλικάς* vocant; non illes qui ex bile in furorem rapiuntur. Ac quod in his hemorrhoides æquæ ac varices solutionem morbi polliceantur (sunt enim varices quum in femoribus & cruribus, ex humore melancholico vena latiores sunt) perspicuum cuius est; quum per has humor peccans & purgeatur, & in aliam partem decumbat. Atque hac etiam ratione infantilibus supervenientia tormina auctor noster prodesse dicit: de quibus etiam septimo Aphorismorum ita scriptum reliquit Hippocrates, A furore difficilis intestinorum, vel aqua inter cutem vel mentis alienatio, bonum.

#### Humerorum dolores qui ad scapulas.

HIPPOCRATES in Prædictionibus, Dolores in humeris fientes, qui quidem ad manus descendunt, torporem ac dolores inducunt; his abscessus non succedunt, verum magis bilem vomientes sanantur; qui verò isthic in humeris manent, aut etiam ad dorsum progrediuntur, eos puris aut atra bilis vomitu effugiant. Verum de his ita considerationem facere oportet; si quidem enim facile spiraverint, ac graciles fuerint, atram bilem ipsos vomituros spes est: si verò difficilius spiraverint, & in faciem ipsis color incurret qui prius non erat, sine rubicundus, sine niger, eos magis puris spirituros esse sperandum est. Ad hæc verò etiam considerandum est, an in pedibus tumores sint:

nam & hoc signum in his consentit. Atque hic mortis viris vehementissimus esse solet à quadagesimo anno ad sexagesimum. Celsius neque expuitionis puris, neque aliorum signorum quæ consideranda monet Hippocrates, mentionem ullam facit; idq; fortassis idèd, quod quum illi antea sermo fuisset de iis quæ atra bilis expurgatione solvantur, de illis etiam quæ eiusdem vomitu curantur, dicendum putaret: quanquam melius fuisset (ut Hippocrates fecit) singulas ad amissum notas explicuisse; nam dum subiungit: Et quilibet dolor deorsum tendit, sanabilior est, id ex abrupto quadammodo fuisse videtur: siquidem quum iam antea frequentius id ab eo inculcatum sit, frustra hic (ubi, si usquam alibi, nunquam brevitati studuit) eandem canilenam, cuculi in morem, sapius cecinerit. Quare dum de iis qui sursum tendunt doloribus loquitur, referendum ad antedicta arbitror; ita ut humerorum dolores qui ad scapulas vel manus tendunt, sanabiles sint si deorsum vergant.

#### Singultus sternutamento finitur.

SINGULTUS, sicuti etiam convulsio, ex inanitione æquæ sit ac repletioni; & qui ex inanitione sit, aut incurabilis est, aut curatu admodum difficilis: qui autem à repletioni sit, sternutamento potissimum solvitur; nam sternutando non solum cerebrum, sed & ventriculus ob nervos qui à cerebro ad stomachum derivantur, vehementer concutitur: quo fit ut violento hoc motu agitati humores peccantes euacuentur. auctor est huius sententia Aphorismorum sectione sexta Hippocrates: Singultus enim si superveniant sternutamenta, solvitur singultus.

#### Longas deiectiones superimit vomitus.

LONGAS deiectiones vocat eas quas Græci *διὰ τὰς* atque quod huius sponte superveniens vomitus salutaris sit, atque ab alii prosumo liberet, auctor est Hippocrates sectionis sextæ Aphorismorum Aphorismo xv. idq; non



idq; non tantum quod materiam peccantem alio renellat; sed etiam quod induci naturam sibi constare, atque ad sese iam redire; atque adeo retinendam interuorum virtutem quæ hæcenus debilis fuerat, roborari.

### Mulier sanguinem vomens.

MULIERI sanguinem vomenti (inquit XXXII. Aphorismorum sectionis quinta Hippocratis) si menstrua eruperint, mali solutio fit; idq; auersum est ad contraria loca facta: quare passim nunciat Galenus, ut naturam ducem sequentes, mulieres hac passione laborantes, nullo ex vena sanguine curemus. vide librum De sang. missione.

### Quæ menstruis non purgatur.

NATURA ita constitutum est mulieribus, ut statim temporibus singulis mensibus sanguine quodam impuro ac quodammodo sæculento purgentur: quod si quando minus fiat quam pro consuetudine solebat, variis affectibus ob impuri sanguinis fuliginem, principum animæ sedem atque adeo vniuersum corpus ledi contingit: quare quum natura de possibilibus, ut ait Philosophus, id quod melius est operetur, ac per debitos & à natura constitutos meatus abundanter illum sanguinem expurgare non possit, per alia maxime conuenientia loca, id efficere conatur, atque huic quidem negotio opportunissime se habent nares; post hæc hæmorrhoides: nonnunquam etiam quoties neutrum horum satis succedit, impuro illo sanguine, per vomitum sese exonerat: & quod magis mireris: Nonnus Forni municipio Flandriæ Occid. anno 1548. mulierem: cui quum forte fortuna elisus dens esset, mensesque subito præter consuetudinem suppresserentur, illinc tanquam ex gurgite quodam multis repetitis vicibus, (atque id eo potissimum tempore, quo menstrua purgatione exonerari solebat) sanguis copiosissimus effluxit. cui quum primis diebus nequaquam operam nostram impenderemus, indicamus, ut postmodum euentus docuit, huiusmodi fluxum

purgationem criticam esse, atque quum minime irritandum: quare quum consideremus, quem esset habuimus finem sanguinis hic fluxor, percepimus singulis mensibus reperere; idq; certis non solum diebus, sed & horis, finiri pro mensuræ purgationis ratione. Atque hoc quidem quoniam quam maxime à natura alienum esse (in si ipse præsens animaduertissem & uissem) putari, attribuendum ratus sum; idq; potissimum quod locus iste hoc quoque efflagitare uidebatur: nam & Galenus in Commento Aphorismi XXXII. sectionis quinta, Hippocratem quauquam dicti sanguinis è naribus fluxorem bonum deficientibus menstruis (sicuti etiam hoc loco auctor nosler) non tamen negare quin alia quæ natura sunt, ducere purgationes, aut reiectiones profint.

### Quæ locis laborat.

LOCOS non vocat eas quas secundas Latini, Græci *ἡσυχία* appellant (quanquam & ita à partu retentis, non inconueniens sit sterminatio) sed uicem: nam, ut Plinius libro XI. cap. XXXVII. Feminis, inquit, eadem omnia, præterque vesicæ iunctus utriculus, unde dictus uicem: quod alio nomine Locos appellant, hoc in reliquis animalibus uulnam. Atque ita quidem Hippocratem retulerit Celsus, qui sectione quinta Aphorismorum Aphorismo XXXV. ita scripsit: Mulieri quæ uicinis molestat, aut difficulter parit, sterminatio bonum: Per locos laborantes uicinis affectionem intelligens, ut docet Galenus eam quæ strangulationem ab utero nominant. Indicat autem sterminamentum uicinis robur: & quæmodum paulo antè diximus, quæ fixius corpori adhaerebat, uehementiore coccisione excernuntur.

### Æstiuæ quartana ferè breuis est.

ÆSTIVÆ quartana, ut secundo Aphorismorum Hippocrates, magna ex parte breues sunt; autumnales uero longæ, maxime quæ hiemem attingunt, quod uidelicet, ut auctor est Galenus, æstare ferè breues morbi accidunt, calore mirum augentis aeris redundantibus



dundantes humores per uniuersum corpus diffundente, ac meatibus corporis (quos πύλα Græci nominant) patefactis, quam celeritate discutiunt. Autumnales uero longiores sunt, quod æstatis calore vires imbecilliores sunt factæ, neque ad expellendos humores noxios satis habiles, tum quod humores in uniuersum corpus non ferantur, tum quod ob autumnalis aeris inæqualitatem, ac ad frigus proclinitatem, pori obstrui incipiunt. Hieme uero longissima sunt quartana, tum ob meatuum conspationem, tum ob humorum cruditatem.

### Cui calor & tremor est, salutis delirium est.

QVAM si hæc sententia uero consona, ego dubito: siquidem est Hippocrates Aphor. sect. sexta Aphor. XXVI. Ὁ ὀσπρὶς οὐ τοῖσι καὶ ὀσπρὶσι τῶμοι γίνονται, πρὸς τὴν λέει, hoc est, Quibus in ardentibus febribus tremores sunt, iis delirium succedit, aut delirio soluntur: non dixit tamen senex ille, delirium illis salutis esse; sed ex ardenti febre subsequi delirium: quod cerè ut non minus periculi, quàm ardens febris secum affert, ita non possit quisquam rectè dicere, delirium ardenti febre superueniens salutis esse. Neque enim mirum est Celsum hic lapsum esse, quum τὸ λέει, amplam illi occasionem præbuerit: siquidem quum Hippocrates hæc dictione non raro omnimodam morbi solutionem intelligere soleat, nonnunquam etiam (ut rectè Galenus monet) morbi in aliam affectionem transmutationem, ut hoc quoque loco fecit: Celsus maiorem rationem habens humoris noxii qui ab una parte in aliam feratur, quàm partis affecta, quando delirio corripuntur homines, τὸ λέει, tanquam salutiferum interpretatus est; quum potius Hippocrates tremores seu τῶμοι signum quodammodo instantis delirii posuerit, materia uidelicet peccante quæ in febribus ardentibus intra uasa continetur, ad nervos translata: quo fit ut quum nervorum genus affectum sit, leuissima quaque de causa, nervorum principum (quod omnes uno ore cerebrum esse faciunt) coafficiatur; idque potius

sumum, quod sua lenitate vel subtilitate bilis facillimè superiora petat, unde & in ardentibus febribus, si tremores superueniant, deliria comitari consueverunt.

### Lienosis bona tormina sunt.

GENERALIUS nonnihil quàm Hippocrates Celsus de torminibus quæ superueniunt lienosis, pronuntiatum reliquit: siquidem ille dysenteriam longam lienosis superuenientem suspectam adeo habuit, ut & mortis periculum portendere crederet. Dicit enim Aphorismorum sectione sexta Aphor. XLIII. Quicumque lienosi difficultate intestinorum corripuntur, iis longa difficultate intestinorum facta, aut aqua inter cæcis, aut intestinorum lenitas succedit, & moriuntur: quod uidelicet naturalia omnia munia ob hepatis imbecillitatem pelsum eant: breuem uero dysenteriam adeo commendauit, ut morbi suspicionem omnem miserre diceret, expurgato nimirum humore lenem grauantem. inquit autem tum in Aphorismis, tum in Coacis prænotionibus Hippocrates, Dysenteria non longa spleneticis utilis est, longa uero mala.

### Denique ipsa febris (quod maxime mirum, &c.

FEBRIS, sicuti corpori plurima incommoda affert, ita nonnulla etiam habet commoda: nam calore suo nonnunquam crassus ac lentos humores incidit; quemadmodum iam antè de sideratione ex Hippocrate retuli, & in præsentiarum quoque auctor noster dicit. atque hac ratione præcordiorum dolores si sine inflammatione sunt, lenit: nam, ut sexto Aphorismorum Hippocrates, quibus dolor circa præcordia sit absque inflammatione, febris superueniens soluit. Cæterum hypochondriaci huiusmodi dolores, qui febre succedente sanantur, genere triplices sunt, ut in Comento docet Galenus: aut enim ab obstructione, aut à spiritu flatulento, aut frigida aliqua inæqualitate temperie fiunt. Eodè referre potes, quæ de iecinoris dolore Celsus ascribit.

& nec-



## &amp; neruorum distensionem.

HIPPOCRATES Aphorismorum sectione quarta, Quicumque convulsione, aut distensione affligitur, si febris succedit, morbum soluit: & sectione secunda, Melius est convulsioni febrem succedere, quam februi convulsionem. Convulsioni etenim superuenientes febres, superfluum dissolunt humiditatem, frigiditatemque, quæ viræque medicis sunt remedium intentiones.

## &amp; ex difficultate urinæ.

QUEM Græci eleon vocant, Celsus tenuis interitus morbum periphrasticis nominat: verum hic præter morem clarus admodum est; nam præterquam quod Hippocratis sententiam planissime reddidit, rationem quoque eiusdem quam potest brevissime explicat, dum dicit, si urinam per calorem mouet. nā Hippocrates febrem quidem lenare dicit, at qua ratione id faciat, insinuat: dicit enim, Quibus à stillicidio urine eleos superuenit, intra septimum diem moriuntur, nisi febre succedente urina satis effluat. Galenus certe quum neque ratio, neque experientia eorum quæ in hoc Aphorismo scribit Hippocrates indicet, veritatem ingenne fateatur se ignorare, præsertim quum febris eleo seu voluulo intestinis inflammationem patientibus nullo modo prodelle possit. Quare Leonartius Euchsius intelligendum Aphorismum arbitratum ita, ut si eleos urina stillicidio non succedat, tum demum superuenientē febrem morbum solvere: quod certe nec Celsus, nec Græca Hippocratis lectio voluisse videtur, quæ ita habet: Οὐδὲν γὰρ ἐκ τῶν ἐν τῇ ἐκείνῃ ἐπι-  
*ῖναι, ὅτι ἐπὶ τῇ αἰσθητικῇ ἀποδυνάμει, ἢ  
ἐν πνεύματι ἐπινοοῦνται ἄλλοι τὸ αὐτὸ  
εἶναι, quo fit, ut putem Hippocratem & Cel-  
sum existimasse aliquem esse voluulum, qui  
non ab inflammatione, sed a materia fri-  
gida originem trahit, atque huic (consert  
enim febris morbus qui vel ex frigiditate  
sunt aut sola, aut cum humoribus crudis, &*

pituitosis mixta, atque iis qui à spiritibus flatuosis sunt) recte mederi dixerint.

## At dolores capitis.

HIPPOCRATES in Prædictionibus. Primum quidem ex capitis doloribus aliqui sunt leues; aliqui multo grauioribus: utrosque verò hoc modo considerare oportet. Quicumque hebetem visum habent, & rubor quidem ipsi sit in oculis, & prurius frontem vexat, his sanguis sua fronte manans opituitur: atque hic molus necessario simplex, neque id mirum est, quum & oculorum caligo, & rubor cum quadam frontis prurigne, sanguinis abundantis certa admodum signa sint.

## Si capitis ac frontis dolores.

IAM recitate sententiæ statim subiungit Hippocrates, Quibus verò dolores circa caput & frontem ex magnis ventis sunt, & ex frigoribus, quum vehementer calefacti fuerint, eos grauedines quidem, quam maxime perfecte liberant. Præsumunt autem & sterutationes, & mucri in naribus fientes, magis quidem sua fronte, si minus coactæ. Celsus nescio quā recte à frigore & æstu indifferet grauedine aut sterutatione capitis dolores sanari dicit; Hippocrates ex frigoribus tantum, quum vehementer calefacti fuerint: quare τὸ αὐτὸ ἔστω καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ ἔστω, quasi dicat post æstum: ac sic recte constabit sententia, & cuius satis obuia erit, necessum est enim pituitosis humoribus expurgatis, dolores quoque minui.

## Febrem autem ardentem.

HIPPOCRATES Aphorismorum sectione quarta, A febre ardente habito rigore superueniente, solutio. quem Aphorismum libro De indicationibus secundo ita interpretatur Galenus. In ardentibus, inquit, febribus singule accessiones ad integritatem non perueniunt, quoniam qui earum est causa humor, haud expurgatur, sed una cum sanguine in venis continetur. verum quando in iis bilis vehementius agitur ac veluti effervesceat,



effruescit, quinque à natura impellitur, tum rigor supervenit, & solvitur febris.

### Si in febre aures obtuse sunt.

HIPPOCRATES Aphorismorum sectione quarta Apho. IX. Quibus in febrili aures obsiduerunt, iis sanguis è naribus profluens, aut alius turbata morbum solvit. Et eadem sectione Aphorismo XXVIII. Quibus biliosa deiectiones sunt, iis surditate superveniente desunt; & quibus surditas præcedit, iis deiectionibus fluentibus finitur. Nam quum aurium dolor, à biliosa materia fiat, rationi consonum est, ea expurgata surditates quoque finiri. Caterum studio quodam biliosæ deiectionis, & ventris resolutionem fecisse videntur Celsus; idque ut diceret non solum diarrhæa, sed & torminibus, & aliis quibusvis ventris biliosis deiectionibus surditates compesci: nam ut in indicationibus ait Hippocrates: Quibus in febrili aures surdesunt, si necessario febre non discussa delirant: quod quidem delirium sanguis è naribus fluens solvit, vel si venter solutus biliosa dimittat, vel si difficultas intestinorum supervenerit, vel coxendicium, vel genuum dolor.

### Quibus in fistula urinæ.

HIPPOCRATES Aphorismorum sectione quarta: Quibus in urinaria fistula interculum oritur, iis suppuratione facta, aut eruptione, mali solutio fit. Fit autem solutio, aut (ut Celsus loquitur) sanitas redditur, sedato dolore, & urina profluente: solent enim huiusmodi tubercula, ut rectè monent Galenus & Philothæus, dolores excitare, & urinam propter tumorem suppressere; unde consequens est solutionem fieri post urinae eruptionem. Alij abscessus loco apices hic legere malunt.

### Contrà, si caput febre continenti dolet.

DIGREDITUR iam ad aliud signorum genus, id videlicet, quod in quovis morbo

periculum instans præfagiat, ac statim inter initia, indissolubilem quandam ceu Gordium nodum nolis reliquit; adeò ut dum interpretationi studeamus, ac locum loco redere conamur, quid tandem in medium proferemus, hæsitandi subliterimus: nam quantumvis ea quæ de dolore capitis circa ullam excretionem variis locis Hippocratis applicari queant, ea tamen quæ de etatibus adiungit, iisdem nulla ratione accommodari possunt. Nam quod Hippocrates in indicationibus dicat, Puris per nares, aut aures eruptione capitis dolores solvi, mirum non est: quum idem eosdem ex bile in initio statim fieri dixerit, ac quod capite dolentes periculo non vacent, nisi aliquo modo expurgentur, tum alibi, tum libro quem De morbis inscripserat manifestum fecit: quod ut clarus fiat, unum aut alterum exemplum subiungemus. Dicit autem: Si vena circa cerebrum sanguinem emiserint, ac cerebrum calefecerint, febris emergit fortis, & dolor ad tempora, & sinuiput, & posteriorem capitis partem, & aures innuunt, & flatus implentur, & nihil audit, & anxius est, & seipsum præ dolore iactat: hic sexta aut quinta die moritur. Quum sic habuerit, caput ipsius calefacito; si enim per aures aut nares aqua eruperit, mortem effugit. Et paulo ante de alio morbo: Dolor, inquit, caput corripit, & si paululum moneatur, bilem emet; quandoque etiam difficulter urinam emittit, & desipit; quandoque septima die moritur, & vox quoque & undecima septimanam transgressus, si non eruperit per nares, aut aures, si vero eruperit, evadit: fuit autem aqua subbiliosa; deinde temporis progressu purrefacta, pus fit. Quod Celsum uoxum omnino voluisse credemus, nisi etatis puerilis meminisset, quod nunquam Hippocratem fecisse comperimus: quare aut mendum his subesse suspicamur, aut Celsum pueris huiusmodi periculum ascripisse, quod per vitæ inconitinentiam, in biliosos potissimum morbos incidunt: quales sunt, & febres continentes, & capitis dolores, qui nisi bilis purgatione solvantur, lethales admodum sunt, & quam ocysimè interierunt.

In pul-



## In pulmonis morbo.

DICTVM autē est, secretionem quæ citò inter inuia sit, atque leniter feritur, bonam esse; malamque quæ ei contraria sit, hoc est quæ post principia, puta post septimum diem fiet, & quæ cum difficultate excernatur, qualis ea quoque est quæ iussim monet.

## Quantoque magis mixtos.

HIC varietatem excretionis vituperat, ac deterioiorem dicit quo magis mixtos colores, neque inter se diuissos præ se ferat, quòd videlicet talis non solum materiae malitiam, sed & cum varietate multitudinem quandam denotet, ad cuius concoctionem & excretionem vires suffecerint, quum omnes ex æquo humores peccent.

## Et tamen nihil peius est.

HIC aliud longè inferre videtur, quàm iam antè pronuntiavit: quum, si quis rem penitus inspiciat, hæc cum antedictis maxime conveniant: nam quamvis excretiones eo peiores iam antè dixit, quo magis mixtos colores, neque inter se aduictos aut separatos habeant, non sequitur tamen Celsum iam contrarium asserere, quum omnium pessimas sinceras dicit: nam quæ mixtæ sunt, neque vnum aliquem præ se ferunt colorem, quantumcunque varietatem humorum peccantium denotent, non tamen vnius alicuius humoris in summo excessum, quod sincera faciunt, portant. Appellatur enim sincera tum deiectiones, tum excretiones, Galeno teste, quæ vnum aliquem duntaxat, qui excernitur, humorem cæteris impermixtum habent: ac quòd hæc mala sint, passim docet Hippocrates; nam deiectiones, inquit, in sinceras spirituosasque desinentes, exacerbant. & in Prædictionibus: Scretio flaua si sincera est, cum periculo est: nam quicquid alius humor præter sanguinem, si sincerus fuerit, prauam indicat affectionem, quæ à flammido calore obrineat generationem.

## Siue ruffum est, siue cruentum.

QVONIAM hæc periculus ex Hippocrate, ut totus serè hic Celsi liber, transumpta est; senis Cui verba, ut hæcenus feci, ascribam: verum quoniam ne sic quidem satis clara reddetur sententia, breuiter ex Galeno enarrationem subiiciam. Inquit autem in Prædictionibus Hippocrates: Si quis longè post principium doloris expuerit quod flammum est, aut solum, aut quod multam iussim inducat, & non valde permixtum est, deterius est: nam & flammum meracum periculosum est; & album, & viscosum, & rotundum inutile est: malum est & quod viride valde est: itémque pallidum & spirituosum. Si verò ita fuerit meracum, ut etiam nigrum appareat, hoc etiam deterius est quàm illa. Malum etiam est si nihil repurgetur, neque emittat, pulmo, sed plenus feruat in gutture. Grauedines & sternutationes in omnibus circa pulmonem morbis, & antecessisse & succedere malum est. at in aliis morbis leuissimis sternutationes profunt. Omnia spura sunt mala quæ dolorem non sedant; pessima verò sunt nigra. Hæcenus Hippocrates: quem auctor nosser dum reddere studet, nonnulla inuenit, ac alia quodammodo suo more confundit: nam pro non admodum permixtis excretionibus, valde permixtas reddidit; idq; qua ratione, iam antè dictum est: quanquam si quis hic mendum subesse putet, ac tò magis mixtos, in tò minùs mixtos, Hippocratem secutus, conuertere malit, per me integrum est. Sed neque contentus hoc loco ab Hippocrate desinisse Celsus, album, ruffum, glutinosum, pallidumque spiritum sine ullo discrimine eodem habuit loco; quum Hippocrates in his maximum discrimen statuerit: siquidem ut sanguinea ac pituitosa affectiones modestissimè se habent, ac agrotationes quæ ab atra aut pallida sunt bile difficiliores; ita (quod ad periculum attinet,) merito primas obtinuerint atrabilaria, ac biliosa, quales nigra sunt ac flaua: post hæc pituitosa, in quo albo glutinosa ac candida sunt.

V

At quod



At quod ad horum colorum causas attinet, ut in Commento docet Galenus, flavus red-  
ditur ubi serofus ipse humor assatur, quo  
permixto croceus ipse apparet: rubiginosus  
verò ubi vehementer assatur: niger verò,  
aut quoties ipse vehementer assatur (qua  
sanè deterrima & quammaximè derodens  
atra bilis est) aut ubi crassus sanguis simili-  
ter exsiccat, aut ubi calor naturalis ex-  
tinguitur, ac refrigerationis periculum im-  
minet; unde non immeritò pessimas omnium  
nigras excreationes vocat. Spumantes au-  
tem excreationes, quauquam per se inutiles  
sint, uti pituitose omnes expuitiones, si ta-  
men tantummodò parum spumârint, inter  
exitiosas omnino non veniunt numerande:  
siquidem quum fiant ex aëria & glutinosa  
substantia pariter mixtis, facile resolventur,  
nisi & pituita crassior fuerit, & nebulosam  
turbulentamque materiam continuerit, unde  
spumam quæ & vehemens sit, & qua dif-  
ficulter resoluitur longumque tempus duret,  
consequi ratio est. Sternutamentum verò  
quum aliis morbis salutare sit, hic malum  
ominatur, quòd & distillationes magna ex  
parte subsequatur, quæ malis humoribus pul-  
monem repleat, & quòd quum eo vehe-  
menter concutitur thorax, pulmonem vitiet  
atque ad distillationes suscipiendas habilio-  
rem reddat.

### Periculosissimumque est, si hæc, &c.

NON omne alui profluuium pleuritidi  
ac peripneumonia succedens malum dicen-  
dum est. Est namque quum in mediocri  
pulmonia, aut morbo laterali aluius turbata  
bono sit, idq; si materia peccans expurgetur,  
& concoctionis aliqua signa appareant. In  
vehementi tamen pleuritide, aut peripneu-  
monia superveniens diarrhoea est lethalis ad-  
modum, atque exitialis, ut docet Hippocra-  
tes Aphorismorum sectione sexta Aphor. xvii.  
quòd significet membris spiritalibus lasis na-  
turalia coacti, neque naturam functiones  
suas obire posse. Quare verisimile quoque  
est Celsum nostrum non de quavis pulmo-  
nia, sed vehementi tantum locutum: nam

& ea quoque quæ hucusque retulimus, ma-  
gnitudinem morbi indicabant.

### Ex iocinore si pus crucntum.

SENTENTIA hæc paulo antè, capitis  
huius videlicet § quinto, explicata est, de-  
sumptaque ex sectionis septimæ Aphor. vii.

### At ex suppurationibus.

HÆC accommodare potes quæ § sexto  
& septimo huius capitis retulimus.

### Atque ex his quidem sup- purationibus.

DE utrisque etatibus scriptum reliquit  
Hippocrates: nam in Prædictionibus, Qui  
purulenti, inquit, ex pulmonia sunt, si ma-  
iores natu fuerint, citius intereunt; per alias  
verò suppurationes minores natu potius mo-  
riuntur: nam ad sanationem peripneumo-  
nia, opus est viribus robustis ad excreatio-  
nem, quæ in etate declinantibus etiam de-  
clinant; in iunioribus autem adhuc valide  
sunt. Aliæ autem suppurationes iunioribus  
potissimum suspectæ sunt, quòd quum ma-  
gna ex parte calidi ac biliosi sint natura, ad  
febres ac deliria opportuniùs sese habeant: ac  
de iis quidem in iisdem Prædictionibus ita  
scriptum reliquit Hippocrates: Aurium dor-  
lor acutus cum febre continua ac vehementi  
difficilis est; periculum enim delirii, aboli-  
tionisque imminet. quia igitur fallax hic  
locus est, citò etiam animadvertere omnia  
alia indicia à primo die necesse est, natu mi-  
nores septimo die, aut citius, ab hoc morbo  
interiuntur; natu verò maiores multo  
tardius.

### At in tabe sputum mixtum.

QUÆ suppurantur, inquit in Prædictio-  
nibus Hippocrates, dum creatio biliosa est,  
exitiosa admodum sunt, siue vicissim bilis  
ac pus, siue simul excreantur: quòd Celsus  
per sputum mixtum ac purulentum voluisse  
verisimile est. Quæ subiungit de febre, siti,  
tenuique corporis constitutione si contraria  
omnia



omnia ad tabidorum sanationem facere diximus, hac plurimum obesse necessarium est.

### Si quis etiam in eo morbo.

**V**IDES quanta breuitate multas in unum Hippocratis sententias cogat: nam sectionis quinta Aphorismum undecimum & duodecimum, & secundi libri Prognosticorum Aphorismum xxxv. complectitur: siquidem hic ita scriptum reliquit Hippocrates: Pingue telis auaneorum simile in urinae superficie natans, damnandum est; indicat enim consumptionem. In Aphorismis autem: Qui tabe molestantur, si sputum quod extrusum, graueolet iniectum carbonibus, & capilli à capite desiliunt, lethale est: & quibuscunque tabe laborantibus capilli à capite desiliunt, iis alui superueniente profluvio moriuntur. Et XIII. eiusdem sectionis: A tabe habito profluvium alui superueniens lethale est. Hæc enim omnia maximam naturæ imbecillitatem denotant. Nam capillorum desiliunt, citra maximum alimenti defectum aut humorum corruptionem fieri non potest; alui autem profluvium virium imbecillitatem comitari solet.

### Utique si tempus autumnus est.

**Q**UANTOQUAM autumnus exquisitè inequalis dicatur, non possumus tamen negare, quin ad frigidum & siccum tendat. Quare quum æstatis præcedentis calore, corpus nostrum rarum ac perspirans facile redditum sit, ab autumnum tum inequalitate, tum frigiditate, tum etiam siccitate, exhaustum exsuccumque tabidorum corpus, tenuissima de causa afficitur: quo fit ut non solum autumnum in Epidemias tabidis malum dixerit Hippocrates; sed & ver, quando ficus folia cornicis pedibus similia habet, hoc est ipso veris principio, quando videlicet hiemem aliqua ex parte refert, & quando minimè constans ac temperatum est.

### Item pus expuisse in hoc morbo.

**H**IPPOCRATES sectione septima,

Aphorismo XVI. A puris sputo tabes & fluor: quum verò sputum retinetur, moriuntur; quia videlicet significat facultatem expultricem imbecillam adeò esse, ut pulmonem per creationem amplius liberare non possit: unde periculum est interceptionis spiritus, & suffocationis.

### Solent etiam in adolescentibus.

**H**IPPOCRATES secundo Prædictionum: Quicumque verò pectore suppurati facti fuerint, dum imenes sunt, ex humorum illapsu aut fistula, aut alio quopiam huiusmodi, aut ab abscessu recursum, hi non evadunt nisi multa bona signa ipsis accesserint: pereunt autem homines hi ad autumnum. Sed & ex aliis morbis longis plerique ad hoc tempus maximè moriuntur. Ceterum ex aliis minimè superstites manent, & virgines, & mulieres, quibus ex suppressis mensibus tabes orta est. Si verò aliqua virgo aut mulier evasura est, & aliorum signorum bona multa accedere oportet, & menses splendide ac pure apparere, aut nulla spes est. Quæ virginibus tam Celsus quàm Hippocrates ascribunt, antè dixi. Verum Celsus hic, ut antè quoque, super tabem mensurua suppressi dicere maluit, quàm cum Hippocrate, à suppressis mensibus tabem oriri; idque quod præsentissimum remedium censuerit mulieribus, aut virginibus tabe laborantibus, puram splendidamque mensum purgationem.

### Cui verò sano subitus dolor capitis.

**H**IPPOCRATES sectionis sexta Aphorismis LI. & LII. Si quibus bene valentibus dolores capitis repente accidunt, statimque obmutescunt & stertunt, intra septem dies pereunt, nisi febris apprehendat. Considerare verò oportet oculorum per somnum suspensiones: si quid enim candida partis commissis palpebris apparet, neque ex alui profluvio, neque ex purgantis medicamenti potione istud contingat, prævum est signum, & admodum exitiale. Quos Aphorismos, metathesi



metathesi quidam verborum usus auctor conuinxisse videtur. Est autem illi sermo de apoplexia, quam (ut antè iam dictum est) vehemens feltris igneo suo calore dissolvere poterit, crassus nimium & pituitosis humoribus extenuatis.

### At aqua inter cutem si ex acuto morbo.

HIPPOCRATES in Prognosticis, Aqua inter cutem omnis, si ex acuto morbo existit, mala est: non enim sedat febrem, sed dolorem alioquin infert, ac mortem, ferèque incipit ex parte inani, ac lumbis iccorèque.

### æquè in ea quoque tussis spem tollit.

AQUA inter cutem laborantibus, inquit Hippocrates sectione sexta Aphor. XXXIII. Si iussis supervenerit, malum est: nam significat aquosum humorem ita adanctum, ut iam asperam etiam arteriam occupet, atque adeo suffocationis periculum imminuat. Nam & quum insuendi cupiditas sit (ut in Prasagis Hippocrates) nihil excreant commentatione dignum, destitenti videlicet facultatibus naturalibus, quum earum origo iecur affectum sit.

### Item si sanguis sursum deorsumque.

HIPPOCRATES secundo Prædictionum, Cui verò multum sanguinis sursum ac deorsum eruperit, & febris insuper accesserit, eum multa aqua repletum iri timor est: atque hic hydrops brevissimi temporis est, ut ex quo paucissimi evadunt. verum de hoc alteri prius significare oportet. At quibus magni tumores facti emarcescunt, ac rursus attolluntur, hi magis convalescunt, quam illi qui ex sanguinis eruptione implentur: verum fallunt hi hydropes ipsos egrotos, faciuntque, ut ipsi à medicis discedant, atque pereant. Ceterum quæ à sanguinis illa eruptione oritur hydrops, ut impediant sanguificationem ab universi corporis refrigeratione ac caloris innati omnimoda extin-

ctione significat; ita etiam maximum periculum indicat.

### Illud iure aliquis mirabitur.

QUI suppurati (inquit Hippocrates sexta Aphorismorum sectione XXVI. Aphorismo) aut aqua inter cutem correpti videntur, si pus aut aqua confertim effluerit, omnino intereunt: idque quod copiosa hæc puris aut aquæ enacuatio spiritus vitales exsolvat, atque deliquium animi inducat: sicut fieri videmus, ut ait Celsus, in his qui quum sani sint, ex vulnere exangues fiunt.

### Articuli verò qui sic dolent.

SECUNDO Prædictionum Hippocrates: Quicumque, aut senes sunt, aut circa articulos callos tophaceos concretos habent, aut arummosè vivunt, aut siccam aluum habent, hi omnes sani fieri non possunt humana arte, quantum ego novi. Sanant quidem hos optimè dysenteria, si successerint. Celsus leniri quidem, ceterum ex toto solvi non posse dicit, neque ullam arummosa vitæ aut sicca alui mentionem facit; quod, ut habet ille, solvere nodosam nescit medicina podagram: quanquam ad tophaceos illos callos in interioribus remedia satis multa, eaque efficacia, tum veteres tum recentiores excogitarint.

### Morbus quoque comitialis.

HIPPOCRATES secundo Prædictionum: Ex his porro qui à sacro morbo corripimur, difficillimè quidem liberantur hi quibus à puero contingit morbus, & simul ad virilem ætatem pervenit; deinde hi quibus corpore in vigore ætatis constituto factus est, & fuerit à viginti quinque annis ad quadragessimum quintum. Post hos autem quibus factus fuerit morbus, nullam significationem præbens, ex qua corporis parte initium sumat. At quibus ex capite initium capere videtur, aut à latere, aut à manu, aut à pede, facilius curantur. Poteris huc accommodare



commodare quæ iam antè de convulsivis epilepticis diximus, ubi horum serè omnium rationem reddidimus.

Si verò aut mens læsa est.

ELEGANTI periphrasi fortem siderationem (apoplexiam Græci vocant) expresserit, si tò aut in & commutatis: in ea enim & mens læditur, & quum animalis facultas ventriculis cerebri obstructis interceptatur, nervorum resolutio sequitur; ita ut non raro auctor noster, per nervorum resolutionem, simplicem, atque parvam apoplexiam intelligat. Atque quod huiusmodi sideratio perniciofa sit, neque curationem admittat, docet Hippocrates XLII. Aphorismo sectionis secundæ: Apoplexiam solvere fortem impossibile est: verum quoniam in sequentibus eundem Aphorismum repetit, ne *πρωτόδοξος* accusandus veniat Celsus, paulo aliter hic locus interpretandus videtur, ita ut mentis alienationem, ac nervorum resolutionem in omni morbo malam dicamus. sic eiusdem sectionis Aphorismo XXXIII. In quavis morbo, inquit Hippocrates, mente consistere, & bene se habere ad illa quæ offeruntur, bonum; contrà verò se habere, malum: quod videlicet significet cerebrum ipsiusque membranas affectas.

Deiectionibus quoque si febris accessit.

HIPPOCRATES secundo Predictionum: Dysenteria si quidem cum febre invaserint, aut variis alni ogestionibus, aut cum hepatis inflammatione, aut precordij aut ventris, aut quæ dolorosa fuerint, aut cibos interceptiunt, sitimque inducunt, hæc omnes male sunt, & quæ sanè plurima horum malorum habuerint, citissimè peribit; cui verò paucissima talium fuerint, huic plurima spes sunt. Moriuntur autem ex hoc morbo maximè pueri, qui quinquennes; & seniores adhuc decennes: reliquæ ætates minime. Repetit hæc sententia, tum epidemion VI. part. VII. Aphor. I. tum Aphorismorum sectione VI. Aphor. III. in hunc modum: In diuturnis intestinorum

difficultatibus cibi fastidia malum portendunt, & si cum febre accendant, peiora. Neque enim singula hæc enumerata mala exitium statim portendent, nisi longas dysenterias comitentur; nam alioquin nisi multa concurrant, spei aliquid reliquum erit. Quod autem de varia alio dicit, hoc est de variis alni ogestionibus, etiam si Aphorismorum sectione secunda Hippocrates in alni præsturiis excrementorum mutationes innare dicat, nisi ad mala fiat mutatio: non tamen temerè id fecisse videtur; præsertim quum verisimile sit, in tanta pravorum signorum syndrome, excrementorum etiam mutationes ad malum fieri: atque sic quidem quam maxime periculum augebit, quod nimium varietatè materiæ peritis denotent. Nam (ut quarto Aphorismorum Hippocrates) Deiectiones nigre, qualis est sanguis niger, spontè venientes, siue cum febre, siue sine febre, pessime: & quanto colores magis pravi fuerint plures, perius; cum medicamento verò, melius; & quanto colores plures non pravi.

Mulier quoque grauida.

HIPPOCRATES paulo post in Predictionibus iam iam citatum locum: Quæ, inquit, & vterum gestant, etiam superstitres magis evadunt ad partum, & ex partu, & foetus conservant, sanguine & ramentis egestis, etiam per multos menses, nisi dolor ipsis affuerit, aut aliud quoddam malum signum, ex his quæ in dysenteriis fieri scripsi, accesserit. Si verò aliquod illorum apparuerit, & foetui perniciem significat, & prægnanti periculum, si non post foetus effugium, & secundæ exolutionem ipsa dysenteria eadem die, aut post modicum tempus desinat.

Quinetiam tormina ab atra.

DYSENTERIÆ si ab atra bile inciperint, inquit Hippocrates Aphorismorum IIII. Aphor. XXI. lethalis est, quod, ut docet Galenus, à cancro ulcerato quam minimè differat: sincera autem nigra deiectiones



non solum in extenuatis corporibus à tormi-  
nibus periculosa sunt, sed in omnibus ex  
aquo morbis, quod atra bilis dominium  
portendunt.

#### aut intestinorum læuitas.

QUAMVIS hæc possint etiam de tor-  
minibus accipi, sicut quotquot hodie typis  
excusa exemplaria extantia, indicare viden-  
tur, ita ut si lienteria dysenteris succedat  
(dictum est enim abrais intestinis longis, ab  
intestinorum difficultate, eorundem læuita-  
tes superuenire) ut boni secum nihil affert,  
ita si simplex sit, non omnino exitiosa est,  
& non nisi aliis malis signis concurrentibus  
mortem præ foribus ostendit; cuius generis  
sunt quæ hic enumerat Celsus. Tamen quo-  
niam Hippocrates secundo Prædictionum  
(unde hæc desumpsisse Celsum certum est)  
læuitatis intestinorum, quæ & diutina fue-  
rit, & continua, & huiusmodi prava acci-  
dentia coniuncta habet, meminit: læuitates  
intestinorum à torminibus separatim intelli-  
gere visum fuit, ut tò aut, in at, mutatis  
distinctionibus conuertatur, expuncto nimi-  
rum colo ante tò periculiosior. Dicit  
autem in Prædictionibus Hippocrates, Læui-  
tates porro intestinorum lienteriaque Græcis  
nominate, quæ quidē sunt continuæ, & diu-  
turnæ, & per omnem horam, & cū strepiti-  
bus, & sine strepitibus exturbantur, & simi-  
liter noctu & interdum incumbentes, & ege-  
ssione subante aut, valdè cruda, aut nigra  
& leni & graueolente, hæc omnes mala sunt;  
nam & sitim inducunt, & potum non ad  
vesicam promouent, ut per urinam eiicia-  
tur; & os exulcerant, & ruborem eleua-  
tum in facie efficiunt, & maculas solares  
varios colores habentes: simul autem &  
ventres emolliatos & sordidos, & rugosos  
reddunt. Ex talibus autem homines impo-  
tentes fiunt ad cibum capiendum, ad deam-  
bulandum, ad faciendum alia quæ facere de-  
bent: estq; morbus hic grauissimus seniori-  
bus; vehemens etiam viris; reliquis autem  
ætatibus multo minor. hucusq; Hippocrates.  
Neque mirum est concurrentibus huiusmodi  
signis lethalem esse lienteriam, quum ab ex-

ulceratione summæ partes occupante oriri  
certum sit; quando & sitim inducant, &  
ruborem in facie eleuatum efficiant: &c. si-  
quidem malè affectus ventriculus non solum  
non rectè naturalia obit munia, verum etiam  
nonnunquam maximè contraria operatur;  
sic ab infernis particulis interdum aliquid ad  
se se allicit, unde contingit faciem varicolo-  
ribus tingi maculis, ut abundè de sympto-  
matum causis Galenus.

#### si verò in tenuiore intestino.

MORBVM tenuioris intestini vocat eum  
quem eleon, chordapson, aut voluulum vo-  
care solemus: est autem lethalis, ac (ut paulo  
pòst inferi Celsus) fere septimo die interimit.  
Ceterum qui voluulo afficiuntur, nihil per  
inferiora excernunt, estq; hoc proprium &  
inseparabile huic passioni (ut docet Galenus)  
ut nihil ad inferiora descendat. Sed neque  
vomitus semper & necessariò eleum con-  
comitatur, sed tum demum quando is exitia-  
lis est, & si quando vehementius distor-  
quentur, steruus ipsis ad superiora feritur,  
atque singuliunt: quidam etiam desipientes  
conuallescuntque, nervorum principio com-  
patiente stomachi affectui. quare rectè ex  
Hippocratis Aphorismorum septimo, Ab eleo  
vomitus, singultus, desipientiam, nervo-  
rumq; distentionem malum esse dixit Celsus.

#### At in morbo arquato.

HIPPOCRATES sexto Aphorismorum  
Aphorismo XLIII. Morbo regio correptis  
iecur durum effiei malum est: significat enim  
iecinoris duricies, vel inflammationem in  
ipso esse vel durum tumorem, quorum  
utrumque malum est & lethale.

#### Quos lienes malè habent.

HIPPOCRATES Aphorismorum se-  
ctione sexta, Aphorismo XLIII. quicum-  
que lienosi à difficultate intestinorum corri-  
piuntur, iis longa difficultate intestinorum  
facta, aut aqua inter entem, aut læuitas in-  
testinorum subit, & moriuntur. Celsus per  
omnia Hippocratem reddidit, nisi quòd lon-  
gitudinis



gitudinis torminum non emminerit, satis mali lienosis asserre suspicatus, si tormina, vel in aquam intercutem, vel lienteriam conuertantur: neque enim in lienteriam commutabuntur, nisi abrasis prius intestinis; neque in aquam intercutem, nisi abolita temperie innati caloris, compaſſientibus simul hepate, liene, venosoque in uniuersum genere cum intestinis.

### Morbus intestini tenuioris.

QUANQVAM acutus admodum, ac ferè lethalis sit intestini tenuioris morbus quem aleon vocari diximus; non tamen intra septimum diem semper occidit: est enim quum à pituita frigida, quam viueam Praxagoras appellat, generetur; atque hæc quidem in longum produciuntur tempus. Quare an rectè hic dixerit, videant alij: ego certè Celsum puto voluisse XLIII. Aphorismum scitionis sexta explicare, præsertim quum iam duos ordine Aphorismos recensuerit: verum quando ab hoc quàm maxime variet, nescio aut quomodo cum Hippocrate componi possit, aut quomodo id quod de suo in medium protulit, explicandum sit; potissimum quum ea qua scribit non cohereant satis: nam quod dicit nisi resolutus est, videtur velle innuere potiorē ei causam esse frigiditatem qua calore aut alio quouis modo resoluitur: quum, ut ait Galenus libro De naturalibus facultatibus, inflammationes magis pariant voluuli: qui quantumvis mali sunt, non tamen semper intra septimum interiment: est tamen ubi præſens secum afferant periculum; videlicet quoties ex urina stillicidio oriuntur. Nam, ut in Aphorismis Hippocrates, Quibuscumque ex urina stillicidio voluulus accedit, ij intra septem dies perent, si nō febre orta, satis urina profluxerit.

### Mulier ex partu ſi cum febre.

QUANQVAM ex suo deprompſerit hæc promptuario Celsus, non tamen citra omnem rationem dicta sunt: nam quum mulieres à partu non probè purgate in febres aut capitis dolores acutissimos incidunt, materia sursum

repente; non iniuria mortis periculum incurrent: idq; imprimis, quum & parvas doloribus exagitata viribus imbecillioribus ſint, & continuis capitis doloribus & febribus vehementibus detineantur.

### Si dolor atque inflammatio est.

HIPPOCRATES in Prognosticis, crebram spirationem, dolorem aut inflammationem que supra præcordia fatiget, ſignificare dicit: hic autem malum ſignum dicit Celsus, ſi thorace inflammato, aut dolente, crebrior atque idem repetitus ſpiritus reddatur: cuius rationem iam antè reddidimus; quare rectè huc accommodaueris, qua de ſpiritu raro in medium protulimus.

### Si ſine cauſa longus dolor capitis.

HIPPOCRATES in Predictionibus: Quibus autem dolores ſine manifestis cauſis ſunt, & diuturni, & in toto capite, ſintq; ipſi & graciles, & debiles; his prædicendum est, morbum longè graviorē priore eſſe. ſi verò etiam ad collum, & ad dorſum deſcendat caput relinquens, ac rurſum ad caput recurrat, adhuc gravior ſit: verum omnium horum grauiſſimus est, ſi ex capite ad collum, ac dorſum tendat. Vtilitates autem his ex abſceſſibus fore expectandum est, aut ubi pus per tuſim reiecerint, aut hæmorrhoides habent, aut puſtulas in corporibus enatas; conſert etiam caput furfures habens. Torpores & punctura pruriginosa, velut ab urtica, quibus per caput diſcurrunt, aliquando per totum, aliquando per aliquam partem, ſæpe verò & frigillitas aliqua ab ipſis ſentiri putatur velut per caput diſcurrere; hos etiam interrogare oportet, an etiam ad ſummam linguam punctura illa procedat: ſi enim hoc ſecerit, perfectus morbus ſit, & qui difficilis ſubmoueri poſſit; verum abſque hoc facilis est. Modi verò utilitatum conſequendarum ex abſceſſibus contingent velut antè ſcriptum est: ſed tamen abſceſſus in his minus ſuccedunt, quàm in illis. Quoſcumque verò una cum doloribus vertigines



vertigines corripunt, malum agri exolubile ac furiosum existit; senilus autem maxime hic modus fit. Quæ omnia Celsus accuratissimè reddidit; nisi quod pro capitis fursuribus, præriginem nescio quàm apposuè transitiones, quæ Hippocrates seimgit, confuderit; ad hæc quod hamorrhoidum non meminerit, & quod vertigines cum dolore, exitiale omnino malum, præterierit.

### In coxæ verò doloribus.

HIPPOCRATES secundo Prædictionum: De coxendicam morbo sic considerationem facere oportet. Quibuscumque senioribus corporales vehementissimè fuerint, perfrigerationes tum lumborum, tum crurum, & qui pudendum arrigere non possunt, & quilibet alius non egerit nisi ad necessitatem coacta, & prodiu ipsis nullus stercoraceus mucus, hi maxime diuturnus morbus erit; prædicendumque est annum ut minimum duraturum morbum esse ab eo tempore quo incepit, & opem ad verè & æstatem expectandam esse. Celsus hic iterum arrectionis pudendi mentionem nullam facit, cuius certè inter reliqua meminisse debebat, quod videlicet morbi magnitudinem, si quod aliud, portendat; significat enim vesicam, atque adeo spermatica vasa, reliquaque genitalis inferuentia ex nimio dolore molestiam aliquam transsumpsisse. Præterea Cornelius nosse vere ac autumno morbum solui dicit; Hippocrates vere ac æstate, resolutis nimium humoribus frigidis qui dolorem conciliabant æstatis calore: quare, nisi quid obficeret, pro tunc autumno, tunc æstate legere malim; quum certum sit affectionem hanc non solum non autumno fini, sed tunc potissimum accessiones suas facere, atque exacerbare.

### Difficilis æquè curationis est.

DIXIMVS autè ex secundo Prædictionum, dolores humerorum si ad manus perveniant, solui vomitu puris, aut atra bilis: unum autem ex hoc inseri Celsus, exitiosos

esse huiusmodi morbos, nisi puris aut bilis atra vomitu leventur.

### Quacunque verò parte corporis.

HIPPOCRATES in secundo Prædictionum, Quibus una cum hoc quod movere non possunt, morbo corporis pars extenuatur, hi in sanitatem restitui non possunt: quibus autem colliquationes non accesserint, hi evadent. Colliquatum enim aut emacrescens membrum nutritione planè desinitur.

### Omnique resolutioni nervorum.

NON solum resolutioni, sed & omnibus aliis morbis autumno malus est (ut alibi testatur Hippocrates) sua inæqualitate: hiems etiam sua frigiditate & humiditate paralyti, aut siderationi admodum infesta est; æstas contra calore suo aut siccitate eandem resolvit. Reliqua iam antè diximus. Nam notus aliqui per se satis est Hippocratis Aphorismus: Solvere morbum quem apoplexiam vocant, fortem, impossibile; debilem verò, non facile.

### Mulieri grauida.

HIPPOCRATES Aphorismorum sectione quinta Aphor. xxxvi, & xxxvii. Mulieri viro gerenti si mammae repente graciles fiant geminos habenti, alterum abortiu: & si quidam mamma dextera gracilis fiat, marem; si verò sinistra, feminam: quod videlicet gracilescentes mammae ostendant fœtui alimentum deficere. Nam quum communes quedam venæ sint mammis & uteris, fit ut quando in venis parum contineatur sanguis, gracilescent utera, unde inedia perituri fœtus contingit.

### Quæ neque peperit.

HIPPOCRATES quinto Aphorismorum Aphorismo xxxix. Si mulier quæ neque peperit, neque grauida est, lac habet; hinc menstrua defecerunt: nam quum, ut dixi, communes venæ sint mammis & utero, contingit puriorem menstrui sanguinis portionem,



tionem, quem alioqui natura duce per matricem expurgari conueniebat, ad mamillas regurgitare, atque inibi in lac conuerti.

### Quartana æstiuæ breuis.

HVC accommodare potes quæ ex Aphorismis hoc capite in hanc sententiam protulimus.

### Si sanguis profluxit.

HIPPOCRATES septimo Aphorismo. A profusio sanguinis desipientia ac conuulsio malum; & a vehementi sanguinis profusio conuulsio, malum: oritur enim conuulsio huiusmodi ab inanitione; quare & lethalis est. Delirium autem à siccitate membranarum cerebri fit.

### Itemque si medicamenti purgatum.

EIVSDEM planè argumenti cum iam dicta est hæc sententia, repetiturque ab Hippocrate multis locis: nam Aphorismorum quinto, Aphorismo quarto, ex superflua purgatione conuulsio aut sine ultius superueniēs, malum est. & primo eiusdem sectionis: Conuulsio ab heileboro lethalis est. & rursum sectione septima Aphorismo xxv. A purgantis medicamenti potione conuulsio lethalis est.

### aut si in magno dolore.

HIPPOCRATES septimo Aphorismo.

rum Aphor. 26. in vehementi ventris dolore frigiditas partium extremarum, malum significat. Celsus hic ventris non meminit, vel quod putaret in omni ventris dolore, malum esse extremarum partium frigiditatem, vel quod magna ex parte inflammationem interiorum partium denotet. Sic alibi quoque in acutis morbis extremarum partium frigiditatem vituperat.

### Neque is ad vitam redit.

HIPPOCRATES Aphorismorum secundo, Aphorif. xlii. Qui strangulati ac dissoluti nondum mortui, non referuntur quibus spuma circa os fuerit, quod videlicet spuma hæc violentiam pulmonis ac spirituum partium denotet.

### Aluus nigra sanguini atro similis.

HIPPOCRATES Aphor. sectione quarta Aphor. xxi. Deiectiones nigra, qualis est sanguis niger, spontè venientes, siue cum febre, siue sine febre, pessima: & quanto colores magis prani fuerint plures, peius. Celsus varicolores deiectiones hic omisit, quod antè eorum meminerit. Reliqua ex antecedentibus clara sunt; multa namque hoc capite, tanquam per transennam, transcurrimus, quod iam antè aliqua ex parte enarrata essent.

## CAPUT IX.

### De morborum curationibus.

COGNITIS indicijs, quæ nos vel spe consolentur, vel metu terreat, ad curationes morborum transeundum est. Ex his quædam communes sunt, quædam propriæ. Communes, quæ pluribus morbis opitulantur. Propriæ, quæ singulis. Antè de communibus dicam. Ex quibus tamen quædam non ægros solum, sed sanos quoque sustinent: quædam in aduersa tantum valetudine adhibentur. Omne verò au-

X

xilium



xilium corporis, aut demit aliquam materiam, aut adijcit, aut euocat, aut reprimat, aut refrigerat, aut calefacit, simulque aut durat, aut molliat. Quædam non vno modo tantum, sed etiam duobus inter se non contrarijs adiuuant. Demitur materia, sanguinis detractio, cucurbitula, deiectione, vomitu, frictione, gestatione, omni que exercitatione corporis, abstinentia, sudore. De quibus protinus dicam.

## ENARRATIO.

SECUNDVS hic Celsi liber in duas potissimum partes dividitur: In priori enim de communibus signis, salubribus videlicet, & insalubribus edisserit: In posteriori communia auxilia enarrat; & quoniam varia sunt auxiliorum genera, in varia etiam capita distinguitur. Est enim quum pharmacorum aut medicamentorum propinatio, ne corpus subletemus, morboque propinsemus; & quædam vocant: & rursum manuali actione, (χειρουργικὴν) appellant) ægrotis profumus, dum quod redundat rescindimus, adurimus, aut alio quouis modo auferimus. Frequenter etiam victus rationem idoneam præscribendo (διαίτησιν) nominant) corpori pleno aut demimus aliquid, tibi abstinentiam iniungendo, aut attenuantem victus rationem præscribendo; aut idem exhaustum iam exuccumque sensim rescimus ac vegetamus. Celsus ita hac auxiliorum genera sub duobus complectitur, dum omne auxilium corpori aut demere, aut addere aliquid dicit. Nam sanguinis missio, cucurbitula, hirudines, purgationes, sudores, inedia corpori demunt: victus collapsum corpus ferè restaurat, reparatque. Frictio nec addentibus nec dementibus recte adnumerari potest: nam si vehementer sit, corpus durat; si leniter, molliat; si multa, minuit; si modica, implet. sic de balneo, exercitio, unctionibusque iudicandum est: quare media inter demencia & impletoria censenda sunt: quod Celsus quoque fecisse videtur, dum inter auferentia, & addentia, tamquam medio quodam loco posuit.

## Omne verò auxilium.

MEDICINA, inquit Hippocrates, est additio & subtractio; additio quidem deficientis, ablatio superantis in hominum corporibus. Deficiunt autem redundantque, quedam in qualitate, quedam in quantitate, ut auctor est Galenus xli. Methodi. In quantitate, quoties sanguis immodicè est auctus, aut rursus minor redditus: in qualitate, quum vel calidus vel frigidus, vel crassus vel tenuis plus insto, minusve est effectus. Quum igitur additio & subtractio medicinam constituat, rectè auctor noster omne auxilium corpori aut demere, aut addere, aliquid docet: quum quoscunque morbos creat enacratio, oneret resectio; & vice versa quæ ex repletionè sunt, curentur inanitione. Videtur tamen Celsus, medicinæ partes omnes paulo exactius perpendisse, quum omnes particulatim medicamentorum differentias ac, energias quodammodo recenser. Dicit enim præter ea quæ addant aut demant, alia reprimere, alia contrà foras euocare, alia rursus refrigerare, atque alia calefacere, simulque aut durare aut molliare, quasi sub his omnium tam simplicium quàm compositorum morborum, tum causas, tum curationes comprehenderit. Neque enim solam inanitionem aut repletionem cõtentus est morborum causam dixisse, nisi calorem ac frigus immodicè, mediocritatem aut laxitatem aut contractionem, densitatemve mollietatem aut duriciem corporis addiderit. Et quoniam non raro impliciti sunt affectus, addit esse nonnulla



nonnulla auxilia quæ non uno modo tantum, sed etiam duobus inter se non contrariis adiuventur: quemadmodum encirbicularis sudores, & omnia reuulsoria medicamenta foras simul euocare, & aliquid materia pec-

cantis deuiere dicimus; balnea & calefacere simul & foras euocare. frictio autem sibi ipsi contraria, ut suo loco dicitur, operatur: nam durat, molliat, demit, atque addit.

## CAPUT X.

*De sanguinis detractione per venas.*

**S**ANGVINEM incisa vena mitti, nouum non est: sed nulum penè morbum esse, in quo non mittatur, nouum est. Item mitti iunioribus, & fœminis uterum non gerentibus, vetus est. In pueris verò idem experiri, & in senioribus, & in grauidis quoque mulieribus, vetus non est: siquidem antiqui, primam ultimamque ætatem sustinere non posse hoc auxilij genus iudicabant, persuaserantque sibi mulierem grauidam, quæ ita curata esset, abortum esse facturam. Postea verò vsus ostendit, nihil ex his esse perpetuum, aliasque potius

maiores obseruationes adhibendas esse, ad quas dirigi curantis consilium debeat. Interest enim non quæ ætas sit, neque quid in corpore intus geratur, sed quæ vires sint. Ergo si iuuenis imbecillus est, aut si mulier, quæ grauida non est, parum valet, malè sanguis emittitur. Empiritur enim vis, si quæ his supererat, & hoc modo crepta est. Ac firmus puer, & robustus senex, & grauida mulier valens, tutò cutantur. Maxime tamen in his medicus imperitus falli potest, quia ferè minus roboris illis ætatibus subest. Mulieri quoque prægnanti post curationem quoque viribus opus est, non tantum ad se, sed etiam ad partum sustinendum. Non quicquid aut intentionem animi, aut prudentiam exigit, protinus faciendum est, cū præcipua in hoc ars sit, quæ non annos numeret, neque conceptionem solam videat, sed vires æstimet, & ex eo colligat, possit necne superesse, quod vel puerum, vel senem, vel in vna muliere duo corpora simul sustineat. Interest enim ipsæ valens corpus & obesum, inter tenue & infirmum. Tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat. Facilius itaque illi detractionem eiusmodi susti-



nent, celeriusque ea, si nimium est pinguis, aliquis affligitur. Ideoque vis corporis melius ex venis, quam ex ipsa specie aestimatur. Neque enim solum hæc considerata sunt, sed etiam morbi genus, quod sit. Vtrum superans, an deficiens materia læserit. Corruptum corpus sit, an integrum. Nam si materia vel deest, vel integra est, istud alienum est. At si vel copia sur male habet, vel corrupta est, nullo modo melius succurritur. Ergo vehemens febris, ubi rubet corpus, plenæque venæ tument, sanguinis detractionem requirit. Item viscerum morbi, nervorumque resolutio, & rigor, & distentio, quicquid denique fauces difficultate spiritus strangulat, quicquid subito supprimit vocem, quicquid intolerabilis dolor est, & quacunque de causa, ruptum aliquid intus atque collisum est. Item malus corporis habitus, omnesque acuti morbi, qui modò (ut supra dixi) non infirmitate, sed onere nocent. Fieri tamen potest, ut morbus quidem id desideret, corpus autem vix pati posse videatur. Sed si nullum tamen appareat aliud auxilium, periturusque sit, qui laborat, nisi temeraria quoque via fuerit adiutus, in hoc statu boni medici est ostendere, quam nulla spes sine sanguinis detractione sit, faterique quantus in hac ipsa re sit metus. Et tum demum si exigatur, sanguinem mittere. De quo dubitari in eiusmodi re non oportet. Satius est enim, anceps auxilium experiri, quam nullum. Idque maxime fieri debet, ubi nervi resoluti sunt. Vbi subito aliquis obmutuit. Vbi angina strangulatur. Vbi prioris febris accessio penè confecit, paremque subsequi verisimile est, neque eandem videntur sustinere ægri vires posse. Cum sit autem minime crudo sanguis mittendus, tamen ne id quidem perpetuum est. Neque enim semper concoctionem res expectat. Ergo si ex superiore parte aliquis decidit, si contusus est, si ex aliquo subito casu sanguinem vomit, quamvis paulo antè sumpsit cibum, tamen protinus ei demenda materia est, ne, si subsederit, corpus affligatur. Idemque etiam in alijs casibus repentinis, qui strangulabunt, dictum erit. At si morbi ratio patiatur, tumi demum nulla

cruditis



eruditatis \*suspensione remanente id fiet. Ideoque ei rei vi-  
 detur aptissimus aduersæ valetudinis dies secundus aut ter-  
 tius. Sed ut aliquando etiam primo die sanguinem mittere  
 necesse est, sic nunquam utile post diem quartum est, cum  
 iam spatio ipso materia \* & exhausta est, \* & corpus corrup-  
 pit, ut detractio imbecillum id facere possit, non possit inte-  
 grum. Quod si vehemens febris urget, in ipso impetu eius  
 sanguinem mittere, hominem iugulare est. Expectanda er-  
 go remissio est, si non decrescit, sed crescere desijt, neque  
 speratur remissio, tunc quoque quamvis peior, sola tamen  
 occasio non omittenda est. Fere etiam ista medicina ubi ne-  
 cessaria est, in biduum diuidenda est. Satius est enim pri-  
 mum leuare ægrum, deinde perpurgare, quam simul omni-  
 vi effusa fortasse præcipitare. Quod si in cura quoque aquæ,  
 quæ inter cutem est, \* ita respondet, quanto magis necesse \* ista  
 est in sanguine respondeat? Mitti verò is debet, si totius cor-  
 poris causa sit, ex brachio: si partis alicuius, ex ea ipsa parte,  
 aut certè quàm proxima, quia non ubique mitti potest, sed  
 in temporibus, in brachijs, iuxta talos. Neque ignoro quos-  
 dam dicere, quàm longissimè sanguinem inde, ubi lædit, esse  
 mittendum: sic enim auerti materiæ cursum: at illo modo in  
 id ipsum quod grauat, euocari. Sed id ipsum falsum est.  
 Proximum enim locum primo \* exhaurit. Ex vltioribus  
 autem eatenus sanguis sequitur, quatenus emittitur, ubi is  
 suppressus est, quia non trahitur, ne venit quidem. Videtur  
 tamen vsus ipse docuisse, si caput factum est, ex brachio po-  
 tius sanguinem mittendum esse. Si quod in humero vitium  
 est, ex altero brachio: credo, quia si quid parum cesserit, op-  
 portuniores hæ partes iniuriæ sunt, quàm quæ iam malè ha-  
 bent. Auertitur quoque interdum sanguis, ubi alia parte pro-  
 rumpens, alia emittitur. Desinit enim fluere quàm volu-  
 mus, inde obiectis quæ prohibeant, alio dato itinere. Mitte-  
 re autem sanguinem cum sit expeditissimum, vsu habenti,  
 \* tum ignaro difficillimum est. Iuncta enim est vena ar-  
 terijs, his nerui. Ita si neruum scalpellus attingit, sequitur  
 neruorum distentio, \* ea quæ hominem crudeliter consumit. \* tamen  
 \* eaque



At arteria incisa neque coit neque sanescit, interdum etiam ut sanguis vehementer erumpat, efficit. Ipsius quoque venarum, si fortè præcisa est, capita comprimuntur, neque sanguinem emittunt. At si timidè scalpellus demittitur, summam cutem lacerat, neque venam incidit. Nonnunquam etiam calater, neque facilè reperitur. Ita multæ res id difficile inscio faciunt, quod perito facillimum est. Incidenda ad medium vena est, ex qua cum sanguis erumpit, colorem eius, habitumque oportet attendere. Nam si is crassus & niger est, vitiosus est. Ideoque vtiliter effunditur. Si rubet, & pellucet, integer est. Eaquæ missio sanguinis ad eod non prodest, ut etiam noceat, protinusque is supprimendus est. Sed id euenire non potest sub eo medico, qui scit ex quali corpore sanguis mittendus sit. Illud magis fieri solet, ut æquè niger assidue ac primo die profluat. Quod quamuis ita est, tamen si iam satis fluxit, supprimendus est. Semperque antè finis faciendus est, quàm anima deficiat. Deligandumque brachium super imposito expresso ex aqua frigida penicillo, & postero die aduerso medio digito vena ferienda, ut recens coitus eius resoluatur, iterumque sanguinem fundat. Siue autem primo, siue secundo die sanguis, qui crassus & niger initio fluxerat, & rubere & pellucere cœpit, satis materiæ detractum est, atque quod superest, sincerum est. Ideoque protinus brachium deligandum, habendumque ita est, donec valens cicatricula sit, quæ celerimè in vena confirmatur.

\* aliàs: & postero die aduerso medio digito, non autem scalpello, vena ferienda.

#### ENARRATIO.

QUVM sanguine non solum animalis partes alantur, sed & nativus calor in eodem quasi delitescens consistat, ac mansionem, ut sic dicam, faciat, quemadmodum testatur Galenus; non immerito à μόνος ille Erasistratus eiusque sequaces, à vena sectione usque ad eod abhorrebant, quod suspicarentur nativum calorem dissipari vna imminuique, verum quum non raro contingat, ut sanguis aut qualitate, aut quantitate peccans intemperiem suam cordi

communicet, statim is in initio incisa vena evacuandus est. Miri igitur sanguinem incisa vena nonum non est, sed nullum pendere esse morbum in quo non mittatur, nonum est. Nam Galenus libro Quos purgare & quibus id medicamentis oporteat, sanguinis missione eos tantum morbos curari auctor est, qui ab humorum copia (καταρσις vocant) creantur, reliquos qui ab eorum corruptione sunt, purgatione indigere. Atque ea etià ratione, si præueniantur, articu-  
lorum



lorum tophaceam duriciem, morbum comitialem, apoplexiam & id genus alios prohibuisse, qui certis alioqui statisque temporibus solebant invadere, atque hoc iam hominibus ipsa experientia compertum esse, non in se ipsis tantum, sed & iumentis, alio testatur loco Galenus: siquidem ante aetatis initium circa ultimam veris partem, & sibi & illis sanguinem detrahunt, quoniam ad memoriam revocant quibus capiuntur morbis, quando repente calor aestivus supervenerit, hic enim amplius sanguinem extendit, atque diffundit, & quodammodo effervere facit. Sic Galenus libro De sanguinis missione, si reliquorum, inquit, morborum alicui obnoxium esse perspicuum habuerimus, verbi gratia, aut peripneumonia, aut pleuritide, aut angina, committendum non est ut expectemus dum evidens plenitudinis aliquod symptomata appareat, sed auertere sanguinis missione praestat. Atque hac haecenus de morborum precautionione. Verum sicuti hic momenti non parum affert sanguinis missio; ita quoque si iam invaserint, sola vena aperi-  
tione lenantur: Sic synchos ad animi deliquium misso sanguine non raro curatas memorie proditum est, & indies usu venire videmus: sic omnes quotquot sunt morbi qui ex sanguine, hoc est plenitudine vel ad vires, vel ad vasorum humores continentium capacitatem, inflammatione, erysipelate originem habent: sic quoque qui alio quovis modo acuti dicuntur, ut synanche, fideratio, sanguinis missione, si quo alio, innantur. Est praeterea ubi non tam purgandi quam venellendi gratia venam tundimus; ut etiam nonnunquam verrorumque rationem habemus: quemadmodum in hemorrhoidis & mensibus suppressis fieri conspiciamus.

### In pueris vero idem experiri.

PVERI quantumvis vitali facultate valeant, sanguinis missionem non sustinent, quod eorundem substantia, tum ob humiditatem, tum ob temperamenti caliditatem cystis dischiantur. Senes autem enecatio-  
nem quae per vena sectionem fit, nullo modo

admittunt, propter virium imbecillitatem. atque hoc est quod Galenus dicit, Senum aetatem sub hypothese quae a viribus sumitur comprehendi posse, quum nullis qui in ea aetate constituti sunt, robur adsit; pueris autem vires adesse libro Sanitatis tuenda idem aperit declarat, quum infantes functionibus naturalibus, puta aetione, concoctione, distributione, ceteris plane aetatis praestare dicit. Quo sorte argumento motus Arabs ille Abenzoar, aut morbi alioqui vehementia impulsus, puero septennali venam incidit, quum tamen Galenus passim sub virium robore pueros nulla ratione comprehendi asserat; nisi quis Galenum de pleniore, veteribusque consueti purgatione locutum dicat; moderatam enim quae tum viribus, tum plenitudini aut par aut inferior sit, & senes & pueri facile ferunt. Sic etiam Rhazes in aetate decrepita, quae gravi & urgente pleuritide vel peripneumonia urgere-  
tur, sanguinem emisit.

### persuaserantque sibi mulierem gravidam.

CORPUS valens non vocat id quod sanum sit, sed quod etiam si iam quammaxime a sanitate devierit, viribus polleat. Mittendique sanguinis scopos inquit, primumque inter eos obtinere locum dicit, virium robur: nam non solum in sanguinis missione, verum etiam quavis alia vacuatione, vires egroti attendere oportet, ac donec tolerat, & nondum laborat, tentandum est exuperantem humorem educere; quum vero dissoluntur, etiam si supersint supernacua, cauere eorundem vacuationem conuenit; virium enim imbecillitas adiectionem potius quam deiectionem requirit. Tantum igitur virium robori attendendum est, ut etiam si quam maxime reliqua mittendi sanguinem hypotheses debortentur, si vires constent, atque morbus id ipsum flagitet, venam tundamus. Atque sic quantum Hippocrates in gravidis temperandum a sanguinis missione doceat (quod misso ex vena sanguine abortire soleant) tamen si vires constet, non formidabimus phlebotomia: praesertim quum  
idem



idem senex alio loco mensibus qui tertio & octavo interponuntur, gravidis cacochymia laborantibus purgationem qua medicamento purgante obeatur, admittat. nam quum omnibus notum sit plus nocuimenti gravidis accessurum ex medicamento purgantis sumptione, quam à sanguinis missione; si non ultimis fiat mensibus, tunc eadem non minus quam fiet. Et sanè quamvis iam grandior factus infans, maiori opus habeat alimento, tamen certè vel ultimo mense, tutius prægnanti adhibetur phlebotomia, quam purgans medicamentum, quod cathartica omnia exagitatione sua violenta, sæpius admodum efficiant, & quod inmodico suo calore, atque perniciosa substantia, venenata existant. Verè igitur subiungit, postea usum docuisse, nihil ex his esse perpetuum: nam quum extremitas morbis extremè exquisita remedia optima sint, experientia & longo rerum usu didicimus, prægnantem infra octavum mensem in morbo, nullo satis incommodo, venam aperuisse; sit enim ut tanta sit copia in venis, ut modum excedat, matri factique alendo idoneum, ita ut copia abortus periculum adducat: hic igitur nihil periculi expectandum erit, si resignata vena sanguinem modicè minuamus, natura ipsa interdum spontè, supernacui illius effusionem viriliterque moliente, aut per vietum, aut per nares, aut hemorrhoides. Nam & in nonnullis primis tantum mensibus, in aliis toto etiam imprægnationis decursu, menses temporitè statis salubriter effluunt. Et si in plethora natura duce liceat id nobis, cur in acutis morbis quos prægnantibus lethales definit Hippocrates, anceps (si ita vis) periculum non aggrediemur? præsertim si inflammatio aliqua superiora occupet, ut in pleuritide, ubi vena cubiti cæsa, non solum sæpius nihil incommodalimus, sed & affectam partem multo pondere subleuamus, & matrem factumque periculo subtrahimus. Inferiores autem prægnantium venas secare minimè tutum est, quod impetu deorsum conuerso menses immodicè regurgitent, atque præcipitentur foras. Itaque si prægnans conflictetur morbo graviorè, sitq; valentibus

viribus, & animo forti, nec metu perturbetur, & vasa plena sint, nec inediis inanita, unam aliquam ex superioribus venam tuto secabimus, ex qua sanguis sensim elabitur.

### Tenuioribus magis sanguis.

POSTEAQVAM inter ea quæ vena sectionem aut suadeant, aut dissuadeant, primum esse virium robur, demonstravit; iam unde potissimum id colligatur edocet; idque potius ex venis, quam specie totius corporis æstimari dicit: nam quum sanguinem natini caloris atque vitalis roboris domicilium dixerimus, rectè eum qui eo abundauerit, viribus pollere, ut eum qui hunc parciorem habuerit, iisdem quodammodo deficere, indicauerimus. neque enim, ut ante dixit, obsum corpus valens, aut tenue infirmum æstimamus; nam tenuioribus magis sanguis, hoc est cum sanguine virium robur, abundat. Verùm hic inquirendum est, quid per tenuiores & pleniores intelligat: nam vni simpliciter dicendum est graciliores plenioribus sanguine magis abundare; sunt enim, ut docet Galenus, nonnulli, qui cum graciles sint, venas parvas habeant, & si ex iis quæpiam incidat, adeps effluet, quam confluit ad internam eius membranam adnasci: ceterum id rarè admodum in viris conspicitur; in mulieribus verò sæpius, est etenim tum frigidioris nature, tum desidiöse vitæ nota: magna tamen ex parte, & per se, gracilioribus sanguis magis inest, habentque venas latiores: rationabiliter enim in idem ferè incidit, venarum angustia cum pingui habitu ac crassiore, gracilis habitus cum venarum laxitate; nam & vena calore dilatatur, statuque distenditur, & gracilitas temperamenti calidi nota est.

### plenioribus magis caro abundat.

PLENIORES non obesos (quod videlicet sanguinis minimum, adipisquo plurimum habeant, atque quàm celerrimè ex sanguinis missione affliguntur) sed corpulentos, & carnosos, quos Græci εὐαίματος vocant,



cant, intelligit: siquidem si vii carne abundant, ita sanguine non omnino destituuntur, quando, ut docet Galenus, sanguinis copia corpulentia origo sit, atque non infrequens sit, ut qui graciles alioqui natura fuerint, ex ociosa & delicata vita, temperamento in humidius mutato, carnosiores redantur, habeantque & venas laxiores & ampliores graciliter. Quare an rectè dixerit Celsus, graciles plenioribus sanguine magis abundare, non immeritò dubitet quisque: praesertim quum vis atque adeo sanguinis copia, ut hic quoque subiungit Cornelius nosler, melius ex venis quam corporis specie aestimetur. Nam contingit non raro corpulentos non solum carnis quoque plus, sed & sanguinis habere quam graciles, quod venas tumentiores turgentioresque habeant. Quod si quis autem plenum corpus, & temperatum, & obesum, & carnosum velit intelligere, sicut doctissimus quidam, de re medica optime meritis *εὐεργετὸν* (non enim possum verbum verbo reddere melius) apud Hippocratem & Galenum passim accipi dicit; per me quidem integrum est: ego tamen eos hac dictione intellexero, qui natura corpulenti sunt, adeo ut mirer perspicacissimi alioqui ingenij virum eò devenisse, ut Galenum & Hippocratem τοῦτοτρον in ea significatione passim usurpasse crediderit; quum aliàs, aut *πυρρὸς σφόδρα*, aut *σπαρτάδης*, aut *πυρρὸς* dicat. sed neque contentus hac *εὐεργετὸν* significatione *ἀττὶ τῷ τοῦτοτρον* secundo Aphorismorum apud eundem intelligi dicit, quum bene carnosos *πολυσάρκους* vocari scribat. Atque hac hactenus: non ut doctissimum virum, & cui in hisce nostris commentariis plurimum debemus, cavillemur; sed ne confuso temperamentorum ordine, carnosos cum temperatis atque pinguibus confundamus. Igitur ne citius his immoremur, Graciles & plurimum sanguinem qui in venis continentur, & spiritum qui easdem calore dilatat, habere dicimus; ut corpulentos seu pleniores plus carnis, adipis, & obesos: & quanquam usu veniat sanguinem esse carnosum & copiosum & venas amplas; gracilioribus tamen easdem turgi-

diores & pleniores non immeritò pronunciamus.

### Neque enim solum hæc.

HYPOTHESIVM quæ in sanguinis missione sumuntur, primum locum attributum virium robori iam plus satis dictum est: ac promde ne remerarij admodum finis in eius detractiōe, si materia integra est (est enim corpus sanum exlex, ut precedente libro docet Celsus) ab ea temperandum moxet, atque si corpus sanitatis limites excesserit, considerandum morbi genus: nam si ab inanitione est, abstinentum esse; quum quos creaverit morbos inanitis, curet refectio: & si ex plenitudine (*πληθὺς* vocant) originem traxerit, vena missionem efflagitare; idque non citra exceptionem: Requiritur enim ut aut suo genere sit magnus morbus, & vehementis; aut eius causa qua humoribus inest multum accreuerit, aut symptomatis cuiusdam semita presserit. Magnus autem ac vehementis mortus intelligitur ex genere: nam cuiuscunque partis phlegmone sit, gravior deteriorque censetur, quam simplex illius intemperies. dicitur etiam magnus ex partis usu, vel prestantia; præterea etiā ex earundem partium situ, quarum alie principibus affinitate iunguntur, ut pulmo, latera, ventriculus. In summa, vehemens etiam morbus censetur ex partis sensu, qui aut acer, acutus, aut hebes gravisque est. Verum etsi omnia hæc concurrant, morbi videlicet magnitudo, causa efficientis multitudo, symptomatumque scintille; non erit tamen tumentenda vena, nisi probè constantibus viribus: adeo magna habenda est ratio virium, ut non immeritò primas in missione sanguinis obtineat.

### At si vel copia sui malè habet.

SANGVINIS plenitudo duplici modo capitur: prior corporis gravitate aestimatur, ad vires dicta; altera imm. venarum ex-  
tensione, tum quod ille plena tument, agnoscitur, nostri plenitudinem ad vasa, Græci κατὰ τὸ ὑγρῶν vocant. Vtraque autem plenitudo

Y.



plenitudo necessariam vacationem indicat; quod in hac quidem vasa quæ sanguinem continent, in alia pondus id transfundere spectentur; & quantumvis natura hoc pondere non grauetur, non raro tamen vasa rumpuntur; unde ex venarum commerciis sanguinis spuitiones sequuntur. In ea autem quæ ad vires dicta est plenitudine, quantumvis vena non intumeat, nec plena appareant, statim infirmatur homo & viribus destituitur, natura enim ad graue aliquod onus ferendum impotente.

vel corrupta est, nullo modo, &c.

QUVM sanguis qualitate æquæ ac quantitate peccet, Galeno de sang. missione teste, materiam, hoc est sanguinem, corruptam vena sectione optimè curari posse demonstrat. Et quanquam sub dictione corrupta est, eam plenitudinis speciem quæ ad vires dicitur, tantum comprehendere possumus, ut eam quæ ad vasa sub copia, tamen quoniam illa corpore nondum agitante, neque sanguine adhucdum inflammato accidere potest, per verbum corrupta est, sanguinem qualitate peccantem, qualem in inflammationibus, febribusque, & id genus aliis videre contingit, intelligemus: est autem eiusmodi aut biliosus, aut adustus, aut putrefactus. Ei porro nullo modo melius succurritur quàm vena sectione; quum primum vena sectionis consilium sit, ut sanguis qui aut qualitate aut quantitate redundat euacuetur. Si tamen alicui libeat per se, corrupta est, plenitudinem quam ad vires vocamus, intelligere, non omnino male fecerit; quando ea (teste Galeno) promptissimè in putredinem incidat, & nonnunquam etiam in partes quasdam impetu quodam prorumpat, atque inibi tumores præter naturam faciat, sanguinemque corrumpat.

Ergo vehemens febris.

BREVITER enarrat morbos quotquot sunt, qui sanguinis missionem requirant: sunt autem eiusmodi, qui ex sanguinis ubertate, & affluentia (ut diximus) aut ex qua-

vis illius eruptione ortum habent: eius tamen generis maximè sunt, & originis suæ causam inde sortiuntur, febris synochus, tum ea quæ circa putredinem ex sola sit sanguinis effervescentia, tum ea quæ ex putrescente accenditur; quales Celsus hic intellexisse videtur. Neque omnes putridæ cuiuscunque sunt ordinis febres, vena sectione curantur; sed ex tantum quarum obstructio ex multitudine, & immodica copia proficiscitur; in eiusmodi enim febribus non continuis modò, sed & intermittentibus Galenus saluberrimum esse ait venam incidere.

Item viscerum morbi.

PER viscerum morbos omnium inter-  
norum inflammationes (φλεγμονα Græci dicunt) intelligi: appellantur enim viscera omnia interiora quæ pelle teguntur; ut iecur, cor, pulmo, præcordia, ilia.

neruorumque resolutio,  
& rigor, &c.

SVB rigore omnem convulsionis speciem intelligit; quanquam particulariter alibi rigorem Græcis τέναν διάνυ vocet: oritur autem convulsio (Galeno XII. methodi auctore) ex repletionem nervosorum partium (qua ratione eos quos magna phlegmone premit adurit) vel ex ardenti & tenui humore, vel ex ingenti frigore, quod tale quippiam quale gelu efficit. Admittunt autem hæ tres convulsionis species varias curationes: siquidem interdum per vena sectionem, aliàs per enematum infusionem, aut purgantium exhibitionem; nonnunquam etiam per unguenta, leniendi, laxandi, & discutiendi vi prædita. Est & alia convulsionis species quæ ex inanitione fiat, quæ magna ex parte lethalis est, neque medicas admittit manus. Sub nervorum autem resolutione aphoristicè apoplexiam intelligit; eam nimirum, quæ ex fluxu sanguinis ortum habet: nam non raro contingit, ut sanguinis multitudo antequam putrescat, in unam aliquam corporis partem confestim decumbat, & tunc eiusdem actionem penitus aboleat, aut saltem noxam hand contemnendam



nendum inferat; atque ubi in cerebrum confertim irrumpit, apoplexiam facit. Igitur in nervorum resolutione, ubi plenitudinis indicia fuerint, à sanguinis missione curatio aspicienda erit. Oportet tamen in eiusmodi morbis detractionem esse moderatam, ne corpus refrigeretur, sanguisque è latere incolmio educendus est. Ex genere qua sauces subito strangulant, est angina, (quam ἀπὸ τῶν ἀγγείων qua suspensio vocant, à suspensio similitudine quod non aliter quam laqueus praefocatus interficiat, συνάγγη nominant) & quoniam ea frequenter canes apprehenderentur, συνάγγη dicere maluerunt; nonnulli quod lapsus frequens esset virium συνάγγη appellarunt. Est autem proprie inflammatio, qua in faucibus vel in gutture fit; atque quoniam ex cumulatâ confertimque facta euacuatione sanguinis animo facile deficerent, atque adeo suffocationis periculum immineret, non confertim, sed parè pluribus interpositis vicibus auferendus sanguis est. Ac proinde quemadmodum nervorum resolutione sanguinis detractione recte curari dixi; ita aphonis eodem auxilij genere recte medebimur, quum ex iisdem causis, & eodem principio lesio oriantur. Fiunt enim aphonie, aut, ut Celsus, subita vocis suppressiones, lesio nervorum principio, hoc est, cerebro, unde ad nervos vocales, vel alias partes vocis inseruientes, materia multitudo, aut humorum qualitas defluit; atque inibi aut tensionem vehementem, vel exolutionem, & laxamentum tam nervorum, quam musculorum vociferorum facit.

### & quacunque de causa ruptum.

PARTIM ut materiam peccantem remoueamus, ne phlegmonem pariat; partim ut inflammationem iam factam auoliamur.

### Item malus corporis habitus.

EST quando ex longo morbo malus habitus corporis oritur: atque hic quidem quoniam longitudine morbi collapsa sunt vires, non admodum accommodata erit vena

sectio. Nonnunquam etiam ex viscere in scirrbum indurato potissimumque hepate, & liene, consequitur: Interdum etiam suppressis hemorrhoidibus, aut non prole fluentibus mensibus oritur: atque huius quidem generis cachexia, ut docet Paulus, auxiliatur sanguinis detractio, nisi quid obstat; quæ paulatim, ad tertium quartumve diem producit.

### omnesque acuti morbi.

QVI sint acuti vehementesque morbi, ante definitum est: at qui sint ij qui non infirmitate, sed onere grauent, inquirendum est; primique inter hos occurrunt, qui aut strangulant aut suffocant, in his enim vitalis facultas non tan infirmatur, quam suffocatur.

### Fieri tamen potest.

DVOS esse precipuos scopos mittendi sanguinem, virium robur, morbi que magnitudinem, diximus. Galenus videtur virium robur in acutis morbis ex sola vitali facultate aestimare: atque ita quanquam naturalis vel animalis facultas ex functionum lesione, sibi non satis constare videretur; si tamen unius vitalis munus integrum ex pulsu deprehenderit, virium statum satis firmum, nec debilem esse putat; atque in eo sanguinis missionem audacter decernit, quod nullum vite discrimen ex aliarum functionum offensione impendat, nisi hac ipsa vitalis detrimentum acceperit. Iubet igitur, pulsui, tanquam signo minime fallaci, attentos esse de virium robore indicaturos: & si quidem imbecilliores esse pulsus contingat, morbi que ratio sanguinis eductionem efflagitet, tum quidem est mittendus sanguis, non pro morbi magnitudine, sed virium ratione: admonendique astantes sunt quantum periculi iam impendat si venam tundere procrastinemus; & rursus quam anceps remedium sit in sanguinis missione. Verum quoniam, ut docet Galenus, satius sit anceps experiri remedium, quam nullum, constantibus viribus quantum & morbi ratio, & virium robur efflagitat, emittemus: Debili



contra existente corpore, virtutis iam in rationem habebimus; atque quantum morbus opiosam sanguinis missionem requirat, si pulsus parvus, obscurus debilisque, atque respiratio difficilis, parva & crebra sit, cum voce exili, & languida, que neque viro pulmonis, neque pectoris orta sit; parum, & quantum vires ferre possunt, sanguinis detrahemus.

### Sed si nullum tamen appareat.

IN peracutis simpliciter (perperacutos vocant) morbis, anceps potius remedium quam nullum experiendum esse dicit, summis enim morbis, summe exquisitis remedia optima sunt: in his etenim tardare, ut inquit Hippocrates, malum est. quod quoque Aeginetiam voluisse verisimile est, quum precipit in morborum initiis usum id ipsum exigente, sanguinem nonnunquam mittendum, sola in ventriculo ciborum concoctione, aut etiam perfecta in iecinore sanguinis elaboratione facta.

### Cum sit autem minimè crudo.

IN omnibus morbis, quales quales tandem sint, si ferat occasio, à sanguinis missione temperandum est, dum ventriculus, primaque vena nulla humorum corruptela, aut cruditate, aut cibo semicotto confarcta sint; idque ne crudi adhuc cibi, aut parum rectè concocti rapiantur in venas totumque corporis habitum. Cavendum etiam est ne excrementis intestinum, aut vesica lotio distendatur: quare si quando in acutis etiam morbis (exempli causa, pleuritide) mittendus esset sanguis, atque astrictior esset alvus, statim enemate injecto, eandem eluere solebant, atque ita protinus in ipso principio ab injecto clystere sanguinem mittere. Quam foris veterum probuissimam consuetudinem considerans, neque satis intelligens Arabs ille Anticenna, cuiusque sequaces, contra Hippocratis ac Galeni mentem, in morborum omnium principis à phlebotomia abstinendum prorsus precepit, & concoctionem non

solum in primis venis, sed dum morbus principium statumque praterierit, expectandam, atque sub id tempus tantum phlebotomiam rectè administrari posse asseruit. Dicunt enim per initia, praesum veniam noxios humores extenuare, easque per corpus quoque versum propellere, sanguinique puro, & sincero permisceri; nonnumquam etiam nos expectatione nostra adeo decipi, ut cum salubri nihil prorsus vitiosi educatur: consultum igitur multo esse incisionem vene deferre, dum morbus principium ac statum praterierit. Quae sanè etsi prima fronte magnum quid praese ferre videantur; tamen si quis cum Hippocratis Galenique placitis, atque ad id curi ipsa ratione consulas, quam sint absurda atque à ratione aliena facile consequetur: nam si, ut dixi, primus scopus sit virium robor, eo certè egrum destitui continget, in morbis praesertim acutis, antequam morbus principium statumque praterierit. Et si in morbis qui plethoras subsequuntur, concoctionem, seu maturationem materiae expectemus, tantum abest ut optatum finem aliquando consequamur, quum periculum sit, ne qui quantitate tantum peccabat, spatio temporis etiam qualitate molestus sit: atque sic Galenus protinus in principio in synochis antequam putrescant sanguinem demit. Nam & Hippocrates, quum morbi inchoant, si quid moue dum videntur, mouet, atque iisdem quiescentibus quierem adhibet. Malè igitur post statum quiescentibus morbis, tunditur vena ex Archibum sententia, quum neque noxios humores exagitet sanguinis missio, ut asserunt (demit enim multitudinem quae perurbationum & morbi causa fuerat) neque eosdem extenuet, (tenuis enim humor crasso expeditius & celerius emanat:); quare sanguinem & puriorem, & crassiorum reddi consequens est.

### At si morbi ratio patiat.

ACVTORVM morborum quum non omnino similes sint exacerbationes, neque celeriter a quod ad vigorem properet, varij etiam sunt remedium scopi; siquidem peracuti statim,



statim, hoc est ipso etiam quarto die, vel ad saltem, vel ad mortem terminantur: in iis igitur prima die, non expectata confectione, inuadendam venam dixi. At acuti simpliciter, & qui ex decedentia vocantur, seu, ut Hippocrates, qui in quadraginta diebus indicantur (quoniam non usque adeo vehementes habeant paroxysmos, cumque casum vehementiam) intermissionem urinis aut alterius diei facile adferunt: seu, ut in longum tempus sanguinis missio differatur, non facile concesserunt; praesertim qui Hippocrati, & Galeno acuti simpliciter nominantur; quod videlicet morbi magnitudine vires cito prosternantur, quarum in sanguinis missione magna habenda ratio est. Verum in iis morbis qui aut quadagesimo die indicantur, aut corporis malum habitum concomitantur, ut post quartum vena tunc non tundatur, fieri non potest ut credam; quum in iis vires non tam subito prosternantur, neque sanguis tam sit vitiosus, ut confertim totius corporis miscellam corrumpat: in iis etenim non raro ultra quartam etiam diem cruditatis aliqua suspicio adhuc subest. Sed & in acutis etiam morbis imperfecte indicatis, naturam sepe numero innare expedit, aut purgatione aut vacuatione; ne quod reliquum est, in morbis, recidivam pariat. Adde quod Galenus nono methodi Therapeuticae, in continuis febribus cum plethora non dierum numero sed virium robori attendendum dicat: Optimum, inquit, factum est, in huiusmodi febribus non statim numero dierum, sed virium robori attentum esse; quippe quod si servatum est, non solum sexto, sed in octavo, sed etiam sequentibus diebus est mittendus sanguis.

### Quod si vehemens febris urget.

UT vniuersalium temporum, ita etiam particularium, & dierum quibus morbi recedunt, delectum habendum docet: idque in his potissimum morbis, quorum certa est remissio vel intermissio; nam in accessivis a vacuationibus omnino temperandum est, quod humores sub id tempus maxime aestent,

incidentur, ac perturbati permisceantur, omnes etiam vacuationes vires laessant: quare vix tuto in paroxysmorum agitatione obiri possunt. Videant igitur quam obseruent methodam Therapeuticae, qui statim ante febrium accessionem mittendum sanguinem (multiplici sua experientia edocti ut dicunt) astruunt; atque hinc discant quam sit manum citra rationem experimentum.

### Fere etiam ista medicina.

IAM de iterata aut repetita sanguinis missione sermonem facit: hic igitur, ut Galenus docet, observandum id est, ut in quibus vacuare simpliciter mens sit, eadem die reiterata deitatis fiat; in quibus contra revelere praestat, ut post duos dies fiat; & quibus quidem multa opus est evacuatione, vires autem non sint fortes, in his vacuationem reservare oporteat, & prima deitatis deiectione defectuosae facta, rursus iterato deitahere, aut si velis tertium.

### Quod si in cura quoque aquae.

QUAMVIS Celsus sequente libro in cura hydropsis vena sectionis nullam faciat mentionem; Galenus tamen tum alibi, tum libro De sanguinis missione adversus Erasistratum, conuulsionem & aquam inter cutem sanguinis missione se subinde intrasse dicit; idque, ubi vitium originem traxerit, a mensibus aut hemorrhoidibus suppressis. Sic Hippocrates sanguinem enacuare praecipit, siue in tremorem, siue in aquam inter cutem, siue aliud quodvis frigidum vitium, aut vir ex hemorrhoidum suppressione, aut mulier ex mensium retentione inciderit. Caterum hic aliud longe curandi genus intellexisse indicarim, tantum abest ut de hac hydropum curatione Celsum locutum existimem. Nam hydropsis opus erat dicesse aquam inter cutem sanguinis missionem efflagitare, quam ante malum corporis habitum, cuius illa fere comes est, idem remedium requirere pronuntiavit? Quocirca haecce mihi videtur sententia, quod quoniammodum aquam inter cutem (quantumvis aliena sit natura nostra)



Aræ) neque medicamentis elicientibus, neque chirurgi opera confertim unoque impetum citra agri discrimen educimus; ita sanguinem qui naturæ nostræ familiaris est, & in quo nativus calor habitat, non tam precipitanter atque confertim exhauriri æquum est: sed, ut antè diximus, reueranda est detractio. Quò fortè respiciens Arabs Aui-cennas, in synochi principio etiam constan-ribus viribus parçè sanguinem mittit; post statim autem copiosius eundem educit, non contentus Hippocratis & Galeni dogmati-bus, qui in huiusmodi statim ad animi deli-quinum mittunt, in principiis enim morbo-rum vires adhuc probè sibi constant, quæ sensim tum morbi sentitia, tum materiæ pec-cantis pondere labascunt. Sanguinis igitur missione ad lipothymiam usque facta facul-tas vitalis aliquantum licet læsa videatur; natura tamen noxiarum humorum pondere expedita (quæ veluti sarcina premebatur) priores vires facillè recuperabit, & quicquid spiritibus, & immato calori detractum est, resarcit. Quare verisimile quoque est, Cel-sum, hic neque de synochis neque continuis ardentibus locutum esse, sed de iis tantum morbis in quibus vires imbecilliores sunt, & quibus non imminuat maius periculum ex sanguinis abundantia, quàm animi deliquio. Nam & Galenus ipse confertim factas va-cuationes cauendas docet; nec nisi magna urgente necessitate obediendus esse.

Mitti verò is debet,  
si totius.

IN venarum incisione delectum habendū docet: sunt enim hæc varia, & multi-plices. Si igitur totius corporis causa fiat phlebotomia, rescanda sunt vena brachij, quòd nimirum ampliores sunt. Exit autem hic operæ precium explicasse, cuius nam bra-chij vena iudenda sit, pro plenitudinis cor-pus grauantis differentia. Plenitudinem igitur, cui nulla partis affectio asistit, unaqua-libet citra delectum incisa vena curat, modò illius angustia fluxum non remouetur: & quoniam rationi omnino consentaneum est, in vasorum omnium plenitudine, illinc plu-

rimū exhaurire, vli fons, & origo humo-rum est, commodissimè præcideretur vena cu-biti dextera interior; validissimè enim ea, & à caua dicta vena, & à iecinore attrahit. Quòd si plenitudo etiam bilioso humore la-befacteretur, eadem quoque rescanda erit, quemadmodum si melancholico sinistri bra-chij interior, idq; respectu habito ad lienem.

si partis alicuius ex ea  
ipsa parte.

QUANQVAM locus hic multa de reuul-sione quæ ex directo, aut quæ in contrarium fiat, flagitet; tamen quoniam de iis ab aliis satis superque dictum est, paucis quid Celsus noster voluerit, & quid sentiamus, enarra-bimus. Est igitur reuulsio procumbentis, & illabentis humoris tractus in contrarium: Contraria autem vocamus quæ in eodem genere plurimum distant; sitque contraria dicimus, quæ vnius & eiusdem rectæ lineæ extrema tenent, ad quæ & motus facti, contrarij nomine insinuantur. Ea igitur quæ in eiusdem venæ processu recto quàm longissimè distita sunt, contraria vocantur, sic plenitudi dextre, nequaquam contra-rium esse censemus latius sinistrum; quum è dextro latere nulla vena rectis fibris in sini-strum procedat: atque hoc est quod tum Hippocrates, tum Galenus passim inculcant, qui non solum in dextera plenitudine, sed ieco-ris etiam inflammatione interiorem dextri cubiti venā rescant: quæ si fortè non com-pareat, mediam aperiunt; & si neque hæc sese proferat, ad humeralem confugere ma-lunt, quàm ad interiorem diuersi brachij, quum tamen, ut antè diximus, iecori venæ omnes societate inungantur. tantum scilicet vim attribunt reuulsioni quæ è directo la-teri affecto sit. Nam reuulsio, ait Galenus, è directo facta euidentis subsidium celeriter affert; at è transuerso nequaquam: nam quæ in aduersa parte obitur, tantum abest ut morbum adimat, sed noxium humorem in inflammata parte relinquit, vel puro ve-narum sanguini permiscet, aut (quod fre-quentissime contingit) aduersa partis plen-ritudinem



ritidem iniebit. Verum quod auctor noster dicit quàm longissimè sanguinè mittendum esse, inde ubi lædit, intelligendum est omnia contraria verè longinqua esse, neque solum extrema extremis, sed media mediis, & extrema mediis opponi. quo fit ut si reuellendo vacuare voluerimus, liceat omnem in directo cursu venā refecare; aliàs quidem in extremis, aliàs circa mediū, aliàs propinquo, aliàs distante loco. Sic Hippocrates libro De ossium natura, Operam, inquit, dare oportet, ut quàm longissimè à locis ubi dolores fieri solent, ac sanguis colligi, venam secemus; sic enim minimè mutatio magna de repente fiet, & consuetudinem transuleris, ut ne amplius in eundem locum colligatur. Atque hæc quidem in parvis leuibusque inflammationibus, locum aliquo modo habere possint: atqui ubi acris & vehemens inflammatio molesta est, è directo ampla vena loco vicino iuxta citius & valentiùs à loco affecto & retrahit, & vacuat; ut quæ quàm maxime distante præcisa vena sit reuulsio, noxium humorem ignauius tardiusque concitat, neque affectam sedem ab hoc liberat, aut cerè benigni sanguinis exuperantiam primum tollit, vitiosam autem materiam è propria sede raptam cum salubri viliusque permiscet. Neque dubito Hippocratem, & Galenum passim inculcare reuulsionem ad longinqua fieri debere: verum iidem præcipiunt habendam rationem magnitudinis phlegmones: nam celer & ingens humorum fluxio, præcepit remedium flagitat, quod per humorum antispasum in propinquam partem suggeritur. Parua verò ac tarda, longiorem curationis moram sine noxa sustinet, qualis ea fuit cuius ex Hippocrate memini.

### Videtur tamen vsus ipse docuisse.

AVERSIONIS varios modos declarat, capite confracto ex brachio sanguinem mittendam docens; naribus sanguinis fluore laborantibus, brachij è directo lateri affecto correspondens incisam venam plurimum conferre: seruanda enim est, ut docet Aëtius,

in enachando locorum affinitas, rectitudine fibrarum obseruata. At quod subiungit quòd humero affecto, vsus docuerit in altero brachio mittendum sanguinem, quòd iniuria oportunior sit; ut in sideratis locum habet atque resolutis, ita in aliis non semper.

### Mittere autem sanguinem.

IAM quæ in vene sectione chæurgus cauenda sunt explicat: neq. enim citra omne periculum inciduntur; quum venis aut arteria inuncta sint aut nervi subiaceant. sub interiore enim, quæ basilica dicitur, ferè comes arteria delirescit; & sub media nervus: utrisque autem fere musculorum tendones subternuntur. Cephalica licet difficilior sit, omnium tamen solet esse iutissima. Ex nervo igitur, aut tendone puncto, dolor ingens, stupor, & resolutio, & brachij convulsio cum timore eueniunt: atque huius quidem suspicio si qua fuerit, vulnus ne coalescat inhibebitur, dum ab impendente phlegmone vindicatum fuerit, & dies duo tresve intercesserint: id autem commodissimè fiet foin repentis olei. Arteria autem aperta sanguis emanat tenuis rubicundus, ignem & quasi pulsu quodam exiliens; agrèque compescitur, illiusque magna vi effusa, sequitur virium exolusio.

### At si timidè scalpellus demittitur.

QUONIAM Ioannes Fernellius libro De vacuandi ratione, plurima quæ ad locum hunc & alios nonnullos facere videbantur, doctissimè simul & clarissimè explicat; eius non solum sententias, sed & periodos integras ascribere libuit, idque semel commonescere placuit, ne illum suo defraudemus honore: Chæurgus igitur ut probè venam secet, scalpellum habeat, cuius micro sit acerrimus, quem visu perspicaci, manique valida summis digitis apprehendet, nec plus micronis proferet, quàm ad penetrandum sit satis, manu altera membrum, eiusque pollice venam stabilit, seu sim nullaque festinatione, quod satis est, suauiter impellens. Arim  
autem



autem confricuntur, dum incallescant, & proximè supraque eum locum in quem scalpellus adigerit arctius vincitur, ut sanguine collecto, vena tumensior in conspectu se det. Infra quoque alligari nos non minus quam est, quod tremula inconstansq; vena ad phlebotomi quemvis impulsum refugit, aut e sede sua profilit. His autem quibus angusta vena sunt, aut in altum deversa, & quibus cutis densa est, multo arctius vinculum iniicitur, quam iis qui contraria constitutione sunt. Si autem vena lateat, ut docet Celsus, aut non facile reperiantur, manus, aut pedes, si eo loci secare animus sit, in calentem aquam demittimus: & si ne sic quidem sese prodant, eam, quo loco esse solet, digiti impulsu percontabimur, dum sanguinis affluxu illius exploretur sedes; adeo facile est perito venam secare.

### Incidenda ad medium vena est.

QUVM sint tres sectionis figura, transversa, recta non purgens, sed findens venam in directum, & inter has media quæ appellatur obliqua; sufficit Celso dixisse venas in medio incidendas. Transversa igitur videntur est in quibus detractionem omnino recipere non volumus, incurvato enim cubito oscula fissura componuntur: & commoda est hac incisio, ubi magnam fissuram facere voluerimus. Obliqua autem fissura utilis est, in quibus retractio repetenda est, & eo quod à vase non aberramus dum sic secamus; sed etiam sanguinis eiectio ex obliqua fissura pulchrior est aspectu videntibus, dum velut obtorquetur & obvolvitur sanguis in saltu. Oblonga verò in directum fissura, commoda est his in quibus non solum eadem die sectionem reiteramus; sed etiam post unum aut duos dies, incurvato enim cubito disparantur oscula fissura. Commoda est etiam fissura in directum his in quibus prævaricatio labiorum solet fieri. Vena igitur quæ in articulis, in brachij flexu, in poplite extant, in rectum diffisse tardius coalescunt, quod articularum frequenti agitatione, vulnusculi labra quodammodo debif-

cant: verum quæ extra articulos sunt venæ, ut in capite, in pedibus, in manibus, diversam secandi rationem efflagitant; ut quæ in rectum fissæ, cicatricem celerius admittant; labra enim semper inter se coeunt. Rursus, quod ad sectionis modum attinet, si crassus aut viscosus sanguis, qualis melancholicis inesse putabitur, aut si aeris constitutio frigida sit, ampla; si tenuis & aquosus sanguis fuerit, aut ipsa calis constitutio calida, angustior tamen denum fissura fiet. Cæterum iam erumpente sanguine, qualitas eius statim consideranda est: nam si omnibus partibus probe sibi constet, cohibendus fluxus erit; talis autem est qui nec crassus, nec niger, sed rubens ac pellucidus sit. At si vitiosus is est qui effluit sanguis, præsertim si virium robor (quod ex pulsus facile deprehenditur) atque phlegmone adsit, si æger ætate vigeat, ac aeris constitutio sit temperata, sanguinis immutatio est expectanda; siquidem mutatio index est sanguinem ex inflammata sede, in qua is est à reliquo dispar, evelli. In istam tamen quibus imbecilliores vires sunt, nec tantam vacationem quam coloris sanguinis mutatio sequitur, ferre possunt, & quibus phlegmone adeo maligna est, ut de sanguinis mutatione nihil concedi, non erit expectanda sanguinis mutatio: sed quum alij scopi sint sistendi sanguinem, ut docet Galenus, libro De sanguinis missione, illis attentum medicum esse oportet: nam si sanguis minore impetu quam antea ferebatur, effluit, signum est iam satis esse detractum. Signo autem quod ex pulsuum immutatione sumitur, maxime attendendum monet Galenus, quod nequaquam mendaci indicio, confestim quiescendum à sanguinis aspiratione, ubi vel in magnitudine, vel in quantitate is mutatus fuerit, indicit.

### Semperque antè finis faciendus est.

QUOD si simpliciter ad animi deliquium, non mittendum sanguinem dicat, non video qui excusari possit: verum si ita intelligamus, ut agro debiliore existente, finis mittendi sanguinem faciendus sit ante lipethy-



lipothymiam, cum Galeni, & Hippocratis theorematibus omnino conveniet. Nam, ut in Aphorismis Hippocrates, ubi ad animi defectionem expedit ducere, faciendum, si aeger possit tolerare. Sic Galenus nono Methodi, Aufero, inquit, sanguinem de industria ab homine quoad animo languatur. Convenit autem eiusmodi evacuatio, ut ante contra Auicennam diximus, in continentibus, & ardentissimis febribus, idque si vires consent: quare in iis in principio veniendus est, quod vires adhuc integre sint. Phlebotomia enim statim ad animi usque deliquium facta, refrigeratur totius corporis habitus, & febres extinguuntur, & plurimis etiam aliis citatur, & bilis emittitur: quas res statim a toto corpore madores sudoresve excipiunt. Sic Galenus libro nono Methodi, Eorum, inquit, qui ex sola obstructione febricitant, nemo in putredinis febrem incidit, qui prius sanguinem miserat: quin ubi valida virtus est, & aetas permittit, usque ad animi defectionem mitiorem expedit; ubi horum alterum non satis respondet, tutius est quantum visum satis fuerit, tantum principio detrudere, quod desinit, iteratione supplere: etenim hoc presidio omisso, qui ita febricitant, in summum discrimen veniunt, nisi eos vel virium robur, vel largum sanguinis prestium, vel sudor copiosus ex manifesta pernicie eripiat. Sic quoque Galenus in carbunculis (sunt enim feve coniuncti febribus) idem remedium experitur, quod corpus in contrarium statum celerimè agatur, sanguinis missione ad lipothymiam refrigeratum. Neque dubito hoc & alia medicamentis eiusmodi esse facultate praedita, ut si eis immoderatè aut intempestivè utaris, vitam adimant: siquidem, ut Galenus nono Methodi ait, in sanguinis missione, (quam usque ad animi defectionem faciendam paulo ante diximus, quòd flamma in continentibus ex meatuum clausura in febribus extinguetur) non paruum merito subsequitur incommodum, nisi opportuno tempore, aut debita mensura fiat: si namque abundantia paulo viribus superior fuerit, utique ex moderatione adeò nullum accedes viribus in-

commodum, ut etiam maximum comparetur commodum, quod eas premetat sublato. In quo affectus sanetur multa vacatione est opus, resoluatur autem ex tanta inanitione virtus, non modò rursus homini non prodiderit, sed maximum etiam illi afferet periculum. Igitur in febribus aut aliis morbis qui ex corruptela humorum incidunt, quanquam id quod corruptum est, à natura omnino alienum sit, & se auferendum dicet, si tamen corruptela illa cum virium imbecillitate sit, paulatim quod vitiosum est evacuamus, sensumque pro eo quod salubre est reponemus; siquidem immodicas aut quæ confertim sunt vacationes, aut purgationes vires imbecilla non ferunt. In eiusmodi igitur morbis, in quibus quod affectus remedium est, cum virtutis custodia pugnat, Celsus vacationes moderatas præcipit, & quæ ad animi usque deliquium non fiant: nam & Galenus ipse has vacationes confertim factas vitandas ac fugiendas monet, nisi magna quadam necessitas ut id faciamus inbeat. Quin etiam revulsio ipsa non leue existens auxilium per sanguinis quoque missionem sæpius factam, quanto maiorem in numerum particulares auxeris detractiones, tanto efficacior fit. Ita enim natura toties irritata per particulares has detractiones sanguinis quæ ad partem malè affectam conflunt, maiore cum impetu in contrarium locum reponere, ac retrudere assuescit, ut hoc nomine necesse sit, auersionem quæ per sanguinis missionem sæpe iteratam sit, multo esse præstantiorem, quàm eam quæ confertim fieri solet.

### Ideoquæ protinus brachium.

SANGVINE, ut morbi magnitudo & vires aegroti ferebant, misso, vinculum solvendum est, vulnusque exicandum, ne concrecente sanguine, madens, aut non coalescat, aut abscessus metum inferat. Detersum vulnus linteis obsignandum, vel rosacco, vel dulci aqua imbuto, aut etiam oleo si fundere sanguinem iterum consiliū sit, fasciisque linteam devinciendum, quæ nec arctiores sint, nec cutim vulnerisque labra distorqueant.

Z

CAPUT



*De sanguinis detractiōe per cucurbitulas.*

**C**UCURBITULARVM verò duo genera sunt, æneum, & corneum. Aenea altera parte patet, altera clausa est. Cornea altera parte æquè patens, altera foramen habet exiguum. In æneam linamentum ardens conijcitur, ac sic os eius corpori aptatur, imprimiturque, donec inhæreat. Cornea per se corpori imponitur, deinde ubi ea parte qua exiguum foramen est, ore spiritus adductus est, superq. cera cauum id clausum est, æquè inhærescit. Vtraque non ex his tantum materiæ generibus, sed etiam ex quolibet alio rectè fit. At si cætera defecerunt, caliculus quoque aut pultarius oris compressioris, ei rei commodè aptatur. Vbi inhæsit, si concisa antè scalpello cutis est, sanguinem extrahit: si integra est, spiritum. Ergo ubi materia quæ intus est lædit, illo modo: ubi inflatio, hoc imponi solet. Vfus autem cucurbitulæ præcipuus est, ubi non in toto corpore, sed in parte aliqua vitium est, quam exhauriri ad confirmandam valetudinem satis est. Idque ipsum testimonium est, etiam scalpello sanguinem, ubi membro succurritur, ab ea potissimum parte, quæ iam læsa est, esse mittendum, quod nemo cucurbitulam diuersæ parti imponit, nisi cum profusionem sanguinis eò auertit, sed ei ipsi quæ dolet quæque liberanda est. Opus etiam esse cucurbitula potest in morbis longis, \* quamuis & ijs iam spatium aliquod accessit, siue corrupta materia, siue spiritu malè habente. In acutis quoque quibusdam, si & leuari corpus debet, & ex vena sanguinem mitti, vires non patiuntur. Idque auxilium vt minus vehemens, ita magis tutum. Neque vnquam periculosum est, etiam si in medio febris impetu, etiam si in cruditate adhibetur. Ideoque ubi sanguinem mitti opus est, si incisa vena præceps periculum est, \* aut si in parte corporis etiam vitium est, huc potius confugiendum est. Cum eo tamen, vt sciamus, hîc vt nullum periculum, ita leuius præsidium esse, nec posse vehementi malo, nisi æquè vehemens auxilium succurrere.

\* aliàs,  
quamuis  
etiam spa-  
tium

\* & si in  
nobili p.

ENAR-



## ENARRATIO.

**D**VO antiquis cucurbitularum genera fuisse tradit Celsus; eorum unum, alterum cornu: neque ex his tantum materia generitus, sed & ex alio quoniam recte constari. nam vitreas commenti sunt; idque ideo ut sanguinis qui euacuatur qualitas, & quantitas in euacuando pellensceret: sed haec quum flammam copiosorem non sustineant, aeneis longe sunt inofficaces. Argenteorum quoque usus aliquando fuit: sed quoniam vehementius igneuntur, reiecit antiquitas. De figura earundem ne attigit quidem Celsus, quum tamen eadem plurimum inter se differant; & praesertim aenea, ut auctor est Oribasius. Altiores enim, ut inquit, magis quam humiliores trahunt; quaque humiliores sunt, quia non vehementer attrahunt, capiti sunt accommodatiores: Quae habent plana labia, corporibus latis; quarum labia resina sunt, corporibus curvis & gracilibus aptius accommodantur: Quae acutum os habent, iis conueniunt, in quibus non scarificamus, sed vehementi impositione cucurbitularum, quas leues affigimus, attrahere volumus, quum acumen labiorum ad violentum attractum faciat. quae labra habent obtusa, cum in aliis, tum vel maxime in capite utimur. At quoties admoturi sumus cucurbitulas particula in reatum figuratae, ex latere eadem affigimus; si enim (ut docet Paulus ex Aegina medicus) iacentibus ipsis desuper linamentum cum flamma ex lucerna inducamus; ex cute decedit illa, graniter adurit, usu hoc ipsum postulante.

### Cornea per se corpori imponitur.

**CORNEARVM** usus summe commendabatur, ubi excitationis subesset periculum: siquidem quantumvis aeneis minus trahant, vicinas tamen partes non exurunt, vel quoties vix anelli posse suspicio esset, ut in capite, aut si timidior sit patiens, nec flammam sustinere possit, cui affigenda sit.

### Vbi inhæsit.

**AFFIGVNTVR** cucurbitula, aut cum scarificatione, aut sine eadem, sed quæ citra scarificationem applicatur, aut cum igne, ut dixi, admoetur, aut cum aqua tepida, in qua decocta sint herbe emollientes: atque huiusmodi in plenitudine summe commendabatur antiquitus, quod & spiritus citra noxam attraheret, & poros laxiores redderet.

### Ergo vbi materia quæ intus est lædit.

**SCARIFICAMVS**, ut docet Galenus, partes corporis aut phlegmone vexatas, aut fluxione, quæ iam firmata est, tentatas, aut tensas, aut induratas, aut dolore aliquo gravatas, aut ubi materiam ex aliis partibus in alias traducere volumus. Hic autem subiungere locus postulat, quantam diligentiam veteres illi, in diuisionum mensura, & qualitate, & ordine obseruauerint; nam pro loci affectu varietate, diuisionum discrimina variabant: siquidem cruribus, dorso, abdomini, thoraci, cernici, per rectitudinem scarificabant; at in capite pro situ capillorum, in fronte obliquas faciebant. Præterea partes quæ scarificanda erant, prius lauabant, si modò fieri posset; sin minus, aqua tepida perfundebant, usque dum ruberent: aut spongiis aliqui fovebant, & si quando à carnosus partibus detractione molirentur, primum cuius scalpello exasperabant, ita ut incisiones æquali inter sese magnitudine, atque æqualia essent quæ inter eas sunt interstalla, initium scarificationis ab inferioribus partibus semper sumentes, deinde cucurbitulam imponentes: At si excarnis esset, leuem prius cucurbitulam affigebant, atque ubi in tumorem particula elenata esset, scarificatu adhibito, rursus ipsam accommodabant, ac pro quantitate materia quam euacuare cogitabant, diuisiones paucas, aut multas faciebant. Hodie contra nulla horum ratione habita, carnositas aquæ ac excarnibus partibus ante scarificationem



tiorum cucurbitulas affigimus, neque quasuis tantum, sed eas solum quae magnitudine reliquas excellunt, idque cum uberiore flamma, ut quam plurimum noxii aut humoris aut spiritus peccantis ad se trahant. Alij exaltatorem quandam methodum sibi pollicentes, primum admonent scyas; in ablatis in tumorem loca redacta circumspiciunt; ac si quae sint quae colore aliquo extraneis varient, aut alioqui admodum exuberent, scalpello curim exasperant; sin minus, contra. Terminum autem diuisionum moderate altitudinis solam cutis crassitiem statuunt. Igitur quae cum scarificati adhibentur cucurbitulae, efficacius humores, & spiritus per halium egerunt, sensibilibus ea quae nocent ex alto elicientes: nam non modo sanguinem, sed & alios quoque humores vacuant, praesertim cum flamma copiosiore glutinata.

#### vbi inflatio, hoc imponi solet.

LEVIS cucurbitula, inquit Paulus, inflatione discuit, distillationes in stomachum suspendit, sanguinem extrahit, & profluentem rursus sistit, obiectis partibus admotae; quod aliud conditum est, in summa rursus educit. Celsus inflationibus tantum imponi dicit, quod videlicet his seu praesentissimum remedium adhibeantur, quemadmodum docet Galenus Therapeutices xxi. libro, dicit autem: Dolor qui spiritum flatuosum comitatur, propriam quandam curationem sortitus est ex cucurbitula cum flamma copiosa multoties admotae, videbiturque praesidium hoc in huiusmodi morbis incantamenti cuiuspiam quid simile efficere, siue in intestinis, siue in quavis corporis particula sine excitati, illico enim cucurbitula admotae qui spiritus flatuoso cruciantur, tum a dolore liberi, tum omnino sani redduntur.

#### Vsus autem cucurbitulae praecipuus.

QUIBUS affectibus cucurbitula recte adhibeantur, Celsus dixisse sufficit: at quo tempore eandem vsus conueniat, subicit, vel quod clarius putauit quam ut dici de-

beat, vniuersalia dicta remedia antequam particulae, vel quod senties adhuc morbos, ut loquitur Galenus, intellexerit, in quibus non expectata purgatione cucurbitulas ad veniendum adhibemus; vsus enim earum est, mouere aliquid, agitare, & foras euocare.

#### Opus etiam esse cucurbitula.

LONGIS aequè ac acutis morbis scarificationem prodesse dicit: sic Galenus diuturnis oculorum fluxionibus vexatis conuenire, & capitis affectibus, malisque thoraci & dorso accidentibus recte applicari auctor est: sic haemorrhoidibus, mensibusque suppressis subuenit, fluxionem a partibus nobilioribus ad ignotiores derivans.

#### In acutis quoque quibusdam.

Huius generis sunt angina, quod humores sensim eliciat, ac euacuet, atque eadem ratione pleuritidi (ubi videlicet locus affectus humorum fluxione iam non amplius grauetur, corpusque recte purgatum est) in hypochondriis recte adhibentur; ac si res exigat, saepius reiteranda erunt.

#### & ex vena sanguinem mitti, vires.

VIDETUR Celsus cucurbitularum usum omnino periculo liberum pronuntiare; quum tamen Aetius longe aliter sentire videatur, praesertim si ante totius corporis euacuationem fiat. Dicit autem in hunc modum: Illud porro nosse expedit, quod non solum localis venae sectio derrimento est, antequam vniuersum corpus euacuetur, per affectas partes sanguinem derrahens; sed etiam cucurbitula. Et venae quidem sectio minus periculosa est; pro ratione enim allationis materiae, etiam sanguinis excretionem facit: cucurbitula vero tum impetu affixionis violenter materiam attrahens, tum multum locum occupans, & tamen neque vasis sensibilem fissuram faciens, attrahit quidem memorabilem materiam, non euacuat autem pro ratione attracta; & praecordis



Et præcordiis quidem intempestivè affixa, præsertim in continentibus febribus, Et semitertianis, Et maxime etiam si mens ægri fuerit turbata, Et sensus sui obtusus, strangulatum Et mortem eadem die inducit. Capiti verò intempestivè admota, lethargos, Et corporis Et mentis stuporem, Et oculos prociuius facit; quibus autem contigerit ut hæc effugiant, hi omnino in diuturnum aliquem capitis affectum hinc incidunt. Hactenus ille. neque ab hoc dissonat canon Aui-cennæ, qui sensum Et intellectum hebetari dicit, si sinicipiti adhibeantur; si occipitio, obliuionem inducere. Verum etsi hæc quammaximè sic se habeant; tamen si ignobilioribus partibus affigantur, ut ferè fieri assolet, sanguinis missione periculi minus afferunt; præsertim ubi plethora aliqua morbi suspicionem nobis infert, neque viscera, quæ in toto corpore insunt, vasa immoderatè re-

pleta sint, neque distendantur, tum enim periculum id quod à nimia attractione metuendum dicit Aetius, facile subterfugiemus: ac in iis quoque qui ex virium imbecillitate phlebotomiam non admittunt, tutiores sunt cucurbita, ut rectè infert Celsus, aut aliqui si sæpe in anno reueranda sit phlebotomia, quod cum sanguine copioso, è vena vitalis excernatur spiritus, eo autem copiosius exhansito, vniuersa corporis moles refrigeretur, omniæque munia naturalia deterius obcuntur. Si quando tamen necessitas urgeat, ut non ignobilioribus, sed principalibus, aut nervosis aliqui quæ facillè contraherentur, aut conuellerentur partibus affigenda sint cucurbitula, reputa capiti, hypochondriis Et: tum denum, ut noxam omnem, quoad fieri potest, euitemus, cornicis affigemus; ex eis enim ore sugentes trahimus, unde Et minor quoque earum est attractio.

## CAPVT XII.

## De Deiectione.

**D**EIECTIONEM autem antiqui varijs medicamentis, crebraque alui ductione in omnibus ferè morbis moliebantur, dabantque aut nigrum veratrum, aut filiculam, aut squamam æris, quam λεπιδόχαλον Græci vocant, aut lactucæ marinæ lac, cuius gutta pani adiecta abunde purgat, aut lac vel asininum, vel bubulum, vel caprinum, ei que salis paulum adijciebant, decoquebantque id, & sublatis his, quæ coierant, quod quasi serum supererat, bibere cogebant. Sed medicamenta stomachum ferè lædunt. Ideoque omnibus catharticis aloë miscenda est. Aluus si vehementius fluit, aut sæpius ducitur, hominem infirmat. Ergo nunquam in aduersa valetudine medicamentum ejus rei causa rectè datur, nisi ubi is morbus sine febre est. Ut cum veratrum nigrum, aut atra bile vexatis, aut cum tristitia insanientibus, aut ijs quorum nerui parte aliqua resoluti sunt, datur. At ubi febres sunt, satius est ejus rei causa cibos, potionesque assumere, qui



qui simul & alant, & ventrem molliant. Suntque valetudinis genera, quibus ex lacte purgatio conuenit. Plerunque vero alius \* potius \* potionibus ducenda est, quod ab Asclepiade quoque sic \* temperatum, ut tamen seruatum sit, video plerunque seculo nostro praeteriri. Est autem ea moderatio, quam is secutus videtur, aptissima: ut neque \* saepe ea medicina tentetur, & tamen semel sumptum vel bis non omittatur. Si caput graue est: si oculi caligant: si morbus maioris intestini est, quod Graeci κώλον nominant: si in imo ventre, aut in coxa dolores sunt: si in stomachum quaedam biliosa concurrunt, vel etiam pituita eò se, humorve aliquis aquae similis confert: si spiritus difficilius redditur: si nihil per se venter excernit, utique si iuxta quoque stercus est, & intus remanet: aut si stercoreis odorem, nihil deiciens, ager ex spiritu suo sentit: aut si corruptum est quod excernitur: aut si prima inedia febrem non sustulit: aut si sanguinem mitti, cum opus sit, vires non patiuntur, tempusve eius rei praeterijt: aut si \* portauit: multum ante morbum aliquis \* potauit: aut si is qui saepe vel sponte, vel casu purgatus est, subito habet aluum suppressam. Seruanda verò illa sunt, ne ante diem tertium ducatur, ne vlla cruditate substante, ne in corpore infirmo, \* diuque in aduersa valetudine exhausto, ne in eo, cui satis aluus reddit quotidie, quive eam liquidam habebit, ne in ipso accessionis impetu, quia quod tum infusum est, aluo continetur, regestumque in caput, multo grauius periculum efficit. Prædie verò abstinere debet ager, ut aptus tali curationi sit. Eodem die ante aliquot horas aquam calidam bibere, ut superiores eius partes madescant, tum \* deiciens aluus est, si leui medicina contenti sumus, pura aqua: si paulò valentiori, mulla: si leni, ex aqua, in qua scœnum Græcum, vel prisana, vel malua decocta sit. Si reprimendi causa, ex verbenis. Acris autem est marina aqua, vel alia sale adiecto, atque utraque decocta commodior est. Acrior fit adiecto vel oleo, vel nitro, vel melle quoque. Si acrior est, eo plus extrahit, sed minus facile sustinetur. Id quod infunditur, neque frigidum esse oportet, neque calidum, ne alterutro modo laedat.

Cum

\* potius

\* vituperatum,

\* semel ad summum

\* portauit:

\* diuque adu.

\* alias, immittenda in aluum.



Cum infusum est, quantum fieri potest, continere se in le-  
tulo debet æger, nec primæ cupiditati deiectionis protinus  
cedere. Vbi necesse est, tum demum \* desidere. Fereque \*residere.  
eo modo dempta materia superioribus partibus leuatis mor-  
bum ipsum \* molliat. Cum verò quoties res coëgit, desiden- \* tollit.  
do aliquis se exhaustus, paulisper debet conquiescere, & ne vi-  
res deficiant, utique eo die cibum assumere: qui plenior an  
exiguus sit dandus, ex ratione eius accessionis, quæ expecta-  
bitur, aut in metu non erit, æstimari oportebit.

## ENARRATIO.

PRISCIS illis antiquisque medicis  
mos fuit in omnibus ferè morbis quales  
quales tandem essent seu cacochymiam, seu  
plethoram subsequerentur, alium medica-  
mento purgante sollicitare; idq; variis, iisq;  
vehementissimis, medicamentis, quæ non  
citra virium iacturam exhibebantur. Nam  
si quod malum in metu esset, statim ad helle-  
boros, iithmallos, scammonium, idque ci-  
tra ullam commisionem, concurrebant; &  
si non pro voto fluere alius (quod aut ob  
agrotantis hominis proprietatem naturæ, aut  
ob sterus densatum, atque in intestino aliquo  
exiccatum, aut natura ad urinam vergente,  
impedienteque medicamenti purgantis ope-  
rationem, accidere solet) tum demum variis  
medicamentorum modis, eandem sollicita-  
bant; ut puta enematis, glandibus, epithe-  
matibus, oleis & inunctionibus, quæ omnia  
Celsus noster præterit, solarum purgatio-  
num & enematum mentionem faciens. Ve-  
rum quoniam in omnibus morbis adhiberi so-  
litam dicit purgationem, quamvis paulo post  
enarrat, qui morbi eandem requirant, breui-  
bus tamen ante capitis enarrationem perstrin-  
gens purgandi alius scopos. Utimur igitur  
purgatorio medicamento ad corporis tem-  
peramentum transmutandum, ut in diuturnis  
febris, quartanis & quotidianis, insania,  
lepra, scabie, & similibus; præterea mate-  
rie remouende causa, ut in cephalæa, verti-  
gine, comitiali morbo, podagra, nephritide,

arthritis; adhuc ad fluxiones assiduas co-  
bibendas, ut si aures, os, nares, oculos, sto-  
machum, aut totam corporis superficiem in-  
festarint, neque rescicentur ab aliis auxiliis  
aut alia quavis ratione fisci possint. Damus  
etiam medicamenta purgantia, ad antiquas  
affectiones amouendas, atque expurgandas,  
quemadmodum in atrophæa, sideratione, tor-  
pore, sopore, & in summa ad circumscriptum,  
& infestantem humorem educendum, ut in  
aqua inter cutem, & regio morbo. Verum  
ut quis medicamento purgante tuto uti pos-  
sit, requiritur, non secus ac in sanguinis mis-  
sione, virium robur: quare nec senes, nec  
pueri, quum eorum substantia ocysimè diffle-  
tur, commodè purgationem tolerabunt. sed  
neque calidis temporibus tuto eadem adhibe-  
tur, quod tum calor innatus, atque adeo vir-  
tus insita diffleat; sub Cane enim & ante  
Canem (ut ait Hippocrates) difficiles sunt  
medicationes.

dabantque aut nigrum  
veratrum.

DVÆ sunt hellebori species: alter enim  
albus est, alter niger; uterque, ut auctor est  
Galenus, extergentis & calefacientis facul-  
tatis; hic autem gustu calidior, ille amarior:  
suntq; in tertio ordine excalefacientium, &  
desiccantium. Albus, ut ait Dioscorides, vo-  
mitione varios protrahit humores; de quo in  
sequentibus latius: Niger contra, teste Aëcio,  
atram



atram flauamque bilem ex toto corpore attrahit, ac infernè citra molestiam expurgat; quapropter febrientibus etiam per circuitum, & diu ipsum exhibuit. Datur & furiosis & hemicranicis, & diuturno capitis dolore afflictis; in quibus laborantiū maximo commodo & nos quoque usi sumus. Maxime verò idoneus est visceribus, aut vtero, si purgatorio medicamento opus habent, Melampodij cognemem sortitus est, quod Melampus Amithaonis filius, furens Præri filias hoc purgasse dicitur: Dioscorides phlegmagogum dicit, adiecto scammono: Mesues sanguinem etiam puriorem reddere testatur, attrahendo scilicet e venis excrementa sanguini mixta, non à solis cavitatibus partium, sed a toto corpore, ac etiam remotis partibus, & ente ipsa. nam & Manardus quoque hominum memoria doctissimus, ac celeberrimus medicus, veratri nigri ꝑ. i. exhibuit, cum scammonij preparati (dactydiū nominant) granis 2. minusque & lenius purgare dicit, quam iusta dosi cataplorum quæ aggregatina vocant: Albo usus non est; ex Italis tamen robustos posse ferre putat. Mesues cerè nigrum albo salubrius dicit: nam & album (inquit) terribilia minatur symptomata; nigrum contra incolume, & velut inuenile corpus tuerit. & quum omnium consensu nigrum exhibendum dicat, robustis tantum & animosis verno tempore, id quod natura & arte correctum sit, propinat; atque in iis & temperamenti melius, & probatioris mores, & inuenilius florentiusque corpus pollicetur. Acrius diuersimodè exhiberi solitum veratri auctor est: alij enim decoctum veratri dabant; alij cremorem, alij ipsam eius substantiam, & alij sorcipe in ramenta confectum ipsum exhibebant; alique usum & cribratum, idq; pro virum, ætatis ac morbi ratione. nam quibus vires imbecilliores erant, ut pueri, & senes, & quibus morbus facile solubilis esset, cremorem in quo materiatum esset veratrium, dabant; & qui maiori molimine, ac exagitatione opus haberent, & qui confidentiores robustioreque essent, ramenta concisa dabant. Hippocrates pleniticos quoties infer-

nas partes dolor infestaret, hellebro purgat; quandoque helleborum per se, interim etiam peplio admixtum præbens, atque eiusdem usum summopere commendauit. Hodie arte chemica veratrum extrahunt: cognitque in crassiusculum succum; idque variis excoctis modis, ex quo paucillum veluti ꝑ. 3. plus aut minus pro extractionis ipsius intentione ex iure aliquo, aut vino albo maximo cum successu propinant.

### aut filiculam aut squamam æris.

PER filiculam, polypodium seu ῥιζόπο-  
τυον hic cum Plinio Naturalis historie libro XXVI. cap. octauo, non ῥιζόποτυον intellexero; siquidem polypodium, teste Dioscoride, purgandi vim habet, humores lentos ac crassos terget, digerit, siccet, bilem atram & pituitam, vel crassam, vel lentam purgat; etiam à iuncturis: affectionibus ob hoc melancholicis prodest, ut quartanis; præsertim cum nulla, teste Mesueo, aut cum epithymo, etiam colico dolori, & splenis duriciei quouis modo vsurpatum. Verum hic admonitum oportuit lectorem, aliter longè fuisse facultatis, Græcorum polypodium, quod à ꝑ. ij ad aureos quatuor tantum, intò posse exhiberi credebant, quàm nostrum, cuius vel integra uncia parum, & citra molestiam purget. Quod autem ad æris squamam attinet, quumvis tam æris quàm ferri, stomatiisque squamina, & omnes quotquot sunt desiccet atque astrictiōis quid adipiscantur, atque in hoc tantum differant, quod alia magis, alia minus id præstent, helentisque (quam λιπτό ζαλμα vocari dicit Celsus) principem in desiccando obineat locum; Galenus tamen tertio Simplicium, duplicem qualitatem in æris squamina prædicat: ac proinde, sicut duplex ei qualitas inest, ita gemina quoque facultate prædita est; nam & astringit, & mordicat. quare astrictiōe quidem siccitas ulceratarum carnum partes cicatrice obducit, mordicatione verò præhumidas colliquat: quod si intò in corpus sumatur, purgat quidem ventrem, verum non cohibet, vincitur enim ea astringendi facultas,



facultas, ab acri purgationeque potentia, tanquam si vbi succum fecerim inij commiscens: nam quod ex acerbis commixtum erit, soluet vntrem, hand silet, licet gustu aueritas exuperet. Educit aquosa: quare & hydropicis conuenit, satisque est 3 ij ex cocto melle in catapotia redactas sumere, aut ex aqua mulsā bibere.

### aut lactucæ marinæ lac.

TITHYMALORVM genera septem recenset Dioscorides: quorum is qui characias, id est vallis dicitur, principem obtinet locum habentem antea omnes vincentem acrimieque caliditatem; suntque ex quarto calefacientium ordine. Characia liquor vim habet aluum per inferna ducendi, pituitam & bilis purgans, duorum obolorum pondere ex posca sumptus, cum melierato autem vomitum cit. Galenus validissimum liquorem dicit, secundum locum tenere semen, & solia radicemque earundem facultatum partem esse, sed non ex æquo. Tradunt inquit Plinius tones purgari hydropicos feco sumpta, quot guttas lactis characia exceperit. Orbasius instillatum caricis liquorem, protè & circa molestiam purgare, auctor est.

### Aut lac vel asininum vel.

DVPLEX lactis est utilitas: una, ut alimentis; altera, ut medicamentis. Saluberimum est purum sincerissimum, nec acridinis, nec acrimonia, aut aciditatis, aut sal sedinis, aut febris participes. Omne autem lactis triplici constat substantiâ, caseosa, fersa, ac pingui, quam copiosissimam obtinet bubulinum: equinum, vti & asininum, magis alio secedit, quod pinguis succi minimum possident. Caprillum, ut docet Aëtius, moderatam compagem obtinet, & ad purgandum bubulo debilius est; de cætero aquè commodum, & multum nutriens. Mesues contra ad aluum ducendam sero lactis caprini vititur: Optimum enim est, inquit, capratum nigratum (nigriora enim in brutis sero

fortiora sunt, quod & carnes ipsorum restantur, sunt enim iscondioris saporis; quemadmodum alba, imbecilliora) bonis pabulis nutritarum, recens fatiarum, recens, boni & iscondi odoris, & saporis. Rhabarbarum etiam efficacius agere dicit, sumptum ex sero lactis; præsertim caprini. Secundum in bonitate ouillum ponit: Aëtius contra ouillum & suillum ineptum ad secernendum serum dicit. Fit autem serum ex lacte ebulliato, seu à quo est pingue innatans secretum, quando lubricitatis causam ex partibus excretoriis auferre volumus, & ex lacte non ebulliato quoties partes eas lenire magis & lubricare studium est. Ceterum præparandi illius modum docet Aëtius: Lac, inquit, in ollam funditur, coquiturque igne concitatore, & asidue ac equaliter mouetur, & ubi effervuerit, à motu cessatur; & ubi adhuc amplius effervuerit, aqua frigida in promptu sit in profundiore quodam vasculo sita, in quam olla in qua lac coquitur immittitur: statim enim sedatur; sedato autem seruire rursus coquitur: & ubi effervuerit, acetum mulsam, aut aqua mulsā bis aut ter irroratur: quo facto caseus à sero statim disparatur; serum igitur mox per panniculum, aut discerniculum excolatur. Vbi igitur crassæ ac pituitosæ materias abundare suspicatus fueris, acetum mulsam irrorabis; ubi acres & biliosos, aquam mulsam. Quin & immisso in ollam, postquam lac bis aut ter effervuerit, vase singulissimā aquam habente, fissuram ac secretionem facimus. Vitendum est sero ad debiles ac cibos auersantes: oportet autem sero quod primo bibitur, salem admiscere; ubi verò purgare cœperit, circa salem dare; atque hoc per inervalla facere, donec æger satis purgatus fuerit. Mesues alia ad huius præparationem methodo vititur. Habet autem serum lactis vim exterioriam, ut docet Galenus, ac sul ducendi ventris gratia sumitur, tum in potu, tum per chlysiorem immissum, nam acrimoniam intestinorum circa mordacitatem abluunt & abstergit, estque calidum & secum gradu primo usque ad secundum, teste Mesueo.

a

Sed



### Sed medicamenta stomachum fere.

MEDICAMENTVM, teste Galeno, omne id dicimus, quod naturam nostram alterare potest; sicut nutrimentum, quicquid substantiam augere. Sunt autem genere diuersa, alia composita, alia simplicia: omnia stomacho inimica, sed hæc magis; illorum enim malignitas si non auferatur, saltem obtunditur, & quibus fieri potest modis corrigitur, partim malitiam simplicium, & excessum frangentibus, partim salubrem aliquam facultatem afferentibus. Inimica autem stomacho sunt, atque eius potissimum ori, quia dum familiarem sibi humorem trahunt, fit ut exoluantur aut alio quouis modo afficiantur.

### Idcoque omnibus catharticus aloë.

ALOE medicamentorum omnium purgantium præstantissima est, & ob suam quandam prærogatam excellentissima; quum enim cetera purgantia, ut dictum est, partes nostras principes, & ex his cœu fontibus facultates corpus nostrum dispensantes, vel actionis vehementia ladant, vel nihil inueniunt, aloë sola eas partes roborat, & ad functiones suas reducit, & medicamenti quæ actione sua corpus dissolvere solent addita, ipsa corrigit, & noxam eorundem aufert. Quare Orribasius quotidie æna cum maximo emolumento sumi posse auctor est: Subducitur enim, inquit, & ciborum vim non hebetat: præterea sitim non inducit, & hominem ad cibos sumendos facit promptiorem. Est enim, ut auctor est Galenus, medicamentum; si quod aliud, stomacho gratum; neque totum purgat corpus, verum sitam tantum in stomacho, ventre, & intestinis bilem citra molestiam ac placidè unâ cum subiectis excrementis educit. Quapropter quum ventrem tantum subducatur, ex numero eorum medicamentorum esse dicunt, quæ ἰσχυρὰ ὄντα Græci dicunt; nō enim rectè quis ἰσχυρὰν dixerit. Tutior tamen est frigidis humidisque corporibus: nam Galenus siccis, ut biliosis inue-

nibus, & senibus suspectam videtur habere, quòd usu crebro & multo iisdem noxia esse soleat propter exsiccationis periculum quòd adferre consuevit, nisi plus prosit vacuabile, quàm ladat, calefacto & siccato magis corpore. Verum de his plura in nostris Miscellaneis.

### Aluus si vehementius fluit.

HYPERCATHARSIS, hoc est à medicamento purgante vacuatio immodica, fit aut ratione sumentis, aut medicamenti; aut accidentium virique superuenientium. Ratione sumentis, quòd si excrementis ad fluendum paratissimis abundet; vel quòd venarum facultate retentrice sit imbecilla; vel quòd earundem orificia sint ampla. Medicamenti quidem ratione, quoniam id qualitatem habet alienam, aut deleteriam, aut quòd largius sumptum sit, vel portione sui ventriculi & intestinorum villis adheret, aut venarum ora pungit, mordet, aperit, aut alioqui cor intemperantius reddit. At ratione quæ virisque superueniunt, si australis sit constitutio; ea enim aperit, & rarefacit, Galeno teste, ac humores ad fluendum idoneos reddit. Idipsum quoque præstat Boreas, sed diuersa ratione; siquidem comprimendo atque exprimendo fluxiones excitat, ut antè satis dictum est. Qui igitur tunc promptè fluxionibus tentantur, à catharticis abstineant. Subsequuntur autem immodicas alui fluxiones, febres, diarrhææ, stomachi subuersiones, vertigines, & id genus alia, de quibus abunde Ioan. Mesuemus.

### Ergò nunquam in aduersa valetudine.

FEBRES medicamentum purgans non ferunt, quòd plus mali quàm boni secum afferat purgatio; calore enim medicamenti purgantis febrilis calor accenditur. Intelligimus autem hîc per febres, non quasvis, sed acutas, & æquiditas: in acutis enim passionibus, Hippocrate teste, rarè & in principis medicinis purgantibus vri. & hoc cum præmeditatione faciendum: neque enim periculum



riculum minimum, auctore Galeno, in morbo acuto vii medicamento purgante, quum omnia id genus sint potestate calida; febris verò quatenus febris est, & sui ratione, non calefacientibus, & exsiccantibus, sed potius contrariis, hoc est humectantibus & refrigerantibus egeat. In febris verò longis, ut quartanis & quotidianis, ad temperamenti mutationem & amouendam morbi causam purgationes concedi diximus. Acute igitur febrientes satius est cibos potionesque assumere, qui simul & alant, & ventrem molliant: atque huiusmodi quidem eorumque fortiores vocare solet Hippocrates. Quamquam & vitus humidus per se, eodem teste, febrientibus conveniat, quum & humectet, & facillime concoquatur, atque ocysime dissolvatur, ac per aluum seernatur, eamque quoad fieri potest subducatur.

### At ubi febres sunt, satius.

SYMPTVS hic locus est ex quarto De ratione vitus in morbis acutis, ubi in causa fortiores attractorias dat; per fortiores attractorias eas intelligens (ni quid me fallat opinio) quæ & nutrant simul, & aluum citra molestiam subducant, & corpus nonnihil humectent: quale est iusculum galli; idque aut simplex, & per se, aut una cum prunis damascenis, aut mercuriali, aut malua, aut silicula, aut simili aliquo decoctum: prisana etiam in qua radix polypodij, cnici semen, aut brassica marina decocta sit. Huiusmodi etenim fortiores, etsi non manifestè humorem peccantem attrahunt, tamen eò quod meatui nonnihil aperiunt, atque ventrem fluidum faciunt, attractorias rectè appellaveris, quod mixta quodammodo sint facultatis, inter medicamenta & nutrimentum.

### Suntque valetudinis genera.

ANTE simpliciter serum lactis purgatricem vim habere ostendit; nunc autem quosdam esse morbos qui id requirant. Sunt autem eiusmodi, teste Mesueo, mania, me-

lancholia, impetigo, pruritus, lepra, ulcera maligna, morbi que omnes obstructions sequentes: quales sunt hydrops, ac icterus, febres item a putrida bile, tumores lienis, & id genus alij; & si quidem per se sumptum non satis efficax fore putamus, alia in eodem pro usu exigentia maceramus.

### Plerumque verò alius potius.

LIBRO tertio capite quarto hanc Asclepiadis moderationem paulo apertius describit auctor noster. Ante omnia, inquit, quaeritur, primis diebus æger qua ratione continendus sit. Antiqui medicamentis quibusdam datis concoctionem moliebantur, eò quod cruditatem maximè horrebant: deinde eam materiam quæ lædere videbatur, ducendo sæpius aluum, subtrahabant. Asclepiades medicamenta sustulit, aluum non toties, sed ferè tamen in omni morbo subduxit: Febre verò ipsa præcipuè se ad eius remedium uti professus est. Conuellendas enim ægri vires putavit luce, vigilia, siti ingenti: sic ut ne os quidem primis diebus elui sineret. haftenus Celsus. Quæ commodatio præsertim in febris, mihi, nec Celsus ipsi alibi, satis probatur; præsertim quum in febris non ideo ducamus aluum ut vires conuellamus (hinc enim maximè immineret periculum) sed potius, ut docet Galenus, ad evacuationem noxiorum humorum: nam eam tantum admittit, ubi utilitatis plus (quod ferè evenit) quam detrimenti ex medicamento purgatorio æger consequatur.

### si morbus maioris intestini.

IN colico dolore medicamenta purgantia parum probari, vel hinc constat, quod magna sua vi attractrice, noxios humores ad ventriculum primum, deinde ad intestina trahant; unde & ea distendant nonnunquam, & dolores aliquando augent & exacerbant. Coningit enim frequenter dolo-



res eo esse vehementiores, quo obstructio est maior. Clysteris igitur ante medicamenti propinationem eluenda est alvus, ac deinde, si res exigat, cathartici monenda.

### aut si sanguinem mitti, cum.

Nisi hic adderet, tempusve eius rei praeferret; nescio quam recte dixisset, facilius tolerari purgationem sanguinis missione; quam cuius etiam notum sit, plus exagitari vires, atque adeo totam corporis missionem distrahi purgantis medicamenti portione, quam moderata sanguinis detractione. Non negamus tamen esse, quin, si quando post principium vocatus medicus, cum plethora communem cacochymiam videat, dimissa sanguinis missione, sola medicamenti lenientis alium portione contentus esse possit; quod Celsum voluisse suspicio est.

### Servanda verò illa sunt.

POSTEAQVAM dixit quibus recte accommodentur medicamenta purgantia, iam quae eandem prohibeant enumerat: ac primum ante diem tertium, aut ante concoctionis signa, alium irritari prohibet; per diem tertium, morbi principium intelligens: si quidem trifarium morbi principium dicimus, proprie enim impertibilis illa ac indivisibilis primi morbi impetus invasio, in qua victus homo decubuit, principium appellatur; quemadmodum principium febrilis exacerbationis dicimus contractionem extremarum partium; ac praecipue nasi, & quandoque etiam frigiditatem, oscitationem, & pandulationem totius corporis; nonnunquam etiam insculam leniter irritantem, una cum frigiditate invnentem. Principium etiam dicitur, quod per dilatationem nominant, quod usque ad tertium diem extenditur. Principium etiam dicitur proprium ac necessarium, quod velut partem totius morbi nominamus, quod sanè non dierum numero, sed exacerbatione, qualitate & concomitantium accidentium lenitate aestimatur; siquidem quae ea fuerint mitiora, eo concoctio, aut, si minus, maturatio perfectior obitur.

Sic Galenus augmentum, statum, declinationem, ab accidentibus, & concoctione metitur, ut tanisper totius morbi principium dicatur, donec apparuerint manifesta & perfecta concoctionis signa. In principis autem non esse medicandum, satis docet Hippocrates tum alijs, tum in primo libro Apborismorum: Concocta, inquit, medicari & movere, non cruda, modo non turgent; plurima verò non turgent tum quarto De victu in morbis acutus: Quicumque enim, dicit, statim inter morbi initia phlegmone obsessas partes medicamento solvere conantur, hi a parte interni, a inflammationeque nihil auferunt; affectus enim quod crudus est non cedit, quae verò morbo resistere possunt, & sana sunt, absument. Recte ergo ante diem tertium, hoc est in morborum principiis, purgationes vetat Celsus.

### ne vlla cruditate sub- stante, &c.

QVANTQVAM cruditatem sub principis comprehendere dixerimus, tamen quoniam practici hic miris modis se torquent, in materiei digestionem, ut loquuntur, aut maturationem, alijs concoctionem increassando, alijs contra attenuando fieri affirmantibus, ut duo illi Arabicae scholae cardines longis ambagibus seu gyris quibusdam sese implicant, adeo ut vix sese extricare possint: crassorum enim humorum incisione, & tenuium ac serosorum insufflatione, concoctionem, aut preparationem humorum fieri sateri coguntur, quum tamen Hippocratem & Galenum passim inculcantes audiant, Corpora quum quis purgare voluerit, oportet fluida facere, quod non increassationem aut insufflationem aliquam, ut sic dicam, exigere videtur; nam erunt fluida Galeno teste, omnibus meatibus reseratis, humoribus incisis, atque attenuatis: atque hoc est quod voluit Hippocrates sexto Epidemion: Si volueris, inquit, ut is qui helledoruni bibit, celeriter purgetur, aut lauet, aut comedat, praecipue lauet, nimirum corporis meatus laxiores reddendo, & ut humores balnei caloye fundantur. Comedat autem cibos eos, qui videlicet incidunt crassos



dant crassos & tenaces humores. Nam quantumcunque tenues; quantumcunque subtilis sint humores, aut materia peccans, semper attenuantibus & incidentibus vii solent; ac propterea Galenus in acutis etiam passionibus consuevit capere occasionem propinandi melicratum, in quo coctum sit aliquid, vel hyssopi, vel origani, vel tragorigani, aut rhyini, aut pulegij, siue quid aliud huiusmodi, vim habens humores excoquendi: nam quis de achoribus obuiunt, clauiora sunt quam vi responsum mereantur, quum incipientes achores (ubi totum corpus superfinitatibus careat) per aspergentia & repellentia curari certum sit. Huc quamuis referri possunt, quæ de minoratione materie dicunt; tamen quoniam à doctissimo viro, mihi nunquam nisi honoris titulo nominando, Domino Hieronymo Drusio præceptore quondam nostro, tum ab aliis, satis explosi sunt, ne attingere quidem volumus.

### ne in ipso accessionis impetu.

PURGATIO non exarscensenti, sed mitescenti morbo offerenda; cum enim natura dictum militari æquum est, siquidem ea plerumque in se ducunt, maximèque intermitentium inuasionibus vomitiones, & in declinationibus sudores commode ciet, quo tempore eadem nobis vtiliter arte promouere concessum est, ac non vel alui deiectionem, vel vena sectionem meditari. In accessionibus enim ab his omnino temperandum est, ut quas natura non molitur, sed si quæ incidunt, solius morbi impetu atque sermone fiant, & quum alui deiectiones vires sepe lacefiant, vix tutò potest in tanta accessionum quasi fluctuum aestuatione obiri, quum humores tum maximo quodam quasi aestu incitati effervescent, obstruuntque permisceantur, nulla etiam queat instari excretio.

### Prædie verò abstinere.

HINC satis constat Celsum antè per substantiæ crudiratem intellexisse materiam, quæ causa esset ipsius morbi: nam iam ne incoctus adhuc crudusque cibus vasis

inhereat præcens, pridianam commendat abstinentiam, quod videlicet natura duobus, atque iisdem diuersis officiis simul ad ausum intentum esse nequeat: neque enim cibos concoquere, concoctosque digerere commode possit, simulque medicamento purgantem obtemperare.

### Eodem die ante aliquot horas.

CELSVS hic horis aliquot ante medicamento purgantis summptionem, aquam calidam bibendam dat, eamque aut simplicem, aut eam in qua decoctum sit hordeum: idque non tantum vi superiores partes madescant; verum etiam vi intemperies totius corporis aut ventriculi si calidior sit, nonnihil ad temperiem reducatur, ne videlicet calida intemperies, medicamentis, quæ fere facillime calida sunt, aliquo modo leatur. Orbasus eandem exhiberi solitam aut præcis illis medicis post purgationem: nam & morsus vellicationesque sedare credebant, & excretionem iuuare; cuius loco hodie medici sorbitinulam, aut ius carminum exhibent.

### si leui medicina contenti sumus.

HÆC, & reliqua quæ ad capitis usque sinem subsequuntur, vel ad enematum infusionem transferri possunt, vel præcedentibus rectè accommodari: siquidem quum autè dixisset in intemperie calida totius corporis aut ventriculi tantum, eiusdemque imbecillitate, rectè ante purgationes exhiberi aquam calidam, iam eiusdem exhibendi ordinem prescribit. Nam si leui medicina contenti fuerimus, suffecerit pura aqua; si paulo valentiori, mulsæ, quod huc videlicet mellis acrimonia aliquid deterforis purgantisque scilicet addiderit. Atque eadem ratione quid obstat quo minus aquam in qua decocta sit verberna, propinquius ante medicamento purgatorij exhibitionem, stomacho debiliore atque ad vomitum propensiore? Et quod subiungit æquum fieri adiecto nitro, non improbat quæ sententia fuisse, si possit de præparatione ad medicamentum præparandum.



ptionem : nam Galenus, & post eum Paulus & Aëlius, nitrum si intro sumatur, secare atque extenuare lentos crassosque succos restantur; idq; potentiùs quàm reliqua salis genera. Et Oribasius, iis qui sumpto medicamento purgatorio non purgantur, aquam mulsam sorbendam dat, aut nitrum aqua liquefactum. Quamquam sic se habeant, proprietas tamen sermonis exigere videtur, ut de enematum injectione sententiam intelligamus : siquidem per superiora, quemadmodum per inferiora non infundimus, sed aut propinamus, aut exhibemus sorbenda deglutiendave medicamenta : quamquam quomodocunque intelligas, constet sententia.

Cum infusum est quantum fieri.

QUAMVIS Hippocrates in Aphorismis dicat, Quum liberit quis helleborum, ad

motiones corporum ducere magis, ad somnos verò atque quietem minùs : indicat autem navigatio turbari motione corpora. & alio loco : Quum volueris magis ducere helleborum, mone corpus; quum verò sistere, somnum facito. Sententia huic nequaquam refragatur Celsus : etenim tantisper quiescendum dicit, dum medicamentum, aut id quod infusum est, vim suam exernerit : siquidem quum quies in eodem statu seruet, motus verò mutet atque alteret corpus, faciliùs medicamentum energiam suam attractoriam exeret in quieto, uti expulsoariam cathartica in moto. Ideoque Hippocrates particulam magis addidit. Tantisper igitur quiescendum monet Celsus dum purgari incipiat corpus, ac deinceps monendum, ac rursus quiescendum si hypercatharsis molesta sit; & si vires deficiant, cibum exhibendum pro ratione accessionis eius quæ expectabitur.

### CAPUT XIII.

#### De Vomitu.

AT vomitus, ut in secunda quoque valetudine sæpe necessarius biliosis est, sic etiam in his morbis, quos bilis concitavit. Ergo omnibus qui ante febres horrore & tremore vexantur, omnibus qui cholera laborant, omnibus etiam cum quadam hilaritate insanientibus, & comitiali quoque morbo oppressis, necessarius est. Sed si acutus morbus est, sicut in cholera, si febris est, ut inter horrores, asperioribus medicamentis opus non est, sicut in deiectionibus quoque supra dictum est, satisque est ea vomitus causa sumi, quæ sanis quoque sumenda esse proposui. At ubi longi, valentesque morbi sine febre sunt, ut comitialis, aut insania, veratro quoque albo utendum est. Id neque hyeme, neque æstate rectè datur, optimè verò, tolerabiliter autumno. Quisquis daturus erit, id agere ante debet, ut accepturi corpus humidum sit. Illud scire oportet, omne eiusmodi medicamentum, quod potui datur, non semper agris prodesse, semper sanis nocere.

• humidus

ENARRA-



## ENARRATIO.

**P**RIORE libro canones quosdam tradidit, ad conseruationem sanitatis vomituris necessarios, ad quos cen Polycleti regulam actiones suas dirigerent, qui huiusmodi medicinali genere humorem noxium purgare conarentur: Vtilior est, inquit, hieme quam astate vomitus: nam cum & pituita plus, & capitis granitas subest. Inutilis est gracilibus & imbecillis stomachum habentibus; utilis est plenis & biliosis omnibus, si vel minimum sese repleverint, vel parum concoxerint: nam sine plus est quam quod concoqui non potest, periclitari ne corrumpatur non oportet; si vero corruptum est, nihil commodius est quam id quia via priuim expelli potest, eicere. Itaque ubi amari ructus, cum dolore & granitate praecordiorum sunt, ad hunc protinus confugiendum est. Sic Polybus quoque, Sex mensibus, inquit, hybernus vomere utile est; per id enim tempus pituita magis quam astate abundat, & morbi capitis & parium quae supra septum transversum sunt, magis infestant. Et quantum iuxta Hippocraticum axioma, quo natura vergit per loca maxime conuenientia, eo ducere oporteat, ac pituita deorsum natura feratur; maiore tamen id compendio per vomitum ante fieri demonstravit Celsus, quam per alui deiectionem, quum ea in stomacho supernatans, ac subinde nauisem mouens, oesophagum petat. Vomitum igitur utuntur sani, ut auctor noster docet, qui ciborum humorumve copia granantur; pituitam enim mouet vomitus, & caput leuat, & eum qui auidius cibum ingessit, & plus vini hausit, ledi prohibet. At agrotis necessarius est vomitus qui ex bile laborant, quod hac sua leuitate superiora potissimum petat: quare quum natura ductum imitari debeat medicus, per superiora, hoc est vomitum, bilem educere conabitur: sic tunc in febris cum rigore, vel tremore incipientibus, quales tertianae purae nothaeque sunt, atque adeo in quartanis vel ipso accessionis tempore secure vomitoria exhibebimus, natura huiusce-

modi expulsionem per se nonnumquam mouente.

## Cum hilaritate quadam insanientibus.

**I**N his nimirum quibus a stomacho initium mali ortum est: nam his qui carise primario affectu comitiali morbo correpti sunt, incongruus est vomitus. Affici autem cerebrum consensu stomachi & aliarum quarumvis partium, Galenus libro De locis affectis passim docet, tum eo loco ubi inueniem epilepticum statim ante accessionem epilepticam, a genua cen lenem agram ad cerebrum ferri sensisse edocet, quam sympathiam cerebri cum ventriculo fieri dicit propter magnitudinem nervorum a cerebro ad os ventriculi descendentium.

## Sed si acutus morbus est.

**I**N acutis morbis acriora aut vehementiora non sine periculo adhiberi docet; vel quod vires morbi magnitudini simul, & medicinali violentia non sufficerent; vel quod intemperie medicamenti vomitorij morbus ipse augetur. Sic Hippocrates carnes sanas habentibus, helleborum periculosum dixit, facereque conuulsiones. Sic quoque Aegineta, Medicamentis, inquit, vomitum facientibus, neque sani, neque acuta agitudine occupati, uti permittuntur. Verum quae citra molestiam vomitum mouent, tuto exhiberi possunt: qualia sunt mulsae, aqua tepida, in qua garum sit coctum, prisana cui mel sit additum, lomentum carniuum, pinguis omnia; neque solum iura ipsorum, verum etiam (vbi Paulus & Aetius restantur) ipsas quoque carnes integras deglutire oportet, eosque vomitum ipsi mandendis diu immorabitur, in eundem usum exhibentur vina dulcia, quod in ventre magis supernatent.

## At ubi longi valentesque morbi.

**N**ON simpliciter in longis valentibusque morbis,



morbis, sed si sine febre sint, veratrum exhiberi periculum enim esset, ne helleborus febri incrementum adderet, aut alioqui inflammationem excitaretur propter operationis vehementiam: siquidem cum demum veratrum exhibendum est, ubi longi valentesque morbi sunt, & spes ex aliis praesiliis adempta est, quod nimirum agitando in omnibus fortior existerit. Posui autem comitalem, & insipientem pro exemplo aliorum morborum: nam siue continue inflauerit morbus, ut in hydropsi, sine statu temporis, seu paroxysmis quibusdam innaserit, ut in podagra & comitiali ecclē adhibetur. Porro, usum exhibendi veratri, copiosissime nobis inter alios describit Orribasius atque eiusdem praeparandi modum: ac inter reliquos commendat enim, qui ex hellebori libra triiduo macerata in senis aqua heminis lento igne ad tertias decoquebatur, deinde expresso helleboro, additis decocto heminis mellis duas, iterum decoquebat ut ars exigebat: atque huius quidem ebullientia dū propinabatur, quae circa ullam molestiam aut animi anxietatem purgare prodiderunt, atque adeo iis qui insipienti, neque ullo pacto eum sumpturi essent, propterea quod omne alimentum suspectum habeant, rectissime propinavi crediderunt: nam licet morbum non expellat, minuit tamen adeo ut sepe ipsis volentibus iterum propincent.

### Id neque hieme neque aestate.

HIEME & aestate non citra periculum veratrum exhiberi docet, quum tamen Hippocrates opportunissimum tempus ad purgationes superiores, aestatem statuerit: Medici cavi, inquit, aestate superiores magis; hieme inferiores: quod nimirum humor qui aestate eluxuriet, ut vult Galenus, flava bilis sit, & omnino tota animalis natura propter ambientem caliditatem, magis ad superiora moveatur. Celsus & Polybus, ut ante dixi, hieme per superiora purgabam supernatantem in stomacho pituitam. Atque haec quidem etsi quam maxime sic se habent, non tamen sequuntur Celsum male suspectum ha-

bere hieme & aestate veratri usum, quum dictus Hippocrates Aphorismus, de iis medicamentis quae leuiter per superiora ducant, intelligendus sit. Hic autem Celsus de veratro summisque remediis, atque adeo de iis morbis loquitur, qui per intervalla innadunt, de quibus simile plane pronunciatum reliquit Hippocrates: Nam quibus, ait, vena sectio vel purgatio cum medicamento convenit, hos Vere purgare, vel sanguinem incidere oportet, ut videlicet antipemus Vere adveniente purgare, vel per vena sectionem, si plenitudinis morbus subiacuerit; vel per purgationem, si eis qui ex corruptione pronascuntur. Tempus igitur verum ad sumendum helleborum accommodissimum est; deinde autumnus: aestas autem incongrua est; vti & hiems, nisi valde magna urgeat necessitas: & tunc hieme quidem aptiores sunt, ut docet Aetius, qui valde calidum temperamentum sortiti sunt; aestate vero senes. Caeli autem constitutio ad hellebori sumptionem idonea est, serena & calida, & insolata. Nam & Hippocrates sub Cave, & ante Canem cavendas pharmacias docet; & graules & facile vomentes per superiora purgandos, vitata hieme.

### Quisquis daturus erit.

Quia alij alius diffidius per superiora purgantur, & evacuatio ea quae per vomitum fit, aliquid molestiae secum soleat afferre, facit iam quae perissimum ratione arte hellebori sumptionem praeparandum sit corpus; ac inter ut acceptum corpus humidius sit: corpora enim quum quis purgare voluerit, oportet fluida facere, humectantur autem aqua lavacro, aut pluri cibo, aut quiesce: Siquidem, ut sexto Epidemion Hippocrates, si volueris eum qui helleborem bibit celerius purgare, lavare aut comedere oportet; lavare autem convenit non multo tempore ante assumptionem, sed pridie; diffundit enim humores corpusque laxius ac mollius reddit lanacrum. Quies etiam, si quod aliud, humectat: quo fit, ut febrientibus tam summe commendatam habeat Hippocrates. Cibus autem non quivis humectabit corpora, sed is.



sed is qui citra manifestam aliquam qualita-  
tem extenuet, atque incidat crassos humo-  
res, & qui meatus qui in corpore sunt per  
quos humores isti transmittuntur, atque  
trahuntur à medicamentis purgantibus ape-  
riat, hoc est, talis qui neque acerbis prozms,  
neque acris, neque salis, neque amarus sit.  
Acutissima igitur victus ratio instituenda  
est illis, qui veratro sunt vsuri; attenuatis  
enim corporibus, non citra noxam exhibetur.  
Abstineant ergo, ut docet Aëlius, diebus tri-  
bus aut quatuor à carnibus, aut reliquis crassi-  
succi edulis, aut potibus: assuesciant autem  
se ipsos ad vomitum, & ter aut quater prius  
vomant à cana, & alius ante subducatur;

videndumque, ut deficiente potius, quam  
increfcente luna vomitum cum helleboro  
promocemus.

### Illud scire oportet.

PRIORE libro corpus sanum exire esse  
dixit; & nos helleborum sanis non conveni-  
re, aut diximus: iam autem non semper  
agris prodesse dicit. Oportet igitur dome-  
sticis ante declarare anxietatem certaminis  
furi; atque sic ad hoc auxilium procedere:  
nam non raro strangulationis periculum im-  
minet; convulso, item singultus, & id ge-  
nus alia, quæ non citra vitæ discrimen in-  
cidunt, subsequuntur.

## CAPVT XIII.

### De Frictione.

DE Frictione verò & \* gestatione adeò multa Asclepia-  
des, tanquam inuentor eius posuit: quod in eo volumine  
quod communium auxiliorum scripsit, cum trium tantum  
faceret mentionem, \* huius & equi & gestationis, tamen  
maximam partem in hoc consumpsit. Oportet autem ne-  
que recentiores viros in his fraudare, quæ vel reppererunt, vel  
rectè secuti sunt, & tamen ea, quæ apud antiquiores aliquos  
posita sunt, auctoribus suis reddere. Neque dubitari potest,  
quid latius quidè, & dilucidius, ubi & quomodo frictione  
utendum esset, Asclepiades præceperit, nihil tamen repere-  
rit, quod non à vetustissimo auctore Hippocrate paucis ver-  
bis comprehensum sit, qui dixit, Frictione si vehemens sit,  
durari corpus: si lenis, molliri: si multa, minui: si modica, im-  
pleri. Sequitur ergo, ut tum utendum sit, cum aut astringen-  
dum corpus sit, quod fluens est: aut molliendum, quod in-  
duruit: aut digerendum in eo quod copia nocet: aut alen-  
dum id, quod tenue, & infirmum est. Quas tamen species  
si quis curiosius æstimet, quod iam ad medicum non perti-  
net, facile intelliget, omnes ex vna causâ pendere, quæ de-  
mit. Nam & astringitur aliquid eo dempro, quod interposi-  
tum,

\* equita-  
tione

\* aliàs,  
vini scili-  
cet, & a-  
qua, & ge-  
stat.

tum, ut id laxaretur, effecerat: & mollior eo detracto, quod duritiem creabat: & impletur non ipsa frictione, sed eo cibo, qui postea usque ad cutem digestionem quadam relaxatam penetrat. Diuersarum verò rerum in modo causa est. Inter unctionem autem & frictionem, multum interest. Vngui enim leuiterque pertractari corpus etiam in acutis & recentibus morbis oportet, in remissione tamen & ante cibum. Longa verò frictione uti, neque in acutis morbis, neque incrementibus conuenit, præterquam cum phreneticis somnus ea quaeritur. Amat autem hoc auxilium valetudo longa, & iam à primo impetu inclinata. Neque ignoro quosdam dicere, omne auxilium necessarium esse incrementibus morbis, non cum iam per se finiuntur. Quod non ita se habet. Potest enim morbus, etiam qui per se finem habiturus est, citius tamen adhibito auxilio tolli, quod duabus de causis necessarium est, ut & quam primum bona valetudo contingat: & ne morbus, qui remanet iterum, quamuis leui de causa, exasperetur. Potest enim morbus minus grauis esse quam fuerit, neque ideo tamen solui, sed reliquijs quibusdam inherere, quas ad motum aliquod auxilium discutit. Sed ut leuata quoque aduersa valetudine rectè frictio adhibetur, sic nunquam adhibenda est febre incremente. Verum si fieri poterit, cum ex toto corpus ea vacabit, minus certè cum ea remiserit. Eodem autem modo in tutis corporibus esse debet, ut cum infirmus aliquis implendus modò est in partibus, aut quia ipsius membri imbecillitas id requirit, aut quia alterius. Nam & capitis longos dolores, ipsius frictio leuat, non in impetu tamen doloris, & membrum aliquod resolutum ipsius frictione confirmatur. Longè tamen sæpius aliud perfricandum est, cum aliud dolet, maximeque cum à summis, aut à medijs partibus corporis euocare materiam volumus, ideoque extremas partes perfricamus. Neque audiendi sunt, qui numero finiunt, quoties aliquis perfricandus sit. Id enim ex viribus hominis colligendum est. Et si is per infirmus est, potest satis esse quinquagies: si robustior, potest ducenties esse \* faciendum. Inter vtrunque deinde, prout

\*fricandū.



prout vires sunt. Quò fit, vt etiam minùs sæpe in muliere, quàm in viro, minùs sæpe in puero vel sene, quàm in iuvene manus dimouendæ sint. Denique, si certa membra perfricantur, multa valentiq̃ue frictione opus est. Nam neque totum corpus infirmari citò per partem potest, & opus est quàm plurimum materiæ digeri, siue id ipsum membrum, siue per id aliud leuamus. At vbi totius corporis imbecillitas hanc curationem per totum id exigit, breuior esse debet & lenior, vt tantummodo summam cutem emolliat, quò faciliùs capax ex recenti cibo nouæ materiæ fiat. In malis iam agtū esse testatur, vbi exterior pars corporis friget, interior cum siti calet, vt suprà posui. Sed tunc quoque vnicum in frictione præsidium est, quæ si calorem in cutem euocauit, potest aliqui medicinæ locum facere.

## ENARRATIO.

**F**RIGATIONIS multus apud veteres usus erat; adeò vt Aselepiades, (vt auctor non fer docet, & Plinius capite tertio libri xxvi. testatur) eam inter quinque res communium auxiliorum professus sit: hodie contra nullus aut perquam rarus eius usus est, præsertim illius quæ Preparatoria, seu Parascenastice, & quæ Apotherapia dicitur. Annumerabatur autem hæc frictionis species in genere eorum quæ sanitatem conseruant: suscipiebantur enim in optimi status natura calefaciendi corporis causa; adhibebaturque parascenastice ante exercitationem, quòd corpus prius manuum ac linteorum frictione calefactum oportuit; fricabant autem tantisper dum colore virido corpus effloresceret, & conficta particula in molem eleuaretur; ac primum quidem mollior; mox verò exercitationem aggressuri, duriter fricabant, atque tum demum corpus inungebant. Tenebat autem preparatoria frictionis scopus huc, vt corpus mollius redderetur, & excrementa attenuarentur: Apotherapia autem scopus erat, vt excrementa purgaret & corpus à lassitudine tutum conseruaret; est enim omnis exercitationis probè peractæ postrema pars apotherapia. Porro siebant va-

ria frictiones ex manuum iniectione circumactioneque: alia enim superne deorsum; alia inferne sursum adhibentur; alia rursus intransuersum & subtransuersum: faciebant autem varium manuum iniectionem circumactionemque, quo vniuersæ, quoad fieri posset, musculorum fibra omni ex parte fricarentur. Medicamentosa autem frictio ea dicebatur, quæ agrotantibus exhibebatur: cuius generis est contrapositionis partis frictio, potissimum per ea medicamenta quæ calefaciunt; annumeraturque inter medicamenta quæ in contrarium vocant; cuiusmodi ea quæ plethoricis sit frictio, inter resoluentia aut purgantia. Galenus enim auctor est plethoram non raro discurrere sola frictione: nam libro quarto Methodi: Si quis, inquit, etiamnum sanus, nec adhuc quicquam latus in sanguinis redundantis concursu sit positus; non statim huic mitti sanguinem est necesse: imò alij sufficit inedia, alij cibi parcitas, alij soluta alius, vel purgatio, vel frequens balneum; alij sola exercitatio, vel multa frictio. & xiiii. methodi, Plethora, inquit, tum sanguinis missione curatur, tum frequenti balneo, tum exercitatione, tum frictione.

b 2

Neque



### Neque dubitari potest, quin.

MULTIS argumentis Galenus libro Sanitatis tuenda contra Theonem gymnasten agit: contendebat enim Theonem qualitatis quantitatisque mentionem minime faciendam seorsum; sed in frictione qualitates quantitibus semper esse coarpiandas, per se nanque esse imperfectiores, quam ut aliquis successus praevenire possit: quasi verò si quis Hippocratis in dicendo brevitatem scruetur exactius, hanc Theonis combinationem non inveniat; nam quum frictionem vim solvendi, ligandi, carum augendi ac diminuendi habere dicat, duram utique ligandi, mollem solvendi, multam minuendi, mediocremque carnem augendi; quis non ex his intellexerit, molli frictione solui, aut, ut dicit Celsus, levi molli corpus, si modicè fiat; & si arripitis adhibeatur, molli quidem vel solui & tunc, sed intensius? Ad hoc rectè dicit Celsus, nihil ab Aesclepiade repertum, quod non à vetustissimo auctore Hippocrate paucis verbis comprehensum sit: Hippocrates nanque (ut pulcherrimè docet Oribasius) redactis veluti in elementa simplicibus differentiis, universam frictionum rationem absoluit; quemadmodum carnem satis adicias, quemadmodum detrahas, quemadmodum corpus mollias, quemadmodum constringas. Cum his protinus una se promunt tum media earum opera, tum quae per coniugationem faciunt: media quum neque ligare corpus neque solvere, neque carnem minuire neque augere studemus: per coniugationem verò sunt. ut quum (verbi gratia) pariter colligare & carnem adiacere volumus, frictionem daram unà cum mediocri quantitate adhibeamus; quum verò mollem, frictionem quoque mollem, & in quantitate mediocrem administremus; & in aliis etiam coniugationibus ad proportionem. Etenim tres differentiae (ut docet Galenus libro Sanitatis tuenda secundo) frictionum à qualitate sumptae, tribus quae sumuntur à quantitate coniunctae rationem coniugationes efficiunt: siquidem una iuxta quan-

titatem nempe multa, si tribus quae à qualitate sumuntur, dura dico, molli, & mediocri innungantur; tres secundum multitudinem differentias efficiunt; modica rursus si eisdem tribus copulerentur, tres alias procreabit: sic & mediocri quantitate eisdem tribus addita, alias tres propagabit. Sed de his abundè Galenus.

### Quas tamen species si quis curiosius.

FRITIONEM, qualis qualis ea sit, semper adiacere docet Celsus: vana quantitas panca carnem augeat, id fieri magis ratione assumpti cibi, qui per frictionem relaxata sit per corpus universum facilius diffundatur.

### Inter vñctionem autem & frictionem.

VNCTIONI cum frictione commune est, quòd neque in morborum accensione, neque ante cibum obeunda sit; habet quae vñctio, non seius ac frictio, varios diversosque scopos: alia enim ad refrigerandum, alia ad calefaciendum, alia rursus ad humectandum, rarefaciendum & consipandum utimur. In hoc autem ab vñctione differt frictio, quòd recentes atque acuti morbi in ipsis morborum principiis, nulla habita cruditatis ratione, vñctionem admittant. Sic Hippocrates quarto Acutorum eos quibus inter initia februm urinaennes fuerant, non purgabat, sed quieti permittibat, ungebat, & aequaliter contegebat, nullamque aquosam bibendam, & pituita cremorem sortendum dabat, ventremque ab initio enematè ducebat, nempe adversus vim febris, humiditatem eam quae vñctionibus comparatur remedium esse putavit: praeterea & neque valenter calefacere, neque refrigerare, sed lenire mulcerèque, quibus maxime indigent quae cognuntur, manvanturque: Frictio contra in principio aut incremento morborum nulla ratione admittenda est; nam praeterquam quòd nihil prodesset, plurimum etiam incommodi secum afferret; periculum enim esset ne humores qui in una aliqua parte



partes continentur, frictione in totum animalis corpus quodammodo respiciuntur; frictio enim adiuvat digestionem, ac distributionem humorum in corpus.

### Longa verò frictione viti neque.

ACUTI morbi, ut iam saepius dictum est, magna ex parte originem suam à causa calida habent; ac proinde quum contrariorum contraria sint remedia, frictio in acutis non rectè adhibetur, quòd calefaciat, corpusque impuritate magis contamineat, atque adeo obstructionibus opportunius reddat. In phreneticis tamen, ubi somnum conciliare propositum est, frictio quæ molles simul & longa sit, conveniet; hæc enim demulcet, ac spiritus foras evocat. Nam ut Galenus XII. Methodi therap. ad somnum alliciendum frictio uberius facit.

### Amat autem hoc auxilium.

FRICTIO, ut diximus, digestionem adiuvat, quare in morbis longis, usque qui ex decidentia acutè dicuntur (sunt enim hi magna ex parte frigidi, aut in abscessu aliqui terminantur) rectè post augmentum in morbi declinatione ea veniunt; maturat enim, rarefacit & digerit, atque evaporare facit noxios humores.

### Neque ignoro quosdam dicere.

QUEMADMODUM morbus per tempora, hoc est principium, augmentum, statum, declinationem distinguitur; ita ordinem quandam in curationis desiderat: adeo ut aliquid in eis primum, secundum, tertium, aut quartum sit. In aliis enim vena sectione; in aliis purgatione; ac rursum in aliis mediis, aut victus ratione congrua, aut cataplasmatibus,unctionibusque, & id genus aliis ordine quodam utimur; nam in principis raro, id est, cum præmeditatione, medicamentis purgantibus utendum; sequentem dum corpus foret morbo, frangunt, atque concoctionem (cui quicquid natura in-

terita est) impediunt, in his tamen si quando materia turgcat, in ipso morbi insultu medicaminis usus est: nam quum periculum sit in mora, satius est anceps quam nullum remedium experiri; adeo in omnibus habenda ratio nature est, quam rectè in Epidemidis morborum curatricem appellat Hippocrates. Si igitur inter morborum injuria maturationi natura studeat, hæc omnes actiones dirigeret medicus; sin eadem expulsionem materia peccantis (quod fere in statu atque declinatione facit) moliat, verbi gratia, aut per sudores, urinam, excrementa alii, aut vomitum sese exonerans, omni rixu eandem promovebit, ne quid sit quod vasis inhaerescens recidivam pariat; nam, quemadmodum senex ille Cuius, Quæ relinquuntur in morbis, recidivam facere consueverunt. Neque enim semper adeo robusta est natura, atque ad expulsionem prompta, ut absque adminiculo prudentis medici, quicquid in corpore redundat reiciat. nam videmus non raro, ut rectè subiungit auctor noster, morbum quandam nonnunquam minus gravem esse, quam fuerit, neque tamen ideo salui, sed relinquitur quibusdam inhaerere, quos ad morbum aliquod auxilium discerneret: atque hinc est, quod Galenus naturam omnium horum opificem, medicum verò ministrum dixerit.

### Sed ut levata quoque aduersa valetudine.

SI per incrementum febres, intelligimus febriles paroxysmos, aut eas febres quæ quum acuta sint, & à calida materia originem suam trahant, accessiones suas incrementum faciant, neque ad remissionem perveniant, bene quidem; sin per incrementum febrem eam quæ ad statum nondum pervenit, accipiamus; nescio quomodo Celsum cum Galeno componemus: hic siquidem his qui ex copia crudorum humorum cum stomachi offensione febricitant, statim in morbi principio vitur: nam XII. methodi. Nulli tali sine maximo dispendio inquit, sanguis mitti solet, quum tamen vacationem desideret; verum nec sanguinis missionem nec purgationem sustinent, vapore quos sine his syn-



his syncope subito adortur. Quanam igitur est ratio talibus medendi, qui quum vacuari possent, vacuum praesidia non ferant? Sane nullam aliam vacationem idoneam his inueni, praeter eam qua ex frictione paratur. Incipere vero in principio statim morbi oportet, ac primum à cunctis superne deorsum, idque luteis non admodum molli- bus, sed aspidinis mediocriter quid habentibus debet abradi his cutis, quum simul & cale- fieri per eam, & digne agrotus possit: Dehinc tota brachia ab humeris usque, & superne deorsum simili modo sunt fricanda; & reliqua quae deinceps sequuntur. subiun- git autem paulo post: Eas quas dixi partes ordine fricans, eoque solum tempore inter- mittens quo somnus hominem occupauerit; ad quem etiam alliciendum frictio uberius fa- cit. itaque vel hoc nomine utile praesidium fuerit, nedum quod inuariat. haecenus Gale- nus, aperit declarans etiam in febrium ini- tiis sola habita somni ratione frictionem in- terdum recte adhiberi. In aliis tamen fe- brius frictiones quae ad resoluenda morbi reliquias obveniunt, non quous tempore, sed circa morbi statum statim continentur, non omni quidem in parte, sed extrema; ut non longe à declinatione absit: in temporibus vero accessionum primum in declinatione fieri debent. Observandi tamen sunt, qui partes aliquas inflammationibus obsessas ha- bent: nam si ea sint, dissolui nullo pacto fe- bris poterit.

### Nam & capitis longos dolores.

PRO exemplo quopiam subiungit capi- tis dolores: quibus si inclinato dolori in- petu adhibeatur frictio, maximum lenamen aegris conciliabimus. Contra si ingrauescente morbo eandem moliamur, tantum abest ut quicquam in melius proficiamus, ut hinc multo maior noxa expectanda sit. Consido- randa igitur morborum tempora, in quibus quid conveniat, aut non. Ceterum quod frictio, ea videlicet quae mollis est, capitis do- lores leniat, ex antedictis satis patet; neque id mirum est, quum demulceat sinum & fi-

ritus enocet. Et quod dura frictio à causa frigida resoluta membra firmet, ante di- ctum est.

### Longè tamen saepius aliud.

DVPIEX usus est frictionis: aliàs enim affectam partem liberat atque euacuat; aliàs in contrarium renocat, atque sicuti Galenus libro quinto Therapeuticae methodi, Frictio contraposta parvis potissimum per ea me- dicamenta quae calefaciunt, iis quae in con- trarium renocant, medicamentis est annun- tanda: sic sanguine è naribus erumpente, extremos artus; mensibusque immodicè ma- nantibus, brachia manusque fricamus: sic quoque si in profundum corporis materia de- litescit, visceribusque inhaeret, frictione ex- tremarum partium elicitur.

### Neque audiendi sunt, qui numero.

QUONIAM sicuti frictione non secus quam sanguinis missione, purgatione, aut vomitu, corpus attenuatur, atque materia peccans euacuatur, frictionis finis seu ter- minus non numero agitationis circummagi- rationisve manuum metiendus est; sed ex vi- ribus hominis aestimari debet: Siquidem, quemadmodum Galenus docet, summe ca- uendum est, ne ex nimia frictione vires la- cessantur, aut lassitudinis sensus concussa iam carne superveniat: quo fit etiam ut ubi par- ticularis aliqua frictio obeunda sit (verbi gratia, aut in pedibus aut in manibus tan- tum) nullam valentemque frictionem faci- lius leniusque tulerint aegri, quam si uni- versum per totum corpus fieret.

### In malis iam agrum esse.

RETVLI ante ex Hippocrate, exteriorum summorumque partium frigus, atque inter- narum cum sui, calorem, exitiale esse. Verum quoniam medicorum theorematum non sunt ita certa, ut interdum etiam non fallant (nam rationem coniectura talem esse ante demonstrat Celsus, ut quum sepius aliquando responderet, interdum tamen nos fallat)



*fallat) ex proposito nunc docet, quomodo  
huiusmodi signum se offerens, nos usque  
adeo terrere non debeat: nam si extrema-  
rum partium frictione calor foras enocatur,  
spes aliqua adhuc superest; potest enim me-  
dicina alicui locum facere.*

## CAPVT XV.

*De Gestatione.*

**G**ESTATIO quoque longis etiam & inclinatis morbis aptissima est, utilisque est & his corporibus, quæ iam ex toto febre carent, sed adhuc exerceri per se non possunt: & his quibus lentæ morborum reliquæ remanent, neque aliter eliduntur. Asclepiades etiam in recenti, vehementique febre, præcipueque ardente, ad discutiendam eam, gestatione dixit utendum esse. Sed id periculose fit, meliusque quiete eiusmodi impetus sustinetur. Si quis tamen experiri volet, sic experiat, si lingua non erit aspera, si nullus tumor, nulla durities, nullus dolor visceribus, aut capiti, aut præcordijs suberit. Et ex toto, nunquam gestari corpus dolens debet, siue id in toto, siue in parte est, nisi tamen solis nervis dolentibus; neque vnquam in recenti febre, sed in remissione eius. Genera autem gestationis plura sunt adhibenda: quæ sunt & pro viribus cuiusque, & pro opibus, ne aut imbecillum hominem nimis digerant, aut humili obliunt. Gestationum lenissima est naui, vel in portu, vel in flumine: vehementior in alto mari naui, vel lectica, aut scamno: acrior vehiculo. Atque hæc ipsa, & intendi & leniri possunt: si nihil horum est, suspendi lectus debet, & moveri: si ne id quidem est, at certe vni pedi lecti funiculus subijciendus est, atque ita lectus huc & illuc manu impellendus. Et leuia quidem genera exercitationis, infirmis conueniunt. Valentiora verò his, qui iam pluribus diebus febre liberati sunt: aut his, qui grauium morborum initia sic sentiunt, ut adhuc febre vacent. Quod & in tæbe, & in stomachi vitijs, & cum aqua cutem subiit, & interdum in morbo regio fit. Aut ubi quidam morbi, qualis comitialis, qualis insania est, sine febre, quamuis diu manent.



nent. In quibus affectibus ea quoque genera exercitatio-  
num necessaria sunt, quæ comprehendimus eo loco, quo  
quemadmodum sani, neque firmi homines se gererent præ-  
cipimus.

### ENARRATIO.

**O**MISIT ferè reliquas omnes exerci-  
tationes, quæ in motu corporis sitæ  
sunt, præter gestationem & frictionem, de  
qua præcedente capite dictum est; idq; ut  
videtur, quod de corporis ventris aut egro-  
rantibus aliqui sermonem fecerit. Nam  
quum tria prima exercitatorum genera nu-  
merentur, primum, quum a nobis ipsis mo-  
uemur, tanquam sanorum proprium omisit;  
de altero, quum ab aliis mouemur, videtur  
gestatione, sermonem habere instituit; quem  
admodum partem tertiam, hæc est enim quod  
a medicamento sit, meminit. Est autem ge-  
statio mixtum quid ex motu, & dispositione  
quieti simili, quum plurimæ corporis partes  
quiescere videantur, totum corpus gestatio-  
nis tractu moveatur: utilis admodum &  
lenis exercitatio, convalescentibus aut debi-  
lissimis conveniens. Non enim lassitudinem  
inducit corporibus, quum tamen ipsa, velut  
maxima exercitationes, moveat excitetque  
innatum calorem, & materiam multitudi-  
nem diffundat atque dispergat, habitumque  
corporis ac stupidas actiones roborat. Et in  
iis quidem quos vigilie exercent, somnum  
conciliat; & contra vetustiss & dissolutis  
reditum ad se, & vigilie parat. Ac som-  
num quidem conciliat, excrementa quæ à  
capite ac stomacho delabuntur, per halitum  
digerendo, quum hæ partes sint vigiliarum  
causæ præcipuæ; vigilias autem postea in-  
ducit corporis tenorem ad se reducendo &  
corroborando. Cæterum utilis est, ut dicit  
Celsus, corporibus tantum quæ febris ca-  
rent, aut quæ aliqui exerceri non possunt.

### Asclepiades etiam in recenti.

QUAM rectè Asclepiades in vehementi  
ardenteque febre in ipso statim principio ge-

statione sit usus, viderint alij: mihi certè  
nondum placere potuit; præsertim quum Hip-  
pocrates somnum & quietem cõcoquere at-  
que adeo mitigare febres dixerit. In mitio-  
ribus tamen febribus, & ubi vigilie urgent,  
aut quos cataphora premunt, gestatio lenis,  
& qua in sella stratoria gestamus, conve-  
niet. Et qui permanente diurnæ, &  
simplici febre iactantur (ut docet Oribasi-  
us,) si vires ferant, debent gestari quam-  
plurimum; quandoquidem gestatio mixtus  
moveus corpora, quandoque febre exco-  
quat. Ergo in febricitantibus qui ad integritatem  
perveniunt, vel quorum longa admodum  
remissio est, vel qui febribus tenentur ad-  
modum longis, etiam si non magna interna  
habean, conveniet gestatio; non in ardente  
aut vehemente febre.

### Genera autem gestatio- nis plura sunt.

VARIA sunt genera gestationis; qua  
ordine, quodam Celsus noster recenset: pri-  
mum enim sit in lectulo; idq; eo aut pensili,  
aut sulcata molilia iuxta angulares pedes ha-  
bente, aut chorda uni pali subiecta. Alterum  
sit in lectica; quod & duobus modis obtinet;  
scilicet idem ij qui gestantur, aut decumbunt,  
aut desident. Tertium sit navigio: quartum  
vehiculo: quintum equo; sed huius men-  
tionem nullam facit, quod robustis magis  
conveniat. Lenis autem gestationis genera,  
imbecillissimis conveniunt, ut valentiora ro-  
bustis. Nam quæ in lecto sit, ut docet  
Aëtius, vitendum est in febricitantibus, aut  
diuturno morbo decumbentibus, in quo cor-  
pora ita consumpta atque exhausta sunt, ut  
erigere sese nequeant. Sed & in his qui vi-  
res recolligunt à febrili affectione, & phre-  
neticis utilis est: nam spiritus perturbatio-  
nem pla-



nem placide lenit, ac somnum allicit. At qua in curru gestatio fit, concussorium quid obtinet, & diuturnos morbos commouet. potest autem & intendi & remitti: mitioreque utendum est in capitis affectionibus, & in his quibus intestina fluxione laborant; vehementiore vero in affectionibus pectoris & stomachi, in laxis tumoribus ac hydropicis, ac stupore attonito percussis. Vertiginosos aures & hemicranicos, auersos ab itinere retrorsum desidere in curru oportet, eosque leniter mouere: multos enim se nouisse Aëtius dicit, qui hoc modo curati, nullo alio auxilio egerint. Gestatio qua in nauigio fit iuxta ripam, aut in mari tranquillo, hydropicia conuenit, siccatis tumidisque; subuenit quidem primo stomachum, paulo autem postea in consuetudinem venit. At qua per

pelagus fit, omnium vehementissima est, mutationesque plurimas ac maximas facit, mirum quous animam mixtos affectus habeat, ex tristitia, spe, metu, ac periculo, modo gaudentibus & letis, modo periclitantibus nauigantibus.

### Aut ubi quidam morbi.

Hic locus non sine mendis suspitione, ac plane abruptus esse videtur: nam sententia efflagitat, ut plena sit periodus atque oratio constet, ut tamen ex aequo non semper affligunt, aut aliquid simile adiciamus, in hunc modum: Aut ubi quidam morbi, qualis comitialis, qualis insania est, sine febre, qui quamuis diu manent, tamen non semper ex aequo affligunt. In quibus, &c.

## CAPUT XVI.

### De Abstinentia.

**A**BSTINENTIAE verò duo genera sunt. Alterum, ubi nihil assumit æger. Alterum, ubi non nisi quod oportet. Initia morborum, primum famem, sitimque desiderant: ipsi deinde morbi moderationem, ut neque aliud, quam expedit, neque eius ipsius nimium sumatur. Neque enim conuenit iuxta inediam protinus satietatem esse. Quod si sanis quoque corporibus inutile est, ubi aliqua necessitas famem fecit: quanto inutilius est in corpore etiam ægro? Neque vlla res magis adiuuat laborantem, quam tempestiua abstinentia. Intemperantes homines apud nos, ipsi cibi tempora curantibus dant. Rursus alij tempora medicis pro dono remittunt, sibi ipsi modum vendicant. Liberaliter agere se credunt, qui cætera illorum arbitrio relinquunt, in genere cibi liberi sunt, quasi quaeratur, quid medico liceat, non quid ægro salutare sit. Cui vehementer nocet, quoties in eius quod assumitur, vel tempore, vel modo, vel genere peccatur.

C

ENARRA-



## ENARRATIO.

**D**E inedia aded multa Erasistratus eius-  
que sequaces scripserunt, sicuti auctor  
est Galenus, ut è medio pulso phlebotomia  
usu, morbos quosvis ex plenitudine ortos, ea  
sola curari posse existimarent. quod sanè  
quàm fuerit erroneum, & quàm multos ea  
curandi methodus interemerit, satis aperte  
edocet Galenus libro De sanguinis missione,  
& eo qui hunc sequitur, aduersus Erasistra-  
tios. Proinde sicuti plenitudinem duobus  
modis molestam esse diximus, altero ad vi-  
res, quum qualitate sanguis peccet; altero ad  
vasa, quum quantitate; sic quoque duplex  
esse abstinentia genus auctor noster in præ-  
sentia edocet: alterum videlicet quod quan-  
titate aestimetur, nimirum ubi nihil assumit  
eger, inediam vocamus; alterum quod quan-  
titate aq̃e ac qualitate mensuramus. Nam  
hic (quod in aliis ferè omnibus integrum est)  
quantitates à qualitatibus separare non li-  
cet: sunt enim nonnulla, quæ licet quanti-  
tate modica exhibeantur, qualitate tamen  
& citò alterentur, & multam nutriant;  
in quo albo, onorum luteum est. Alia rur-  
sum sunt, quæ quantumcumque ad nauseam  
usque sumuntur, parum tamen aut nihil  
nutriant: cuiusmodi sunt pituita, melicra-  
tum, & similia.

### Initia morborum, primum famem, &c.

**H**IC, si usquam alibi, Celsus dum  
brevis esse laborat, obscurus fit: nam in ge-  
nere dicere initia morborum primum famem  
sitimque desiderare, ut in aliquibus verum  
est; ira in multis falsum, sicuti decimo Me-  
thodi demonstrat Galenus: nam si quis ex  
inedia, labore, siccitate, ira, ardore solis in  
febrem inciderit, huic nec sitim nec famem  
prescribemus; sed in ipso principio antequam  
febris acrimonia reliqui succi accendantur,  
humidum nutrimentum exhibebimus, & si  
assueverit, gelidam fontanam propinare non  
verebimur: quemadmodum Galenus de iuvene  
calido & sicco, qui in feruoribus sub Ca-

nicula ex ira febricitauerat, narrat; is enim  
ubi in prima accessione, duas frigida hemi-  
nas bibisset, statim quidem vomuit flauissi-  
mam bilem, non multo post etiam deorsum  
excreuit. Deinde quum rursus post cibum  
aqua heminam similiter sumpsisset, iam fe-  
bricitare desit. Quare ut Celsum à calum-  
nia vindicemus, & cum Hippocratis & Ga-  
leni theoremati conciliemus, initia quidem  
morborum qui ad vigorem citò perueniunt,  
famem sitimque desiderare dicemus, si agro-  
tantis vires adsint, per initia, totum tem-  
pus dum morbus consistat intelligentes: mor-  
bus siquidem quæ morbus est, absiduam inediam  
flagitat; quo fit ut si quid cibi administre-  
tur, non alia de causa id fiat quàm quò vi-  
res conseruentur: sunt namque, ut ex Hip-  
pocrate rectè monet Galenus, à primo statim  
die in omni agro spectanda duo hæc à quibus  
cibandi consilia petamus, summus nempe  
morbi vigor, & agrotantis vires.

### ipsi deinde morbi mo- derationem.

**N**ISI mihi religio esset, totam hanc  
periodum hunc in modum immutarem:  
Initia morborum qui statim ad vi-  
gorem perueniunt, famem sitimque  
desiderant: ipsi deinde qui hos or-  
dine sequuntur morbi, moderatio-  
nem, ut neque, &c. Ita enim breuiter  
clarissimeque varios Hippocratis Aphorismos  
continuerit, quos alioqui magis confuderit  
atque offuscavit, quàm explanarit: neque  
enim perpetuum esse demonstrauimus, in  
initis quorumvis morborum famem sitim-  
que prescribere; & rursus quotquot tales  
sunt, eos non solum in principiis, sed multo  
magis sub vigorem extremè tenuissimum  
requirere victum: quod Celsum nostrum  
voluisse coniectura est, dum initia morbo-  
rum famem sitimque desiderare dicit: siqui-  
dem, ut Hippocrates inquit, Quando mor-  
bus in suo vigore consistit, extremè tenuis-  
simo victu utendum est. & alio loco: Qui-  
bus morbus



bus morbus statim consistit, iis statim tenuis victus adhibendus est; quibus vero posterius debet consistere, iis & in ipso consistendi tempore, & parum ante illud, cibus subrahendus est; prius vero uberiùs agendum, ut ager sufficiat. Quò alludens auctor noster, moderationem quandam eos requirere dicit, qui hos ordine sequuntur, hoc est, tantum in his à tenui victu declinandum, quantum morbus antedictis minis fuerit acutus: nam, ut idem senex ait, Vbi morbus peracutus est, statim extremos habet labores, & extreme tenuissimo victu utendum; ubi verò non, sed plenioris victum contingit adhibere, tantum cibi indulgendum est, quantum morbus extremus est mollior. Quamquam non absurdè quis moderationem hanc ad tempora morbi transtulerit: neque enim conuenit statim in declinatione pleno victu uti, hoc est, ut auctor noster dicit, iuxta inediam protinus satietatem esse; sed sensim ad consuetam victum rationem transeundum; nam quæ sensim extenuata sunt corpora, lenitè reficere oportet.

### Neque enim conuenit iuxta inediam.

CAVENDVM monet Galenus ne propter & multum, sed sensim paulatimque renutriamus: quippe qui post inanitionem ad pristinam dietam protinus redeunt, iis corporis habitus crudis succis repletur, quos mirum antequam concocti commode in ventre venisq; sint, corporis moles ad se trahit. Ceterum locus hic ex secundo De ratione victus in morbis acutis, transumptus videtur. nam Hippocrates, Verum, inquit, & medicos contra omnino quam oporteat agere scio: nempe omnes languentes ipsos per initia morborum duos vel tres vel etiam plures dies inedia siccare, atque ita tum sortitiones vel potius exhibere volunt; idq; fortassis quòd magna corporis mutationi, magnam quampiam mutationem obliuere ipsis decens videatur. Verum mutatio ipsa bene quidem habet non modica, sed rectè transferenda venit. Iam autem & ciborum exhibitio, mutationis rationem maxime subit, maxime

ergo ludentur, qui tota videntur pituita, nisi rectè transferantur; ludentur quoq; qui solo videntur cremore, quanquam minus; ludentur quoque qui solo videntur potu, sed hi minime. Oportet autem ex sanorum hominum victu disciplinam quæ conseruat facere: nam si sanis quibusdam tales, vel tales cibi variare videntur, tum in aliis quibusdam, tum in nonnullis mutationibus, quomodo & morbis quibusdam & maxime acutis non valde variabunt? hucusque Hippocrates: qui quamuis in diatriarios sermonem primum facere videatur, tamen quæ de sanorum hominum victu subiungit, ad sententiam nostram plurimum faciunt; adeò ut verisimile sit Celsum quæ hic de renutritione scribit, ex dicto Hippocratis loco mutatum.

### Neque vlla res magis adiuuat.

QUANTVM momenti in morborum curationibus afferat victus ratio congrua, passim inculcat Galenus & Hippocrates: si enim cò tã rã exhibeantur cibi, ut vires non grauant, ita facile consueuntur; & rursum si intempestiue, vires caloremque natuum suffocant, & corpus crudis succis replens: neque enim potest natura duobus simul esse intenta, hoc est non potest morbum euincere simul, & cibos conficere: verum ut tempora quibus cibi offerendi non sunt, & tunc, & quibus offerendi existunt cognoscamus, maximum est, ut diximus, febrium tum intentiones, tum declinationes, non in acutis modò, verum quoque & in longis obseruare: nam in principiis & in accessionibus, ut docet Hippocrates, abstinere oportet, cibum enim dare nocuum est; & quibus per circuitum sunt accessiones, in ipsa accessione abstinere oportet.

### Intemperantes homines.

NON est in medico semper reueretur ut ager: siquidem sunt morbi, qui quum diuinum quippiam coniunctum habeant, (ut auctor est poetarum sapientissimus Homerus) medicamentis parum cedant; alij contra



acutos vehementesque adeo paroxysmos habent, ut remediis ne momentum quidem temporis concedant: sunt rursus alij ita rebelles atque maligni, ut quantumvis tempora medico concedant, saluberrima presentissimaque remedia respuant: alij deinceps sunt qui etsi solertis medici industria superari atque evinci possint, assidentium tamen, & aegri incuria in peius mutantur; quod (pro dolor) in nostro rigido septemtrione nimisquàm frequens est: nam quum

commensationibus ingente crapula assuescunt, difficulter ad probam victus rationem, atque eam potissimum quæ ex præscripto medici fiat, transferuntur: quo fit ut quum aut cibandi tempora negligant, aut à medico præscriptam ciborum, tum quantitatem, tum qualitatem contemnant, non raro in vitæ discrimen incidant: adeo rectè ab Hippocrate dictum est, quod non solum oporteat ut medicus seipsum præstet opportuna facientem, sed & assidentes, & agrum & exteriora.

## CAPUT XVII.

## De Sudore.

\*sudatio-  
aum,

\*interini-  
tia m. v.  
e. cum non  
amplius  
grau.

\* & si ante

SUDOR etià duobus modis elicitur: aut sicco calore, aut balneo. Siccus calor est, & arena calidæ, & Laconici, & clibanij, & quarundam naturalium \*sudationes, ubi è terra profusus calidus vapor ædificio includitur, sicut super Baias in myrtetis habemus. Præter hæc sole quoque, & exercitatione is movetur. Ut illa quoque hæc genera sunt, quoties humor intus nocet, isque digerendus est. Ac nervorum quoque quædam vitia sic optimè curantur. Sed cætera infirmis possunt convenire: Sol, & exercitatio tantum robustioribus, qui tamen sine febre, vel \* initio morbi, vel etià gravibus morbis tenentur. Cauendum autem est, ne quid horum vel in febre, vel in cruditate tentetur. At balnei duplex usus est. Nam modò diffusis febribus initium cibi plenioris, vini quoque firmioris valetudini facit: modò febre ipsam tollit, fereque adhibetur, ubi summam cutem relaxari, evocari quoque corruptum humorem, & habitum corporis mutari expedit. Antiqui timidius eo utebantur, Asclepiades audacius. Neque terrere autem ea res, si tempestiva est, debet: \* & ante tempus nocet. Quisquis febre liberatus est, simul atque ea vno die non accessit, eo qui proximus est, post tempus accessionis, tunc lauari potest. At si circuitum habere ea febris solita est, sic ut tertio, quartove die reuertatur, quandoque non accessit, balneum tutum est. Manentibus vero adhuc febribus, si hæc sunt



sunt lentæ, lienesque iam diu malè habent, rectè medicina ista tentatur. Cum eo tamen, ne præcordia dura sint, nève ea tument, nève lingua aspera sit, nève aut in medio corpore, aut in capite dolor ullus sit, nève tum febris increseat. At in his quidem febribus quæ certum circuitum habent, duo balnei tempora sunt, alterum ante horrorem, alterum febre finita. In his verò qui lentis febriculis diu detinentur, cum aut ex toto recessit accessio, aut, si id non solet, \*certè lenita est, iamq. corpus tam integrum est, quàm maximè esse in eo genere valetudinis solet: imbecillus homo iturus in balneum, vitare debet, ne antè frigus aliquod experiatur. Vbi in balneum venit, paulisper \*residere, experiiriq. num tempora astringantur, & an sudor aliquis oriatur. Illud si incidit, hoc non secutum est, inutile eo die balneum est: perungendus est is leniter, & referendus est, vitandumq. omnimodo frigus, & abstinencia vitendum. At si temporibus integris, primum ibi, deinde alibi sudor incipit, fouendum os aqua calida, tum \*in solio descendendum est: atque ibi quoque videntur, num sub primo contactu aquæ calidæ summa cutis inhorrescat, quod vix tamen fieri potest, si priora rectè cessarunt. Certum id autem signum inutilis balnei est. Antè verò, an postea, quàm in aquam calidam se demittat aliquis, perungi debeat, ex ratione valetudinis suæ cognoscat. Fere tamen, nisi vbi nominatim, vt postea fiat, id præcipitur, moto sudore \*leniter corpus perungendum, deinde in aquam calidam demittendum est. Atque hic quoque habenda virium ratio est. Neque committendum, vt per æstum anima deficiat: sed maturius is auferendus, curioseque in vestimentis inuoluendus est, vt neque ad eum frigus aspiret, & ibi quoque antequam aliquid assumat, insudet. Fomenta quoque calida sunt, milium, sal, arena, quodlibet eorum calefactum, & in linteum coniectum. Si minore vi opus est, etiam solum linteum. At si maiore, extincti titiones, inuolutique panniculis, & sic circumdati. Quinetiam calido oleo replentur vtriculi, & in vasa fictilia, ad similitudinem, quas lenticulas vocant, aqua coniecitur, & sal sicco linteo excipitur,

\*certè  
cūta l.

\*resistere,

\*in solium  
descend. c.

\*leniter

De his ex-  
tinctis titionibus habes  
infr. lib. 3.  
cap. 12.  
Lenticula.  
a simili-  
tudine



\* intraque  
al. lixata-  
que igne

\* intereaq.  
descendit  
al. ascen-  
dit fumus,

tur, demittiturque in aquam bene calidam, tum super id membrum, quod fouendum est, collocatur: \* iuxtaque ignem ferramenta duo sunt capitulis paulo latioribus, alterumque ex his demittitur in eam salem, & aqua super leuiter aspergitur. Vbi frigere coepit, ad ignem refertur, & idem in altero fit, deinde inuicem in utroque \* inter quæ descendit salus & calidus succus, qui contractis aliquo morbo neruis opitulatur. His omnibus commune est digerere id, quod vel præcordia onerat, vel fauces strangulat, vel in aliquo membro nocet. Quando autem quoque utendum sit, in ipsis morborum generibus dicitur.

### ENARRATIO.

**Q**UONIAM qua de insolatione ac arene aggestione ac aliis vaporariis fomentis Aëtius tetrab. 1. sect. tert. cap. IX. ex Antylo posteritati reliquit, ad loci huius explanationem satis faciunt, ordine ascribemus. Quidam, inquit, ad solem se exponunt, partim non uncti, alij etiam uncti; & alij desidentes, alij decumbentes, aut stantes, aut deambulantes, aut etiam curren-tes. Ex decumbentibus aliqui in strato, alij qui super corio, alij in arena, aut sale decumbunt. Solaris itaque inustio citra unctiōnem moderatè adhibita perspirationem occultam auget, & sudores elicit, alium autem sistit, & carnem conseruat, pingui- tudinem autem abolet, & tumores laxos, cum alios, tum maxime hydropicorum de-primis, spiritum autem densiorem ac velo- ciores reddit, & propterea anhelos, & re-cta cervice spirantes exacerbant, verum capiti diuturna frigilitate laboranti commodat: nam & firmum, & agilitatibus minus obnoxium reddit. Conuenit autem soli & igni dorsum præter cetera admo-vere; nemi enim qui voluntatis sunt, in eo potissimum sit sunt, ut habet Herodotus, quibus cale- centibus totum corpus valentius redditur. Caput verò aliquo operimento regendum est, & solis radij vitandi sunt. Oportet tamen in his alium præueni-are: inimica est enim

insolatio capiti, euacuatione non præmissa. At verò insolatio cum unctiōne, eadem si- militer potest; verum corpus magis siccatur, velut vngine assatum: quapropter & su- perficiem magis denigrat, ceterum per oc- cultam transpirationem hæc minus discendit, nimirum ad canterij similitudinem densans carnem. Qui verò desidentes ac stantes in- solantur, vehementius quam deambulantes, & magis quam curren-tes inurentur; decum- bentes autem in strato, non magnopere in- uanunt, sed capite magis replentur. Qui super corio soli se exponunt, magnam vili- tatem consequuntur, præsertim hydropici, ischiadici, nephritici, resolui, elephantiasi laborantes, intumescen-tes circa resectio- nem, & qui circa vesicam veterem mor- bum habent, itenque siderati; semina quo- que quæ ab utero strangulantur, adhuc am- plius quæ alba uteri fluxione molestantur. Oportet autem magnum esse corium, & oleo perunctum, & super tenuem cribratam arenam extentum, & ubi percalfactum est corium, tum demum agrum super id de- cubere, capite cum crudo linteo velato. Permanendum est autem diutius in ea decu- bibus signa, & postquam corpus multum fuerit seruesactum, vertere iubendum, ac denolendum; ac postea rursum in alium latum reuoluendum, ac quiescendum: atque hoc ipsum



hoc ipsum sapiens facere oportet. Idem etiam modus in arena adhibetur, loco assidue permutato. Oportet autem ministrum adesse qui calentiſſimam arenam recolligat, & corpori effuſi atque obruti ſuperingerat; ſi quidem mare affuerit, utendum eius arena eſt, nam & lenior & magis exicans huius arena ſomentatio ac ſeruor eſt, quam eius qua per corium contingit; ſi vero fluuiatilis arena fuerit, praſtat corio vti: nam & arena fluuiatilis, & aer humectior eſt ex enapora-tionibus. Curandum interim eſt ut is qui hoc medicamenti genere uſurus eſt, cibos ante probè conſciat, ac prius inambulet, & pro virum ratione leuiter exerceatur; deinde quum aer calidior fuerit, & arena ſatis feruens fuerit reddita, ad decubitum, ut dictum eſt, ſe componat. Quod ſi ſalis copia adſit, multo praſtabilius eſt tenui ſale ſubtrato hominem decumbere. Oportet autem altitudinem non minorè eſſe tribus palmis paruis; ſi enim non fuerit altus ſal, caliditas ipſius facile diſſipatur, uſuque que ex alto emeſum, ac progreſſum non habeat. hucusque Aëtius. Ceterum exercitationem ſudores pronocere mirum non eſt, quod omni animali ab exercitatione caloris augmentum excitari ſciamus, neque caleſcere tantum, ſed & inſiti caloris motum extorſum contitare: ſed hac ut conſuſſorum quid magna ex parte obtinet, ita robuſtioribus tantum conuenire dixit Celfus. Laconicum autem, ut tradit Dion, à Laconibus, ſeu Lacedaemoniis inuentoribus dictum eſt; quoniam nudi uentique, ante alios in hiſce ſudatoriis exercebantur. Vitruuius ſcribit Laconicum ſudationeſque coniungendas tepidario, qui ſaturitate epularum immodica crudi erant, & cacoſtomachi, cruditateque laborabant, hi ad balneas conſuebant, & in ſudatoriis Laconiciſque ſudorem euocabant, ita ſtomachi cruditatem digerentes, quam epula copioſiores afferebant. quo alludens Columella, ſatyrico morſu canināque ſacundia inſectis in luxurioſorum deliciis, Mox, inquit, ut apti ueniant ad ganeas, quotidianam cruditatem Laconicis excoquimus, & exuſto ſudore ſuim quari-mus. Eliciebatur autem in Laconico ſudor

ſucco calore, humoreſque aliquanto uehementius in eo quam in balneo reſoluebantur, corpus uniuerſum uapore quodam ſeruideo incendebatur, exiccabatur, atque ob id calidis, bilioſis acutiſque affectibus, & extenuato corpori inutile. Morbis autem quorum materia, aut in ſumma cute, aut in artubus haberet, & qui frigidi ac diuturni eſſent, accommodiſſimi. Baia autem ciuitas Campania eſt ſecus Campanum mare ſita, à Baio Vhyſis ſocio illic ſepulto ſic dicta; in huius agro aqua calida ſunt, & ad voluptatem & ad varios morbos accommoda, de quibus abundè Plinius: cuius ſententiam quoniam ad loci huius intelligentiam plurimum facere exiſtimauimus, ſubiungendam cenſui. Emicant inquit Naturalis hiſtor. lib. xxxi. cap. 3.) benigne paſſimque in terris alibi frigide, alibi calide, alibi iuncta, ſicut in Tarbellis Aquitania gente, & in Pyrenæis montibus tenui intervallo diſcernente, alibi tepide egelidaeque auxilia morborum conferentes, & e cunctis animalium hominum tantum cauſa erumpentes. Augent numerum deorum variis nominibus, urbeſque condunt, ſicut Puteolos in Campania; Statullas in Liguria; Sextias in Narbonenſi provincia; nuſquam tamen largius quam in Baiano ſinu, nec pluribus auxiliandi generibus; alia ſulphuris, alia aluminis, alia ſalis, alia nitri, alia bituminis, nonnulla etiam acida ſalſaue mixtura: uapore quoque ipſo aliqua proſunt, tantaque eis vis eſt, ut balneas caleſciant, ac frigidam etiam in ſoliis ſeruere cogant, quae in Baiano Poſidiana vocantur, nomine accepto à Claudijs Caſaris libertis: Hac Plinius. Meminit & Baiarum Joſephus Antiquitatum Iudaicarum libro xxviii.

### At balnei duplex uſus eſt.

BALNEORVM quaedam ſunt dulcia, quaedam qualitatibus expertia, nonnulla etiam qualitatem aliquam extraneam habent; cuiusmodi ſunt nitroſa, ſalſa, aluminofa, bituminofa, ſulphurentia, & qua ferri & arſis qualitatem habeant. Hac igitur quum ex variis & contra ſe mutuo pugnantibus qualitatibus conſtent, conſequens eſt, ut pro qualitate



qualitatem differentia, varios atque eos differentes in corpore effectus edant. Quare verisimile est auctorem nostrum, non de omnibus quotquot sunt in genere balneis locutum, sed de iis tantum quae ex aquis dulcibus consunt: harum siquidem usus, praesertim in febris, ad eliciendum sudorem frequens existit. Huius porro duplex est usus: nam (ut Galenus libro De ratione videtur in morbis acutis) laborantem sapientius ad balneum deducimus, non vacuandi corporis causa, sed prorsus ob contrariam rationem, ut scilicet humectetur madescatque quod immoderatus exaruit: sic Cornelius postea discussus iam febris adhiberi dicit, quod morbi reliquias, atque ex morbo relictis affectibus medeatur; materiam enim, si qua superest, foras euocando discutit, atque adeo totum corpus humectat.

#### modò febrem ipsam tollit.

IAM secundum balnearum usum enarrat: duplici namque nomine balnea calida aquarum dulcium, febris, iisque potissimum quae tertiana exquisita nominantur, profunt; tum quod, ut dixi, foras materiam febris euocat, bilisque nonnihil, ut auctor est Galenus ad Glaucomem primo, educant; tum quod sua qualitate corpus humectent ac refrigerent. Refrigerant autem potentia, immisso nimirum intus madore calido, deinde spacio temporis ad naturam humiditatem redacto.

#### fereque adhibetur ubi.

QUOMODO haec operetur balneum, Galenus decimo methodi Therapeut. clarissime demonstrat: Balneum, inquit, ingredientes in aere versantur calido; postea in aquam calidam descendunt; mox ab hac egressi in frigidam; postremo sudores detergent. Potest autem prima eius pars materiam per totum corpus tum calefacere tum liquare, praeterea quae inequalia sunt aquare, & cutim laxare, & multa quae detenta sub hac finire, euacuare. Secunda eius pars, ubi quis in siccis corporis affectu ea vititur, potest madorem vtilem solidis partibus inmittere. Tertia

balnei pars potest ubi quis frigida vititur, & totum corpus refrigerare, & cutem densare, & vires firmare: Quarta vero corpus per sudores citra rationis noxam euacuare. quod Celsus hoc loco voluisse censendum est, quum omnia haec balneum praestare dicit, nullo discrimine partium balnei habito.

#### Antiqui timidiùs eo utebantur.

QVA ratione veterem medicinam immutauerit Asclepiades, Plinius Naturali Historiae lib. xxvi. cap. tertio edocet: & quoniam non semel Asclepiadis huius mentionem facit Celsus, Plinius verba, quod ad loci quoque huius explanationem faciant, afferbam. Durabat tamen, inquit, antiquitas firma, magnaque confesse rei vindicabat reliquias, donec Asclepiades aetate Magni Pompeij orandi magister, nec satis in arte ea qua stuosus, ut ad alia sagacis ingenij, huc se repente conuertit: atque (ut necesse erat homini, qui nec id egressi, nec remedia nosset oculis usque percipienda) torrenti ac meditata quotidie oratione blandiens, omnia abdicauit; totamque medicinam ad causam reuocando, coniecturam fecit: quin res maxime communium auxiliorum, professus, abstinentiam cibi, alias vini, frictionem corporis, ambulationem, gestationes: quae quum unusquisque semetipsum sibi praestare posse intelligeret, fauentibus cunctis, ut essent vera quae facillima erant, uniuersum propè humanum genus circumegit in se, non alio modo, quam si calo emissus aduenisset. Trahebat praeterea mentes artificio mirabili, vinum promittendo aegris, dandoque tempus, tum frigidam aquam. Et quoniam causas morborum scrutari prior Herophilus insisterat; vini rationem illustrandas Cleophantus apud praesatos; ipse cognominari se frigida danda praefers, ut auctor est M. Varro, alia quoque blandimenta excogitabat, iam suspendendo lectulos, quorum iactatu aut morbos extenuaret aut somnos alliceret, iam balneas auarissimas hominum cupidine instigando, & alia multa dictu grata atque iocunda.



iocunda: magna auctoritate, nec minore sapia, cum occurrisset ignoto suero, relato homine ab rogo atque seruat, ne quis lenibus momentis tantam conversionem factam existimet.

### Quisquis febre liberatus est.

HVIUSMODI potissimum febres sunt, ex quas ephemeræ aut diarias vocant: nam Galenus ad Glauconem primus in his statim post primam accessione solutionem laudandum monet, atque ad solitam victus rationem transferendum, quod videlicet, ut dixi, morti reliquias, si quæ supersint, per sudores euocet atque discutiat.

### At si circuitum habere ea febris.

VNDICESIMO methodi Galenus, in balneo per febres adhibendo tribus attendendum monet: vni quod citra horrorem administraretur, quod etiam paulo post obseruandum docet Celsus: secundo, quod nullum primæ nota viscus sit imbecillum: tertio, quod multitudo crudorum humorum in Venis non contineatur; horror namque non solum non intendere præsentem febrem, sed etiam quum non fuit, eam iterum excitare potest. Partes vero imbecillæ liquatos humores iam recipiunt magis quam antequam liquarentur. Crudorum etiam humorum copia in totum corpus digeritur: horum si nihil obset, ex balneis duo hæc ego compendia accedunt, & quod redundantium humorum aliquid euacuetur, & quod multum febrilis caloris transpiratiur. Quare nec in principio, nec in augmento, quisquam febrientem balneo vti præceperit, sed in febris inclinatione, aut incipiente, aut procedente aut amplius etiam progressa.

### Manentibus vero adhuc febribus.

PER manentes & lentas febres, eas hoc loco intelligere videtur, quæ de quartæ in quartum accessiones suas faciunt; eæ siquidem vel lentos habent paroxysmos, ita

diu permanent, atque ut non raro spiritibus depastis atque humoribus, solidiores corporis particulas occupent, hectica, aut miasmodes ob id vocant. Oriuntur autem hæc ab atro sanguine, quem melancholiam vocant; cuius quum receptaculum sit lien, rectè subiungit auctor noster, lienisque iam diu male habent. Ac quod in his conueniat, atque admodum salutare sit balneum aquarum dulcium, docet Galenus libro x. Methodi: Nam quicumque, inquit, febre hectica laborant, atque ex his ipsis præcipiunt qui iam miasmodes hectica febricitant, modò his nulla alia febris ex putrescente humore, nec phlegmone sit adiuncta, eos omnes audacter lauabis, sed prorsus citra omnem laborem, ne vires resoluas: excrucis enim solidis particulis vitalem maiorem balneum immittit.

### Cum eo tamen, ne præcordia.

DIXI paulo ante, id animaduertendum in febribus, ne primariæ aliquæ partes imbecillæ sint: quod volens Celsus, præcordiorum duriciem, cauendam monet. Ea autem ferè oritur post viscerum, hoc est lienis, aut hepatis inflammationem minus rectè curatam, sanguine circa splenitides, hepatis de venas in ipsis obstruato, qui quum neque digeri, neque excerni facile possit, duriciem quandam scirrhosam gignit, alias quidem cum tumore, alias citra tumorem. Ac quod in his balneum minus tutum sit, ex antedictis satis liquet: siquidem tenax aliqui lentæque materia calore balnei dissoluta iam, ad partes affectas decumberet, unde non solum nihil accederet commodi, sed multo magis exacerbesceret, augereturque malum: huc quoque referenda sunt, quæ de dolore, qui aut in medio corpore, aut in capite est, dicit.

### neve lingua aspera sit.

LINGVA in febribus nonnunquam ab intemperie secca aspera redditur: in huiusmodi sanè si reliqua respondeant, non omnino alienum est balneum. Contingit etiam non raro, ut exasperetur aut diffringatur lingua, aut



qua, aut carbonum speciem induat, ab interiorum viscerum phlegmone aliqua insigni: qua sanè lingua asperitas, quum in principii ferè appareat, nondum apparentibus signis aliquibus inflammationis, à balneo, ut qui maximè, abhorret.

### At in his quidem febribus.

NON statim ante horrorem conuenit balneum; periculum enim esset ne balnei calore humores ad expulsionem agitati, horrorem atque adeò nouam febrem inducerent, sed tribus aut quatuor ad minimum horis ante horroris inuasionem: ut si sexta hora horroris impetus expectaretur, secunda, aut tertia balneum administrandum sit; ita enim, & materiam peccantem expurgabimus, & morbo aliquid demetur.

### In his verò qui lentis febriculis.

PER lentas febres hic intellexero quotidianas: hæ siquidem quum vix ad infestationem veniant, lentiores tamen accessiones faciunt; in his etenim post morbi inclinationem, ut in aliis quoque, rectissimè adhibebitur balneum.

### imbecillus homo iturus in balneum.

QUÆ imbecillo ante ingressum balnei consideranda sunt, explicat: ac primum ne frigus aliquod experiatur ingressurus monet; id enim corpus densaret humoresque ad interiora pelleret, quos alioqui balneo per sudores elicere mens erat. Deinceps ubi iam ad balneum ventum est, paulisper quiescendum ac resistendum docet; est enim agrotanti quies, ut corpus in balneo tum laxius, tum mollius reddatur, idonea. siquidem dum mouetur corpus, muscoli distenduntur, qui minus, tum molliuntur, tum relaxantur: quo fit ut videndum quoque dicat, si tempora astringantur; inutile nanque eo die balneum esse: significant enim magnum febrilis aut extranei caloris excessum, aut alioqui ingentem ariditatem, principiumque mortis.

### & abstinencia vtendum.

LAVARI, inquit Hippocrates, is non debet, qui super sorpsit vel bibit; neque confestim à balneo sorbendum vel bibendum: nam qui biberunt, his caput repletur; qui verò cibum sumpserunt, his non caput modò, ut docet Galenus, verum etiam corpus totum alimonia prius quàm cōcocta fuerit, ad se trahit.

### atque ibi quoque videndum num.

HORRORIS huius causam alibi esse dicit Galenus, rodentium excrementorum confertim actorum citatiorem motum. Proinde quibus horum est abundantia, caro verò & cutis densa, sine balneo sint ingressi, sine stererint in sole, sine quoquo modo vel gestati vel perfricti vel exercitati vehementius sint dimoti, vique his horror inciderit, contrà quibus hæc pauca sunt, & corporis habitus ut remittatur, laxeturque à balnei calore promptius, non modò non horrent, sed etiam meliores redduntur, utpote excrementis per balneum euacuatis.

### Fomenta quoque calida.

FOMENTORVM alia sunt humida, alia sicca; lenia alia, alia mordacia: bursida itaque fomenta inflammationibus à biliosis humoribus factis conueniunt: sicca verò his quæ à tenui & aquoso sanguine producta sunt: lenia quidem mordacibus humoribus opitulantur; ut mordacia & attenuantia crassos & viscosos. Quid autem per extinctiones velit, sequente libro de curatione horroris in febribus dicit: nam fomentis protinus validioribus, ait, totum corpus circumdare conuenit, maximeque inuolutis extinctis testibus & titionibus. Vasorum autem scēlinum (ad similitudinem quas lenticulas vocari dicit) in curatione voluisti Aëtius mentionem facit. Nam fomenta, inquit, adhibenda sunt ex surfuribus & per νεφελία φασκὰ, hoc est vaporaria vasa lenticulata, & per vesciculas bubulas oleo semiplenas. Reliqua quæ sequuntur, quoniam per se ipsa clara sunt, volentes prætermittimus.

### CAPVT



## CAPVT XVIII.

*Quicibi, potionēs-ve, aut Valentis, aut mediæ,  
aut imbecillæ materiæ sint.*

CVM de his dictum sit, quæ detrahendo iuuant, ad ea veniendum est, quæ nos alunt, id est cibum & potionem. Hæc autem non omnium tantum morborum, sed etiam secundæ valetudinis communia præsidia sunt. Pertinetque ad rem, omnium proprietates nosse: primum, vt sani sciant, quomodo his vtantur: deinde, vt exsequentibus nobis morborum curationem, liceat species rerum, quæ assidue necessariæ erunt, subijcere. Neque necesse \* est subinde singulas il- \* sit  
las nominare. Scire igitur oportet omnia legumina, quæque \* fiunt,  
ex frumentis panificia \* sunt, generis valentissimi esse. Id va-  
lentissimum voco, in quo plurimum alimenti est. Item  
omne animal quadrupes domi natum, omnem grandem fe-  
ram, quales sunt capræ, ceruus, aper, onager: omnem gran-  
dem auem, quales sunt anser, & pavo, & grus. Omnes bel-  
luas marinas, ex quibus *κῆτος* est, quæque his pares sunt. Item  
mel & caseum. Quod minus mirum est, opus pistorium valen-  
tissimum esse, quod ex frumento, adipe, melle, caseo constat.  
In media verò materia, numerari ex oleribus debere ea, quo-  
rum radices vel bulbos assumimus. Ex quadrupedibus, lepo-  
rem. Aues omnes à minimis ad Phœnicopterum: item pis-  
ces omnes, qui salem non patiuntur, solidiue saliantur. Im-  
becillissimam verò materiam esse omne olus, & quicquid in  
cauliculo nascitur, qualis est cucurbita, & cucumys, & cappa-  
ris. Omnia poma, oleas, cochleas, itemque conchyliæ. Sed  
quamuis hæc ita discreta sunt, tamen etiam quæ sub eadem  
specie sunt, magna discrimina recipiunt, aliaque res alia vel  
valentior est vel infirmior. Siquidem plus alimenti est in \* car- \* pane,  
ne, quàm in vilo alio. Firmius est triticum, quàm milium,  
id ipsum quàm ordeum, & ex tritico firmissima siligo, deinde  
simila, deinde cui nihil ademptum est (quod *αὐτόπυρον* Græci  
d 2. vocant),



Cibarius  
panis.

Varro libr.  
4. de ling.  
lat. Radix,  
inquit, pe-  
regrinum  
vocabulū:  
sic enim  
antiqui  
Græci, quū  
nunc Ra-  
phanum.

\* sparus,

\* lacteus

\* infirmis-  
simis

vocant) infirmior est, ex polline infirmissimus cibarius panis. Ex leguminibus verò valentior faba, vel lenticula, quàm pisum. Ex oleribus valentior rapa, napique, & omnes bulbi (in quibus cepam quoque & allium numero) quàm pastinaca, vel quæ specialiter, \* radícula appellatur. Item firmior brassica, & beta, & porrum, quàm lactuca, vel cucurbita, vel asparagus. At ex fructibus surculorum valentiores vuae, ficus, nuces, palmulae, quàm quæ poma propriè nominantur. Atque ex his ipsis firmiora quæ succosa, quàm quæ \* frigida sunt. Item quæ ex his auibus, quæ in media specie sunt, valentior ea, quæ pedibus, quàm quæ volatu magis nititur: & ex his quæ volatu fidunt, firmiores sunt, quæ grandiores aues, quàm quæ minutæ sunt, ut ficedula & turdus. Atque ex quoque quæ in aqua degunt, leuiorem cibum præstant, quàm quæ natandi scientiam non habent. Inter domesticas verò quadrupedes, leuissima suilla est, grauissima bubula. Item quæ ex feris quo maius quodque animal, eo robustior ex eo cibus est. Pisciumque eorum, qui ex media materia sunt, quibus maximè utimur: tamen grauissimi sunt, ex quibus falsamenta quoque fieri possunt, qualis lacertus est, deinde qui quamuis teneriores, tamen duri sunt, ut aurata, coruus, \* scarus, oculata: tum plani, post quos etiam leuiores, lupi, mullicæ, & post hos omnes saxatiles. Neque verò in generibus rerum tantummodo discrimen est, sed etiam in ipsis, quod & ætate fit, & membro, & solo, & calo, & habitu. Nam quadrupes animal omne si \* lactans est, minus alimenti præstat. Item quo tenerior pullus cohortalis est. In piscibus quoque media ætas, quæ nondum summam magnitudinem impleuit. Deinde ex eodem sue vngulæ, rostrum, aures, cerebellum. Ex agno, hædove, cum petiolis totum caput aliquanto, quàm cætera membra, leuiora sunt, adeo ut in media materia poni possint. Ex auibus, colla alæ rectè \* infirmis annumerantur. Quod ad solum verò pertinet, frumentum quoque valentius est collinum, quàm campestre. Leuior piscis inter saxa editus, quàm in arena: leuior in arena, quàm in limo. Quò fit, ut ex stagno, vel lacu, vel flumine eadem

\* fragilia  
al. fracida  
al. friabilia.



eadem genera grauiora sint. Leuiorque qui in alto, quam qui in vado vixit. Omne etiam ferum animal domestico leuius: & quodcunque humido cælo, quam quod sicco natum est. Deinde eadem omnia pingua, quam macra, recentia quam salsa, noua quam vetusta, plus alimenti habent. Tum res eadem magis alit iurulenta, quam asfa: magis asfa, quam \*fixa. Ouum durum valentissimæ materiæ est: molle vel \*clix. forbile, imbecillissimæ. Cumque panificia omnia firmissima sint, elota tamē quædam genera frumenti, vt alica, *δρυζα*, ptisana, vel ex hisdem facta sorbitio, vel pulicula, & aqua quoque madens panis imbecillissimis annumerari potest. Ex potionibus verò, quæcunque ex frumento facta est, itemque lac, mulsum, defrutum, passum, vinum aut dulce, aut vehemens, aut mustum, aut magnæ vetustatis, valentissimi generis est. At \*acetum, & id vinum, quod paucorum annorum, \*acidum, vel austerum, vel \*lene est, in media materia est. Ideoque \*pingue infirmis nunquam generis alterius dari debet. Aqua omnium imbecillissima est: firmitiorque ex frumento potio est, quod firmitus fuit ipsum frumentum: firmitior ex eo vino, quod bono solo, quam quod tenui, quodque temperato cælo, quam quod aut nimis humido, aut nimis sicco, nimiumque aut frigido, aut calido natum est. Mulsum quod plus mellis habet, defrutum quo magis \*incoctum est, passum quo ex sicciore \*excoctū vna est, eo valentius est. Aqua leuissima pluuialis est, deinde fontana, tum ex flumine, tum ex puteo, post hæc ex niue, aut glacie, grauior his ex lacu, grauissima ex palude. Facilis etiam & necessaria cognitio est naturam eius requirentibus. Nam leuis pondere apparet, & ex his quæ pondere pares sunt, eo melior quæque est, quo celerius & calefit, & frigescit, quoque celerius ex ea legumina percoquantur. Ferè verò sequitur, vt quod valentior quæque materia est, eo minus facile concoquatur, sed si concocta est, plus alat. Itaque vtendum est materiæ genere pro viribus, modasque \*omnibus pro genere sumendus. Ergo \*omnium imbecillis hominibus rebus infirmis opus est. Mediocriter firmos media materia optimè sustinet: & robustis apta

d 3                      validis



validissima est. Plus deinde aliquis assumere ex leuioribus potest: magis in his, quæ valentissima sunt, temperare sibi debet.

### ENARRATIO.

**Q**UANTVM momenti afferat ad sanitatis non solum conseruationem, sed & ad profligandos morbos ciborum qualitas, satis aperte Galenus declarat, initio libri De boni & mali succi cibus: verum quoniam, ut paulo post docet Celsus, alij cibi multum nutriant, alij parum, alij etiam præterquam quod corpus non alant, vitiosis quoque succis repleant; ciborum qualitates breuiter explicasse conueniebat; idq; ut à precedente, aut purgatione, aut morbo, aut inedia, aut alia quavis ratione exhausto corpore, rectè restituere ac rescire egrum possumus. Nam sicuti varia sunt ciborum qualitates, sic quoque inter se differentes sunt refectiois scopi: alia enim corpora, ut auctor est medicina parens antiquissimus Hippocrates, lentam, atque alia citam refectioem desiderant: nam quæ sensim extenuata sunt corpora, lentè rescire oportet; quæ verò citò, breuiter.

#### Scire igitur oportet omnia legumina.

**GENERATIM** tantum enumerat quæ multum nutriant, non distinguens boni succi cibos à cacoehymis; id enim paulo post explicabit. Dicit autem omnia cerealia, hoc est legumina & frumentacea, valentissimi esse cibi. vocantur autem legumina quæcunque manu leguntur, frumenta quæ falce putantur, quæquam sint, qui, ut docet Galenus, solum triticum sub frumenti nomine comprehendere maluerint. Caterum vrit est, siue sub frumento, siue sub leguminibus complectamur, certum est alia aliis plus nutrire. At quod omnia legumina valentissima materia sint, non videtur verisimile; sunt enim quæ media sunt inter multum, & parum nutrienda: nam phaselli & pisa, ut docet Celsus, media sunt inter *βουρυμα* & *κατά-*

*χυμα*, siue coquantur, siue minùs, inter tarda meatu & celeriter, inter multum & parum nutrienda. Eadem ratione nec omnia frumentacea valentissima materie erunt: siquidem hordeum parum nutrit: & quemadmodum docet Galenus, quod ad panes hordeaceos pertinet, siue oportet omnes quoquo modo parentur, exigui esse alimenti, succumque crassum, ac statim nimium generare, uti etià omnia legumina; nam hæc præterquam quod valentissima materia sint, etiam flatuosa sunt. In summa, omnes crassi succi cibi multum nutriunt: sic, omne animal quadrupes, domi natum, omne grandem feram, omnes beluas marinas valentissima vocat.

#### Item mel.

**QUVM** mellis mentionem facit Celsus, videtur non solum quæ crassi succi sunt, inter valenter nutrienda numerare; sed & ea quoque quæ tenuem succum gignunt. Nam mel, ut auctor est Galenus, ciborum omnium non modò dulcissimum, sed & succum etiam consistentia tenuissimum gignit. Quare ut rectè à Celso inter valentissimè nutrienda numeratum sit, valde dubio: nisi quis ex Hippocratis analogia ad vinum facta, mel multum nutrire dicat: siquidem libro De ratione victus ait duplè vini epotum minùs alere, quàm simplum mellis. Verùm hic Hippocratis locus, non videtur usque adeò urgere, ut hinc statim inter maximè nutrienda mel, idq; potissimum crudum adhuc collocemus: nam Hippocrates non simpliciter & citra exceptionem simplum mellis duplo vini plus nutrire dixisse videtur; sed aliquod vinum, quale est *ιδρύα* *φωγ*, nos villum aut pauciferum vocamus, duplo minus melle alere: dicit enim mulsam vino albo tenui, paucifero, & inodoro



doro quodammodo fortiorem, quodammodo inferiorem esse; adeo ut hinc inter media materia cibos melius rectius constituendum putem.

### & caseum.

CASEVS omnis, inquit Hippocrates, robustus est, estuosus, multum alit, aliumque sistit. Robustus quidem, quod proximus est generationi; multum alit, quia carnosa sunt reliqua lactis; estuosus, quia pinguis est; alium sistit, quia succo & coagulo compactus sit. Quod igitur valentissima materia sit, satis hinc constat; praesertim quando crasso succo materiam praestet.

### Quo minus mirum est.

LOQUITVR de placenta ex lacte & caseo confecta, de laganis, rheumatis, & iis quae ex simillagine & lacte confiunt: quae omnia quum crassioris succi cibi sint, vix simile quoque est multum nutrire.

### In media verò materia.

DYAS tantum extremorum differentias ponit Psellus; Celsus inter hanc mediam statuit, ut res lectori paulo clarius esset. Recenset autem in medio genere cibiorum, olera, quorum radices vel bulbos assumimus: cuius generis sunt sisarum, rapa, bulbum, napi & similia; sed inter haec alia aliis intensius nutriunt.

### Ex quadrupedibus, leporem.

DIXIT paulo ante omne animal quadrupes domi natum, omnem grandem feram valentissima esse materia: nunc sub medio genere, media statura quadrupedes aut animalcula complectitur: sed & huc referre oportuit ceterorum animalium extrema, cuiusmodi sunt vulva, alius, intestina, cauda, auricula, axillae. In genere quoque volucres omnes minus alunt quadrupedibus: unde recte omnes aves à minimis ad phanicopterum sub hoc genere complexus est. Est autem phanicopterus ex aquilarum genere, ab alarum rubedine dicta, magnitudine per-

dices excellens, rostrum, & pedes phanicio habens: versatur per lacus, vulvuri similis, minimis alis; imbecillusque, & degener, adeo est, ut à corvis non raro superetur. Huius autem linguam praecipue esse saporis Apicium docuit, quod Martialis quoque hoc disticho satis demonstrat:

Dat tibi penna rubens nomen, sed lingua gulosis.  
Nostra placet, quod si garrula lingua foret.

### item pisces omnes qui salem.

PISCIVM omnium nutrimentum san- guinis est pariter quam carnis: utrum quum alij aliis nutrimenti plus praebant, (nam cetos & alias id genus beluas marinas valde nutrire dixi,) dicat pisces omnes qui salem non patiuntur, media esse materia: sunt autem eiusmodi omnes molles & friabilis carnis; aut si qui tales sint, qui salem ferre possint, eos esse qui solidi, hoc est integri condiantur sale, ut distinguat eos à beluis marinis, quas frustatis salimus.

### Imbecillissimam verò materiam esse.

NUNC ad ea quae minimè nutriunt progreditur: sunt eius generis herbae omnia, cucumeres, melones, oleopones, edentilia, excrementitia omnia magis sunt, quam nutrimenta: de iis promissum in Epitomis reliquit Hippocrates, quod statim in corpore euacuentur, parvo ne tempore in corpore durantem substantiam habeant: Nam tibi, inquit, imbecilliores non mentaneam vitam habent.

### Siquidem plus alimenti est in carne.

CARO omnis, praesertim quae succulenta est, quales in pecoribus & porcum est, valentissime nutrit, atque ovisque in aliquam transiit partem, quo natura sibi ipsi familia facillime aleret, atque ad sibi ipsi similem



similem hanc transmitti, carnem quæ à sanguine quàm minimè differt, citissimè & alterat, & valentissimè nutrimentum inde consequitur, quod frustra aliqui ab aliis quæ valentissimè nutriuntibus annu-merantibus, expectabimus. Nam quantumvis cetacea omnia beluæque marina corporis mole terrestria animalia ad eam huiusmodi accommodata superent, tamen ob excre-mentitiam quædam pinguis atque superfluitatem qua redundat, minus nutrimentum terrestribus præbent; adeo rectè à Celso dictum est, ea quæ sub eadem specie sunt, magna discrimina recipere, aliæque aliis vel infirmiora vel valentiora esse.

### Firmius est triticum quam milium.

INTER triticea plurimum habent ali-menti quæ densa sunt, totamque substantiam adeo compactam habent, ut dentibus vix diuisa quæant, & talia, cuius exigua mole cor-pora plurimum nutriunt; quæ vero iis sunt coarctata, quæque dentibus quidem facile franguntur, fractæque paræ ac lenia appa-rent, magna mole exiguum reddunt nutri-mentum. Verum quatequale tandem sit fru-mentum, firmius est quàm milium: panis siquidem qui ex milio fit, ut docet Galenus, exiguus est alimenti ac frigidus; perspicuum-que est, quod præaridus sit, ac friabilis, nihil enim in se neque lentoris neque pinguedinis habet; iure ergo humentem alium magis desiccatur, sed vitium hordeo firmius sit mi-lium, magno per ambigo: nam hordeacei quidem panes, ut Galenus De alimentorum facultatibus, triticeis milio minus alunt; qui tamen ex præstantissimo hordeo conficiun-ter, minus à triticeis in eo superantur; qui verò ex laxioris leni, surfuraceis resistent. Dioscorides acilius est enim qui ex milio fit panem, ceteris fragilis minus alere: Psellus quoque eum dein concoctioni repugnare au-ctor est. quare, si quid hic mihi concedatur, paria dictorum metathefi pro hordeo, milium substituerem; ac rursus pro mi-lio hordeum.

### & ex tritico firmis- sima filigo.

SI per filiginem alteram speciem triti-  
ci intellexerit (sunt enim tria in uniuersum tritici genera, robur, filigo & setaceum, quod semestris quoque triticum vocant) ne-  
scio quàm appositè inter triticea firmissimam  
filiginem dixerit; hæc enim, ut ordine robo-  
posterior est, ita hostiæ quoque eodem in-  
ferior est; degenerat enim non raro in filigi-  
nem (ut auctor est Columella) robur. At si  
per filiginem lectissimam purissimamque fa-  
rinam, seminis viriculis ac surfuribus (quam  
alii tritici florem, Plinius eiusdem delicias  
appellat) intelligamus, plurimum inter om-  
nia panificia dixerimus nutrire. solent autem  
panes ex ea confectos, purissimos, & maxi-  
me filiginosque vocare. Hi & massam  
lentam admodum, ut quàm longissimè in-  
diuisa trahi possit, & plurimum ponderis  
exigua mole habent; unde & tardissime se-  
cernuntur, atque nutritum plurimum; quare  
bene fermentandos ac probe subigendos, ne-  
que statim post fermentationem assari vult  
Galenus, sed longum aliquod intervallum  
ut intersit præcipit.

### deinde cui nihil adem- ptum est.

Adversus & Galenus etiam *συσχυρ* &  
dicitur, quod ad ipsos conficiendos tota fa-  
rina nusquam à surfure seuncta *συσχυρ*  
& hoc est comportetur: *συσχυρ* p<sup>o</sup> au-  
tem dictus est *σύν* & *σχυρ* & *συσχυρ*, hoc  
est totum triticum, nulla sui parte adempta,  
in panificium cedat. Verum quid hic ordine  
filiginos sequi debeat, non possim inueni-  
re credam; quum qui ex pulve seu simila  
conficitur, ut filiginis plus, surfurisque ac  
virulentioris habet minus, ita autopyro na-  
triatur intensius: nam & hunc ordinem Ga-  
lenus observavit: St quidem inter panes, aut  
filiginos plurimum nutrit; post ipsum au-  
tem similaceus; tertio hoc medius qui &  
*συσχυρ* & *συσχυρ* dicitur. hos co-  
ctos sequuntur, quos nonnulli secundo co-  
ctos panes, vulgè biscottos dictos esse, pu-  
tant.



tant. Postremum autem omnium locum obtinent fursuracei, sordidi à quibusdam vocati; hi enim quum parum alant, excrementis tantum ventrem replent. Quorum Celsus ideo non meminit, vel quod in usu non essent, vel quod pecudilus quam hominibus magis convenire existimaret. Cibarii autem panes fiebant ex viriclorum aut fursuris maiore portione, pollinis verò aut siliginis minore.

### Ex leguminibus verò.

LEGUMINA vocari dixi cerealia semina, quæ manu leguntur, & ex quibus panis non fit: huiusmodi sunt faba, pisa, cicera, lenticula. Fabarum autem citus flatulentus admodum est, etiamsi coctus diutissime fuerit, aut quouis modo paratus; multoque magis flatulentior erit, si quis iis integrè coctis utatur; fixa quidem aliqua ex parte statim deponunt, sed concoctum difficillime reddunt, tardèque pratercunt, & crassi succi alimentum corpori exhibent. Lentes autem atrida sunt ac friabiles, corticemque habent astringentem, & quæ ipsarum est velut caro, crassi est succi & terrei, auileram qualitatem habens exiguam, difficilis concoctu, melancholicum succum generans, somniag; ob id terrifica concilians, dolorem capitis adaugens, pulmone ac partibus omnibus nervosis ac felli inutilis, soli stomacho ad subversionem, seu dissolutionem utilis. Triginta enim lentis grana denotata eandem curare dicuntur, Dioscoride ac Plinio testibus. Pisa autem tota substantia cum fabis similitudinem quandam habent, ut auctor est Galenus, eodemque cum fabis modo sumuntur, tantumque ab eis discrepant, cum quod non aquè ac faba sint flatulenta, cum etiam quod detergendi facultatem non habeant: quo fit ut miretur cur hæc ordine lenticulis & fabis inferiora definiuerit Celsus.

### Ex oleribus valentior rapa.

RAPA, napique succum in corpus distribuunt mediocri crassiore; ac proinde si quis ipsis liberalius vescatur, succum crudum accretabit, potissimum si minus iusto

consecerit: aqua incocta nulla plantarum congenerum minus nuirunt. Vulbi autem omnium, ut crassam & lentam corporis substantiam consequuntur, ita succum non omnino tunc generant, quanquam suo amare crassos lentosque humores incidere, atque appetitum quodammodo incitare non negauerim, reiectionibusque ex pulmone & thorace prodesset. Caterum si bis fuerint elixi, plus quidem nutriunt, sed depositio amare iis quæ per spiritum deicienda sunt aduersabuntur. Radicula autem opsonium magis est, quam alimentum: si quidem cum manifesta sua calefactione atque acrimonia attenuandi habeat facultatem. Caterum hic, cum Galeno mirari subit eos medicos atque idiotas, qui post cibos, coctionis inuandæ gratia, crudas radículas esant: ipsi quidem hanc rem experientia sibi satis exploratam esse affirmant; qui tamen eos ipsos sunt imitati, omnes læsi fuerunt.

### Item firmior brassica.

BRASSICA asina, ut inquit Simeon Zethi, peioris succi est quam hiberna, malumque ac melancholicum succum generat, visum hebetat, & somnum per contraria insomnia interturbat; cocta cum pingui carne, plurimum vitij atque noxæ amittit. Caro, ut auctor est Plinius, crambem crispam magis probat; deinde leuem grandibus solis, caule magno; prodesseque tradit capitis doloribus, oculorum caligini, praesertim quæ ob humiditatem fit, eorundemque scintillationibus, vel stomachi doloribus crudam ex aceto & melle, coriandro, ruta, mentha, laseris radícula sumptam acetabulis duobus matutino tempore; tantamque esse vim, ut qui terant hæc, validiores se fieri sentiant. Galenus, non ut alimentum, sed ut opsonium plerisque mandere dicit; medicos autem, ut siccante medicamento uti. A beta autem, ut à reliquis quoque oleribus, corpori paucum admodum alimentum accedit; verum hepatis lienisque obstructions aperit: unde iure quis ut medicamentum potius quam ut alimentum mandi dixerit; nam si multum comedatur, ut auctor est

c

Simeon



Simeon Zethi, stomacho infestum edulium est. Porrum quoque acris saporis est; quæ ratione corpus calefacit, crassosque humores attrahat, ac lentos incidit: mali succi est; quare ut præstantior eius usus reddatur, bis aut ter in aqua decoquendum est, neque amplius depravatium succum obtinebit. Lactuca omnibus aliis holeribus anteferenda est: est enim succi quam alia omnia laudabilioris. Nam, ut docet Galenus, omnibus aliis oleribus paucissimum sanguinem, & vitiosum generantibus; ex sola lactuca non multus quidem nec vitiosus, haud tamen omni ex parte laudabilis, gignitur. Vescimur autem vix plurimum ipsa cruda; ac tum stomachi ardores compescit: æstate autem quum in semen proruptura est, in aqua dulci percoquentes, cum oleo & garo & aceto assumimus, aut cum alio ex condimentis opsoniisque; præsertim iis quæ caseo constant: plerique etiam antequam excalescat, in aqua elixa vivuntur: Dioscorides elixam cruda magis alere affirmat; quo fit ut non satis mirari possim Celsum, quod lactucas brassica, beta, porro capitato postposuerit; quum ex antedictis satis constet, laudabiliorem, probiorem ac copiosorem sanguinem à lactuca gigni, quam à quovis aliorum prædictorum olerum; nisi forte hæc idem valentiora dixerit, quod crassiores succum generent. Sed si de lactucis id concedamus, quid tandem de alilibus asparagis, quos omnibus postponit, pronunciabimus? siquidem Simeon Zethi medium quiddam eos obtinere dicit inter olera & carnes: Asparagus, inquit, olerum omnium maxime nutrit; proinde si quis dicat eius naturam positam esse mediam inter olera & carnes, non procul à vero aberrabit, propter nutriendi facultatem, plantarum, & carniū quæ similiter in se habet. Præterea Plinius vilissimum stomacho cibum asparagus prædicat: adeo multis in locis multa præposterè ac confusè (hoc præsertim libro) tradidit Celsus; ita ut nisi religio esset, totam orationis seriem hunc in modum inverterem: Item firmior asparagus, & lactuca, quam vel cucurbita, vel porrum, vel beta, vel brassica.

### At ex fructibus surculorum.

POMA eò quod potu indigeant, dicta putat Marcus Varro. In genere autem vocantur poma fructus omnes, qui ex arboribus sui humano apti sunt; sic Cato Prænestinas quoque nuces poma vocat; & Martialis pini nuces poma appellat: quod sanè si licentia quadam poetica concedendum foret, nisi Plinius, Varro, Columella, & quotquot de re hortenſi scripserunt, eadem licentiâ usi fuissent. Propriè autem poma nominantur, fructus omnes teneriore mollioreque velamine seu corio recti; ut nuces quæ duriores. Ficus porro, ut reliqui omnes fugaces fructus, prani succi sunt; habent tamen aliis minus: sunt autem varia ficum genera, ut auctor est Plinius. Nam sunt quæ grandiores & insipidiore sunt, satuas ob id Martialis vocat; quæ Marisca dicta sunt. & Chia reliquis delicatioris sunt: Aphrica à provincia sic dicta, quod Romanis delenda Carthagini occasionem præbuerunt. Sunt præterea quæ Coctana dicuntur: sunt etiam ficus carica; quæ quum optimè exiccantur, omnes ficus siccitas caricas appellare suenimus. Cæterum quantum ad naturam earum attinet, malum, ut dixi, succum generant; alium citant, vim habent abstergendæ atque catharticæ, plus aliis ponis nutriunt, carnem tamen non compactam neque firmam generant, ceu panis, & suilla, sed sublaçam, & submanem, ut fabæ: præferuntur immaturis, quas grossos nominant, maturas; hæ enim nihil ferè obſunt. Antecibum sumpta ventrem irritant; sed nisi celerius ventrem pertransiant, non bonum sanguinem gignunt: quapropter si ad satietatem usque edantur, scabiem & pruritum & pediculos excitant. Post ficus inter fugaces fructus (quos ἀπείρους vocant) sequuntur vna: quemadmodum enim minus quam ille nutriunt, ita minus malum succum generant; maximumque idipſis inest incommodi (ut auctor est Galenus De alimentorum facultatibus) quod velociter subsidant: quocirca si quando haſerint, graniter ledunt, neque



neque enim verentia bellè concoquuntur, & dum in venas ac iecur distribuuntur, succum crudum generant, qui non facile in probum sanguinem convertitur: nam acinorum substantia, composita est ex ipsarum velut carne, & humore qui per carnem est dispersus, ex quo fit vinum; præterea ex seminibus, & membranofo tegumento, quod omnia hæc extrinsecus circumdabit. Caterùm seminum quidem substantia quodammodo sicca est, & astringens, omniaque intestina pervadit, nihil quod sensu deprehendi queat à se mutata. Tegumentum quoque in stomacho exiguum recipit alterationem: quo fit ut quidam ipsum & omne quod intus habent suxerint, una cum seminibus expuant: quæ & ipsa nonnulli conantur expnere, potissimū quum acini grandiores fuerint, nam in exilibus id factū difficile est. Est autem inter vnas, sicut inter ficus, quoque non parva differentia: alia siquidem dulces sunt, alia acida, alia austera, alia rursum quæ nullam vehementem habent qualitatem; vocantque hæc vinosas. Igitur, quæ dulces sunt, succum habent calidiorem, atque ob id sunt sitibunda; austera verò & acida frigidiora; vinosæ verò inter calidum & frigidum medium obtinens. Omnium certè usus si moderatè sumatur, tutissimus est, quum natura fuerint carnosæ atque maturæ. Innocentiores sunt, ut auctor est Dioscorides, quæ decepta diu pendere, pensiles dictæ, idè quòd in eis copia humoris exsiccat; vilesque sunt stomacho ægrisque quibus cibi aviditatem excitant, capiti que prorsus nihil laudunt, quod aliis ferè omnibus commune est, si immoderatius edantur. Sub hiscitur verò possemus quotquot sunt durioris tegumenti fructus intelligere: in quo albo sunt, castanea, pistacia, amygdala, pinaeque. firmissimi inter omnes alimenti: sed strictius de iuglandibus tantum, (quas persicas, basilicasque seu regias vocant,) & auellanas (quas Ponticas, & Prænestinas nominant) intelligemus; multum siquidem harum ambarum usus est; alimentumque corpori præbent exiguum, copiosius tamen Pontica vocata quàm Regia nux, quod nimirum ipsius substantia

compactior sit & coactior, minusque oleosa: Regia verò laxior, continetque ipsa in se plus pinguedinis: coquitur tamen nux hæc facilius quàm pontica, stomachoque gravior est, idque multo magis quando una cum caricis manditur. In genere verò recentes nuxes stomacho minus nocent, vapore quæ suavior, atque à frigidis ventriculis facillimè concoquuntur, à calidis verò in bilem magis convertuntur. Palmarum quoque quas *Φαινισβαλαροδες* vocant, variæ multaque sunt differentiae: alia siquidem magis, alia minus humida sunt, atque alia dulces, alia sicca & astringentes: quotquot autem sunt, difficiles sunt concocti, atque capiti dolorem inferunt: nam succus qui ab ipsis in corpus distribuitur, crassus omnino est, ac lentioris quiddam particeps habet, quo fit ut celerrimè hepar lienemque obstruant. Porro eæ quæ dulces sunt, succum habent calidiorem; astringentes frigidiora; ac rursum dulces magis nutriunt, acerbescens profunt stomacho, ventremque compefcunt. Pomorum autem, ut reliquorum omnium fructuum, magna quoque est differentia, non in generibus solum, sed in eadem etiam specie, quam ex saporibus distinguemus, atque ex his (Galeno quarto Simplicium auctore) facultates ipsas diindicabimus; siquidem quæ acerbescunt, frigidum habent & terrestrem succum, nempe crassum; quæ autem acida, frigidum, sed tenuium parium. Dulcia calidiora indicantur: *μύζα* (ab Arabibus corrupto vocabulo muza; nos acidodulcia vocare possumus, ut dulcedinis & aciditatis alicuius participia) mediū quodammodo sunt temperamenti. Omnia autem quotquot sunt, excrementitium aliquem, aquerimque, hoc est qualitatē omnis experitē magis quàm probum succum generant: adeo rectè dictum est Omnia mala, mala. Caterum an Celsus succosa frigidis rectè opposuerit, nondum satis assignor, nisi quæ dulcia sunt, eadem proinde & succosa & calida esse dixerimus, ac proinde frigidis contraria: verum facilis admodum fuerit lapsus pro frigidis, frigida scribere; quare expuncto digamma *Æolico*, rigida substituerem; eā enim



et tunc quoniam non solum frigiditas, sed & diuicia deuotetur, recte succosis pomis rigida opponitur.

### Itemque ex his auibus.

MIRVM nemini uideri debet, quod in eodem genere (valentissime dico & meliocriter nutrientium) aues quae pedibus sedant, quam quae volatu magis nitantur valentiores sint; & rursum inter has ipsas eo firmiores esse, quo fuerint maiores: est praeterea notum, omne animal domesticum agresti esse valentioris nutrimenti; nam haec ingi quadam & perpetua aruum agitatione, ac totius corporis motu, quicquid est excrementitium exiunt; illa contra delicata & ociosa vita, ut adipis multum accumulans, ita excrementitium multumque succum plurimum coacervans. Eadem ratio est cur aues quae continuo perpetueque volatu huc illuc feruntur, (ceteris paribus dico) minus nutrantur iis quae pedibus nituntur: in his enim pedes tantum atque musculi eos dirigentes exercentur; in illis contra non solum pedes atque ipsorum musculi, sed tota quantalacunque est corporis compago laborat: nam dum volatu quoquoersum feruntur, aliae corporis particulae continuo motu agitantur, aliae contra dum maximo labore contrahuntur, immobiles persistunt, idque ne aut aeris motu aut ventorum procellis ab instituto itinere perturbentur; siquidem non secus ac nautis in aquore clauo regitur, ita iis particulis, quas tamen minime laborare putes, ancilla ad optatum finem dirigunt.

### Atque ex quoque quae in aqua degunt.

NISI hic subterfugium aliquod queramus, ac ea quae in aqua degunt inter se comparemus; distinguamusque ita, ut alia natandi scientia praedita, alia minus dicamus, nescio quomodo Celsum hic ab errore vindicabimus: nemini namque dubium est, aeris volucros, palustres, lacustres, aut aquatilibus esse lenioris tum cibi, tum nutrimenti: nam quomodo aliquis ab improba malique succi victus ratione bonum succum aut nu-

trimentum expectare audeat? quis à pisciculis, iis potissimum, qui & lentoris plurimum habent, & solide carnis quam minimum, laudatum sanguinem gigni affirmet? quis deinceps ex pituitoso quodammodo sanguine, solidam compactamque carnem desideret? & rursum, quis ex laxa distractaque carne bonum & firmum se consequitur alimentum existimet? qualis certe earum auium caro est, quae in stagnis palustribusque locis & aqua victum querant. Verum quum aliae vastissima interdum flumina, lacusque natantes dum praedam venantur oberrant; aliae rursum natandi peritiam à natura nondum edoctae, in ripis fluminum aut stagnis si casu aliquo praeda quamquam sese offerat, desides oculis tantum quaquaversum circumactis expectant, comparatione quadam inter has facta, lenioris nutrimenti esse dixit, quae natandi scientia praeditae sint, quod videlicet nunquam desides atque ociosae sint: sed siue in aquis victum querant, siue per aëra volent, maximo conatu corpus moueant atque exerceant; nam illic dum aduerso flumine pergunt, pedibus pectorisque magnis nisibus cum rapidis vorticibus certant, ac dum in vastum flumen praeda causa seipsas demergunt, omnes quotquot sunt lacertos ad opus accingunt: hic contra dum expansis alis aërem ferunt, eas quae in aquis quiescere videbantur particulas plurimum & mouent & exercent; unde & magnam excrementiij humoris partem exiunt, & lenius nutrimentum corpori exhibent.

### Inter domesticas verò quadrupedes.

PER suillam carnem, eam hoc loco intelligere videtur auctor noster, quae veteris victimae aratem non exceperit, vel nondum assenta sit, hoc est quae prorsus media sit aratis; hac enim optima est & ad gula illecebras & corporis alimoniam & optimi censetur succi. hinc Plinius libro VIII. cap. LI. Animam, inquit, sui pro sale datam non illepide existimabant. Adde quod quum porcellorum carnes damnet Hippocrates, media tamen



hæc tamen ætatis summè commendat : is si-  
quidẽ libro De ratione viſtus in morbis acu-  
tis ait, *Χολεγο δὲ πικρὴν, οὐδὲν ἔστι ἀνό-  
τερον ἢ περὶ αὐτῆς, ἡ δὲ αὐτῆς δὲ αὐτῆς, καὶ ἐκ-  
ταρακτικὰ, ὅτι δὲ βέλποτε τῶν κρεῖων  
ἀπάντων. κρεῖων δὲ, τὰ μὲν ἰσχυρῶς  
πίσινα, μὲν λιπαρὰ, μὲν ἡλικίῃ φέροντα  
ἰσχυρῶς παλαιῶν :* hoc est, ut verit loannes  
Vassens : Porcelli verò carnes prava sunt,  
quum fuerint crudiores, aut ambuste; nempe  
inim cholerae sunt & turbatoria : Suilla  
autem carnum omnium optima sunt : sed  
prestant etiam ex his, quæ non admodum  
pingues sunt, neque tennes, neque veteris  
victima ætatem habent. Galenus etiam li-  
bro septimo methodi Therapeutica ex morbo  
convalescentibus quum ad sanitatis statum  
propè iam ventum est, suillos pedes in ptis-  
ana elixos dat, ac post ipsum etiam immum  
crus, atque ab hoc reliquas partes : Primum  
quidem, inquit, innensis porcelli, qui si hiems  
sit, etiam die inguletur, nam hesternum  
quàm recens necatum facilius concoquitur.  
Levisimas igitur vocat suillas carnes, quod  
& citissime in corpore nostro alterentur,  
atque in bonum nobisque familiarem succum  
transmutentur : si etenim ea nos potissimum  
oblectent, quæ suavi quadam dulcedine pa-  
larum afficiunt, suilla certè natura nostra  
maximè congrua censenda erit, ut quæ cum  
carne humana analoga quodammodo sit; au-  
tor siquidem est Galenus, Roma quondam  
à canponibus carnem humanam cum aroma-  
tibus in pastillis coctâ, publice diuenditam,  
ac diu sine ullo olfactus aut gustus discrimi-  
mine pro suillis ab omentibus estimatas. Neque  
obstat quod idem Galenus libro tertio De ali-  
mentorum facultatibus dixerit, quod omnium  
ciborum suum caro potentissimè nutriat : eni-  
us rei certissimum ab athletis argumentum  
sumit, qui si paribus exercitationibus parem  
molem alterius cibi pridie totum diem come-  
derint, postero die se sentient redditos imbe-  
cilliores; quod si pluribus deinceps diebus id  
fecerint, non imbecilliores modò, verum pe-  
nuria alimenti macilentiores conspiciuntur.  
Nam etsi plurimum nutrant, præterquam  
quod ocysimè corporis nostri substantia aspi-

ciuntur, probum etiam succum gignunt,  
contrà quàm faciant bubula; quæ etsi minus  
nutriant, totius tamen substantia sua crassi-  
tie suillans superant, ac sanguinem quàm  
conueniat crassiorem generant. Sunt ta-  
men ex suum carnibus hominibus quidam  
ætate florentibus, fortibus, & qui sese mul-  
tùm exercent suum ætate florantium ad con-  
coquendum carnes præstantiores; aliis verò  
adhuc incrementum.

### Itemque ex feris quo maius, &c.

IN genere certè quo animal quodque  
maius est, eo valentiori cibum suppeditat;  
sunt tamen, quæ quum parua sint, ea  
à quibus duplo corporis mole superentur,  
succu bonitate & nutrimenti quantitate  
vincant. Cernina enim caro, ut leporinis  
non omnino dissimilis, ita ab his vincitur,  
quod succum & probiorem generent, & fa-  
cilius concoquantur, ac proinde generosius  
alimentum corpori subministrant.

### Pisciumque eorum qui ex media.

PISCIVM quotquot sunt differentia, aut  
à magnitudine seu quantitate, aut à sub-  
stantia, aut à loco sumuntur : à magnitu-  
dine quidem, nam cetacea omnia ingentia-  
que pelagi monstra duram, concoctum diffici-  
lem & crassi succi habere carnem constat;  
quare ut moderatiora efficiantur, sale con-  
dimus. A substantia, alij siquidem molles,  
*μαλακὰ* Græci vocant; alij dura carnis  
sunt; alij testa integuntur, *ὀρεχόδεμα*  
dicunt; alij rursum hac ambiuntur qui-  
dem, sed tantum tenuiore quodam ceu in-  
crustamento velantur; ac rursum alij cartila-  
ginei sunt, *σκληρὰ* nominant; & in sum-  
ma sunt qui quum neque dura omnino, ne-  
que molles exactè carnis sint, friabiles appel-  
lantur. A loco autem, ut si pelagi, saxa-  
tilis, palustris, lacustris, fluminis : nam in-  
ter hos omnes, quod ad succi bonitatem  
attinet, saxatiles, pelagicique (voco autem  
pelagicos qui in mare profundum secedunt)  
palmam obtinent. Ceterum quod ad eos



pisces qui in media materia sunt attinet, gravissimi sunt ex quibus salsamenta quoque fieri possunt; reddunt enim, ut dictum est, carnes sale moderatiores, & probioris succi, suntque eius generis lacerti; eos statim ordine sequuntur, qui quum dura carnis sint, difficiles quoque concoctui existant: in quo albo corni seu coracini numerantur. Vocat autem lacertum (ut auctor est Paulus Iovius eo quem de piscibus Romanis conscripsit libro) quem Græci *κορακίνος*. Plinius tamen libro XXXIII. capite ultimo varia esse lacertorum genera tradidit. Ceterum lacerti, quos scorteros esse diximus, oblongi & exiles sunt, sulphureoque colore conspiciunt, præsertim quum in aquis vagantur, verèque potissimum pinguescunt; ij quum durioris carnis sint, boni quoque succi sunt, sed difficile secernuntur ac digeruntur, quare salsamento substantia crassities quodammodo atteritur, & ad excretionem promptiores redduntur. Aurate autem & scari inter pelagios pisces summè commendabantur, adeoque inter se similes sunt, ut vix discerni possint: ex auratis verò quum toto passim mari gignantur, Tarentinam præstulerunt antiqui, eamque potissimum qua Lucrinis stagnis illata concharum esu pinguesceret: nani, ut Martialis,

Non omnis laudem preciumque aurata meretur,  
Sed cui solus erit concha Lucrina  
cibus.

Capiuntur rarè astate, hieme autem frequentissimè. Scæros Ennius Iovis cerebrum appellare solebat, quòd inter perrosos pelagiosque primas obtinerent. Cornuos autem & coracinos contra Volaterranum eosdem esse existimat Iovius: Nam cornus, inquit, gibberosus est, & proportionè cæterorum admodum latus videtur; ut accidit coracini, quos Parmenio Rhodius, qui de re coquina scripsit (ut allegat Athenæus) *πλατσαππος* à latitudine corporis appellavit. Oculatam Plinius inter lacertorum genera annoveravit, atque à melanuro semingii: Iovius oculatam cum melanuro idem esse affirmat, sicq; vocatam ab oculi magni-

tudine. Lutorum autem carnes à Galeno in ratione valetudinis, mirificè commendantur, quòd sanguinem subtiliorem, boniq; succi gignant. verum quis fuerit piscis lupus, & virum is quem lupi nomine passim appellamus, in fluminibus, paludibus, stagnisque ac fossis delitescens, admodum dubito; siquidem Galenus inquit: In aquis dulcibus natum hunc piscem non vidimus, sed è mari in flumina aut stagna ascendisse conspeximus; & quamvis pelagius sit, stagna tamen maritima non fugit. Multi quoque seu trigle, pelagicis piscibus annoverantur, celebranturque olim adedò apud homines, tanquam voluptate reliquos cibos superarent, ut sepius argenti puri pondere à privatis etiam civibus, quum pedis longitudinem superarent, emercentur. Omnium serè aliorum pelagicorum carnem habent durissimam, & valdè friabilem: unde neque lentoris alicuius, neque pinguedinis particeps est; nutritque, si probe confectus fuerit, omnibus aliis piscibus copiosius. Atque hæc hætenus de pelagicis, qui sævè ut crassioris substantia sunt saxatilibus, (voco autem saxatiles seu perrosos, qui in perrosos promontorii, & ubi saxa sunt delitescunt parinunque) ita etiam plus nutriunt, quanquam hi probiorem tenuioremq; sanguinem generent.

### Neque verò in generibus rerum.

NON solum rerum genera aut species ciborum discrimina evariant, sed & sexus; alterius enim aries, alterius vernex; & rursum alterius succi nutrimentiq; omnis: eadem ratio est de taurinis, bubulis, vaccinisque carnibus; nam castrata omnia melioris succi sunt, & probius nutriunt. Sexum statim sequitur ætas; nam hæc varietatem quandam & discrimen admittit: etenim quadrupedia quæ iuniora sunt & adhuc lactantur, ut humidiora sunt, ita discutiantur facilius, ac proinde minus nutriunt. Medio loco se habent mediæ ætatis, quod ad succi bonitatem attinet; at quod ad alimoniam spectat, cæteris intensius nutriunt. Senum autem carnes pessima sunt, tum ad concoquendum,



quendum, tum ad bonum succum generandum, tum ad nutriendum. Etatem habitum sequitur, probioris enim succi, validiorisque cibi est bene habitum, quam macilentum ac strigosum; ac rursum sanum, quam morbidum; nigrum, quam album, nigricantia enim albicantibus robustiora sunt & iocundioris saporis. Cohortales porro pulli quo teneriores sunt, eo quoque lenioris materia: dicuntur autem cohortales aues quae intra cohortem villaticam continentur, quales potissimum sunt gallina, ex eo dicta (ut auctor est *May. Varro*) quod circa eum locum pecus coërceatur.

### Deinde ex eodem fove vngulae.

Hic locus flagitat ut breuiter de omnium terrestrium extremis visceribusque sermonem instituamus: extrema autem voco rostrum, pedes, aures; haec & parum carnis habent, & quum perpetuo motu exercerentur, viscosiora sunt & nervosiora: quo fit ut quum ob viscositatem alio facilius secedant, minus quoque nutrimentum corpori administrent; quare rectè in media materia auctor noster constituit. Inter vngulas autem seu pedes summe commendantur suilli. Rostrum ordine sequitur pedes; atque hoc rursum aures, haec siquidè sola cute & cartilagine constant, quare & lenioris nutrimenti, & difficiliore concoctu sunt: nam cartilago in perfectis quidem animalibus confici omnino non potest, in his verò quae adhuc augeantur, si in ore bene lenigata, & in stomacho probè confecta fuerint, paucum alimentum corpori dabit. Cerebrum autem reliquis omnibus pituitosius est alimentum, crassi ac improbi succi, ac tardi transitus, difficile concoctu, inutile stomacho, nauseamque concilians. Huic proximè accedit osium medulla: quae quantumvis durior suaviorque sit, nausea tamen cruditate generat; si tamen probè concoquatur, nutrit ex sententia. Agnorum autem, haedorumque petiolis (ita enim vocamus paruos pedes) cum toto capite lenis admodum sunt nutrimenti, sed boni familiarisque quodammodo succi.

Glandulosa autem omnes partes, si probè conficiantur, non minus quam carnes alunt: hoc enim commune habent, quod tenera, ac suaves edentibus appareant; sed mammarum praecipue, quum lac habuerint, dulciores habentur. si non concoquantur, excrementitium crudumque succum gignunt. Ex harum quoque numero sunt testes, qui propter virositatem quandam quae ipsis inest concoctioni resistunt, & vitiosos generant humores. Renes autem quod mali succi sint, vel hinc liquet, quod in gustu urinae qualitatem quampiam pra se ferant. Hos ordine sequitur iecur: quod ut crassi succi est, ita concoctu difficile, ac aegrè digeritur. huic, quod ad substantia qualitatem attinet, quamproximè accedit cor: lien verò ut melancholici humoris receptaculum est, ita si estur, eundem in corporibus gignit ac adanget; ac proinde iecinori aequè ac lieni incommodat. Pulmo quidem reliquis facilius concoquitur, minus tamen nutrit, ac succum pituitosiorum gignit.

### Ex aubus colla alaeque.

Hic meminisse oportet, quod antè dictum est, non parua esse differentiam earum animarum quae in stagnis, aut palustribus locis degunt, ad eas quae per montes ac siccos locos victum quaritant: etenim iuxta locorum proportionem carnes animalium aut siccae aut superfluitatibus carentes, & concoctu faciles; aut contrà humide excrementitiaeque, ac concoctioni repugnantes redduntur. Alae igitur in inuenibus ac pinguius volucris optima sunt, ac boni succi, & facile concoquantur: nam ingi motu si quid habent excrementitij exunt, suntque imbecillae materiae, ut neruea omnia.

### Quod ad solum verò pertinet.

PRISCI qui de agricultura scripserunt, tria terrarum genera definiuerunt, canipestre videlicet, collinum, & montanum, collemque clementem, ac mollior ascendente qui orientali, aut meridionali plaga aduersus esset, landabant, quiq; lenibus quibusdam



rimulis irrigaretur; hic enim, ceteris paribus, firmius meliusque frumentū producit, quam aut campus aut mons. Neque hic in terminis habendum est; nemini siquidem dubium est, campestre frumentum, quod in pingui, bene subacta dulcique terra creverit, valentius esse collino, quod aspero, macro, frigidoque solo natum sit.

### Leuior piscis inter faxa edirus.

HIC oliver admonendus mihi lector est, quam icinerē medicastri nonnulli cum vulgo pelagicorum piscium (inter quos saxatiles merito annuntiantur; vocamus enim, ut dixi, saxatiles pisces qui vti petra, ac litiora saxosa sunt degunt) vsum agrotantibus potius interdixerint, quam flumiatilium; quod videlicet granioris materiae & cibi firmioris, succique improlioris esse existimarent. Quod sane quam à veritate dissentiat, argumento erunt mugiles, anguilla lupique, qui quum ex alto mari in vicinū aliquod flumen aut stagnum feruntur, statim à genuina illa succi bonitate degenerant: nam (ut post Galenum auctor est Aetius, Paulus & quotquot de re medica classici scriptores erant) optima caro piscium est in puro mari degentium, magisque ubi locus is ventorum procellis agitur, & neque terrea neque leuia littora aquam ambiant, sed arenosa aut aspera aut lapidea. si vero ad aquilonares quoque ventos loci conuersi fuerint, multo melius est: manifestum est enim mare mari praestare in eo quod aliud perfectè tranquillum est, *ἡμυροβάτης* Græci vocant; aliud magnos fluctus excipit: siquidem tanto deterior piscium eorū caro redditur, quanto fluctibus minis agitur; mediūq; quodammodo locum inter pelagicos marinosque pisces, & flumiatiles obtinet. ad id magnum discrimen est, inter pelagicos flumiatilesque pisces, ut non solum succi bonitate cum illis comparari non mereantur, sed multis numeris ab illis superentur; & quod ad succi probitatem attinet, tertij tantum ordinis censentur. Adde quod in flumiatilibus quoque non paruum discrimen sit; siquidem optimi cen-

sentur qui in iis fluminibus gignuntur, ubi aqua & copiosa est & rapide fluit; hos sequuntur qui in leni fluminis tractu pascuntur; hisq; peiores sunt, qui in stagnantibus aquis degunt; habent enim carnem concoctū difficilem, & bonum alimentum quam paucissimum. Proinde non solum aquarum discrimina pisces bonitate succi aut commendant, aut eiusdem improbitate reprobant, sed & penes alimenta quoque peiores melioresve redduntur: siquidem quibusdam, ut docet Galenus, herbarum, aut bonarum radicum copia suppetit, ijge eam ob causam reliquis sunt praestantiores, alij contra herbis pascuntur limosis, & radicibus mali succi: praeterea sunt qui in fluminum ostiis magnam aliquam praeterfluentium urbem quae sterquilinia, aut balineas, aut culinas, & vestium ac linteorum sordes expurgant, victitant; qui ut pessimo victu viuunt, ita pessimi, atque inter reliquos deterrimi sunt. In genere autem neque lacustres, neque palustres, neque stagnales pisces laudem aliquam aut ob succi bonitatem, aut ob nutrimenti copiam merentur.

### Omne etiam ferum animal.

GALENVS De alimentorum facultatibus tertio, Domestica, inquit, animalia temperie humidiora sunt quam agrestia, tum ob aeris in quo degunt humiditatem, tum vero etiam ob vitæ ignaniam: nam quae in montibus degunt, multum exercentur ac fatigantur; praeterea in aëre sicciore viuunt, quapropter earum caro est durior, nulliusque prorsus pinguedinis, aut paucissime, participes; quae causa est cur pluribus diebus quam domesticorum & ociose viuentium animalium seruetur impuris. Liqueat item quod alimentum quod ab iis provenit, minus habet excrementi, sicut excrementitium est quod à domesticis atque ociosis sumitur: necesse igitur est alimentum huiusmodi nutrire valentius, quam alterum, succūque genere multo meliorem. Hucusque Galenus ferorum animalium & domesticorum discrimen enarravit, totamq; hanc periodon breuiter



breviter explicavit; nam aëris seu calidi humiditatem, multum ad temperiem humidam conferre dixit; atque hanc rursum pinguedinis quodammodo causam esse. quare quod & ea quæ domestica & solo humido nata, & pingua sunt, feris, hoc est his quæ in montibus degunt animalibus, & quæ siccò celo pascuntur, & quæ natura non morbo aut alimenti penuria, macra sunt, valentioris nutrimenti sint, liquet: ac proinde quum ea tantum sale condiamus, quæ & excrementitia sint, & corporis mole excedant (sal namque si quid in corpore est humidum, quodammodo absorbit, & quod reliquum est substantiæ solide contrahit, ac proinde conditura sua carnes servat, atque à putredine tueri) rectè salsa insulsis ac recentibus minus nutrire dicimus, quanquam nonnunquam si recenter salita sint, probiorum succum gignant recentibus: cuius rei argumentum præbent ceræea omnia, sues bouesque præpingues; redduntur siquidem, ut dictum est, salis conditura carnes moderatiores. Caterum quod noniter mactatæ carnes (ita enim proprias sermonis efflagitat ut intelligamus) vetustis plus alimenti præstent, vel hinc constat, quod hæc exsucca; illæ contrà succi plene: quare non secus ac pingua mactis, recentia vetustis intensius validiusque nutriunt.

### Tum res eadem magis alit.

ESCVLENTA alia elixa, alia assa melius & edi possunt, & nutriunt; quæ enim humidiora natura sunt, ampliorem humectationem non desiderant; quare & exiccationem requirunt, quam assatura aut fritura facillimè consequuntur. Elixæ enim omnia humidiora mollioræque redduntur; quæ ratione facilius conficiuntur & valentius nutriunt. Assa similiter frictis magis alunt: igneo namque calore quicquid est humoris, quicquid superest succi quodammodo exigitur. Quanquam non negem Aristotelem Problematum sectione prima, assas carnes elixis humidiores prædicare, quod videlicet calore ignis densata cute obstipatisque poris dum exitus viam nullam inne-

nunt, humores intro resiliunt, ac proinde succulentiorē carnem reddunt. quod sanè quàm sit rationi consonum (quanquam analogia ad eos qui nudo corpore in sole obambulant nitatur præbere) cuius satis notum arbitror: nam eodem libro sectione vigesima palam elixatione carnes humiliores mollioresque reddi affirmat.

### Ouum durum valentissimæ materiæ.

OVA res habent penes se differentias: aut enim penes propriam substantiam; gallinarum enim aut phasianorum meliora sunt: aut penes tempus, recentia scilicet ne sint aut vetera; recentia namque meliora sunt, atque adeo optima eorum est operatio: aut penes cocturæ rationem modumque decoquendi; nam quædam diutius decocta fuerunt, alia ad mediocrem usque consistentiam, alia etiam dumtaxat excocta: atque hinc quum summam varietatem, vel ad succi probitatem, vel ad nutrimenti qualitatem consequantur, Celsus duabus prioribus differentiis omisus, hæc sola contentus fuit, clarius existimans quàm ut explanatione egeat, phasianorum, gallinarumque ova ceteris præstare. Igitur ea quæ fortibilia sunt ova (ut auctor est Simeon Sethi) vix calida parantur, facile pertranscunt, & gutturi leniunt aspredinem, quod humor in eis nondum incrassatus concreverit; nutriunt autem reliquis minus. proxima his sunt tremula, vel mollia ad modicam consistentiam cocta; ad nutriendum omnium sunt præstantissima: nam facilius concoquuntur, & digeruntur, bonosque humores procreant. Quæ verò ad spissitudinem usque cocta sunt (quæ Græci vocant) ad concoquendum sunt difficilia, tardique transitus, crassiusque alimentum corpori tribunt. At maius adhuc eorum onus est vitium, quæ subitus calidum cinerem assantur; hæc enim reliquis antedictis peioris sunt succi, & tardiùs descendunt: adde quod ἐμπύρεμα quoddam sapiant. quo fit ut non possim satis mirari obstetricum nostrarum vulgus, quæ tamquam optimi succi cibo, ex parvis decumbentes his solis

f

ennutrire



ennutrire consueverunt; atque adeo eas etiam quæ febris correpta sunt, quo alienius nihil exhiberi potest, propter inaptos, ut dicitur, qualitatem, & succi ipsius improbitatem, ut interim difficultatem concoctionis omittam. Non negaverim tamen quin nonnunquam citra noxam administrari possint: ut si restringendum sit, aut fluxus aliquis inhibendus; ut si puerperij purgamenta immodicè fluant, aut si alvus per se fluxa nimis sit. verum satius esset ad arcendam succi improbitatem, & adustionis qualitatem, eadem horis duabus in acvi aceto macerata madefactis stupis, aut linteis lineis inmoluere, & deinde cineribus obnere. Est porro præter hoc aliud coctura genus, quo in sartagine ova friguuntur, *τρύγανισα* vocant, quæ pessimum habent omnibus modis alimentum: nam interim dum concoquuntur, in nidorem vertuntur, ac præterquam quod succum crassum gignunt, ipsum etiam prævum gignunt atque excrementitium. At quæ *πικρά*, hoc est suffocata appellantur, elixis & asis sunt meliora, Paranturque, inquit Galenus, ad hunc modum: Vbi ipsa oleo, & garo, & paucis vini aspersa fuerint, vas quo continentur cacabo aquam calidam habenti inditur: deinde ubi ipsum totum superne obturaverint, ignem substruunt, quoad ova mediocrem habuerint consistentiam: quæ enim supra modum sunt crassa, elixis & asis sunt similia; quæ vero ad mediocrem crassitatem pervenerint, & melius quam dura concoquuntur, & alimentum corpori dant præstantius.

### Cumque panificia omnia.

PISTORIA omnia seu panificia (eo etenim nomine cereales omnes fruges complectimur) valentissima materia esse ante demonstratum est. verum quum sub eadem specie varia nonnunquam discrimina reperiantur, in his etiam non parva differentia est: alia siquidem aliis intensius minusve nutriunt; nam robur tritici speciem, inter reliqua cerealibus valentissima materia designimus, & ex tritico firmissimam siliqum. Ea autem frumenti genera ex quibus

elotis aut puliculas aut sorbitiunculas parare solent, media aut aliqui imbecillissima materia annumerantur: cuius farina sunt alica, oryza, pisanum; in genere quoque quotquot sunt frumentacea quæ elota sunt, infirmioris sunt alimenti illotis, nam quicquid habent lentoris, quicquid habent crassitie, ablutione exiunt. Per alicam autem, frugem intelligit, ex tritici genere; quæ, ut auctor est Galenus, nisi lota sit, valenter nutrit, succumque crassum habet. ceterum sine ea quæ Græcis *χρόνη*, an ea quæ *ἀλίζ* dicitur, doctissime disputat Rembertus Dodo-næus medicus Mechliniensis: quare si quis huius & aliarum pulicularum & sorbitiuncularum, quarum hic Celsus meminisse videtur, facultates atque naturam scire desiderat, eum consulat. Oryza autem sine elota sit, sine illota, alica minus nutrit, difficilisque conficitur. Per pisanam autem hordei granum decorticatum intelligit, quod nimirum ex hoc (potissimum apud Græcos) pisanum conficitur: nam alioqui etiam (nisi oryza meminisset) ad oryzam, & ad alias omnes fruges purgatas & a corticibus suis mundatas (nam pisanum *ἀπὸ τοῦ πριόρου*, hoc est à purgando, dicta est) aquæ transferri posset: siquidem Plinius libro XVIII. Italici, inquit, oryza maxime gaudet; ex qua pisanam conficiunt, quam reliqui mortales ex hordeo. Galenus quoque ex tritico eandem fieri affirmat: quæ vii ex firmiori fit materia, ita ea quæ ex hordeo conficitur intensius nutrit. Atque hæc hætenus de elotis frugibus, sorbitiunculisque ex iisdem factis. verum qui panis abluendi modum excogitarunt, ut ait Galenus, minoris sanè alimenti cibum, sed qui ab obstructionis nota absit, quoad licet longissime, inuenerunt; siquidem panis hic succum habet minimè crassum & lentum, ut qui ex terrestri aëri sit factus: nam eius leuitas apparet tum per stativam, tum quod in aqua non submergatur, sed suboris instar supernat.

### Ex potionibus vero.

VARIA ex hordeo triticoque, vini penuria, potionum genera excogitarunt homines; ita



nes; ita ut quot sunt septentrionem versus provinciarum nomina, totidem sint potionum discrimina: quas omnes uno eodemque vocabulo patrio nomine birias; aut à cerealibus frugibus cereuicias nominant. Antiquitas zythi, conrumique & polenta (quam ἄλφιτα Græci dicunt) meminit: nam, ut Dioscorides, ex hordeo potus fit cui zytho nomen est. huius usum apud Ægyptios Dionysium primum inuenisse tradunt: qua de causa apud poetas Pelusianus potus nominatur. Suidas autem zythum hordeaceum vinum nominat, quod vicem natini vini gerat: alij βρύτοιον seu βρύτιον vocare maluerunt; Aristoteles autem, ut auctor est Athenæus, πύρον appellat: verum quomodounque appellare lubuerit, idem esse zythum cū nostra cereuicia contenderim; qua quanto plus tritici aut hordei admittit, eo valentius nutrit: varias namque facultates sortitur pro decoctionis differentia; alij etenim hordei auenæq; quam minimum, triticique quamplurimum induunt; alij rursus tritici nihil, secalis, hordei aut auenæ quam plurimum: sunt alij rursus qui resinis quibusdam utantur; alij hormino satino eiusque semine; alij deinceps agresti myrto decoctionem præparant; atque omnes quotquot sunt lupo salutaris tanquam condimento quopiam, ne ante tempus ace scat, condiunt.

### itemque lac, mulsum, defrutum, passum.

LAC, ut docet Galenus De alimentorum facultatibus tercio, inter cibos qui ab animalibus sumuntur, est numerandum: in quo haud parua pro anni temporibus est differentia, & adhuc maior pro ipsorum animalium specie atque habitu, atque ex ipsis pascuis. Nam quantum natura inter se distat vacca, equa, & ouis, ceteraque quotquot sunt animalia; tantum & lac ipsorum inter se differt: siquidem bubulum lac crassissimum est ac pinguisimum, ac proinde valentius reliquis nutrit. tenninus, liquidius, ac pinguedinis minimè particeps est camelorum. mox equarum sequitur; deinde asinarum: media autem consistentia est capra-

rum; hoc crassius est ouium: suillum autem omnium crassissimum est, ut neque coagulo opus sit ad coagulandum, & serum modicum habeat, & in coctura celerrimè coëat, unde in ventriculo leuissima de causa nauseam mouet. Ab habitu quidem: nam melius lac præbet sanum, quam morbidum animans; nigricans quam albicans; nam in totum in brutis nigriora sunt robustiora; alba verò imbecilliora; nam & carnes nigrorum animalium magis sapida ac delicatioris sunt, quam alborum. Secundum anni tempora: nam verum, & post partum est liquidissimum; temporis verò progressu, magis ac magis incrassescit, ita ut media æstate ipsum in medio sue naturæ consistat, quare & cum concoctu facilius, & suauioris est odoris; post id deinceps tempus sensim crassescit, donec in totum deficiat. Sed & neque ex his tantum lactis discrimina petenda sunt, verum etiam à pabulo quo vescitur animal: alias siquidem aliam herbam depascuntur animalia. sic siquando contingat (ut docet Galenus libro De sanitate tuenda) ea lactucas marinas esitasse, lac quoque vim catharticam sortietur. sic Hippocrates sexto Epidemion, Si puero alius non satis respondet, inber ut mulier aut capra elaterium, aut cucumim siluestrem comedant; ita enim puerulis facilem subsequuntur purgationem: nam & si astringitione opus sit, exhibitis ante pabulis qua astringunt, & austera, acertaque nonnihil sunt, lactis ipsius naturam præparare solent. Præterea virides herbe, & iuxta aquas nascentes liquidius modicumque lac suggerent; qua verò duriores sunt ac montana, optimè se habent ad lactis tum boni, tum copiosi generationem. In genere tamen lac omne boni succi est & multi nutrimenti: præsertim si animalium sit in vigore consistentium; id enim reliquis melius, nam inuenum liquidius, serum scitius est. Intensius autem nutrit, si cum aliquo crassioris succi edulio diutius coquantur, statuostratèque deponet. atque hac habetenus; de mulso, defruto, passo in sequentibus disturi.

f 2

vinum



vinum aut dulce aut  
vehemens.

EVARIANT vina penes solum, substantiam, colorem, saporem, etatem & odorem: Secundum solum; nam aliud collinum, aliud campestre, montanumque aliud. Penes substantiam: aliud siquidem tenuium est parium, aliud crassarum. Penes colorem: ut si rubrum, subrubrum, nigricans, fulvum, albidum sit. Penes saporem: aliud namque dulce, aliud acre, anserinum & astringens aliud est. At secundum eam quæ in odore est qualitatem: alia siquidem boni odoris existunt, alia contra ingrati odoris sunt, ac fermentem quandam ac insuam nacta sunt qualitatem; alia rursum nullum omnino odorem habent, sed aqua instar inodora sunt. Secundum etates autem differunt: nam aliud recens est, aliud magna vetustatis, aliudq; medio quodam loco inter hæc situm est. Verum non est presentis institui singulas vinorum differentias enumerare, atque eas ad amissim excutere; sed eas tantum quæ ex nutriendi facultate sumuntur. Igitur quod ea quæ crassa sunt tenuibus intensius nutrant, præter experientiam, ex ipsorum quoque natura clarum sit. hoc tamen variant discrimine quædã alia magis, alia minus pro crassitudinis portione id efficiant: nam quæ crassa admodum sunt, ut tardius conficiuntur, ita si robustum ventriculum nacta sunt, atque perfecte concoquantur, reliquis copiosius alimentum subministrant. Atque ea quæ moderate crassa sunt & rubra, optime nutrire dicimus, ut quæ minima egeant mutatione, ut in sanguinem mutantur; quo fit ut ei generando sint accommodatissima. His proximè accedunt, quæ nigra, crassa dulciâque sunt, atque ea quæ colore quidem nigra sunt, & rubra; consistentiâ autem crassa cum astringendi facultate. His minus alunt, quæ alba simul sunt & crassa & acerbâ: uti omnium minimè, quæ & colore alba sunt, & consistentiâ tenui. Ceterum quæcumque dulcia sunt, ea quoque substantiâ crassa sunt, ac facultate calida; (nam, ut Galenus de simplicium medicamen-

torum facultatibus, dulcis sapor à caliditate, quæ non immoderata & vehemens sit, generatur) anseri, quæ facilius & distribuntur in ventriculo & conficiuntur. Vehementia autem vocat, quæ Hippocrates & Galenus potentia ac vinosa appellant: ea colore quidem fulva aut flava, consistentiâ vero, sicuti dulcia, crassa sunt: hæc principem ad sanitatis conservationem locum obtinent, si moderate sumantur; nam calorem innatum augent, ventriculum roborant, atque quæ concoctionem adiuvant, facile etiam concoquuntur, aliâque ducende non omnino aliena; in hoc solum vituperanda, quod caput virtute sua calida repleant atque offendant. Mustum deinceps quomodo, valentissimi generis alimentis ascriptis, vehementer miror; notum siquidem est mustum omne & crassum esse & stansilentum & concoctum difficile, atque id bonitatis duntaxat habere, quod ventrem subducit; cuius successu si frustreretur, maiorem noxam corpori asferre: nam facillimè in stomacho acecit, & diutissime in ventriculo aquæ instar suspensum manebit, ac calorem innatum suffocabit, & concoctioni resistet. Contra quæ magna vetustatis sunt vina, eò inter valenter nutrientia numerant, quod eadem consistentiâ crassa quoque sunt; siquidem nulla tenuia (quæ *ἀλυσόφρα* vocant) vetustatem ferre possunt: sunt tamen in regimine sanitatis non ab omni noxa libera; nam si immodicè bibantur, ut ait Dioscorides, nervos reliquosque sensus ledunt, quare cavendum iis qui intestina alicuius partis imbecillitatem sentiunt, monet; si tamen in secunda valetudine diluantur aqua; noxam aliqua ex parte exuere tradit. Solent autem vetera vocare vina, quæ septuennium transgressa essent; necdum siquidem vinorum etas, eodem teste, septimo anno desinitur.

## At acetum, &amp; id vinum.

QUEMADMODUM varia sunt vinorum discrimina, ita aceti plurima reperiuntur differentie: omnes tamen quæquor sunt, parum admodum corpori subministrant alimentum, quare an rectè medicæ materis attribueris,



tribuerit, dubito: nam praterquam quod parum nutriat, crassos ac lentos humores etiam incidit: unde rectius imbecillissimis annumerandum putarim. nam, quod ad nutriendi facultatem attinet, nescio an recte vino (quod quum paucorum annorum sit, leue quoque vel austerum est) comparari possit: siquidem quantumcumque omnia, qualia randa sunt, recentia vina parum nutrire dixerimus, plus tamen aceto cuiuscumque generis alent. Vocat autem paucorum annorum vinum, quod septimum, ut diximus, annum nondum attigit.

### Idcoque infirmis nunquam generis.

VINUM leue, quod ἀλγύφον quoque vocari dixi, quod paucorum quoque annorum sit, agrotis rectissime administratur; ut quod parum nutrit, & citissime per uniuersum corpus distribuitur ac per urinas fertur, caputque ac nervos quam minimè tentat. Verum an idem in austero experiri liceat, delibendum censeo; siquidem quantumvis parum nutriat, ac per uritides in vesicam oryssimè delabatur, citra tamen noxam aliquam id non praestabit; nam caput leuissima de causa dolore tentat, & quam citissime temulentiam gignit.

### Aqua omnium imbecillissima est.

QUANQVAM generatim omnes aquarum differentia concoctu sint difficiles, tardique transitus, ac nullum vel paruum admodum corpori nutrimentum exhibeant; intenditur tamen firmiusque redditur earum alimentum, si frumento commisceatur, quemadmodum in xylho ceremisiaque fieri ante demonstravi; idque eo validius, quo frumentum firmius meliusque fuerit.

### firmior ex eo vino quod bono solo.

QUEMADMODVM ad frumenti bonitatem non parum conducit soli qualitas (nam collinum reliquis praestare dictum est) ita ad vini naturam immutata non parum fe-

cerit celi temperies & soli qualitas; siquidem quod temperato caelo, ac lato bonoque solo, & annibus quibusdam irriguo natum sit, eo quod frigido lenique solo, & caelo ad alienius intemperiei excessum declinante prouenerit, firmius multo ac ad usus humanos magis accommodum reddetur.

### Mulsum quod plus mellis habet.

MVLST, quod δινόμενον vocant, vires (quod ad nutriendi facultatem attinet) non solum intenduntur, pro mellis copia, sed & eiusdem qualitate, & vini ex quo fit, etate & consistentia. Si ex probi mellis metreta una (quale est, Galeno libro De sanitate tuenda auctore, id quod odorum flauisimae praeterea acerrimum dulcissimamque fuerit, tum erasitudine nec planè crassa nec liquida, sed quae continentiam suam tneatur, ut si digitum in id demiseris, post in sublimè tollas, quod mellis ab eo desinit, longissima quasi lineà continuatum videas) quam id quod ab improbi mellis (cuius modi id est quod multam egerit spumam) sesquimetreta vinique metretis duabus praeparetur. Ac rursus intensius nutriet mulsum, si ex cocto despumatoque melle confiat, quam si ex crudo. Adeo multa hic consideranda sunt: nam & vinum ipsum si antiquum sit, & fulvum & consistentia crassum, vim quodammodo intendit; ubi villum tenue & paucorum annorum, eandem imminuet. Praeparabant autem antiqui variis modis ano-meli: nam Dioscorides id summe commendabat, quod ex duabus vini veteris metretis, mellisque una pararetur, Palladius contra musti optimi, post dies xx, quam ex lacu leuatum fuerit, quaterum voluerimus sumendum praecipit; ac deinceps mellis optimi non despumati (prius tamen fortiter triti dum albescat) quintam tantum partem admiscet. Quae sanè confectio ut mellis minus recipit, ita debilius nutrimentum subministrat. Atque haec de simplici mulso: nam ex medicatis herbis, aut aromatibus praeparatur; quod podagricis, nephriticis, arthriticis senibusque vtilissime. subministrari affirmat Galenus



libro sanitatis tuenda quinto: quod ut medicamentosum magis quam vescum est, ita ad hunc locum parum pertinere arbitror.

### Defrutum quo magis incoctum est.

DEFRUTUM à defruendo dictum est: solebant autem id variis modis preparare, variæque pro decoctionis modo nomina inde: siquidem aut sapani, aut caranum, aut defrutum nominare consueverunt. Mulsimum igitur aut mustum ubi fortiter despumauerit, atque ad spissitudinem effectum est, defrutum; Caranum quum tertia deperdita duæ partes remanserunt; sapani, ubi ad tertias partes redactum descenderit, vocabant. Celsus solo defruti nomine contentus, eo plus nutrire dicit, quo plus inferunt: nam decoctione firmitus crassiusque redditur; qua ratione sapani carano defrutum; proprie dicto intensius nutrire dicemus.

### passum quo ex sicciore uua est.

PASSUM hoc modo conficitur: leguntur uuae passæ quamplurimæ, & in siccellis clausæ iunctis factis aliquatenus rariore contextu virgis primo fortiter verberantur; deinde ubi unarum corpus vis contusionis exsoluerit, cochlea supposita spora comprimuntur: hinc passum est quicquid effluerit; ac proinde quemadmodum de uuis quoque, defruto, ac mulsio dictum est, quanto fuerit crassius, tanto validius euadet, cuiusmodi ex ficcoribus potius quam humidioribus uuis exprimeretur.

### Aqua leuissima pluuialis est.

AQUARVM differentia variæ sunt: nam præter eas quas hic enumerat Celsus, enantiant non raro propter spiritus; ut si Boreas, Ausler, Famonius, Eurus, aut alius quispian collateralis ventus spirauerit. Penes tempus anni etiam discrimen admittunt: ut penes regionem; ut si ex montibus, aut acclini planiorve loco fluant, ac rursum secundum orbis plagam quâ feruntur; ut si se-

ptemtrionem, meridiem, occidentem aut orientem versus labantur. In genere tamen aqua eo commendatior est, teste Hippocrate, quo fuerit lenior: qualis ceri è erit, si citò calefiat & frigefiat. Galenus lenitatem non vult estimari pondere, sicuti facit Celsus, sed quod ventrem citò permeet, atque quam minimè grauet; qualis inter reliquas pluuiæ potissimum est: hæc enim & tenuissima & leuissima est, sine pondus, sine & rariarum species: nam quum sol educat, & rapiat quod est subtilissimum, non ab aquis dulcibus tantum, sed & à cadaveribus & aliis corporibus unde pluuiam generari tradunt philosophi, consequens est vapores corporibus unde exhalantur, esse tum & rariarum, tum leniores. & rariarum autem Celsus subintellexit, quum dicit quoque celerius ex ea legumina percoquuntur. Pluuiatili quamproximè accedit fontana, præsertim si ex præruptis rupibus per meam quendam, aut terram putam, orientem versus prorumpat, qua ut grauior & crassior consistentia est fluuiatili, ita quod ad bonitatem attinet, ordine posterior: præter solam Nili aquam, quæ prærogatiua quadam reliquas aquas quoquoersum ferantur, antecellit: nam & parum accelerare traditur, & urinae cienda, ac ventri subducendo accommodatissimam ferunt, corpusque concinnum ac vegetum reddit. Postponunt autem fluuiatili scaturiginosam sine putealem vocare malis; nam & grauis terræque est, & frigida; redditur tamen probior si continuò exhaletur, ac si fluat. lacustres ac palustres omnes quum stataria sint ac canosæ, præterquam quod difficile secedant, ac graues corpori sint, etiã facillimè putrescunt; unde terrum quendam odorem spirant.

### Ferè verò sequitur, ut quo valentior.

FIRMO robustoque ac exercitationibus assueti, alimenta firma ac consistentia crassa conueniunt: ea enim ut promptè alterabit, ita ex his quam maximum nutrimentum consequuntur: quod ex aliis, qua aliqui



quum boni succi sint, facile tamen tum alterentur, tum tenuium partium sint, ne sperare quidem liceat: nam hac non modò non concoquet, sed in alienum quendam humorem transmutabit; adedò diligenter in hoc studendum est, ut quibusvis congruam & consuetam victus rationem præscribamus. Nam ea ferè quæ multum nutrim, ut crassarium sunt partium, atque excrementitia, si

non probè consiciantur, ita si bene alterentur atque concoquantur, optimè plurimùmque alimentum subministrabunt. quare neque morbo extenuatis, neque his qui ex natura debilitate stomachi laborant; aut generatim desidem ociosamque vitam degentibus præscribemus: sed qui & viribus polleant, & stomacho valeant, & vehementius corpus exercent, sicuti de athletis dictum est.

## CAPVT XIX.

*Quæ natura ac proprietas cuiusque rei sit,  
qua vescimur.*

**N**EQVE hæc sola discrimina sunt, sed etiam aliæ res boni succi, aliæ mali sunt, quas *δύρα*, \*vel *κακόδύρα* Græci vocant. Aliæ lenes, aliæ acres, aliæ crassiores pituitam in nobis faciunt, aliæ tenuiorem, aliæ idoneæ sunt stomacho, aliæ alienæ sunt. Itemque aliæ inflant, aliæ ab hoc absunt, aliæ calefaciunt, aliæ refrigerant, aliæ facile in stomacho acescunt, aliæ non facile intus corrumpuntur, aliæ mouent aluum, aliæ supprimunt, aliæ citant vrinam, aliæ tardant. Quædam somnum mouent, quædam sensus excitant. Quæ omnia idedò noscenda sunt, quoniam aliud aliter, vel corpori, vel valetudini conuenit.

## ENARRATIO.

**G**ENERATIM quæ supersunt cibi ac potus discrimina, enarrat: neque enim tantummodo multum aut parum nutrientia sunt. Sed alia probum etiam succum gignunt, alia improbum sanguinem & vitiosis humoribus repletum generant; alia attenuant, alia densant, alia inflant, alia inflationem amouent, alia rursum citam aluum reddunt, alia tardi transitus sunt, ac fluentem aluum compescunt; atque ita deinceps. Sed neque simplicis alicuius facultatis particula tantum sunt singula, sed nonnulla sibi

innicem contrarias ac pugnautes non raro insitas habent; quemadmodum trasicam simul & lenire aluum, atque iam immoderatius fluentem sistere dicimus. Plurima etiam varias, non tamen contrarias, facultates habent: nam sunt quæ simul & probum sanguinem generent, & incidant, & status discutiant, citique transitus sint, quemadmodum in subsequentiis latius explicabimus. quæ omnia idedò cognoscenda sunt, quoniam aliud aliter, vel corpori, vel valetudini conuenit.

## CAPVT



## CAPVT XX.

*Quæ res boni succi sint.*\* verna  
lact.\* ventricu-  
liq̃ue.

**B**ONI succi sunt, triticum, filigo, alica, oryza, amyllum. Item & lenes sunt & stomacho aptæ & calefaciunt, tragum, ptisana, lac, caseus mollis, omnis venatio, omnes aues, quæ ex media materia sunt. Ex maioribus quoque hæ, quas suprà nominauimus. Medij inter teneros durosq̃ue pisces, vt mullus & lupus, \* verna, lactuca, vrtica, malua, cucuinis, cucurbita, ouum forbile, portulaca, cochleæ, palmulæ. Ex pomis quodcunque neque acerbum neque acidum est. Vinum dulce vel lene, passum, defrutum, oleæ quæ ex his duobus in alterutro seruatæ sunt, vuluæ, rostra, \* trunculiq̃ue. In summa omnis pinguis caro, omnis glutinosa, omne iecur.

## ENARRATIO.

**Q**UÆ boni succi sunt, Græci indifferenter *εὐχρημα* & *εὐχρηλα* vocare consueverunt: sunt autem eiusmodi, quæ sanguinem purum, hoc est enim qui neque consistentiā crassus sit admodum, neque tenuis nimium seu serosus, & in summa, quæ nullius extraneæ qualitatis particeps sit, ita vt nec cholericus, neque atrabilarius, nec pituitosus aliqua sui parte existat. At quæ huiusmodi succum gignunt, varia admodum sunt: nam alia firma sunt, alia imbecillæ; ac rursus alia media inter hæc, quæ lenia vocant. Inter firma triticū, filiginem, oryzam, alicam, amyllumque numerat: sed au citra exceptionem omnia hæc boni succi sint, indagare opus cenſeo; siquidē sunt quæ quum neque exquisitè improbi aut boni succi sint, inter media rectè collocaveris, qualis est oryza, alica, amyllum: nam quum glutinosos humores crassioresq̃ue pituitam gignant, vt non omnino malum succum procreant, ita inter ea quæ extra omnem calumnie aleam posita sunt, non numeraueris, sicuti etiam oleracea omnia: nam quan-

tumius inter reliqua omnia lactuca succi bonitate commendetur, Psellus tamen inter *εὐχρημα* constituere vult: Nam olerum, inquit, nullum omnino est boni succi: medioris est lactuca, & cicorium, & buglossa; inde malua, inde chrysolachnum, & portulaca, & blitum, & lapathum. Lactuca non omnino dissimilis est cucurbitæ: nam si coquatur, concoctū facilis est, & boni succi, sitimque sedat, & calidus & siccis temperaturis admodum prodest. Crudam autem esitasse omnino noxiū est, nam præterquam quod improbi succi causa esset, variis etiam symptomatibus locum daret.

## lac.

LONGE optimi succi est, vt auctor est Psellus, lac recens omnium serè animalium, quod confestim bibatur, quum primum multum fuerit. id sanè sumendum est ante cibum omnem, & potum, nec quicquam aliud cum ipso manducandum, antequam concoquatur & digeratur: nam si quid vel parum modò ei misceatur, ipsum corrumpi-



tur, & quod cū eo assumptum est. Praestat igitur matutino tēpore id libere statim mulctum, nec interea comesse quicquam, clementer inambulando. primum igitur alui citat, deinde impensissimē nutrit, nec ultra excernit, sed sistit alui. Casus autem, quod ad succi bonitatem attinet, lacte multo inferior est: nam Galenus omnes, quales tandem fuerint, caecos mali succi esse dixit; vereres etiam improbi: quo tamen fuerint recentiores, ac minorem ab injecto coagulo acrimoniam receperint, eo coquentur facilius, & distribuentur, & meliorem succum producent.

### omnis venatio.

VENATIONEM hic ita intelligemus, ut domestica animalia à sylvestribus distinguamus: siquidem ferorum, quam cucurum carnes succi sunt melioris: nam alioqui si in genere omnem venationem inter boni succi alimenta referamus, nescio an citra calumniam id facere possimus: nam leporinas ceruināsque, & alias id genus carnes, idq; potissimum si completam aetatem consequuta sint, inter improbi succi edulia (quod crassiorē sanguinem generent) rectē collocandū; si tamen teneriores adhuc sint, atque in- crescant, magnam poxam exerit.

### omnes aues quæ.

INTER reliquas optimi succi sunt gallinarum, phasianorum, anagenarum, perdicumque carnes: has sequuntur turdi, merulaeque iuvenes, passerēs, montanae aniculae: palustres omnes & aquaticae volucres, quas in media materia posuit, excrementitia magis sunt quam boni succi.

### Medij inter teneros durosque.

MEDIOS inter teneros durosque pisces vocat, qui leniores atque friabiles sunt; quales saxatiles existunt. nam paulo antè piscinum discrimina ita distinxit, ut alij teneri, alij duri, alij leniores essent; sub lenioribus (viri etiam hic) mulos & lupos vernas complectens. Vernas autem lupos eos vocat, qui

verē nati essent: quemadmodum vernas vocare solent seruos proprios ex ancillis verno tempore genitos.

### cucumis, cucurbita.

NVSQVAM hac elogio cucurim celebrari audio, quo hic Celsus: nam, quantumvis substantia minus humida quam pepones, idcoque non tam faciliē quam illos corrumpi dixerit Galenus; non tamen, ut innoxios, inter boni alimenti cibos numerat. Simeon Sethi anguria qua cucumeres & tetranguria vocari dicit, ob frigidum & humidum temperamentū noxia & mali succi esse dicit, pituitāque glutinosam in ventriculo gignere, qua cruda per venas diffundantur. Non negauerim tamen, quemadmodum antè quoque de cucurbitis dictum est, si coquantur, ac pipere, thymbra aut tragorigano condiantur, minorē tum noxam conciliare, tum probioris succi reddi. Quamquam crediderim magis à quopiam qui rerum naturam non satis exploratam habuerit, inserias hoc loco cucumes: Nam verisimile est Celsum dum hac scriberet, adeo vecordem atque sui immemorem non fuisse, ut easdem res boni & mali succi definiret: siquidem subsequente capite cucumes quoque inter cacochyta numerauit. Adeo multis locis sciolorum quorundam inscitia defraudatus, ac corruptus est, ut dum non raro sibi ipsi pugnantia dicere videatur, atque iis conciliandis nequiquam operam impendas, frequenter integras periodos immutare, interdum etiam subsistitq; obelisco notare atque succidere cogaris. Atque id cur in Celfo nostro vniuersissimo auctore acciderit, non est quod mireris: praesertim quum Galenus ipse queratur, bibliopolas, ut merces suas profluerent, atque quæstum vberiore facerent, priscis auctoribus multa asseruisse, quæ ne somniasent quidem illi. Quod sanè ut in hoc nostro auctore, hoc praesertim libro, multorum errorum occasionem dare potuit; ita crediderim Gottorum ac Vandalorum barbaram colluuiem multū nani ac mendis eundem conspersisse, dum omnem manduciem, omnem ornatum, omnem humanitatem,



tem, omnes denique liberales artes atque disciplinas, unâ cum antiquo Reip. statu evertunt atque erunt. unde factum est ut summa in scholis vigeret barbaries, philosophia reperiatur, matheses exularent, res medica Cimmeris, quod ainit, tenebris obnoveretur: siquidem dum politiores literas negligimus, dum relictis veris fontibus unde disciplina haurienda essent, rivulorum scaturigines querimus, Arabum scriptis contenti in barbarici cano delitescimus, ac nihil nisi quod meram barbariem speret resonetque admittimus. Hinc mille in re medica errorum labyrinthi: hinc laceri defædatique in medium prodeunt classici scriptores: hinc multis partibus mutilus antiquissimus medicus Romanus Scribonius Largus: hinc Celsus quoque noster multis modis laniatus, sauctus, senticosus, ac vixdum sibi constans in lucem prodit. Sed hæc latius quam exigebat præsens negotiū, ut facilius nobis ignosceret candidus lector, sicubi non per omnia Celso subscribamus, eiusque sententiam immutemus; si modò immutare sit, pro falsis ac subreptis, vera ac germana reddere.

#### ouum forbile.

POST lac, cui principem locum inter boni succi alimenta tribuimus, summe commendantur oua tremula forbili quoque, imprimisque gallinarum ac phasianorum lutea; hæc enim reliquis intensius nutriunt, & concoquuntur facilius, sanguinemque laudatiorem gignunt.

#### cochleæ.

COCHLEÆ aded in deliciis habita sunt, ut earum vinaria in Tarquinensi paulo ante civile bellum instituerit Fulvius Lupinus. sunt autem genere duplexes: aquatiles videlicet & terrestres; suntq; , ut reliqua omnia & ex ædignis, dura carnis: quare vilia stomacho, nec facile corrumpi auctor noster asserit: Paulus tamen Ægineta negat; Nam omnibus crustatis, inquit, succus inest alio subducenda idoneus, eoque etiam terrestribus cochleis: ac quum duram carnem concoctam difficilem valentis materia &

succis vitiosam fortiantur; nonnulli ius ipsorum cum oleo & garo conditum, ad alimur subducendam adhibent.

#### palmulæ.

SVCCVM crassum gignunt, quare iecini nori lienique obstruendo accommodissima sunt.

#### Ex pomis quodcunque.

HVIVSCEMODI poma μέλα, aut acidolucia vocari dixi; ea enim diu servari possunt, & antequam marcescant, exsiccantur. verum an hæc boni succi sint, videndum est: nam Galenus omnes fructus quos arbores ferunt, demptis castaneis, mali succi esse dicit; quæ si in ventriculo conficiantur, efficaciter nutriunt, atque crassi quidem, nunquam tamen mali succi sunt.

#### Vinum dulce vel lene.

DVLICIBVS æquè ac suaveolentibus natura gaudet & delectatur: quare ea amplectitur, atque quàm ocysime, si quando offerantur, in benignum succum transmutat, nisi crassitie sua meatus infarciant, ac viscera obstruant: nam dulcia omnia ut crassi succi sunt, ita leuissima de causa obstruiones pariunt.

#### oleæ.

OLEÆ ὀλκωβέδεις stomachum roborant ac appetentiam excitant, parum nutriunt, pinguedinisque quamvis minimam habent: si tamen defruto, passo, aut alio quopiam simili condiantur, efficacius & nutriunt, & succum probiorem reddent.

#### vulvæ.

EIVSDEM planè qualitatibus sunt ventriculi, vulvæ, intestina: nam hæc, ut Galenus, duriori quàm caro constant substantia; quodque ea duriora sunt, eo quàm caro ipsa ad nutriendum minus efficacia sunt: quare rectius hæc & sequentia omnia proximo capiti adunxeris.

#### trunculioue.

SVSPICATVR hæc mendum esse vir doctissimus Ioannes Casarius, ac pro trunculis



culis & ventriculis substinendum, idq; auctoritate Pselli ductus, qui inter ea quæ crudos humores generant, ventres, intestina, vulvas numerat. non tamen negat, esse doctissimi quendam virum qui priorem lectionem non improbet, qui trunculos edulij genus esse dicat, quod frustulati concisis carnibus constet; qualia sunt toties ab Apitio descripta mineralia.

In summa omnis pinguis.

ANIMANTIA omnia potissimum quæ primum aerem inspirant, & exercitiis corpus

fatigant, si neque macie strigosa, neque adiposa, sed bene habita sint & carnosa (ita enim pinguem carnem intelligit Celsus) optime nutriunt, & laudatissimum sanguinem gignunt; idq; eo magis si incrementum adhuc animalium carnes sint; nam seniorum, quales quales tandem sint, pessimi succi sunt.

glutinosa.

GLUTINOSA omnia non tam probum succum, quam crassam pituitam genere autè dictum est.

## CAPUT XXI.

*Quæ res mali succi sint.*

**M**ALI verò succi sunt milium, panicum, ordeum, legumina, caro domestica permacra, omnisque caro salsa, omne fassamentum, garum, vetus caseus, cicer, radícula, rapa, napi, bulbi, brassica, magisque etiam cyma eius, asparagus, beta, cucumis, porrum, eruca, nasturtium, thymum, nepeta, satureia, hyssopum, ruta, anethum, fœniculum, cuminum, anisum, lapathum, sinapi, & allium, cepa, lienes, renes, intestina, pomum quodcunque acidum vel acerbum est, acetum, omnia acria, acida, acerba, oleum, pisces quoque saxatiles, omnesque qui ex tenerrimo genere sunt, aut hi qui rursus nimium duri, virosique sunt, ut ferè quos stagna, lacus, limosive riui ferunt, quive in nimiam magnitudinem excefferunt.

## ENARRATIO.

**M**ALI succi cibos κακοχόλους & κακοχόμους vocant. ab iis, quavis concoquantur, omnibus iis qui sanitati invidentem, cavendum moneo: latenter enim, ut docet Aëtius, diuturniore tempore vitiosus humor in venis ex ipsis congregatur, qui levisima putrefactionis occasione accepta, malignas febres gignit. Est autem vitiosus humor non unum simplexque genus: alius

namque pituitosus, alius cholericus, alius melancholicus, ac rursus alius ex hisce commixtis constat.

milium, panicum.

PANICVM, ut milij similitudine prosit, ita, quod ad faciliates seu energias pertinet, parum admodum ab eo differt: siquidem utrumque alio compescenda idoneum



est; utrunque quum parum nuriat, difficile concoquitur; atque quum praavidum quoque sit ac cineris instar friabile, nulliusque lentoris pinguedinisque particeps, improbum succum accumulat. Cedit tamen in omnibus, quod ad succi bonitatem attinet, paniculi milio, quum esu insuavis sit, ac coctum difficile. Ceterum hordeum, cui summus dotes attribuit Hippocrates, praesertim si probe coctum fuerit, nescio quomodo inter huius ordinis cibos numeraverit: nam Galenus tenuem, ac nonnihil deterforium succum in nobis gignere, qua ratione alio ciende idoneum sit, auctor est. Quare si cui hic libeat parva dictionum metathesi pro hordeo, orobum substituere, non aberrabit.

### legumina.

QVOD legumina, cuiuscunque generis sint, cacochyla sint, argumento erunt faba & pisa: quae quantumvis succi bonitate reliquis praefertantur, crassum ac flatulentum quendam succum in nobis gignant; unde corporis habitum neque compacta densaque carne implent, ut suilla, sed quodammodo fungosiore ac laxiore, sentiuntque, qui iis astidue utuntur, in toto corpore velut tensionem quampiam à spiritu flatulento.

### caro domestica.

NON solum, ut dixi, permacra domestica caro, mali est succi; sed quantumvis bene habita, si sylvestribus comparetur: nam melioris succi esse demonstrant carnes animalium quae liberum, purum tenuemque aërem inspirent, atque avidiore utantur nutrimento, atque in totum quae in agris vitam agunt, probeque exercitantur, quales sylvestrium sunt. Quare non ab re distinctione quapiam permacras, à domesticis sive innoxeris: sunt enim non secus ac permacrae, domestica omnes (sola suilla excepta) mali succi; nam inter carnes primo ordine vituperantur onile, non caprina, arietinaeque deinceps.

### omnisque caro falsa.

SALE quicquid est humoris, quicquid

est lentoris, quodammodo exigitur atque exiccatur: quare ante quoque dictum est, omnes beluas marinas, quae natura excrementitia admodum sunt, atque quae in genere valentissimè nutrientium numerantur, rectissimè sale condiri. Quum igitur sal omnes exhaustiat humiditates atque dissipet, non mirum est salsamentum omne, atque omnes quae salem diu passe sunt carnes, improbi succi reddi. Non negaverim tamen esse, quae si octo aut novem plus minus dies sale excipiantur condianturque, probioris omnino succi futuras, dum quicquid est immodici lentoris salsugine exigitur atque extenuatur, & quicquid excrementitij est salsamento eximitur, cuius potissimum generis sunt onille, bubula suillaque carnes.

### cicer, radícula.

SATIS erat dixisse omnia legumina esse improbi succi: nam cicera, cicercula, dolychi sub leguminum quoque genere comprehenduntur: nisi quis cicerum ideò speciatim fecisse mentionem dicat, quod quemadmodum urbanis insuetus sit cibus (solo enim insculo eorundem vescuntur) tum ad ducendum lotium, tum ad comminuendos lapides; ita si iidem vesci contingat, mali praereliquis esse succi: nam sicut aliis intensius nutriunt, ita excrementitia admodum sunt, & difficulter concoquantur; idque eo magis si testa, assa, frictaque fuerint.

### rapa.

RADICES stirpium oleosarum mali succi sunt, quaecunque acres, ut bulbi, cepa, porri, allia, raphani & dauci; exunt tamen omnem malitiam bulbi admodum cocti, cepa, allia, porra, ampeloprasa bis ternesfacta malum deponunt humorem. Raporum autem, naporum, atque dauci radices, ut non plane bone sunt, ita non penitus vituperande, potissimum si bene coquantur; nam medio quodammodo loco inter res boni & mali succi collocantur.

### brassica.

BRASSICAE omnes mali & melancholici succi



lici succi sunt participes, amittuntq; plurimum noxae, atque vitij, si cum præpingui carne coquantur: præferuntur autem æstiva hybernis. Cymas eandem, quanquam sint stomacho utiliores, idè damnant, quod prætor succi malitiam, acrimoniam quoque maiorem sortita sint: nam paulo post omnia acrida, acida, acerbæque ut mali succi vituperat.

beta, cucumis.

EX oleribus nullum omnino boni succi est; extreme autem mali sunt olera quacunque sylvestria: cuius generis sunt agrestes lactuca, lapathum, picris, & similia. De cucumeribus autè satis dictum est: nam non solum hi, sed & omnes subcanculares fructus, ut improbi succi vituperantur, solis cucurbitis exceptis, quas medio loco inter boni & mali succi res statuant.

lienes, renes.

NON solum lienes, renes atque intestina mali succi sunt, sed & omnia interanea, ut est cerebrum, spinalis medulla, testèque perfectiorum animalium omnium, exceptis gallinacis; reliqui enim virum quoddam plent.

pomum quodcunque.

HIS addere licet factis omnes arborum; præterea poma quæ præcedenti capite enarravimus, ficisque ac uvas; quæ quoque si immoderatus sumantur, ut obstructionem parient, ita non citra noxam eduntur. Pessima autem sunt omnia immatura: his accedunt fugaces horarive fructus, persica videlicet, corna, mora ac cerasa.

oleum.

OLEVM quod ex maturis olivis exprimitur, dulcissimum est calidumque ac humidum moderatè, ac proinde ad succi bonitatem accommodatissimum: sed quod ex imma-

turis olivis (quod omotribes, aut amphacite nominant) quantum austeritatis participes est, tantum & refrigerat, & constipat, & noxiorum humorum causa efficitur. Fit tamen immoderatum illud calidius & acius, ac quantum quidem à dulcedine recentis olei declinat, tantum quoque ad succi pravitatem accedit; omotribes contra vetustate dulcescit, ac sensim vires dulcis imbuir.

pisces quoque saxatiles.

DIC amabo, amice lector, si quisquam hic Celsus (si modò Celsus ita pronuntiatus reliquit) subscribere audeat: nam quis saxatiles pisces qui optimum laudatissimumque sanguinem gignunt, atque citissime in ventriculo consiciuntur, ut improbi succi reiiciat? quis rursum, teneritudinem alimentorum summè commendatam incuset? Nam si saxatiles tenerosque pisces, quod facile in probum succum convertantur, atque id si minus consequantur, damnaris; eadem quoque lege, & ratione, ova sorbilia, lac recens mulctum, phasides, perdices, capones reieceris. quare pro saxatilibus, fluviatilibus aut stagnatilibus legero: & pro tenerissimo, valentissimo. nam ceracea omnia, & quæ in valentissimo genere consistit, mali succi sunt. Sic scorpios, dracones, xygenas, aliæque marina monstra, propter succi malitiam reiicimus: sic quoque putidos, virosos, limosos, durosque, quales stagna producunt, in sanitatis conservatione non admittimus. Neque enim terrere nos debet, quod paulo post reiterat, quos stagna lacusque, limosive riui ferunt, quæ in nimiam magnitudinem excefferunt. hic siquidem auctor noster claficos scriptores imitatus videtur, qui quoties quid diligentius hominum mentibus impressum cupiunt, eandem rem variis tropis diversisque dictionibus efferunt.



## CAPVT XXII.

*Quæ res lenes, quæve acres sint.*

Petiolis, id  
est, parvis  
pediculis: à  
Catone pec-  
decini, in  
de re rustic.  
appellati.

**L**ENES autem sunt, sorbitiones, pulticula, laganum, amy-  
lum, prifana, pinguis caro, & quæcunque glutinosa est.  
Quod ferè quidem in omni, quæ domestica sit, præcipuè ta-  
men in vngulis, trunculisque suum, in petiolis, capitulisque  
hœdorum, & vitulorum, & agnorum, omnibusque cerebel-  
lis. Item si qui propriè bulbi nominantur, lac, defrutum, pas-  
sum, nuclei pinci. Acrida sunt omnia nimis austera, omnia  
acida, omnia salsa, & mel quidem, quo melius est, eo magis.  
Item allium, cepa, crucea, ruta, nasturtium, cucumis, beta,  
brassica, asparagus, sinapi, radícula, intubus, ocymum, lactu-  
ca, maximaque olerum pars.

## ENARRATIO.

**L**ENIA acris opponit, eò videlicet  
quòd quemadmodum hac pulmonē, tra-  
cheam arteriam atque interiora omnia ex-  
asperant atque mordicant; ita illa eadem  
demulcent, mitigant, leniunt atque lenigant.  
Sunt autem duplicia genere: sunt nanque  
ralia, aut penes substantiam, aut penes qua-  
litatem. secundum substantiam quidam sunt;  
ut si glutinosa, pinguis, viscida lentaque  
fuerint: penes qualitatem verò, si omnis ex-  
tranea qualitatis expertia fuerint: extraneas  
autem qualitates voco omnes quæ neque  
amarae, neque dulces, neque suaves omnino  
sunt: nam has, ut familiares, natura am-  
plectitur ac fouet; comperit enim est dul-  
cia omnia gutturis pulmonisque asperitati-  
bus leniendis accommoda esse.

## sorbitiones.

**S**ORBITIONES omnes quæ ex fari-  
na, aqua, lacte, hordeo, leguminibus fiunt  
(quales sunt eihnos, lecythum, prifana, pha-  
coprifana) pinguedine ac lentore quodam  
quem adiunctum habent, leniendi vi præ-

dita sunt. his non inferiores sunt placenta,  
lagana, rhyemata: quæ si fermenti ac casei,  
veteris præsertim, acrimonia destituantur,  
omnis mordicationis sensu carebunt, & ex-  
asperata lenient: nam aliqui si fermenti  
quippiam, caseiue veteris, aut aliud quid  
simile receperint, ut nihil lenient, ita mor-  
dicationis non omnino erunt exortia.

## pinguis caro.

**Q**UOD omnis domestica caro tū pinguior  
tū glutinosior sit sylvestri, antè dictum est;  
& quòd leniendi vi prædita sit, satis quoque  
explanatum est. Verum quid hic per trun-  
culos suum velit, admodum consideran-  
dum est: non enim, ut aliquando ex Ioan-  
nis Casarii in Celsi annotationibus suspi-  
catus sum, edulij genus erit quod frustularum  
concisis carnibus constet, minural vocat Api-  
cius; id enim nihil minus quàm leniet: nam  
dum frigitur, quicquid est lentoris, quicquid  
est pinguedinis, quicquid est humidi exiit;  
unde non immerito ut mali succi cap. XX.  
vituperamus. Quare aliud quippiam quod  
interfectis



interfectis animalibus deiruncetur intelligendum puto; cuiusmodi sunt pedes, aures, rostrum, myflax, & id genus alia. neque mirum alicui videri debet, quod hic suum ungulas à trunculis eorundem seiuixerit (id enim tam Celsò quàm Hippocrati & Gale-  
no peculiare admodum reperies) præsertim quod ungula suum reliquis quæ truncantur probioris longè succi sunt. Sicut tamen omnia quæ deiruncantur, ut etiam capita petiolique hedorum, agnorum, & vitulorum, si coquantur, lentoris cuiusdam participia sunt; cerebrum & spinalis medulla etiam humoris.

### Item si qui propriè bulbi.

BULBORVM plura sunt genera: differunt siquidem colore, magnitudine, & figura, & sapore. Nam Taurica Chersoneso dulces admodum, & omnis amaritudinis gustu privati nascuntur; reliqui amarorem quandam nanciscuntur. Inter omnes tamen bulbos, Megarenses potissimum commendantur. Verum quum bulbi omnes amarorem quandam participent, inter acria rectius eos collocaveris, quamvis lentorem quempiam coctura adipiscantur, ac magnam amaroris partem exuant.

### lac, defrutum.

HVC etiam rectissimè accommodaveris eorum lutea, cæteris efficacius exasperata

demulcentia: pinæ nux succi crassitie idem præstat.

### Acria sunt omnia nimis austera.

SI proprietatem sermonis perpendamus, austera non rectè acria dixerit: verum quomodo eadem acria appellet, ex præcedentibus clarum est; quare acerba quoque & asprigentia omnia his addere licet.

### cucumis.

NISI ambubaia, asparagorum lactucarumque nihil minus quàm acrium hic quoque mentionem faceret, locum hunc de anguino, aut sylvestri cucumi intelligerem. Verum quoniam verissimilius est Celsum de sativa locutum fuisse, cucumim, intubum, lactucam atque asparagos acie Acria insererem; itemque bulbos, cepis statim annecterem: atque hunc in modum lectionem variarem, transpositis aliquot distictionibus: omnibusque cerebellis: lac, defrutum, passum, nuclei pinei, cucumis, asparagus, intubus, lactuca. Acria sunt omnia nimis austera, omnia acida, omnia fælsa, & mel quidem, quo melius est, eo magis. Item allium, cepa, & si qui propriè bulbi nominantur; eruca, ruta, nasturtium, beta, brassica, sinapi, radícula, ocymum, maximaque oleum pars.

## CAPUT XXIII.

### Quæ res crassiores, quæve tenuiorem pituitam faciant.

CRASSIOREM autem pituitam faciunt, oua forbilia, calica, oryza, amyllum, ptisana, lac, bulbi, omniaque fere glutinosa. Extenuant eandem omnia fælsa, atque acria, & acida.

### ENARRA-



## ENARRATIO.

**M**AXIMA breuitate plurima hic complectitur auctor noster: nam sub crasso pituita, ea omnia subaudit, qua crassos humores generant: qualia sunt non solum qua phlegma, sed & qua melancholicum succum (qui inter reliquos crassitudine excellit) quaque abundantiam humorum faciunt, atque adeo qua poros & meatus grauiant atque obstruunt. Ac huiusmodi quidem sunt, itria omnia, triticum quo grauius ac spissius est, panis filigineus non fermentatus, nec probe subactus, omnes casei, lactaria omnia.

## oua forbilis.

RECTIVS frixa, dura, aut assa legeris: nam inter reliqua qua bonum succum gignere dixi, summe commendantur forbilis oua; dura contra tum crassi succi, tum valentis materia censentur. Quamquam, si excusationem Celso queramus, albumen ouorum forbilium ut difficiliter concoctum, crassiores pituitam; luteum, contra sanguinem consistentia optimum, atque succum probissimum gignere dicemus.

## alica, oryza.

SIMILA & alica, ut auctor est Oribasius, valde glutinosos gignunt humores in nervis, & canis locis membrorum: his quamquam non omnino simile, proxime tamen accedit amyllum. Præparata si cruda est, nec bene cocta, idem præstabit; recte tamen probeque præparata, omnis culpe vitiique expers est.

## lac.

NON quoduis lac huc referre licet, sed tantummodò quod feri modicum habeat, ac multum caseosa substantia; id siquidem crassitie sua iecinoris obstructioni erit accommodissimum, ac renes ledit, calculisque gerendis occasionem præbet.

## bulbi.

BULBI si crudi sunt, amarore suo crassos humores extenuant: quare ut sanus constet, de biscoctis intelligendus est Celsus. Nam v'sellus biscoctos bulbos in oleo, & garo cum aceto mansos, crudos humores generare auctor est. Sub bulbis autem non solum propriè dictos bulbos intelligemus, sed & alia quoque comprehendere licebit, si eadem industria atque arte præparentur.

## omniaque ferè glutinosa.

QUALIS est caro recens agnina, calvus porcinus, porculi, atque adeo omnes porcine carnes, si non exactè conficiantur, myrtax circa labra, auricula, lingua, & membra animalium glutinosa.

## Extenuant eandem.

QUÆ cunque & contactu linguae ipsam non astringunt neque contrahunt, velut astringentia solem, sed contrarium facere videntur, extergereque & eluere, salsa omnia dicuntur. Quæ verò absque caliditate mordent, acida vocantur: qua autem mordent, & cum valida caliditate erodunt, acia. Ceterum acida, ut docet Paulus, incidere, diuidere, attenuare, aperire & perpurpare citra calefactionem possunt. Acre autem similem quidem acidis effectum præstat extenuando, perpurgandoque, sed acidum refrigerando enariat, acre calefaciendo, salsum citra manifestam aliquam caliditatem & frigiditatem idem efficit: ac pari modo amarum meatus expurgat, abstergit, extenuat, inciditque crassos succos citra manifestum calorem. Porro qua extenuant, omnia tenuium sunt partium, ac eorum transitus velox est in sensibilibus partibus, suntque, quod ad odores attinet, odorata, ac aromatum quid spirantia, ut piper, casta lignea, cinamonum, thymbra, organum, tragoriganum, &c.

## CAPVT



## CAPVT XXIII.

*Quæ res stomacho idoneæ sint.*

**S**TOMACHO autem aptissima sunt, quæcunque austera sunt, etiam quæ acida sunt, quæque contacta sale modico sunt. Item panis sine fermento, & elota alica, vel oryza, vel præsana, omnis avis, omnis venatio, atque utraque vel assa, vel elixa. Ex domesticis animalibus bubula. Si quid ex cæteris sumitur, macrum potius, quam pingue. Ex fuscis vngulæ, rostra, aures, \*vulvæque steriles. Ex oleribus intubus, la-  
 tucæ, pastinacæ, cucurbita elixa, siler. Ex pomis cerasium, morum, sorbum, pium fragile, quale crustuminum, vel ne-  
 uianum est. Item pira, quæ reponuntur tarentina atque \*si-  
 gniæ. Malum orbiculatū, aut scandianum, vel amerinum, vel cotoneum, vel punicum. Vux ex olla, molle ovum, pal-  
 mulæ, nucleipiceæ, olæ albæ ex dura muria, eadem aceto  
 intinctæ, vel nigra, quæ in arbore bene permaturuerunt, vel  
 quæ in passo, defrutove feruatæ sunt. Vinum austerum, li-  
 cet iam asperum sit, item resinatum. Duri ex media mate-  
 ria pisces, ostrea, pectines, murices, purpuræ, cochleæ: cibi,  
 potionesque vel frigida vel feruentes, absinthium.

\*vulvæ,  
steriles-  
que.

\*saguina.

## ENARRATIO.

**S**ICVTI varie diuersaq; causa sunt  
 cui flaccescat stomachus; ita varia atque  
 eadem diuersa sunt, quæ eundem labescen-  
 tem restituant ac rolorent: siquidem alia aut  
 austera, aut acerbæ, aut amara, aut acida,  
 aut modico sale conspersa sunt; quæ omnia  
 ut diuersas qualitates instantibus exhibent,  
 ita diuersarum quoque partium sunt: alia  
 namque sunt quæ λεπτοσπῆ, alia quæ πυ-  
 κνῆσπῆ vocant. Acida omnia velociter pe-  
 netrant, atque per profundum corporis actio-  
 nem suam ostendunt: quare tenuium quo-  
 que partium existunt. acerbæ contra auste-  
 raque, atque vniuersim astringentia omnia,  
 tardius morantur sunt, atque actiones suas in su-

perficie tantum exerunt; sunt enim terrea ac  
 crassarum partium. ac proinde quum ea quæ  
 inter eustomacha numeret, tanta varietate  
 discrepent, consequens quoque est singula  
 quasus stomachi debilitates refrenare atque  
 compescere non posse, sed unumquodque,  
 prout necessitas atque tempus flagitat, id pra-  
 stare: nam frigido atque nimia pituita flu-  
 uanti stomacho, nequicquam acida propi-  
 naheris; offendes enim magis quam inueris;  
 astanti contra ventriculo non citra maxi-  
 mum commodum exhibueris. Cæterum au-  
 stera omnia, quemadmodum acerbæ quoque,  
 aut crassarum partium sunt, ita difficile alte-  
 rantur atq. corrumpuntur: quo fit ut quum

h

diutius



dintius ventriculo inhæreant, eundem quodammodo cum astringitione quadam comprimant; unde & alui profusius scire adhibentur, ac stomacho nauseabundo commodissime propinantur. Dum enim comprimitur ventriculus, cibos amplectitur, atque is conficiendis elaborat. Ea vero quæ modico contracta sunt sale, ideo stomachum roborare dicitur, quod minus insulsis corrumpantur: nam quum ea quæ sale condire solent homines, pinguis excrementitiaque sint; sit ut stomachum leuissima de causa subvertant: quod ab illis quæ modico sale conspersa sunt quàm longissime abest; nam, ut iam millies dictum est, sale omnem superfluitatem exiulit: unde & teneriores, & probioris etiam succi modica salugine redduntur carnes.

### Item panis sine fermento.

FERMENTATIVUS panis sicuti citissime conficitur, ita non raro ex fermenti, quàm ex putredine assumpti, acrimonia, leuissima de causa in ventriculo corrumpitur, ac in nidorosum quandam succum convertitur. Non fermentato panis non infirmior est elota aut alica aut oryza: nam ablutione omnem, si quem habent, lentorem exiunt.

### omnis avis.

MONTICOLÆ omnes aves, ut bonitate succi commendantur, sic stomachum quàm maxime roborant; palustrium contra ac desidem vitam agentium carnes, ut excremento non vacant, ita non omnino stomacho confirmando idoneæ sunt; idque eo magis quod excrementis plus abundaverint. Quid autem per venationem velit, iam sæpe dictum est: atque quod hæc entomacha sit, certum est, quum excrementis careat, atque macra sit: nam pinguis omnia stomachum obtrunt; quare macra potius in hoc genere quàm pinguis statuit. Edocet autem breuiter atque aphoristicè modum exhibendi carnes, tam sylvestrium animalium quàm animi, quum dicit atque veraque vel assa, vel elixa: nam si stomachus pituitosior sit, atque frigidior, assas; sin ad calidum declinet, elixas easdem dabimus.

### Ex domesticis.

HAC solum laude digna sunt bubula carnes, quod stomachum roborent, ac multum nutriant; idque si nec macie strigosa, nec vetustate rigida, neque prapingues admodum, sed bene habita sint. Ita enim non secus quàm sylvestrium animalium carnes minus excrementitia sunt; concoquuntur tamen difficulter: quare si modico sale imbuta atque contracta sint, ut palato gratiores, sic stomacho non inuitiles reddentur.

### Ex sue vngula.

NON tantum suum vngula, ac reliquæ extrema partes manduntur, sed & reliquorum pedestrium animalium, solentque elixas ex aqua cum aceto mandere. Prepoller autem in his ueruosæ & cutacea natura: quare ut pinguedinis, ita substantia quoque carnosæ quàm minimum habent: quo fit ut non facile in stomacho viuantur.

### vulvæ, sterilesque.

ERAT quando hic citra distinctionem vulvæque steriles legendum suspicarer, mendumque subesse constanter assererem, quod steriles nec multis partibus eneetæ vulvæ meliores censeantur: nisi casu quodam in Plinij. locum libro XI. cap. XXXVII. incidissem, ubi sic habet: Vulva eiectione partu melior est, quàm edito; eiectionis vocatur illa, hæc porcaria, primipara suis optima: Contra effectis à partu præterquam eodem die suis occisa, livida ac macra. Nec novellorum suum, præterquam primipararum probatior, potiusque veterum, necdum effectarum, & biduo ante partum, & post partum, aut quo eiecerint die. Proxima eiectionis est occisa vno die post partum. Quod allusisse videtur Marcialis hoc disticho:

Te fortasse magis capiet de virgine porca;

Me materna gravi de sue vulvæ capiet.

NAM quod olim in deliciis habita fuerint vulvæ, Apitini ille nepotum altissimus gurges, & ut ait Plinius, ad omnem luxum ingenio mirus, docuit. Siquidem ad languentis



guentis stomachi vires refocillandas, vulnam cum laſere Cyrenaico, pipere, mentha ſicca foliis (addito liquamine, melle & aceti medico) condire ſolebat. Hinc Horatius:

Quum ſit obelo

Nil melius turdo, vulua nil pulchrius ampla.

### Ex oleribus intubus.

INTUBI omnes tam ſatini, quàm agrestes ſubamaro quodam guſtu astringunt ac refrigerant, ac ſtomachum adiuuant: ſylueſtres tamen, ſi Dioſcoridi credimus, ſtomacho meliores ſunt; comēſti enim imbecillum ac aſtuantem leniunt. eiſdem planè facultatis ſunt lactuca: nam faſtidium auferunt, & cibi appetentiam faciunt. Cucurbita autem, quamvis elixa, aut in ſartagine fixa aut aſſa fuerit, neſcio quomodo enſtomacha dici poſſit: ſi enim cruda eſtur, inſuauis admodum eſt ac ſtomacho pernicioſa & concoctū planè inexpugnabilis; adeò ut ſi quiſpiam, teſte Galeno, alterius cibi inopia eam ingerere cogatur, pondus cum algore ventriculo incumbere ſit ſenſurus, ſtomachumque energet, & ad vomitionem concitabit, quæ una eum urgentibus ſymptomatibus liberare poteſt. Quare quum de ea veteres medici ita ſenſerint (ſi Plinio habenda ſides eſt) ut nihil aliud quàm aquam congelatam eſſe dicerent, ſtatim ac elixa fuerit, ut veſca reddatur, aut in ſartagine frigemus, aut aſſabimus; ita enim ſucci maliciei omnem deponet: verum an ob id ſtomachum roborare poſſit, nondum induci poſſum ut credam.

### paſtinaca.

ORIBASIVS ſylueſtri paſtinaca, uti & Celſus, vim ſtomachum roborandi tribuit; idq; fortaffe quòd abſterſorium quid in ſe habeat. Plinius etiam folia eiſdem contra cruditates mandi auctor eſt. Siſari autem radix ut elixa ori ſuauiſ eſt, ita ſtomacho quoque grata, & appetentiam excitat, faſtidiumque diſcutit. Huc quoque referri poſſunt, rapa napique valde cocti, bulbi quoque; nam ciborum appetentiam exacuant; nemque capparis ſale condita.

### Ex pomis ceraſium.

TEMPVS vtendi ut intubis, lactucis cucurbitisque elixis, ita & moris ceraſisque eſt; idq; cum corpus ſqualore ventriculi aſtuat, quo tempore neceſſe eſt idem quoque hepati accidere. Sumenda autem ſunt ante alios cibos, nam celeriter tranſeunt, cibisque aliis præeunt, ſi ventriculum purum inueniunt; ſin poſt alios cibos ſumpta fuerint, ac ventriculum impurum naſta fuerint, celerimè unà cum aliis quoque cibis corrumpuntur. Verum quum ceraſia alia aliis magis astringant, quo maiorem aſtrictionem ſortita fuerint, eo etiam reddentur ſtomacho gratiora.

### forbum.

SORBA, ut auctor eſt Galenus, magis ut medicamentum, quàm ut cibus eduntur: quare & parè quoque iis vtimur. Astringunt alium; debiliſ tamen quàm meſpila, & maiori quadam cum voluptate ſumuntur: neque enim ut meſpila in initio priuſ acerbis quippiam obtinent, ſed ſuccus eorum citra acerbitatē duntaxat auſterus eſt; unde & amica ſtomacho ſunt.

### pirum fragile.

FRAGILIA pira vocat quæ citò frangi poſſunt, & quæ friabilia ſunt: huiſmodi autem potiſſimum ſunt, quæ acidulo quodam ſapore non iniucunda ſunt; inter quæ primas facilè (ſi Columella & Plinio credimus) obtinent cruſtumina.

### Malum orbiculatum.

MALIS omnibus orbicularis figura eſt, ut piris turbinatior: ſunt tamen quæ propriè orbiculata vocantur, ſic dicta à figura orbis in rotunditatem circumacti; inter quæ ſcandiana, amerina, cotonea punicæque numerantur. Plinius in Epyro orbiculata, unde & Epyrotica quoque dicantur, primùm inuenta docet. Caterum monet hic rectè Celſarius Plinium, Scantiana ſcribere maluiſſe; quanquā auctor noſter & Macrobius Scandiana legerint.



## vel cotoneum.

CYDONIA mala astrictiorem copiosorem fortificant; unde iis quoque qui deiectionem habent appetentiam, sunt accommodissima. Punica autem mala piris, pomisque reliquis succum habent copiosorem, suntque cardialgia, tum Hippocrate secundo Epidemion, tum Galeno De alimentorum facultatibus secundo testibus aptissima: nam ore ventriculi vitiosis humoribus repleto adeo roboratur, ut humorem ipsius tunicis imbitum expellere queat.

## Vua ex olla.

OLLARES vuas componendi ac faciendi varios modos observabant antiqui: quos si quis scire desiderat, Columellam De re rustica libro XII. cap. XLIII. consulat. Generatim tamen decerpebant luna decrefcente vuas sereno caelo, post horam quartam quum iam insolata essent, nec rovis quicquam haberent (nam sic optime absque noxa eas servari tradunt) ac deinceps in singulorum aliquod vas, in modum patinarum latum, quod extrinsecus & interius bene picatum esset, modicumque defruti, passimve reciperet, per transversos fustes ne qua parte sibi contigua essent, aut defrutum passimve attingerent, vuas reponabant; ac tum demum opercula vasis superponebant, & pice aut gypso obliniebant. Dabantur autem iis commodissimè quibus stomachus fluctuaret, & appetitus prostratus esset, sicuti etiam passim, acerbescensque atque vinaceis demptis vna, si Psello, Aetio, Oribasioque credimus. Ceterum Oribasius (forte quod iam in dissuetudinem venissent ollares vna, aut quod vulgo non satis nota essent) ansteras vuas si cum ipsis foliis appendantur, commendabat.

## palmula.

IDQUE eo magis quo fuerint acerbiores, sunt enim omnes, Dioscoride teste, astringentes ac acerbæ.

## nuclei pinei.

SIC pinos nucleos simpliciter & citra exceptionem stomacho idoneos pronuntiavit Celsus, non video qui calumniam subterfugere

possit, quum omnia oleosa pinguique (in quo albo pinei nuclei sunt) stomacho nequaquam commoda sint, ut post Galenum etiam Auicennas testatur reliquit. Quare quum hoc capite de nutriente potissimum cibo stomacho conveniente agatur, dicendum erit Celsum de lotis tantum nucleis pineis locutum fuisse, quos Galenus pro nutrimento illotus præfert, quod ninurum lotionem omnis pinguedo evanescat & absumatur, sicut testatur septimo De simplic. med. facultatib.

## oleæ albæ.

OLEARVM fructus si non ad unguem maturus ac substantus adhuc sit, stomacho æstnanti melius conveniet, quam si prorsus maturaverit, ac nigredinem quandam quodammodo induerit: non negaverim tamen omnes oleas stomachum roborare, & appetentiam excitare; sed efficacius id efficient subaustere, idque eo magis si cum sale aut murtia condiantur (quas ἀλμύδες vocant) aut aceto intincta eidem quodammodo innatent, ὀξύμυρδες ob id vocatæ: nam has prædictis præstantiores esse asserit Oribasius.

## Vinum austerum.

VINVM austeriusculum atque acerbescens, Aetio teste, os ventris roborat, itemque ventrem ipsum, præsertim calida intemperie affectum: si tamen admodum austerum sit atque acerbum atrumque, vomitum citat. Resinatum autem vinum si ex opposita dyscrasia vitium contraxerit stomachus, eidem robur addit.

## Duri ex media materia.

TESTACEA omnia quæ ὀρεκώδην vocantur, quemadmodum carnem habent ad concoquendum, ita ad corrumpendum difficilem; atque ob eam causam ea sæpius exhibemus, quibus cibi in ventriculo ob præviis succos corrumpuntur, siue ex hepate in eum coeunt, siue in ipsis tunicis continentur; ostrea tamen inter alia omnia testacea ut carnem habent mollissimam, ita quam minimum robur ventriculo dant.

cibi



## cibi potionesque.

CALIDÆ intemperiei cibi potionesque frigida conueniunt; frigida contra feruentes, hoc est quæ teporem aliqua ex parte excedunt: nam alioqui si simpliciter feruentes cibos accipimus, potius adurendo ledent, quàm commodum aliquod afferent.

## apsinthium.

ARSINTHIVM, ut auctor est Galenus, astringentiam, amarant, & acrem simul qualitatem possidet, excalesciens pariter & abstergens, roborans simul ac desiccans, ac proinde biliosos humores ventri ac stomacho

inherentes per inferna propellit ac per urinam euacuat Dioscoridi, inflationibusque ventris, & stomachi doloribus, cum seseli ac uardo Gallica prodest. Atque ob hæc quodque sepor eius in uina quotidie transferunt; id enim stomacho, si quod aliud, accommodum, ac tardè concoquentibus uila. Verum quum tria apsinthij genera tam Galenus quàm Dioscorides describant, non quoduis prout in manus venerit, usus humanis commodum est (nam seriphium quod maritimum vocatur stomacho inimicum est,) sed solum Ponticum seu Romanum tanquam germanum verumque dictum.

## CAPVT XXV.

*Quæ res alienæ stomacho sint.*

**A**LIEA verò stomacho sunt omnia tepida, omnia salia, omnia iurulenta, prædulcia, omnia pingua, sorbitio, panis fermentatus, itemque vel ex milio, vel ex hordeo, oleum, radices olerum, & quodcunque olus ex oleo garôve estur, mel, mulsu, defrutu, passu, lac, omnis caseus, uua recens, ficus & viridis & arida, legumina omnia, quæque inflare consueuerunt: item thymum, nepeta, satireia, hyssopum, nasturtium, lapathum, lapsana, iuglandes. Ex his autem intelligi potest, non quicquid boni succi est, protinus stomacho conuenire: neque quicquid stomacho conuenit, protinus boni succi esse.

## ENARRATIO.

**S**ICVTI omnia quæ ventriculum cogunt comprimuntque, eustomacha sunt, ita si quæ eundem laxant, subruunt, ac fluctuantem faciunt, stomacho aduersantur: ac proinde quum frigida calentiæque ei accommoda sint cogendo, tepida quoque tanquam duobus hisce extremis contraria stomacho inimica dicimus, quod exoluant, atque nauseabundum reddant: eadem quoque ratio est, cur pingua vituperantur; siquidem

hæc præterquam quod fastidium pariant, fluctuant quoque in stomacho; ac rursum sicuti antea bene habitas carnes ac modico sale conspersas laudamus, ita macie rigidas strigosasque, ac salsedine nimia exuccas, tanquam cacostomacha reiciit. Prædulcia autem omnia stomacho ideo aliena dicit, quod citò vitientur, atque leuissima de causa in biliosum humorem conuertantur.

h 3

panis



## panis fermentatus.

**O**B acrimoniam nimiam quam ex fermento assumpsit; siquidem acris omnia stomacho ingrata sunt. Ex milio autem panis propter nimiam quandam ariditatem (est enim omnis pinguedinis ac lentoris expers, atque arena instar friabilis) stomacho ineptus est.

## radices olerum.

**M**IRVM admodum est neminem animadvertisse, locum hunc mendosè depravarique ad hæc usque tempora impressum: siquidem claris luce est, blitum betasque stomacho adeò inimica esse, ut morsum inducant si uberius comedantur: si tamen cum aceto, garo, oleoque comedantur, maliciam exuent, atque non inepti stomacho reddentur: quo fit ut hunc in modum legendum putarim: radices olerum & quodcunque olus, si non ex oleo garove estur. Sic enim Psellus, Aërius, ac Oribasius de oleribus pronuntiata reliquerunt.

## mel, mulsum.

**M**EL, ut docet Galenus, in calidis corporibus promptissimè in bilem vertitur; frigidis verò, siue per ætatem, siue per morbum, siue natura tales fuerint, est accommodissimum: ob id in sanguinem mutatum nutrire ipsa potest; in calidis verò prius in bilem quam in sanguinem mutatur. Non igitur omnibus in uniuersum ventriculis incommodum mel est; sed iis tantum qui calore æstuant: nisi quis ob nimiam mellis acrimoniam vellicari stomachum contendat. Passum autem, mulsum, defrutum, noua crassaque vina crassitie sua ac dulcedine, nauseam vomitumque conciliant.

## lac.

**S**IVE in calidiorem, siue frigidiorem ventriculum inciderit lac, non citra noxam

sumitur; nam in hoc accescit, in illo in bilem ac nidorem conuertitur: verum ut utramque hanc noxam subterfugiamus, mellis aliquantulum salisque atque aqua momentum ei incoquimus: nam mellis acrimonia facile deorsum fertur, aquaque tam mellis, quam feri acrimonia compescitur; unde non ita facile in bilem mutatur.

## omnis caseus.

**C**ASEI omnes ut mali succi sunt, ita viscera grauant atque obstruunt: veteres etiam quum succi improbi sint, acrimonia sua stomachum pungunt atque rodunt.

## item thymum.

**T**HYMVS, thymbra, seu satyria, eiusdem plane facultatis sunt; vtilisque sunt pro condimento in sanitatis usu, ut ait Dioscorides: quare an rectè inter subruentia stomachum numerauerit Celsus, deliberandum conseo; nam sicuti acrimonia aut calore suo calida ventriculi intemperiei obsunt, ita eidem si frigidior sit, optimè conueniunt; adeò nihil in huiusmodi categoricas pronuntiandum est. De hyssopo autem id concedimus, quod post Celsum, Plinium quoque idem pronuntiata reliquisse comperiamus; quemadmodum de nasturtio omnes ferè ad unum classici scriptores.

## iuglandes.

**I**UGLANDES, quas regias quoque nunc vocant, stomacho quidem per se sunt inutiles; anellana tamen sunt innocentes, nec omnino ventriculo ingrata, si cum caricis sumantur.

## Ex his intelligi potest.

**E**XEMPLO erit lac: id namque quum inter reliqua optimi succi sit, inimicissimum stomacho (ad utramcunque temperiem declinet) est. Contra quantumvis conueniat, panis non fermentatus malus est.

## CAPVT



## CAPVT XXVI.

*Quæ inflent, aut inflammationem leuent.*

**I**NFLANT autem omnia fere legumina, omnia pingua, omnia dulcia, omnia iurulenta, mustum, atque etiam id vinum, cui nihil adhuc ætatis accessit. Ex oleribus allium, cepa, brassica, omnesque radices, excepto sisere & pastinaca, bulbi, ficus etiam aridæ, sed magis virides, vux recentes, nuges omnes, exceptis nucleis pincis, lac, omnisque caseus, quicquid deinde subcrudum aliquis assumpsit. Minima inflatio fit ex venatione, aucupio, piscibus, pomis, oleis, conchylis, ouis vel mollibus, vel sorbilibus, vino vetere. Fœniculum verò & anethum inflationes etiam leuant.

## ENARRATIO.

**I**TA videtur paritius Caput hoc auctor noster, ut quum alia sint quæ flatu generent, atque alia rursum quæ inflationes leuent; sint tamen alia quæ quum neque exquisitè inflent, non possis tamen exactè inter flatu experiri numerare: ex quibus minimam inflationem fieri dicit. Verum quum magna pars eorum quæ hoc capite recensentur, ex antedictis satis constant, satis erit nobis difficiliore aliquot locos annotasse.

## omnia ferè legumina.

**LEGUMINA** appellat fabas, pisa, ciceres, lentes, lupinos, oryzam, erium, cicerulam, aracos, ermilia, phaselos, & similia. Sunt omnia flatu non omnino exortia: alia tamen aliis intensius id præstant; siquidem cicera fabasque reliquis inflant magis: ac rursum inflat magis fabarum farina, quam si integra aut alio quouis modo coquantur; fricta enim faba flatu vniuersè expers est. Dolichi inflant quidem, fabis tamen minus & ciceribus: Pisa contrà, phaseli, cicerula, ermilia, media quodammodo sunt inter flatuosa & flatu experitiâ.

## Ex oleribus allium.

**Q**UOD cepa bulbique, præsertim crudi, inflationes pariant, & quòd probè decocti atque ex oleo cum aceto comestis inflationem omnem exuant, notum admodum est: verum an allium inter flatuosa numerandum sit, aliis pronunciandum relinquo: nam neque Dioscorides, neque Galenus, neque Aëtius, nec quisquam alius hac nota scorodon insigniuit; sed omnes ad vni allium comestum corpus excalfacere, flatu discutere, crudos ac lentos humores incidere affirmant.

## omnesque radices.

**SISARI** quidem radix quòd quum calescat, adiectam quoque habeat amaritudinem quandam cum leuicula astrictione; pastinaca quòd absterforum quid in se contineat.

## Ficus.

**FICVVM**, ut auctor est Aëtius, flatu modico tempore durat, propterea quòd facile aluo subeant: quæ exactè matura sunt, nihil offendunt. Quo fit ut Oribasius easdem non simpliciter inter flatulentos cibos numerauerit,



rauerit, varum tum demum flatulentas tantum esse dixerit, quoties diutius in ventre haeserint: ficibus non omnino absimiles sunt carice, dactyli, vna.

lac.

NON solum lac caseusque facile in ventre inflantur, sed omnia quotquot sunt lactaria.

quicquid deinde subcrudum.

SIVE subcrudum ad fructus, tanquam immaturum dicas, siue ad cocturam referas, parum interest: nam tam immatura quam semicotta, excrementis non vacant, unde flatilus generandis occasionem quam citissime praebent.

Minima inflatio fit.

QVOD ea qua libero aere vagantur, animalia, atque ea qua perpeti alarum nisu per aera feruntur, quam minimam inflationem, ut pote excrementis omnis humoris expertia, generent, clarum satis arbitror; verum an in eodem albo sint pisces, ambigo: nam quum piumiosi sint excrementis atque si corporis compageni spectes, suburgida inflataque potius carne (si saxatiles demas) quam compacta erunt, quare aut expungendos esse censeo pisces, aut statim subiungen-

dum saxatilibus, in hunc modum: Aucupio piscibus saxatilibus.

pomis.

NVLLA in vniuersum poma flatibus omnino destituntur; reliquis tamen minus cororea, & quantumcunque decoctas, licet flatulenti spiritus portionem aliquam exuant, nunquam tamen effeceris ut omnem flatulentiam deponant.

conchyliis.

CONCHYLIA atque adeo ostracoderna omnia, ut durioris carnis sunt, atque difficilius in stomacho corrumpuntur, sic reliquis piscibus minus inflant.

vino vetere.

QVEMADMODVM noua vina, multa dulcia crassaque, quod tarde transeant atque meatus obstruant, flatum generant; ita vetera tantum non eos gignunt, sed quodam modo (sicut anisum, feniculum) leuant ac discutiunt.

anethum.

PRO anetho mallet hic anisum legere, feniculo per omnia par, ventrisque inflationes, si quod aliud, sedans: quanquam non ignorem ad crasorum humorum inflationes anethum quoque prodesse.

## CAPVT XXVII.

Quae res aut calefaciant, aut refrigerent.

AT calefaciunt piper, sal, caro omnis iurulenta, allium, cepa, ficus arida, balsamentum, vinum, & quo meracius est, eo magis. Refrigerant olera, quorum crudi caules assumuntur, ut intubus, & lactuca. Item coriandrum, cucumis, elixa cucurbita, beta, mora, cerasa, mala austera, pira fragilia, caro elixa, praecipueque acetum, siue cibus ex eo, siue potio assumitur.

ENARRA-



## ENARRATIO.

**CALEFACIENTIA**, ut refrigerantia, quatuor ordinibus seu gradibus distinguuntur: primum quidem ordinem faciunt, ut quum humani corporis temperati excedat temperiem, ad sensum tamen adeo sit obscurus, ut ratione deprehendere oporteat: alterum ab eo secundum, qui iam ad sensum manifestior est: tertium qui fortiter calefacit, nondum tamen urat: quartumque ac ultimum qui vistorius planè sit; ac de eius ordinis simplicibus, quum vesca non sint, nec in quotidianum usum recepta, hoc capite non sumus dicturi. Sunt autem generatim omnia calefacientia tenuium partium, atque diuersis saporibus euariant: siquidem alia dulcedinis, alia amaroris; atque alia acrimonia cuiusdam sensum exhibent, & (quod ad odorem pertinet) quum oxyporata sint, facile ad cerebrum usque permeant, ac nares fragrantia aliqua, aut aromatico odore replent.

## vinum.

**VINROVM** hunc ordinem ponit Aërius: Vetusissimum, inquit, multum calidum est; dulce moderate calidum; ac propterea suum inducit: fulvum calidius est nigro; flavum calidissimum est exivemè; album omnium minimè calefacit: rubellum, tenue, mustum novum ac crassum infrigidant.

## Item coriandrum.

**CORIANDRI** temperamentum minimè simplex est ac frigidum, ut hic Celsus innuere videtur, & alibi testatur Dioscori-

des; sed variè coalitum ac compositum est ex contrariis facultatibus, ut auctor est Galenus: siquidem plurimum habet amare essentia, quam ostendimus tenuium esse partium, & terrestrem: sed & aquosæ humiditatis repida ei non parum inest, habetque & astritionis pauxillum.

## beta.

**VIDETVR** hic, sicuti Martialis, non citra mendii suspicionem satias inspidasque vocare betas, ac temperiem frigidam illis ascripisse, quum caliditatem potius indicet nitrosa qualitas, visque tum extergens, tum digerens: quare nisi quid obstat, pro beta blitum, si quod aliud, inspidum admodum olus, substituturo.

## caro elixa.

**PAVLO** antè inter calefacientia carnes invulatas, nunc elixas (quod serè idem est) inter refrigerantia posuit: verum id ideo fecit, quod quemadmodum carnes in decoctione varia opsonia atque condimenta recipiunt; ita contingit quoque earum temperiem immutari pro condimenti quod recipit qualitate.

## præcipueque acetum.

**ACETVM** frigidum admodum est atque exiccatorium: quare sitim quæ à calore immodico oritur, strenuissimè reslinguit; sicut eam quæ a calida & sicca temperie, aut a sicca tantum provenit, sanare nequit. de eius porro facultate si quis plura desideret, Galenum libro primo Simplicium consulat, ubi ex professo temperiæ eius discutit.

## CAPVT XXVIII.

*Quæ res intus facile vitientur, vel minimè corrumpantur.*

**FACILE** autem intus corrumpuntur, panis fermentatus, & quisquis alius quàm ex tritico est, lac, mel, ideoque \* lactaria atque omne pistorium opus; teneri pisces, ostrea, olera, i cæcus,



caseus, & recens, & vetus, crassa vel tenera caro, vinum dulce, mulsum, defrutum, passum, quicquid deinde vel iurulentum est, vel nimis dulce, vel nimis tenue. At minimè intus vitiantur, panis sine fermento, aues, & eæ potiùs duriores, \* aurati pisces: neque solùm aurata pura, aut scarus, sed etiam lolligo, locusta, polypus. Item bubula, omnisque dura caro, eademque aptior est, si macra, si salsa est, omniaque salsamenta, cochleæ, murices, purpuræ, vinum austerum, vel refinatum.

\*duri p.

#### ENARRATIO.

QUÆCUNQUE humidum temperamentum sortita sunt, nisi citò per alium secedant, lenissima de causa corrumpuntur: quare ut ocyus subsistant, ante alios cibos sumenda sunt: sunt autem eiusmodi præcoces omnes fructus ac subcaniculares, lac, casei recentes æquè ac veteres, lactaria omnia, ut sunt placenta, rhyemata, atque etiam lactantia; hæc enim ut teneriora sunt, ita faciliùs corrumpuntur. Malim tamen hic, (quanquam exemplaria variant, & utraque lectio sibi constare possit) lactaria, quàm lactantia legere. At quòd panem fermentatum in hoc albo colloca, mirandum mehercules est, quòd videlicet is qui probè

coctus est, ut optimum atque laudatissimum gignit sanguinem, ita si temperatum bonumque ventriculus sortitus sit, quamminimè, & nisi gravissimis de causis, vitabitur, non negaverim tamen non fermentatum & filigine difficiùs corrumpi; quantum ob id in censum eorum quæ intus facile vitiantur, non sit referendus fermentatus panis. Carnes autem crassas vocat pingues, non autem carnosas ac bene habitas. Ostrea verò vitioso humore corrumpunt reliquum cibum; quare bis terq; coquenda sunt, atque in aliam puram fermentem aquam transferenda; sicuti etiam alia quæ dura restia integuntur: atq; ita quàm minimo vitiantur.

#### CAPVT XXIX.

##### Quæ res aluum moueant.

AT aluum mouent, panis fermentatus, magisque sicbarius vel hordeaceus est, brassica, si subcruda est, lactuca, anethum, nasturtium, ocymum, vitica, portulaca, radícula, capparis, allium, cæpa, malua, lapathum, beta, asparagus, cucurbita, cerasia, mora, vua, omnia mitia, ficus etiam arida, sed magis viridis, vûæ recentes, pingues, minutæ aues, cochleæ, garum, salsamenta, ostrea, pelorides, echini, musculi, & omnes fere conchulæ, maximeque ius earum, saxatiles, & omnes teneri pisces, sepium atramentum, si qua caro assumitur pin-



tur pinguis eadem, vel iurulenta, vel elixa, aues, quæ natant, mel crudum, lac, lactaria omnia, mulsam, vinum dulce, vel falsum, aqua tenera, omnia tepida, dulcia, pingua, elixa, iurulenta, falsa, diluta.

\* lactaria  
\* aqua, te-  
nera om-  
nia.

## ENARRATIO.

QVÆ alium mouent καὶ ἀρρηκτά, nos purgantia; Cælius Methodicus affectato quodam dicendi modo ventris fluxa dicere maluit. Fermentum igitur alium ducere, ex ipsa falsedine & acrimonia satis constat: atque id quidem quamuis per se præster, non tamen ob id omnis fermentatus panis alium statim leniet: nam qui ex purissima tenuissimæque farina (quam tritici florem vocari diximus) conficiuntur, plurimum ponderis exigua mole habentes, tardè admodum deiciuntur, quantumuis fermenti plurimum adieceris. Furfuracei autem panes (quorum Celsus, ut autè dictum est, nusquam meminit,) sicuti parum nutriunt, ita facillè subducunt: furfur enim quum facultatis sit deterforia, merito intestinis irritatis celerem facit deiectionem; ita ut hic fermenti parum, aut leuis subactio, breuèque intervallum suffecerint. His quamproximè accedunt cibary sordidius dicti panes: nam quemadmodum siliginis quàm minimum, furfurisque quàm plurimum recipiunt; ita alium quoque lenigant, & parum corpori præstant nutrimentum. In eodem quoque albo sunt hordeacei: parum enim & hi nutriunt, & quum friabiles sint, nihil in se lentoris habent; ac proinde tenuem ac deterforium in nobis succum gignunt.

## brassica, si subcruda.

VSVS exhibendi brassicam, Galeno teste, is fuit ad subducendam alium. Leniter coctam & vniuersam ac repente in vas aliquod in quo sit oleum & garum transfusum, ante alios cibos sumebant. Dioscorides crudum eius succum cum iride & nitro vorandum exhibet. Purgat autem propter qualitatem quandam nitrosam quam obti-

net; qua si diutius coquatur, absuntur: atque hinc fit ut sequente capite inter alium astringentia posuerit biscoctam crambem. Dioscorides porcoctam idem facere testatur; enaporat enim tenerior & absterforia qualitas, vehementi & diuturna coctione. Paulus marinam vehementiorè dicit ad solvendam alium, propter amarorem: Dioscorides sativam prætulit. Lactucas autem alio ducenda ideo idoneas dicimus, quòd aquosa sua substantia facillè permeant; quanquam de sylvestri seu marina lactuca locum hunc intelligendū existimem: nam, ut docet Dioscorides, aquam per alium elicit, potus in aceto, mulsio ad duos obolos eius succus. Si tamen de sativa accipere malis, de ea intelligendum suspicor quæ in caulem exierit; hæc namque vim quandam nanciscitur, succo aut lacti sylvestris lactuca similem.

## anethum.

HIC, si quid mihi concedatur, iam iterum pro anetho, anisum substituo; idque eò potissimum, quòd Dioscorides anisum urinam ciere, aquam quæ subit eadem dissipare, potiusque sitim sedare dicat: Anethi contra, præsertim comæ seminisque decoctum, urinam quidem ciere, alium tamen lenèque vomitiones sistere: cui sententia Plinius quoque subscribit; nam is tormina sedare dicit, atque alium sistere. Quanquam si quis anethum viride ideo alium solvere dicat, quia minus calidum sit sicco, atque eodem humidius, ac proinde crudos humores coquere, per me quidem integrum est; quanquam, ut dixi, anisum legere malim: atque sic quæ sequuntur cohererunt; nam ocymum alium turbare tradit Dioscorides, nasturtiumque ventrem mollire Plinius: Nasturtium,



tiuum, inquiens, Venerem stimulat, animum  
exacit, aluum purgat, detrahit bilem potum  
cum aqua decem denariorum pond. Vrtice  
autem folia cum conchis cocta aluum emol-  
liunt, urinamque cient, Dioscoride teste: Ga-  
lenus autem ventrem subducere, ipsa dum-  
taxat exersione, ac veluti titillatione, non  
purgatione asserit.

### portulaca.

COMPERTVM satis non habeo, quomodo  
portulaca vim subducendi aluum ascribat  
auctor noster: nam quantumvis temperie  
sit humida, unde facile intestina praterla-  
batur; habet tamen vim quandam astric-  
toriam: quo fit ut intestinis fluxione laboran-  
tibus recte infundi dicat Dioscorides; &  
sicut Galenus asserit, paucæ ansteritatis par-  
ticeps est; & quoniam astringit, utiliter dy-  
sentericis edicunt, & in muliebri profusio-  
ne & in sanguinis reiectionibus. Plinius etiam  
vomitiones sistere auctor est, dysenteris-  
que & vomitibus dari ex aceto, vel bibi cum cu-  
mino.

### radicula.

EODEM ferè elogio celebrantur, radi-  
cula, cepa, allium, capparitis: nam omnes  
quotquot sunt, crassos corporis humores ex-  
tenuant, sitim gignunt, aliuque utiles sunt,  
eamque leniter subducunt.

### malua.

VENTRICULVM (ut inquit Simeon  
Sehi) malua facile subit, non solum propter  
humiditatem, verum etiam glutinositatem;  
atque in primis si cum oleo & garo offera-  
tur, vino quo edicunt tempore irrorata.

### lapathum.

Λάπαθος Græci dictum autumant ἀπὸ  
τοῦ λαπάθου, quod omnium solis decoctis  
aluum molliatur, atque inanietur: Galenus  
tria tantum genera facit; Dioscorides autem  
quatuor, verum quotquot sunt rumicis ge-  
nera, lubricant aluum efficiunt; radicemque  
cum vino decoctum, regio morbo mederi tra-  
dunt, bile nimirum per secessum expurgata.  
Bera autem nitrosa facultatis particeps est:  
qua cum extergis, tum digeris, tum per na-

res purgat, atque aluum ad excretionem  
stimulat, stomachumque vellicat, eorum præ-  
sertim, qui hunc sensibilem valde habent.  
Cocta autem bera, ut vult Galenus, nitrosi-  
tatem omnem exuit, & ad detergendum  
digerendumque validior est alba; nam nigra  
adiunctam habet astrictionem.

### asparagus.

ASPARAGVS generatim dicitur caulic-  
ulus tenerior herbe fruticis ad fructum &  
semen excresecens; speciatim verò herba vul-  
go satis cognita ita vocatur: atque huius  
quidem cauliculi cocti & comesti aluum  
molliunt, ac urinam movent, renique ac ie-  
cur infarctum liberant, quod hinc manifestum  
feri affirmat Simeon Sehi, quod urina odo-  
rem in suum transmutant.

### cucurbita.

SUBSTANTIÆ quidè affinitate cõinncta  
sunt, mora, cerasia, melones, cucurbita, pepo-  
nes, cucumeres; omnibus siquidem cõmune est  
quod cum substantiæ humiditate lubricita-  
tem quandam sortiantur. Quare si ante  
alios cibos sumantur, & in purum ventri-  
culum inclerint, citò subsidunt, ac ventri  
utilia sunt: Cucurbita autem elixæ succus  
expressus, ut auctor est Dioscorides, cum exi-  
guo melle & nitro potus, aluum leniter  
purgat, ac si quis in cucurbitam crudam ex-  
canatam vinum infundat, & sub dio ha-  
beat, temperatissime ieiunus bibat, aluum  
leniter molliet.

### vua, omnia mitia.

SI quid rursum hic mihi concedatur,  
pro tã vua, legetovina; idè ne in eo, quem  
sumit breuitati induisse certum est, τρω-  
τολογία aliquo modo culpæ possumus:  
nam paulo pòst vuas recentes ac pingues  
enumerat. Neque enim alienum à ratione  
est, ut ante quoque dixi ubi vinorum fa-  
cultates expendi, mitia vina, hoc est dul-  
cia, nulliusque ansteritatis participia molli-  
re aluum: nam in subsequente capite vina aspe-  
ra, que ex diametro mitium opponuntur,  
astringentibus annumerat.

ficus.



### ficus etiam arida.

**FIGVS**, ut daces Galenus, commicabiles sunt, & facile in totum corpus pervadunt penetrantque: nam & abstergerendi vi pollent haud obscura; cuius gratia commanfa, & calculosis renibus arenularum virus propellunt. Aride quoque ficus, quas caricas vocari dixi, extenuandi incidendi que vini habent; quo nomine alium stimulant ad excretionem, renisque purgant.

### vuæ recentes.

**DICTUM** est maximum uvarum bonum esse, quod celeriter subeant atque alium turbent; atque horum magis participes reddi, quo fuerint & pinguioribus, & recentioribus: nam quæ aliquandiu decerpita pepererunt, pensiles ob id dista, ut humoris portione aliqua primata exaruerint, ita alio ducende minus idoneæ sunt.

### minutæ aues.

**NON** quotquot sunt minuta aues, ventri ducendo idoneæ sunt; sed quæ teneræ sunt & λεπτομερές: sub quo genere comprehendere possumus passerulos atque omnes monticolis aues; hæc siquidem quemadmodum facile conficiuntur atque distribuuntur in uniuersum corpus, ita facilius alium reddunt; secus est de aquatilibus auib; quæ parua corporis mole infuso crassiores gignunt succum. Si tamen placeat per minutas auiculas, teneras adhuc & nuper exclusas intelligere; constabit sententia: nam omnia nuper edita facilius alterantur ac distribuuntur, ac ventri subducendo utiliora sunt annosis, quæ sicuti ex ucca magna ex parte sunt, ita alio ciende inutilia.

### cochleæ.

**CRUSTACEAM** testaceamque habentium tunicam im (inquit Psellus) ut astacorum, pagurorum, nutilorum, concharum, & aliorum id genus, ventrem citat: nam si quis hæc coquat, inde concinet coctionem ex oleo & garo & pipere, facile alium citauerit. Ceterum marinorum echinorum, & conchylium ista, ut etiam veterum galorum, præsertim rufforum, per se alium

subducunt. Paulus Aegineta, las, inquit, omnium quæ testis integuntur, alium ducit. ob hanc causam terrestres cochleæ ventri soluit: nam, ut ait Galenus, omnibus id commune est quod salsum in carne succi contineant, qui alium subducit, quod scorsum unicuique magis minusque inest, pro qualitatibus ac quantitatis ratione; siquidem ostrea inter alia testacea carnem molliissimam habent: quo fit ut alium quoque valentius subducant.

### garum, fassamenta.

**NON** modica fassarum carniū diffrentia est, prout quadam ex ipsis saluntur: nam adeo inmutantur, ut sepe animalis temperamento humidi caro salita longè superior enadat, quàm caro animalis sacci natura, non fassa. Generalim tamen omnia fassamenta tenuium sunt partium, & comesta lentos ac crassos humores incidunt atque attenuant, atque intestina ad fluxionem stimulant. A fassamentis autem quàm minimè, quod ad vim ducendi alium pertinet, declinat garum; cuius conficiendi modum dacet Plinius Naturalis historie libro VIII. cap. VII. Aliud, inquit, etiamnum exquisitum liquoris genus est, quod Garum vocare, intestinis piscium, ceterisque quæ abicienda essent, sale maceratis, ut sit illa putrescentium sanies. Hoc olim conficiebatur ex pisce quem Græci Garon vocabant: & reliqua quæ fassissima eodem capite tractat Plinius. Sunt alij qui costorum piscium ius vocent garum, quod in hunc modum prepararetur, quemadmodum in venusto quodam manuscripto libro se reperisse affirmat Gualterius Rysius: Sumuntur pisces minores salsi, aut si salsi non fuerint, saluntur paucis sale, mittiturque idorum sextarius unus in boni vini sextarius tres, ac decoquitur æreo vase dum due partes absumantur, deinde ius decocti per incerniculū percolat, reconduntque vitreo vase, atque usui seruant. Celius Methodicus libro Chromion, Garum, inquit, appellatur ius ex piscisiluro confectum. Aerius multos alios purgatorij Gari modos describit: quos si quis scire desideret (longum enim esset hic singulos adscribere) eundem consulat.



## sepiarum atramentum.

SEPIÆ ex genere mollium piscium sunt, salūque quodammodo humorem in se continent, unde & alio ducenda accommodata sunt. Vocat autem sepiarum atramentum, liquorem qui his pro sanguine inest.

## si qua caro assumitur.

HYMIDA omnia ficcis, succosaque ex-nectis facilius præterlabuntur: quo fit ut carnes omnes pingues (sunt enim temperamento humida) alium molliant; idque potissimum si aut intulenta sint, aut elixæ. Verum quomodo in hoc albo posuerit carnes earum alium quæ natant, nondum assequor; hæc siquidem ut crassi succi sunt, ita difficile secerantur: nisi quis idcirco lenire dicat, quod aquosæ cuiusdam humiditatis participes sint.

## mel crudum.

QUVM mel tenuissimum sit partium, ut docet Galenus, acrimonia quiddam habeat necesse est, quæ alium ad excretionem prouocet; quam adimentes ipsum efficiunt ad distributionem & concoctionem accommodatius. optime autem ipsum adinuemus, si primum, illi multum aquæ admiscuerimus, ac deinde tantisper coxerimus, quoad spumare desinat. Oportet autem spumam statim ut emergerit, incontinentem ab ipso tollere: quum enim hac parandi ratione acrimoniam auferit, neque ad excretionem amplius alium irritabit; atque ob hoc melli crudo tantum purgatricem facultatem ascribit Celsus.

## lac.

LAC omne quo liquidius est, eo magis alium subducit, crassum minus, serum autem lactis (ut XII capite ostendi) valde emollit ventrem. Initiendum autem lacti est (ut rectè monet Galenus libro De alimentorum facultatibus), ad ipsum mellis optimi quod satis sit ad condiendum solum, ne stomachus subvertatur, ac in eadem rationem saltem indere oportet, ne gustus offendatur.

## lactaria omnia.

ETSI hic inter exemplaria non satis conueniat, aliis lactaria, aliis lactantia legentibus; potiorque numerus priorem lectionem sequatur: maluius tamen inter alium ducentia lactantia animalia numerare. nam, ut psellus, inuenum animalium carnes, magis quam veterum, subducunt, extremæque mediis. Ac Aërius animalium valde inuenum carnes facilius alio secedere testatur: siquidē quanto sunt ætate propectis humidie constitutione seu temperamento, tanto sunt excrementosiores ac humidiores: ac proinde minus quidem nutriunt; discutuntur autem ac distribuuntur celerius. Et quum lac ex contrariis substantiis coalitum sit, serosa videlicet, cui purgantem facilitatem inesse tradidi, butyrosa seu pingui ac caseosa, quæ obstat ac meatui infarci; nescio quomodo lactariis omnibus vim subducendi alium rectè ascribemus: nam quæ ex crasso lacte consistunt, ut crassiores sunt consistentia, ita fixiusherent, tardiusque præterlabuntur: Huc adde quod Aërius, Oribasius, psellus liborum ac placentarum genera, psylliumque omne opus tardi transitus esse dixit.

## mulsam.

MVLSVM, quod ὀνόμαζα, & aquam mulsam, quam ὀνόμαζα καὶ μελίχρῳ appellant, eo intensius purgare constat, quæ fuerint minus cocta: nam coctione, ut dictum est, mellis acrimonia dissipatur. Ac quod dulcia omnia vicia subducant alium, satis explicatum est: & si quis quæ de salisamenti dicta sunt intelligat, facili percipiet, vinum salsum ad excretionem irritare.

## aqua tenera.

SIVE tenera cum tepidis, siue cum aquis adinuemus, parum interest. verum si aquis annexamus, tum eam intelligemus, quæ dulcis & sincera sit, nullius plane qualitatibus particeps; hæc enim ne minimo quidem tempore in præcordiis moratur, facillimeque citra molestiam fertur: quanquam si quis et tenera reponitis annexat, clariorem sententiam efficiet: atque ita hunc lo-

cum non



cum non de prædictis tantum aquis, sed & de marina quoque intelligere licebit; hæc quum calida simul sit & acris, alnum catenari vehementius conturbat, atque pituitam

expellit. Nam aliqui nisi teneris omnibus tepida ascribamus, stomachum magis subvertere, atque ad vomitum provocare dicemus, quam alnum turbare.

## CAPUT XXX.

*Quæ res alium adstringant.*

**C**ONTRA adstringunt, panis ex siligine, vel ex simila, Panis.  
magis si sine fermento est, magis etiam si \*vstus est, in- \*tostus  
tenditurque vis eius etiam si bis coquitur. Pulicula vel ex  
alica, vel ex panico, vel ex milio, itemque ex iisdem sorbitio,  
& magis si hæc antè fricta sunt. Lenticula, cui vel beta, vel  
intubus, vel ambubeia vel plantago adiecta est, magisque  
etiam, si illa antè fricta est, per se etiam intubus, vel ex plan-  
tagine vel ambubeia fricta, minuta olera, brassica bis decocta,  
dura oua, magisque si assa sunt, minutæ aues, merula, pa-  
lumbus; magisque si in posca decoctus est, graues omnes aues,  
quæ magis currunt, quam volant: lepus, caprea, iecur ex his  
quæ seuum habent, maximeque bubulum, ac seuum ipsum,  
caseus, qui vehementior vetustate fit, vel ea mutatione quam  
in caseo transmarino videmus, aut si recens est, ex melle  
mulsõe decoctus. Item mel coctum, pira immatura, sorba,  
magisque ea, quæ torminalia vocantur, mala cydonia, & pu-  
nica, oleæ vel albæ vel perimaturæ, myrta, palmulæ, purpuræ,  
murices, vinum resinaturn vel asperum, item meracum, acco-  
tum, mulsurn quod inferbuit, item defrutum, passum, aqua  
vel tepida, vel præfrigida, dura, id est ea quæ tardè putrescit,  
ideoque pluuiæ potissimum, omnia dura, macra, austera,  
aspera, tosta, & in eadem carne assa potius quam elixa.

## ENARRATIO.

**L**ENTORIS ac crassitie plurimum for-  
tuitur panis siliginens; huncq; sequitur  
similacens: quo fit ut alium astringant;  
idq; eo magis si fuerint azymi, hoc est, non  
fermentati; nã fermenti acrimonia, ut præ-

cedente capite dictum est, ad expulsionem  
irritaretur. Intenditur autem adhuc magis  
eorundem astrictio, si assine aut recoctione  
humidi quicquid habet, exugatur: nã sicca  
omnia atque exicca difficilius transiunt.

Pulci-



## Pulicula.

ALICA nunc frugis genus est, modò ex fruge facta farina, & inde pulicula vel sorbitumcula; habetque non secus ac filigo succum lentum, unde & difficulter subsidet, ac iecur ossimè obstruit, renibusque generandi calculum occasione prebet; atque hinc Galenus iis qui sani adhuc vehementi ventris mordicatione, aut ob biliosi humoris transiitum, aut aliud genus infestabantur, sorbitiones ex alica exhibuit. Milium autem & panicum, eiusdem planè, astrictoria dico, facultatis sunt: nam utraque nihil neque lentioris neque pinguedinis habent, sed præarida simul & friabilia sunt; unde & humectent alium per se, & ex iisdem facta sorbitumcula vel pulicula desiciant, idque eo magis si inultum plurimumque autem excabernunt decoquantur: atque vehementius adhuc vis astrictoria insendetur, si fruges primùm frignantur: nam fructura non solum si quid est, astrictoriam facultatem adipiscitur, sed quicquid illucenda alio ut medicamentum assumitur: sic rhubarbo, sic quotquod sunt myrophalaporum generibus, cathartica aliis, qui di præditis, vel lentissima fructura aut obstruunt astrictoris nonnihil conciliamus.

## Lenticula, cui vel beta.

OMNIA ferè in quibus sapor est acris vel salus, vel nitrosus, acris est, & que contrarias in se facultates habent: sic brassicam lentemque paulò ante purgare dixi, quas nunc alium cohibere affirmat: nam substantia que velut oleris ipsius caro est, astringit; succus però, atque ipsorum decoctionum vis ventrem emollit. Sic lenticula quoque tametsi gustu magnam restringendi facultatem repræsentet, eandem potentiam sortita est, ut auctor est Galenus libro De alimentorum facultatibus: nam si quis ipsas in aqua coxerit, & deinde aquam sale aut garo, aut cum ipsas oleo condians sumperit, potius is alium danciet. At ex his decoctis lentibus ad eum quem diximus modum lens apparatus; succo habet facultatem contrariam: nam corticem habet astringentem; & que ipso rum veluti est caro, crassi est succi & terre,

austeram qualitatem habens exiguam, cuius cortex multa est particeps. Hinc porro si betam adieceris, ac una coxeris, gratissimum non modò opsonium, sed medicamentum effeceris; ut quod Galenus Heraclidem Tarentinum sanis æque ac ægris exhibere solitum dicat. Nam quum extremorum quodammodo sint expertia, mediam quandam naturam sunt adepta; unde non tam astringunt, quam robotant ventrem: atque hinc quum ex utrisque mistas quodammodo facultates sortiretur, πειροφάνης nominabat Heraclides. Eadem ratione Galenus ex pisana (qua leni quoque contrariam facultatem habet) & lente præstantissimum ædulum componi auctor est, quod phacopisanam nominat. Astringet autem vehementius lenticula, si eidem admisceatur intubus, ambubeia vel plantago; nam omnia hæc astrictoria facultatis sunt, idque eo magis si frignantur.

## per se etiam intubus, vel ex plantagine.

VIDE ne non coniunctis ex expungenda sit, atque sic immutanda lectio: per se intubus, vel plantago, vel ambubeia fricta.

## minuta olera.

NESCIO quàm appositè minima omnia olera alio compefcende idonea dicat: si quidem hic non tam humilitatem, proceritatem aut quantitatem, quàm qualitates que ex gustu deprehenduntur, expendere licet: nam si acerba, si austera sint, quantumcumque in alium assurgunt, ventrem sistere dicimus: & rursum que acris, nitrosa, incidentiaque sint, quantumvis humilia, alium ducunt.

## brassica bis decocta.

QVOD brassica bis decocta astrictoria facultatis sit, ante dictum est. verum ubi humectent alium exiccare volumus, quum iam modèratè cocta esse videretur, prima aqua effusa, altam calidam statim affundimus, deinde in ea ipsa rursù coquimus donec flaccida fiat. Oportet autem neque aerem neque aquam



que aquam frigidam attingere quod bis co-  
quitur: non enim amplius exacte flaccescit,  
etiam si diutissime coquantur.

### dura oua, magisque si assa sunt.

QUÆCUNQUE dura sunt & consisten-  
tia crassa, ut difficile concoquuntur, crassum-  
que succum generant, ita tardè secernuntur,  
alio inutilia sunt: non mirum igitur si oua  
ad duritiem decocta ventrem astringunt,  
idque eo magis si in cineribus assa sint: ea  
enim præter duritiem à circumiectis cineri-  
bus, terrea quadam crassaque qualitate par-  
ticipant.

### minutæ aues.

NESCIO an sui per omnia memor mi-  
nutas aues hic collocarit: nam præcedente  
capite easdem lenire alium dixit, ubi sub  
minutis auitibus, non tantum monticolæ au-  
iculas comprehendendi posse demonstrari, sed &  
quasvis nuper editas: atate enim quales qua-  
les tandè sint, sicciore atque tardioris transi-  
tus redduntur: adde quod coctura ratio, cu-  
ius hic non meministi, Tor noster, ipsarum  
facultatem nonnihil alterare posuit: nam qua  
in aqua dulci elixantur, sicut alimentum  
humidum subministrant, ita alio utiliores  
sunt ac facilius secernuntur: at quæ assan-  
tur aut sartagine friguntur, quemadmodum  
sicciore coctura redduntur, atque omne quo-  
dammodo humorem exiunt, ita alio inuti-  
liores sunt, atque eandem duritiem reddunt.

### merula, palumbus.

QUEMADMODUM turdo non omnino  
ab similibus merula, ita quam proximè ad eius  
delicias ac dulcedinem accedere quidam exi-  
stimant. Plinius tamen earum carnes astri-  
ctorie cuiusdam facultatis participes quo-  
dammodo innuere videtur: Nam dysente-  
ricis cum myrti baccis rectè adhiberi dicit.  
De palumbo autem mirum non est: nam ob  
glandium immodicum esum, quibus delectari  
ferunt, Venerem simul ac alium cohibet:  
quod respiciens Marialis inquit:

Inguina torquati tardant hebetantque  
palumbi;

Non edat hanc volucrem qui cupit  
esse salax.

Magis autem astringunt si in aceto aut  
posca decoquantur: nam tum quoque dy-  
sentericis commodè administrari auctor est  
Plinius.

### Grus, omnes aues.

GRVVM substantia, ut auctor est Gale-  
nus, dura est & fibrosa: quare ante esum  
pluribus diebus macerare solent, ut ita faci-  
lius & concoquantur & dissolvantur. Cæsarius  
hic mendum subesse suspicatus, graves le-  
gere maluit, ita ut graniores omnes aues  
quæ pedibus fiderent, quam quæ volatu ma-  
gis niterentur, intelligeret; ea siquidè quem-  
admodum nutrimentum copiosius præstant,  
ita difficilius secernuntur: sunt autem eius-  
modi anseres, tarde & tardè dicta, struthio-  
cameli similisque.

### lepus, caprea.

VENATIO omnis crassi melancholicis-  
succi est, agrèque digeritur: quo fit ut ob-  
structis meatibus difficile excreetur. Non  
solum igitur leporem capreadque, sed & cu-  
niculos, cernos, hinnulos, atque adeo omnem  
venationem tardi transitus dicemus.

### iecur ex his quæ seuum habent.

ANIMALIA quæ natura magis terrea  
sunt, sebum habent: qualia sunt, si Aristoteli  
credimus, quæ altera tantum parte den-  
tata sunt; humectiora autem adipem atque  
hec utrinque dentata, idem affirmat. Quam  
igitur iecur omnium animalium crassi succi  
tardisque transitus fit, ac difficilius concoctionis,  
eorum potissimum animalium, quæ naturâ  
sicca & terrestria sunt, veniri inutile erit,  
quale, si quod aliud, bubulum est.

### caseus qui vehementior.

CASEI omnes, ut auctor est Galenus,  
agrè concoquuntur, acidum rictum gene-  
rant, & statim ventrem impleant, & improbè  
alio secedunt, pituitam & æstum ventri  
inducunt; siquidem in præparatione ab  
immissa coagulo acrimoniam assumunt, &

k

omnem



omnem humorem deponunt, præsertim in-  
ueterati, qui acriores quidem & calidiores  
redduntur: ceterum maiorem noxam ex  
succis prauitate consequuntur, ægriusque con-  
toquuntur ac difficiliter aluo sedunt. Trans-  
marinos autem caseos vocant, qui trans  
maria vehuntur; in quo alio potissimum  
censeantur, ut auctor est Columella, qui  
neque fideles, neque salsi, neque præaridi  
omnino, neque alicui vitio subiecti, sed qui  
à crassiore liquore coacti in longam ætatem  
seruari possunt. Exatque si Plinio credimus,  
trans maria Bithynius caseus in gloria.

aut si recens est ex melle.

QUANQUAM alibi recentem caseum,  
& modo coactum deicienda alui gratia cum  
melle ante cibum sumi testetur Galenus, sen-  
tentia huic non oppugnat: nam mellis crudi  
acrimonia ad excretionem stimulat, quod  
à solo caseo tantum abest, ut expectemus ut  
ventrem, iecur, renisque (sicuti etiam lac,  
quod quum consistentia crassum sit, parum  
feri habeat) obturet & obstipet: quo minus  
mirum est omnia liborum ac placentiarum  
genera, ex recenti caseo, similagine mellisque  
confecta, tardi transitus esse; nam lentore  
quopiam meatui infarciunt.

Item mel coctum.

QUOMODO mellis acrimonia per de-  
coctionem adimatur, precedente capite ex  
Galeno retulimus. Plinius medicamentosam  
astringentiamque magis vim obtinere dicit, si  
in eodem apes mortue sunt; id enim deco-  
ctum dysentericis vultus exhiberi.

pira immatura.

IMMATURA pira omnia austera sunt  
acerbique, frigida, concoctum difficilia pra-  
uique succi, ac proinde quum qua austera  
acertaque sunt, eadem statim astringentia  
sint, consequens est omnia pira ventrem  
astringere.

forba.

SORBIS, ut auctor est Plinius Natu-  
ralis historia libro XV, quadruplex est disse-  
rentia: alius enim eorum rotunditas mali,

aliis turbinatio piri, aliis ornata species, cen-  
malorum aliquibus. Hac obnoxia acri odo-  
ri, & suauitate rotunda antecellunt; cate-  
ris vini sapor. Generosissima quibus circa  
pediculos tenera folia. Quartum genus tor-  
minale appellant, remedio tantum probabile,  
assiduumque promerit, minimum pomo,  
ideoque torminale dictum suspicor, quod dy-  
senterius, quæ tormina Latini vocant, me-  
deatur, generatim tamen quotquot sunt sor-  
ba astringunt; nam succus ipsorum austerus  
est, sine ulla acerbitate. Dioscorides & Pl-  
nius sicca & ante maturitatem collecta ad  
compescendam aluum magis commendā-  
runt. Sammonicus autem vetusta sorba  
pueris ex dentitione fluore alui laborantibus  
appetitissime adhiberi auctor est: nam  
Proderit (inquit) & pueris quos dentis  
origo fatigat

Castaneas coxillæ nuces, & sorba verustia.

Quod alludens Martialis, dicit:

Sorba sumus molles nuntium durantiæ  
ventres;

Aptius hæc puero, quam tibi poma  
damus.

Mala cydonia vel  
punica.

COTONEIS eximium quippiam, quod  
in aliis non inuenitur, inest: nam præter-  
quam quod astringentem habeant copiosio-  
rem, succus etiam eorum diu permanet ac  
durat. Punicum quoque malum omne astring-  
entis est facultatem; succo tamen acini ma-  
gis, atque his intersitis cortices astringunt.

olea vel albæ vel  
præmaturæ.

SI quid rursus hic mihi concedatur,  
pro præmaturis, immaturas legero, nisi  
forte quis præmaturum id quod ante tempus  
maturuerit, intelligere malit; quanquam ne  
sic quidem sententia constare possit. Nam,  
ut Galenus, olim rapum quantum habent  
astringentis, tanta & frigiditatis participes  
sunt; fructus verò, si quidem ad æquum  
maturuerit, moderatè calidus est; sin imma-  
turus est, magis cum astringit, cum refri-  
gerat.

myrta.



## myrta.

MYRTI baccas, Catenem sequutus myrta vocat, Varro Myrta dicere maluit. Constat autem ex contrariis substantiis: verum predominatur in ipsis terreum quippiam; habet tamen & quippiam tenuium partium calidum, unde & fortiter siccant. Omnes tamen ipsius partes restringendi vim habent, tum forissecus corpori imposita, tum intra sumpta. De palmulis capite XVIII. factum est: sunt autem hic eo convenientiores quo fuerint acerbiores.

## purpuræ, murices.

Oregodigmar in scula precedente capite vi quadam ob innatam salseinem alium ducendi pradita ostendimus, eorundem tamen carnes exhausto humore ventrem astringere: nam contrarias atque sibi invicem quodammodo pugnautes, non secus ac lenticula, faciliates obinent.

## vinum refinatum vel asperum.

PERSPICVUM est, auctore Galeno, quod astringens, austerrum, asperumve & acerbum, qualitate unicam significant: ac proinde quod austera vina qualis tandem coloris sint, ruffa, alba, flava, nigraue ventrem sistant, consequens est. Verum an refinatum vinum idem efficiat, indagare opus habet: nam ut calefacit, ita concoctionem quoque adiuvat, ac proinde ventri non omnino inutile est, nisi quis refinatum vinum a resina lentiscina (quam mastichem appellant, quæ reliquis resinis præfertur, quod parum astringentis possideat, & stomachi ac ventris, hepatisque debilitati conducatur) dictum putet. Verum etsi resinatis vinis id concedamus, citra calumniam meraca omnia vina idem efficere difficile sit asserere: nam dulcia omnia, & quæ mista sunt, alio cienda idonea pronuntiamus: quare per meraca ea tantum intelligemus, quæ quum vinosa sint, consistentia etiam crassa sint; quæ videlicet calore suo humores cogant atque adassent.

## acetum.

ACIDA omnia, ut auctor est Galenus,

quum crassum succum in ventre innuerint, ipsum incidunt, ac deorsum subducunt; atque ob id, deiectiones humectant: quod si ventrem purum innuerint, ipsum magis sistunt.

## mulsum quod inferbuit.

PERIPHRASTICUS quod Græci ἐμφρακτὴρ, nos Sapam, mulsum quod inferbuit, vocat; idque ut defrutum a sapa distingueret. diximus autem XVIII. capite varietates tum mulsi, tum defrui componendi esse modos, atque pro decoctionis modo nomina immutari: ac rursum quoniam, ut precedente capite dictum est, decoctione mellis acrimonia dissipetur, consentaneum quoque est, mulsum quo magis inferbuit, eo sistende alio magis idoneum reddi, ac proinde sapam quum defrui magis decoquatur, efficacius quam defrutum ventrem cohibere.

## • passum.

PASSVM appellare solent, quod vuis sole siccatis in area aut in sarmento torrefactis exprimitur; quod sanè lentore quopiam ac crassitie obstruit.

## aqua vel tepida vel.

NESCIO quam appositè, aqua præfrigida tepidam opposuerit; neque enim hæc ventrem astringit, sed stomachi potius mollietur subuersiones, aut si id non efficiat, per alium citissimè labetur: quare, nisi quid obstat, tunc tepida in feruida commutari; idque ideo potissimum, quod antè inter stomachum roborantia, feruida ac frigidus tam cibos, quam potus posuerit; feruida enim non secus ac præfrigida, alium firmat atque obstitat. Pluviam autem aquam cur inter alias duram dixerit, demiror: nam Hippocrates, Galenus, Aëtius, & quotquot sunt classici scriptores, pluviam aquam lenissimam, & quæ citissimè mutetur, definierunt: quare quum facile mutetur, atque in bilem transeat, febribus ac reliquis huiusmodi affectibus non admodum convenire. Quo fit ut si rursum aliquid mihi condonetur, locum hunc ita immutandum censeam: aqua quæ vel feruida, vel præfrigida, dura, id



ra, id est ea quæ tardè putrescit, ideòque putrea potissimum: nam quantumcumque pluviani aspidionis quippiam habere concedimus, præsertim si ventrior sit, non ideò duram eandem dicere fas erit; qualis certè putrea si quæ alia est:

nam frigida terreæque est, difficulter exseritur, agrèque concoquitur, ideòque tardè putrescit. Dura autem, aspera, tostæ, macrag; cur huc referantur, non opus est rationem reddere, quum ex antedictis satis clarum sit.

## CAPVT XXXI.

*Quæ res urinam mouent.*

**U**RINAM autem mouent, quæcunque in horto nascentia boni odoris sunt, ut apium, ruta, anethum, ocymum, mentha, hyssopum, anisum, coriandrum, nasturtium, eruca, fœniculum. Præter hæc asparagus, capparis, nepeta, thymum, satureia, lapsana, pastinaca, magisque agrestis, radícula, siser, cepa. Ex venatione maximè lepus, vinum tenue, piper & rotundum & longum, sinapi, absinthium, nuclei pinci.

## ENARRATIO.

**Q**UÆ urinam mouent tam medicamenta quàm cibi, dicuntur à Græcis, Celius Methodicus affectatè mictualia vocat; suntq; omnia tenuium partium, & quod ad temperiem attinet, terij serè ordinis exiccantium & calefacientium: qua ratione Celsus noster si quæ in hortis nascantur, quæ boni odoris sunt atque aromatum quid spirant, in hoc albo locat: sunt autem talia, anisum, ruta, hyssopum, nasturtium, thymbra, capparis, thymum, nepeta, lapsana, radícula, pastinaca. verum efficiunt id alia aliter: siquidem sunt quæ per urinam humorem è thorace educant, quod sanè inter reliqua nuclei pinci virides, piper rutæque efficiunt. Alia rursus ab hepate educunt per urinas, ut est mentha, fœniculi & anisi semen; atque item alia à renibus eandem expellunt, ut apium, pastinaca, piper, vinum tenue: atque iterum sunt quæ à splene idem præstant, qualis est thymus, capparisque tum radix, tum fructus. Atque in summa sunt

quæ à toto corpore efficaciter id operantur, ut asparagus, basilicon, vinum tenue, salvia autem, erythrodanque radix urinam multam, pinguem, sanguinèque non asilem educere creduntur: orobisque sanguinem male olentem per urinam expurgare dicitur. Atque hæc hætenus: nunc quomodo hæc facultate prædita sint nonnulla, expendamus. Asparagus igitur abstersionem tantum citra manifestam aliquam caliditatem, aut frigiditatem lotium ciere dicitur. Ocymum autem (quod & basilicon dicitur) & fœniculum quum calefaciant modicè, excrementicia quædam humiditate quoque prædita sunt: quo fit ut non tam urina cienda, quàm lacti generando idonei sint. Coriannon verò aut coriandrum, temperie variè coalitum est, ac mixtum; est enim non copiose amaritudinis particeps, quæ in tenui simul ac terrestri parte fundatur, unde urinas mouere auctor noster docet: sed & aquose humiditatis tepida non parua ei inest, qua ratione lacti generando



generando & somno conciliando non omnino inutile est. Membram autem ideo provocare urinam dixerunt, quod sanguinem extenuet, atque serosum faciat, iecurque ab obstructione liberet. Ac quod sicca quam viridia, semen quam herba, agrestia quam domestica hortensiaque efficacius id præstant, clarum admodum est: nam exsiccata temperie calidiora, & sicciora redduntur, hortensiaque

agrestibus ferè humidiora sunt. Porro leporinae carnes Hippocrates siccare quidem atque sistere, sed loquum mouere docet. Piper quoque urinam mouere in confesso est: verum quod (ut Aristoteles vult) si largius sumatur, vesicam soluat; si parcius, alnum, non ita vulgatum. cuius si quis rationem desideret, problematum sectionem primam consulat.

## CAPVT XXXII.

*Quæ res somnum moucant, aut  
sensus excitent.*

SOMNO verò aptum est papauer, lactuca, maximeque æstiuæ, cuius cauliculus iam lacte repletus est, morum, porum. Sensus excitant nepeta, thymum, satureia, hyssopum, præcipueque pulegium, ruta, & cepa.

## ENARRATIO.

SOMNVS, Aristotele teste, est sentiendi quædam impotentia, ob alimenti vapores in cerebro refrigeratos, & internum calorem ad cor reuocari proueniens. Verum quamquam scire admodum somnum definiuerit Aristoteles, non tamen semper, ut innuere videntur, ex eadem causa pendet: siquidem contingit nonnunquam somnum irrepere ab intemperie frigida, aliàs ab humida; vti etiam nonnunquam ab utrisque simul mixtis: quo fit ut ea que somno conciliando idonea sint, temperie varient, hoc est aut frigida, aut humida aut utrisque qualitatibus simul commixtis, frigida simul sint & humida. Porro que somnum inducunt, duplicita sunt genere: nam sunt que æstiuæ & vernalis, tanquam stuporem quandam inferentia vocantur; atque hæc quidem si quando in usum veniunt, remediis rebellem frigiditatem relinquunt: quare non nisi in summis morbis ad ea confugiendum esse monet Galenus, ob deleteriam quandam facultatem.

Alia rursus sunt, que citra vllum periculum assumi possunt; qualia cori sunt, que temperamento sunt moderatè frigido & humido, inter que commendatur lactuca, maximeque æstiuæ, cuius cauliculus iam lacte impletus est: is enim succus quum frigidus & humidus sit, nequaquam vitiosus est, teste Galeno libro De alimentorum facultatibus, ubi plura ad hunc locum pertinentia scribit. Quod autem ad papauer attinet, quamquam candidi vel sauii papaueris semen totum in secunda mensa cum melle apud antiquos edi solitum tradiderit Plinius atque Galenus, panibus non secus ac sesamum vtiliter cum dulciarium inspergi, non libenter quotidianum eius usum edissero: nam propter nimiam quandam refrigerandi vim, non solum somniferum, sed & soporiferum quodammodo est: siquidem si liberalius edatur, soporem inducet, agrèque concoquetur. Nolim tamen inficias ire, citra omne discrimen calyculorum decoctum, & quæ ac seminis



albi (quod quoniam reliquis intus sit, Apuleius  
vfuale vocat) iis qui vigiliis vexantur ex-  
hiberi: quanquam id prius aut lactucis in  
cauliculis exurgentibus, aut moris, aut ce-  
rafis, aut corianni decocto, aut aliis, quæ  
moderatè frigida & humida sint, experiri  
malim: si tamen eius usus necessarius sit,  
preferendum nigro albo, quod videlicet  
illud frigidius sit. Atque hac hætenus. Ve-  
rum cur porrum, nil minus quam somnum  
promocans, adiecerit, nondum satis assequor:  
nam Dioscorides terrifica insomnia facere

auctor est. quo fit ut hic quoque mendam  
subesse arbitrer, substituentumque, pro porro,  
prunum facultatis frigida & humida, ut  
morum: aut aliqui inter ea quæ sensus ex-  
citant transponendum, statimque subiungend-  
um cepis, quibus facilitate ormino respon-  
det. Porro sensus excitant quæ somnificis  
contraria sunt, hoc est calida & sicca, atque  
ea quæ acrimonia quadam prædita sunt: de  
quibus quoniam, quod ad loci explanatio-  
nem attinet, in præcedentibus satis dictum,  
verbum non amplius addam.

## CAPUT XXXIII.

*Quæ res corpus aut erodant, aut reprimant; aut refrigerent,  
aut calefaciant; aut durent, aut emolliant.*

**E**VOCARE verò materiam multa admodum possunt. Sed  
ea quæ ex peregrinis medicamentis maximè constant,  
aliiq. magis quàm quibus ratione victus succurritur, opitulatur,  
in præsentia differam. Ponam ea verò, quæ prompta, & his  
morbis (de quibus protinus dicturus sum) apta corpus ero-  
dunt, & sic ex eo, quod mali est, extrahunt. Habent autem  
hanc facultatem semina erucæ, nasturtij, radiculæ, præcipuè  
tamen omnium sinapi. Salis quoque & \* fici eadem vis est.  
Leniter verò simul & reprimunt & molliunt lana succida  
\* ex aceto vel vino, cui oleum adiectum est, contritæ palmu-  
læ, furfures in salsa aqua, vel aceto decocti. At simul reprimunt,  
& refrigerant, herba muralis, parthenium vel perdicium  
appellant, serpyllum, pulegium, ocymum, herba sangui-  
nalis, quam Græci πολύχρονον vocant, portulaca, papaveris  
folia, capreoliq. vitium, coriandri folia, hyoscyamum,  
muscus, \* siser, apium solanum, quam σπύγγιον Græci vocant,  
brassicæ folia, intubus, plantago, fœniculi semen, contrita  
pira vel mala, præcipueque cydonia, lenticula, aqua frigida,  
maximeque pluuiialis, vinum, acetum, & ex horum aliquo  
magis, madens vel panis, vel farina, vel spongia, vel cinis, vel  
lana succida, vel etiam linteolum, creta cimolia, gypsum,  
melinum,

\* fici

\* vel aceto  
vel vino,  
quo oleum  
adi.

Herba sangui-  
nalis.

\* cicer,



melinum, myrteum, rosa, acerbum oleum, verbenarum confusa cum teneris caulibus folia, cuius generis sunt olea, cupressus, myrtus, lentiscus, tamaris, ligustrum, rosa, rubus, laurus, hederæ, punicum malum. Sine frigore autem reprimunt cocta mala cydonia, malicorium, aqua calida, in qua verbenæ coctæ sunt, quas suprà proposui, pulvis vel ex facce vini, vel ex myrti folijs, amaræ nuges. Calefacit verò ex qualibet farina cataplasma, siue ex tritici, siue ex farris, siue hordei, siue crui, vel lolij, vel milij, vel panici, vel lenticulæ vel fabæ, vel lupini, vel lini, vel fœni græci, ubi ea deferbuit, calidaque imposita est. Valentior tamen ad id omnis farina est ex mulso, quàm ex aqua cocta. Præterea cyprinum, irinum, medulla, adeps ex felle iuncta oleo, magisque si vetus est, sal, nitrum, git, piper, quinquefolium, fereque quæ vehementer & reprimunt, & refrigerant. Durant quæ calefaciunt & digerunt, & emolliunt. Præcipueque ad emolliendum potest cataplasma ex lini vel fœni græci semine. His autem omnibus & simplicibus & permixtis variè medici vtuntur, vt magis quid quisque persuaserit sibi appareat, quàm quid euidenter compererit.

## ENARRATIO.

**S**ICVTI medicina ratione & experientia, tanquam duabus manibus ad omnes actiones obeundas vtitur, ita ea bifariam censu in membra quadam diuiditur, in theoreticam videlicet, & practicam: theoretice quidem ea tractat quæ circa signa, causas, symptomataque versantur: atque huius partes ferè sunt *φυσιογνωσις*, in qua de hominis natura differitur; *αιτιολογια*, quæ ea quæ præter naturam sunt inquirunt; *προγνωστις*, prætorum cognitionem, præsentium inspectionem, & futurorum prædictiones continet: atque de his abunde dictum est in primis capitulis. Practica verò hæc quæ per rationem inuenta sunt, ac per usum ac experientiam comprobata sunt, nititur: atque hæc rursum trifariam distinguitur, in pharmaceuticam, diæticam, & chirurgicam seu manialem:

Pharmaceutice ferè priuatione eorum quæ ledunt atque abundant obitur: diæticæ autem tum morbo collapsas vires restituit, atque si quid desit restaurat, tum supernacua non raro demit. Chirurgia autem variis modis obitur: nam demit dum scalpello confusa vena sanguis emittitur, dum quod aut corruptum est, aut quod abundat resecamus, adurimus, aut alio quouis modo tollimus. Adhæc fluxus nimis reprimunt, ac dum res exigui obstipata foras euocat; præterea indurata molit, atque mollia durat: atque de hac potissimum medicina parte, licet breuiter & confuse admodum, auctor noster posset hoc secundi libri capite tractare decreuit: nam hæcenus, quum nimirum cuiusque rei proprietates expendere docui, de his tantum simplicibus quæ quotidianis nostris usibus



visita sese offerunt, & quæ vesca sunt, ser-  
monem fecit, ut ex iis distans, prout morbi  
ratio flagitare videbitur, egyptiis illis exatē  
prescribere posimus. Nunc verò quāquam  
simplicium quorundam quæ in iro tanquam  
cibos & medicamenta assumimus, mentio-  
nem quoque faciat, de iis tamen tantum in-  
telligendum, quæ foris applicita, eiusmodi  
energiam exhibent: bona etenim eorum pars  
quæ hic recensentur, ob insignem qualitatis  
alicuius intemperiem à natura abhorret (pe-  
regina ob id Celsus vocat) atque deleteriam  
quandam facultatem obtinet: quæ si intus  
sumantur, aut interficiunt, aut sensibilem  
aliquam noxam lesionemve inferunt; forin-  
secus autem imposita, aut infigidabunt mul-  
tum ac stupefacient, aut contra adurent ex-  
ulcerabuntque; atque alia reprimunt, rari-  
fisque alia, dum corpus erodunt, ex eo quod  
mali est attrahunt. Elicunt autem variis  
modis quod nocet corpore: nam sunt quæ  
id præsentem cutem tantum rarefaciendo, vasu-  
lisque oscula aperiendo; atque hæc mode-  
ratè & citra molestiam, calefaciunt. Alia  
item exulcerando in superficie; atque alia  
rursum dum vehementer calefaciunt, re-  
num quoque sunt partium, ut acra omnia;  
unde & erunt, corpus erodunt, & crustam  
inducunt, & foras euocant.

#### & fici eadem vis est.

SVCCO quàm scilicet maior vis inest,  
ac rursum fici arboris liquor, foliorumque  
ejus succus potèius digerit, ac discedit, quā-  
quam non negauerim, collas fici ritas illi-  
tasque, durities, discutere, parotidas ac su-  
runculos emollire, panis que maturare, ma-  
ximè inde, nigro ac calce additis. Succus ta-  
men ut efficacior est, ita non solum hæc præ-  
stat, sed & exulcerat corpora, & venarum  
ora aperit, mureccidatque eicit, ut auctor  
est Galenus. Plinius arboris succo etiam pro  
psilothro vitur.

#### Leniter verò simul.

QUÆ reprimunt, ex diametro cum iis  
pugnant quæ foras euocant, suntque magna  
ex parte astringenti vi prædita.

#### lana succida.

TONSVRÆ tempus (inquit Varro) in-  
ter æquinoctium vernū & solstitium, quum  
sudare inceperint omnes, est: à quo sudore  
recens lana totisa, succida est appellata. Porro  
hæc propter sordes & sudores (ita enim æsy-  
pum vocant) per se applicita, emollit; lota  
autem aut aceto intincta, minus molli, ve-  
hementiusque reprimat.

#### furfures in salsa aqua.

MALIM hic pro discurtina copulatim  
scribere, in hanc modum: furfures in  
aqua salsa & aceto decocti. ita enim  
oxycraton (postquam Latini dicunt) repercuti-  
forium, si quod aliud, intellexerit.

#### At simul, &c.

LOCVS hic usque adde senticosus  
ac spinosus est, ut vix multis exanatis la-  
toribus se erueret posset; atque hinc fit, ut  
dum substantia ac facultate plurimum di-  
stare quæ sub eodem genere statuit, videmus,  
caput hoc hinc inde tanquam ex varicolori-  
bus centonibus confartum esse suspicemur.  
Nam quis pulegium solano; quis papaveris  
folia, hysc amelis, lauro? quis portulacam  
atque hyoscyamum fœniculi semini, ocymo-  
rethē comparaverit? quis præterea vinum  
aceto recte contulerit? Scimunda igitur  
hic dixerò à frigidis ea quæ facultate calida  
sunt, qualia sunt serpillum, ocymum, sifer,  
apium, fœniculi semina, laurus: atque nisi  
quid obster, locum ita immiscuero: Salis  
quoque & fici eadem vis est. Item  
serpillum, pulegium, apium, bras-  
sicæ folia, ocymum, fœniculi semen,  
laurus. Leniter verò simul & reprimunt  
& molliunt, ligustrum, sifer,  
lana succida ex aceto vel vino, cui  
oleum adiectum est, contrita pal-  
mula, furfures in salsa aqua & aceto  
decocti, muscus, creta cimolia, he-  
dera, lenticula. At simul reprimunt  
& refrigerant herba muratis, (παρυσ-  
τος vel perdicium appellant) herba  
sanguinalis, quam Græci παλαιοί  
vocant, portulaca, papaveris folia,  
capreo-



capreoliq̃ue vitium, coriandri folia, hyoscyamon, folanum quam *εὐχνοῖ* Græci vocant, intubus, plantago, contrita pira vel mala, præcipueque cydonia, aqua frigida, maximeq̃ pluuiialis, vinū, aceturum, &c. atque hæc erit ita inuenterimus, dum singulorum temperiem ac facultates expendimus, paucis explicabimus.

### serpyllum, pulegium.

**PVLEGIUM** quum acre & subamarum sit, valde ium excafcacit, tum extenuat, ideoque in tertio ordine calidum, & siccum esse statuat. Galeus illitum rubescere, & si quis diutius tollerit, exulcerare: Dioscorides extenuare & concoquere auctor est. huic per omnia simile est serpyllum: nam acre admodum gustu est, atque ita calidum, ut menses & vrinam moueat. Dicit tamen forte quis, Celsus dum serpyllum inter reprimentia numerat, erroris occasionem dedisse, quod Dioscorides, Plinius, & Aëtius, male factum aceto ac decoctum, admixto rosaceo, phrenitis & lethargum patientibus summo pere congruere tradiderint; quasi verò id non efficiat discernenda magis quam reprimendo.

### ocymum.

**OCYVM** & sisarum utraque secundis ordinis excafcacientium sunt: in hoc tamen differunt; quod ocymum excrementitia cuiusdam humiditatis particeps sit; sisarum autem propter modicam siccitatem, astrictiorem quandam sortitum sit: unde & inter ea que leniter reprimunt & molliunt; ocymum verò quum foris illitum digeratur & concoquat, foras euocantibus adieciunt.

### coriandri folia.

**POTVISSEM** & hic quoque, idq̃ Galeni auctoritate, aliò transferre coriandri folia, nisi compertum nobis fuisset, antè ex Dioscoride, Celsum temperie frigidi coriannum definiuisse: quare quoniam ad loci huius planiorem intelligentiam plurimum fecerit Galenus, operaprecium erit ex septimo Simplicium libro, illius verba in medium

proferre: Coriannum, inquit, siue corion, aut vicinq̃ vocare lubet, vetustiores Græci coriannum nominabant: at recentiores omnes medici corion appellant; sicuti etiam Dioscorides, frigidam esse herbam ipsam diffinitans; sed perperam: siquidem ex contrariis facultatibus constat, & composita est, plurimum habens essentia amara, que tenuium est partium, & terrena, nec parum etiam aqueæ humiditatis obtinet, que tepentis est facultati: his adiunctum est astrictiōnis quoque pauxillum; ex quibus omnibus variè quidem agit ea que scribit Dioscorides, sed non tantum ex refrigeratione. Caterum ego cuiusque particulam actionis causam enarrabo: Primum ergò non Dioscorides tantum, sed & alij complures medicorum indeterminate de morbis pronunciant; sicut sanè in hac tempestate non paucos innenas medicos, vel insignes præter alios in hac re hallucinantes. Interdum enim atra, limida, frigidaque reddita parte qua erysipelas habuit, nec amplius refrigerantia poscente pharmaca, cœu antea, sed ea qua infixum parti præter naturam humorem eliciant; quidam tamen refrigerare persenerant, alij ad digerentia quidem transierunt: caterum ea erysipelas sanare dicunt; quanquam sciebant incipientibus etiamnum atque gliscentibus crescentibusque erysipelatis alia esse medicamenta, alia verò iam declinantibus, ac flacciscentibus, sed ita res non habet; neque enim erysipelas vocari debet posteaquam inflammationis eius & feruor ac biliosum illud abierint, neque qua facultate sunt frigida, neque que illa sanant, remedio esse putandum, sed veluti si vel in initio protinus aut percussis, aut alia de causa quauis tumor in parte quapiam aut limidus aut niger extiterit, eum esse frigidum affectum existimabis, & qua digerant excafcaciantq̃, poscere. Ad eundem opinor modum si calida affectio in frigidam reciderit, negligenda quidem prior est, sed secunda alio appellanda nomine; aut si displicet nominis mutatio, saltem (sicut quidam alij scribunt) principij, alia declinationis remedia; concedendumque sanè est, si cui ita placet, ut talis affectio etiam erysipelas



pelas vocetur; sed eam etiam calidam dicere, ubi iam refrigerata est, id verò nenti- quam concedendum. Itaque ne quod ei tunc auxilio est refrigeratorium esse credamus, sicut Dioscorides coriandrum, qui cum pane & polenta erysipelas curet illi: nam quod ad unguem est erysipelas, quod utique inflammatum est, & flauum, & biliosa fluxione infestatum, haud quaquam sanare queat coriandrum; sed illud quod refrigeratum est. Hucusque Galenus, copiose quidem multisque verbis coriandri facultates expendens, perperam à Dioscoride frigidum dictum continet, idque paulo post multo aperiuit, dum suo ipsius gladio Dioscoridem ingulat: Neque enim rhæadas seu strumas cum eregmo vel lomento discueret, si frigidum est: nam Dioscorides ipse sexcenta remedia rhæadas sanantia scripsit, quæ omnia tum temperie calida, tum actionibus digerentia confectus est.

### muscus.

MUSCVS vim habet astringentem in- nalidam, ut Galenus sexto Simplicium; quia nimirum nec multum frigidus est, sed proxime ferme mediis, unde & digerendi & emolliendi facultatis est particeps, maximeque is qui in cedrinis lignis reperitur. Huic, quod ad facultatem attinet, non ab- similis est creta cimolia; refrigerat enim ac digerit paululum. Hedera similiter ex contrariis composita est facultatibus: habet enim astringentis substantia quiddam, quæ terrena & frigida est; habet etiā nonnihil acris, quæ calida est, neque deest tertia, aqueam namque substantiam obtinet, præsertim si viridis sit; siquidem dum arefcit, hæc prima exhalet necesse est, manetque quæ terrea est & astringens, & ea quæ calida & acris. Succus autem & lachryma eius, ita caleat, ut inter psilothra numerentur. De lenticula autem satis dictum est: Polygonum, parthe- nium, vitium capreoli, papaveris folia, hyo- scyammum, solanum, plantago, acetum, aqua frigida, non ignaviter frigefaciunt & re- primunt.

### apium.

APIVM & feniculum calida usque adeo sunt, ut menses & urinam prono- ceant, flatibus quoque discutiendis apissima sunt, mammarumque durities emolliunt.

### brassicæ folia.

BRASSICA sine manducata, sine foris imposita desiccatur: unde reprimere quoque dixit, sed moderato suo calore discutit po- tius; nam cum feniculi farina podagricis & arthriticis medetur, atque eorum dolores mitigat, cum sale carbunculos rumpit. Ex- storum autem caulium brassica cinis desic- cans admodum est; adeo ut adurere quodam- modo videatur: quo fit ut si veterem adipem ei admiscueris, discussorium valde, ad quos- cunque etiam innumeratos dolores laterum, medicamen effeceris.

### vinum.

NON quoduis vinum, sed acerbum tantum, & anilernum reprimi: nam cali- dum alioqui, & quod tenuius est partium, resoluet potius atque digeret.

### ligustrum.

CYPRVS arbor, & ligustrum simi- les admodum & affines sunt; adeo ut qui- dam persuasum habeant, pro eodem sumi cyprum & ligustrum: quos doctissimus vir Franciscus Massarius Veneris conuincit. ve- rum, vni est, hoc est, sine eadem sine diuer- sa sit arbor, in hoc certe conveniunt, quod eiusdem sint facultatis, ac utriusque tum fo- lia, tum germina qualitatibus mista sint, & facultatis: habent enim quiddam digerens cum aquea substantia modice calida, ha- bentque etiam astringentium quiddam ex ter- rea substantia frigida: quo fit ut inter leui- ter reprimentia posuerim.

### laurus.

LAURI semen & folia quod calida sint, clarius est quam ut dici debeat: & quod emolliant, testis est Dioscorides; nam laurorum decoctum in muliebres infusus ad- diendum, vulvae & vesicæ viriis convenire testatur; & rursum medicamentis iis quæ

neruorum



neruorum lassitudines reprimunt (*ἀναγκάζουσι* vocant,) ac quæ calefaciendi ac discutiendi vi prædita sunt, commodè adhiberi: præstant autem hæc omnia efficacius semina quam folia.

### medulla, adeps.

NON tam calefaciunt quam molliunt, & leniunt; unde indurata corpora emolliunt, siue ligamenta, siue muscoli, siue tendines, siue viscera hoc modo fuerint affecta. Differunt tamen singula inter se prout magis, aut minus eas vires habent. Nam Aëtius cerninam medullam optimam esse testatur; deinde vitulinam; taurorum autem & hircorum acriorem magisque siccatoriam esse; & propterea durities in scirrhum duras dissolvere non posse.

fereque, quæ vehementer & reprimunt & refrigerant.

MIRVM prorsus est omnibus obuium usque adeo mendum hætenus à nullo animaduersum; nam quis, cui vel mica rationis supersit, verba quidem sibi constare, sensum vero propter malè distinctas periodos inuersum non videas? Neque enim quæ vehem-

enter reprimunt & refrigerant, calefacere dicere quisquam audeat; & rursum durare quæ calefaciunt & digerunt & molliunt. Quare immutatis paulum distinctionibus, & expuncta copulatiua & ante rō digerunt, sic legendum censeo: Fereq. quæ vehementer reprimunt, & refrigerant, durant; quæ calefaciunt, digerunt & molliunt. Reliqua quæ sequuntur, clariora sunt, quam ut longiore egeant enarratione; siquidem non erat nobis in animo, huic capiti tam diu inherere, nisi rationes aliquas addere decuisset, cur mutilum aliqui, aut inuersum caput, totum fere restituerimus, aut inuerterimus. quod sanè quæ potuimus fide & diligentia fecimus, non canillandi studio aut libidine aliqua incitati; sed quò antiquissimus auctor suo tandè nitore restitueretur, atq. à calumniis immunis redderetur; sperantes interim non defuturos, qui dum nostras hæc enarrationes legerint, simili planè studio ducti, hæc & reliqua quæ extant Celsi, ita cum nostris aliorumq. censuris expendent, ut integer tandem & ei qui iam circumfertur dissimilis planè in lucem prodeas.

1 2

AVRE



A VRELII  
CORNELII CELSI

DE

R E M E D I C A

LIBER TERTIVS,

A BALDVINO RONSSEO *Gandensi, medico,*  
*Enarrationibus illustratus.*

CAPVT I.

*De morborum generibus.*

\* Præuisis

**P**

ROVISIS omnibus, quæ pertinent ad vniuersa genera morborum, ad singulorum curationes veniam. Hos autem in duas species Græci diuiserunt, aliosque ex his acutos, alios longos esse dixerunt. Ideoque quoniam non semper eodem modo respondebant, eosdem alij inter acutos, alij inter longos retulerunt. Ex quo plura eorum genera esse manifestum est. Quidam enim breues \* vtique sunt, qui citò vel tollunt hominem, vel ipsi citò finiuntur. Quidam longi, sub quibus neque sanitas in propinquo, neque exitium est. Tertiumque genus eorum est, qui modò acuti, modò longi sunt. Idque non in febribus tantummodo, in quibus frequentissimum est, sed in alijs quoque fit. Atque etiam præter hos, quartum est, quod neq. acutum dici potest, quia non perimit: neque vtique longum, quia si occurritur, facillè sanatur. Ego cum de singulis dicam, cuius quisque generis sit, indicabo. Diuidam autem omnes in eos, qui in totis corporibus consistere videntur, & eos qui oriuntur in partibus. Incipiam à prioribus, pauca de omnibus præfatus. In nullo quidem morbo

\* acutique



morbo minus fortuna sibi vindicare, quam ars potest, ut po-  
 re cum repugnante natura, nihil medicina proficiat. Ma-  
 gis tamen ignoscendum medico est parum proficienti in acu-  
 tis morbis, quam in longis. Hic enim breue spatium est, in-  
 tra quod si quod auxilium non profuit ager, extinguatur.  
 Ibi & deliberationi & mutationi remedium tempus patet,  
 adeo ut raro, si inter initia medicus accessit, obsequens ager  
 sine illius vitio pereat. Longus tamen morbus cum penitus  
 infedit, quod ad difficultatem pertinet, acuto par est. Et acu-  
 tus quidem, quod vetustior est, longus autem quod recentior,  
 eo facilius curatur. Alterum illud ignorari non oportet, quod  
 non omnibus agris eadem auxilia conueniunt. Ex quo in-  
 cidit, ut alia atque alia summi auctores, quasi sola <sup>\* fortuna,</sup> vendica-  
 uerint, prout cuique cesserant. Oportet itaque ubi aliquid <sup>\* indicaue-  
 rint,</sup> non respondit, non tanti putare auctorem, quanti ægrum, &  
 experiri aliud atque aliud. Sic tamen, ut in acutis morbis ci-  
 to mutetur, quod nihil prodest: in longis, quos tempus ut  
 facit, sic etiam soluit, non statim condemnetur, si quid non  
 statim profuit. Minus vero remoueat, si quid paulum sal-  
 tem iuuat, quia profectus tempore expletur.

## BALDVINI RONSSEI.

## ENARRATIO.

QVÆ corpus nostrum alterare solent,  
 genere triplicia sunt: causa, morbus,  
 & quod ipsi sequitur symptoma seu ac-  
 cidens. Morbus quidem in acutos seu cele-  
 res, & tardos seu longos diuiditur; atque  
 hos quidem Græci ἀκρότης & χρόνιος,  
 illos ἀργός vocant. Diuturnus morbus est  
 omnis qui quadragesimum diem transcen-  
 dit: Acutus vero trifariam distinguitur;  
 aut enim talis simpliciter aut exquisitè existit  
 (Hippocrate sectione secunda Aphor. XXIII.  
 auctore) qui ad decimumquartum diem ex-  
 tenditur: est & alius non exquisitè talis,  
 qui ad vicesimum usque progreditur: est  
 etiam acutus ex mutatione vel decidentia,

qui in quadraginta diebus indicatur. Recen-  
 tiores in peracutos, quorum quartus est in-  
 dex; in peracutos simpliciter, quorum septimus;  
 & in peracutos ex degeneratione seu deci-  
 dentia, quos Hippocrates simpliciter acutos  
 vocat, quorum decimus quartus est index;  
 & in acutos simpliciter, quorum vigesimus  
 est indicatorius; & acutos ex decidentia, di-  
 stingere solent, qui, ut iam diximus, qua-  
 dragesimo die indicantur.

## Quidam enim breues.

ACUTVS morbus dictus est, quod motus  
 eius velox sit, & subito illi pericula adue-  
 niunt; neque enim recte acutus dici potest



(ut commenſo ſextio Prædiſtionum Gale-  
nũ) niſi adiuncta ſit magnitudo quedam  
ac febris continua.

### Tertiumque genus.

Hoc videlicet quod ex præteritis  
ſen decidentia fieri dixi, vix pote quod per  
imperfectam indicationem ab una ſpecie in  
aliam mutatur, ut ſi plenitudo in ſuppurati-  
onem, argina in empyema tranſeat.

### Atque etiam præter hoſ quartum eſt.

Hoc nimirum, quod neque ſenſitioni  
accidentium, neque continuam febrem con-  
iunctam habet: atque huiusmodi poſſimum  
eſt, quod quadrageſimo indicari diximus; id  
enim neque exquiſitè acutum, neque lon-  
gum dicere poſſis.

### In nullo quidem morbo.

PVLCHERRIME hoc demonſtrat  
Cælius Methodicus in præſatione rãv 26o  
rãv: Celeres, inquit, vel acuta paſſiones,  
etiam ſpontè ſolvantur; & nunc fortuna,  
nunc natura ſauente: quo ſit rãv ignari ho-  
mines elati, ſæpe medicos fugiant, quum hoſ  
prouentus incantationibus nonis aut liga-  
mentis adſcribant, aut fortune; quum quo-  
ties repentino aliquo nuncio lati aut terribi  
ægotantes, mutatione quadam corporis mor-  
bos excludunt, vel ea per intemperantiam  
gerunt, qua ratione occulta ſibi proſutura  
neſcientes, duce deſperatione committunt;  
ſunt de quodam elephanto qui per viſtus  
intemperantiam ſanitatem recuperavit, me-  
moriam prodidit Antonius Beniuennius.

### repugnante naturâ.

QVOD omnium quæ in humano cor-  
pore geruntur opifex ſit natura, auctor eſt  
Hippocrates, tum aliàs, in ſexto Epidemion,  
ubi naturam morborum curatricem defini-  
uit; quum non ſolum in ſanis, ſed & in  
ægris ſua ſponte, non ex intellectu motiones  
innenerit; ſponte enim in ægris non raro è  
natis ſanguinis profluuium, hæmorrhoidi-  
bus, aut aliunde, ſudoresque & alui proflu-  
uium molitur ad expellendas morborum reli-

quias; adeo rectè natura morum imitan-  
dum in Aphoriſmũ idem præcipit: nam quò  
natura fert, inquit, per loca maximè conue-  
nientia, ed ducere conuenit.

### Magis tamen.

HIPPOCRATES in Aphoriſmũ, Acu-  
torum morborum non omnino certa ſunt  
prænuſiationes ſalutis aut mortis; per paro-  
xyſmorum enim vehementiam, continuam-  
que inſultum ac breuitatem temporis, medico  
vix ſpatium temporis relinquunt ut morum  
nature adiunget.

### Longus tamen morbus.

MORBI longitudine vires non ſolum  
conuelluntur atque proſternuntur; ſed &  
non raro totius corporis habitus corrumpi-  
tur: unde ſit ut vires debiliores, quàm ut  
increſcentem adhuc longumque morbum ferre  
poſſint, non minus periculum ægro porten-  
dant, quàm ſi acutiſſimo prehenderetur  
morbo; adeo malum eſt morbum aliquem  
radices fixiſſe, atque ſolidas corporis par-  
ticulas occupari, ſicuti in maraſmode indies  
videmus.

### Alterum illud.

QVEMADMODVM omnes omnibus  
corporibus, ætatibus atque virique ſexui com-  
munes ſunt morbi; ita varia eaque diuerſa,  
pro ætate, ſexu ac temperiei diſcrimine me-  
dicamenta expoſcunt: aliud ſiquidem ſenex,  
aliud iuuenis, aliud vir, aliud mulier, aliud  
ſanguineus, ac rursus, ab hoc diuerſum reme-  
dium phlegmaticus poſtulat: ac proinde quot  
ſunt temperaturarum diſſerentia, tot oportet  
eſſe morborum diuerſa auxilia.

### Oportet itaque.

OMNIA, inquit Hippocrates, ſecun-  
dum rationem facienti, ſi non ſecundum ra-  
tionem ſuccedant, non tranſcendum ad alia  
ſtante eo quod prius fuit: ſit enim nonnun-  
quam, ut in commenſo eiſdem aphoriſmi  
Galenus ait, ut morbi aliqui adeo perſina-  
ces atque rebelles ſint, ut non niſi tempore  
medicamentis cedant; ſicuti gutta cadens la-  
pidem canat ſæpe cadendo: atque in iis qui-  
dem non



dem non statim, si non ex sententia; res cedat, medicamentum immutandum est, sed perseverandum; dum sensibile aliquod lenamen consequatur: si tamen experientia doceat, quæ præter rationem sunt adhibenda, neque emolumentum quicquam consequamur, satius est rationem ducem sequi, neque tantum facere auctorem quam rationem.

Sic tamen ut in acutis.

ACUTI morbi quum veloces admodum

## CAPUT II.

*Quomodo morbi cognoscantur, et an incregant, an consistant, an minuantur: Et qua ratione ab initio, qui languere incipit, curari debeat.*

**P**ROPTINVS: autem inter initia scire facile est quis acutus morbus, quis longus sit: non in his solis in quibus semper ita se habet, sed in his quoque in quibus variat. Nam ubi sine intermissionibus \*accessiones & dolores graues vrgent, acutus morbus est. Vbi lenti dolores, lentæve febres sunt, & spatia inter accessiones porriguntur, acceduntque ea signa, quæ in priore volumine exposita sunt, longum hunc futurum esse manifestum est. Videndum etiam est, morbus an incregcat, an consistat, an minuat, quia quædam remedia incregentibus morbis plura inclinantibus conueniunt. Ea que quæ \*decregentibus apta sunt, ubi acutus incregcat vrget, in remissionibus potius experienda sunt. Incregit autem morbus, dum grauiore dolores accessionesque veniunt, hæque & ante quam proximæ reuertuntur, & postea desinunt. Atque in longis quoque morbis etiam tales notas non habentibus, scire licet incregcare, si somnus incertus est, si deterior concoctio, si \*fædiores deiectiones, si tardior sensus, si pigrior mens, si percurrit corpus frigus aut calor, si idem magis pallet. Ea verò \*quàm contraria his sunt, decedentis eius notæ sunt. Præter hæc in acutis morbis seriùs æger alendus est, nec nisi iam inclinatis, ut primò dempta materia impetum frangat.

\*accessionum dolore graui vrgentur,

\*cregentibus

\*fætidiores

\*quæ



\* aduen-  
turi  
\* At  
\* moliri,  
per quam

frangat. In longis maturius, ut sustinere spatium \* affecturi mali possit. \* Ac si quando is non in toto corpore, sed in parte est, magis tamen ad rem pertinet vinum totius corporis \* moliri, quam propriæ partes ægræ sanentur. Multum etiam interest, ab initio quis rectè curatus sit, an perperam, quia curatio minus his prodest, in quibus assidue frustra fuit. Si quis temere habitus, adhuc integris viribus viuit, ad mora curatione momento restituitur. Sed cum ab his coeperim, quæ notas quasdam futuræ aduersæ valetudinis exhibent, curationum quoque principium ab animaduersione eiusdem temporis faciam. Igitur si quid ex his quæ proposita sunt, incidit, omnium optima sunt, quies, & abstinentia. Si quid bibendum, aqua. Idque interdum vno die fieri satis est. Interdum, si terrentia manent, biduo: proximeque abstinentiam sumendus est cibus exiguus, bibenda aqua, postera die etiam vinum, deinde inuicem alternis diebus, modò aqua, modò vinum, donec omnis causa metus finiatur. Per hæc enim sæpe instans grauis morbus discutitur. Plurimique falluntur, dum se primo disprotinus sublaturus languorem, aut exercitatione, aut balneo, aut coacta deiectione, aut vomitu, aut sudationibus, aut vino sperant. Non quò non interdum id incidat, aut non decipiat, sed quò sæpius fallat, solaque abstinentia sine vllò periculo medeatur. Cum præsertim etiam pro modo terroris moderari liceat, & si leuiora indicia fuerint, satis sit à vino tantum abstinere: quod subtrahendum, plus quam si cibo aliquid dematur, adiuvat: si paulò grauiora, facile sit, non aquam tantum bibere, sed etiam cibo carnem subtrahere. Interdum panis quoque minus quam pro consuetudine assumere, humidoque cibo esse contentum, & olere potissimum. Satisque sit tum ex toto à cibo, à vino, ab omni motu corporis abstinere, cum vehementes notæ terruerunt. Neque dubium est quin vix quisquam, qui non dissimulauit, sed per hæc maturè morbo occurrit, ægroret.

\* deinceps  
fiat,

ENAR-



## ENARRATIO.

**A**CVTORVM morborum natura est (ut libro De ratione victus in morbis acutis auctor est Hippocrates) ut febres continuas coniunctas habeant: quare quum & propter casum vehementiam, & morbi magnitudinem ad vigorem celerimè properent, cuius facile est longos ab acutis morbis discernere.

## Videndum etiam est.

**G**ALENVS De præstantissima medicorum secta ostendit, quomodo morborum tempora indicantur, certo causa motu (sunt autem ea quatuor numero, principium, augmentum, status & declinatio:) ac proinde si motus, qui prius in nobis non erat, moveri incipit, & constitutus iam molestat, huiusmodi motum principium vocat; si autem magis procedat motus is, incrementum; si statim incrementum acceperit, vigorem nominat; atque si motus imminuat, declinationem. Horum autem temporum maxima habenda est ratio, quod sine horum cognitione nemo ægrum rectè aut cibaverit aut enacuravit. Nam in principis dum adhuc constant vires, si quid monendum videtur, monere expedit, iuxta Hippocratis sententiam: in vigore contra fractis consumptisque insultum vehementia viribus, quiescendum est.

## Atque in longis quoque morbis.

**L**ONGI morbi non secus ac acuti tempora habent; qua tamen non tam facile deprehendi possunt, quum neque in his gravitas doloris aut paroxysmorum percipi possit, & sola concoctione diiudicari queant: nam quum viscerum mortuus est, adhuc augetur; quod ab excrementis peritus medicus facile predixerit: quumque & reliqua quæ hic Celsus adiungit, ad temporum cognitionem non parum momenti attulerint. si quis autem generalium morbi temporum pleniorum cognitionem desideret, Galenū De crisi-

tus, & qui hunc sequitur De generalibus morborum temporibus consular.

## Præter hæc in acutis morbis.

**A**CVTVS morbus, inquit Hippocrates, statim extremos habet labores, & extremè tenuissimo victu vivendum est; ubi verò non, sed pleniorum victum contingit adhibere, tantum cibi indulgendum est, quantum morbis extremis fuerit mollior. considerandum tamen est, an æger ad vigorem usque morbi perducere possit cum victu quem præscripsisti, & numquid ille prius deficiat, & cum illo victu durare queat; aut morbus antea deficiat aut retardetur. Nam hic quoque, ut in aliis omnibus, dandum aliquid consuetudini, tempori & ætati est. In genere tamen quo peracutior fuerit morbus, & celerius ad vigorem pervenerit, eo tenuiorem victum flagitat. Sed nec in vigore ipso quicquam dandum est; præstat enim naturam permittere, ut vacet circa morbi concoctionem, quam eundem anocare ad conficiendos cibos.

## In longis maturius.

**I**N longis morbis non sunt inedia aut tenui aliqui victu laceffende ægri vires; quando inter reliqua harum præcipue sit habenda ratio: tantum igitur cibi hic indulgendum est, quantum & natura circa molestiam concoquat, & virium robur efflagitet: nam alioqui inedia præstare vires morbi longitudini omnino non sufficerent.

## At si quando is non in toto.

**V**ITPVTA si phlegmon alicuius partis sit; exempli gratia pleuræ, aut lateris: hic satius erit totum corpus molliori tenui victus ratione, quàm acutus quoque sit morbus, quam propria partes ægrè, hoc est, difficulter sanentur; frustra enim sanguinis missionem, frustra localia adhibueris, nisi adsit debita vitæ ratio.

m

Igitur



Igitur si quid ex his  
quæ propolita.

QUIES quidam quia concoquit & humectat : nam, ut in Epidemius Hippocrates, somnus & quies concoquunt, atque aded materiam caloremque febrilem dissolunt. inedia ; quia si quid abundat demit : quam tamen, uti dictum est, pro tempore variare convenit.

si quid bibendum  
est, aqua.

VIDETUR hunc & precedentem paragraphum, de acutis morbis intellexisse, qui ut originem sortiuntur calorem non naturalem, ita quietem quam maximè desiderant & abstinentiam, hoc est tenuem dietam, quæ humida simul sit & frigida. atque hac quoque ratione nunc frigidam commendat, quod nimium inflammationi aduersetur, cui postmodum, hoc est alternis, aut tertio quoque die vinum subiungendum dicit, quod putredinem discutiat ; ut in primum Celsus annotavit mihi numquam nisi honoris titulo nominandus D. Hieremias Drincus Brachelius.

solaque abstinentia.

PRÆCEDENTE libro, capite De abstinentia, ex decimo Methodi Galeni libro retulimus esse morbos, qui nihil minus quam inediam flagrant : atque hi quidem quales sunt, secundo huius capitis §. dictum est ; nam reliquis ut non aliena est abstinentia, ita plurimum emolumenti citra ullam noxam affert. Considerandum tamen est quantum à naturali temperie recesserit corpus, atque si multum ab eadem declinet, maiori videntur abstinentia, ut ad pristinam constitutionem redeat, si parum vixit aut alterius diei abstinentia suffecerit.

humidoque cibo esse  
contentum.

CIBVS humidus à natura facillimè alterari & distribui potest : quare cum secundæ sectionis Aphorismo xi. iis qui celeri resolutione opus habent, accommodissimum scribit Hippocrates : Facilius, inquit, est refici potum quam cibo ; ac proinde qui in genere parum nutritivum, radices oleum quæ edimus, atque aded olera ipsa posuerimus, consequens est oluscula crinscunque generis sub tenui victu comprehendere.

### CAPVT III.

#### De Februm generibus.

ATQUE hæc quidem sanis facienda sunt, tantum causam metuentibus. sequitur verò curatio februm, quod & in toto corpore, & vulgare maximè morbi genus est. Ex his una quotidiana, altera tertiana, altera quartana est. Interdum etiam longiore circuitu quædam redeunt, sed id raro evenit. In prioribus & morbi sunt, & medicina. At quartanæ quidem simplices sunt. Incipiunt fere ab horrore, deinde calor erumpit, finitaque febre biduum integrum est, ita quarto die reuertitur. Tertianarum verò duo genera sunt. Alterum eodem modo quo quartana & incipiens & desinens, illo tantum interposito discrimine, quod unum diem præstat integrum, tertio redit. Alterum longè perniciosius, quod



quod tertio quidem die reuertitur, ex octo autem & quadraginta horis, tere sex & triginta per accessionem occupat, interdum etiam vel minus vel plus, neque ex toto in remissione desistit, sed tantum leuius est. Id genus plerique medici hemitritæon appellant. Quotidianæ verò variæ sunt, & multiplices. Aliæ enim protinus à calore incipiunt, aliæ à frigore, aliæ ab horrore. Frigus voco, vbi extremæ partes membrorum inalgescunt: horrorem, vbi totum corpus intremat. Rursus aliæ sic desinunt, vt ex toto sequatur integritas: aliæ sic, vt aliquantum quidem minuatur ex febre, nihilominus tamen quædam reliquæ remaneant, donec altera accessio accedat, ac sæpe aliæ vix quicquam, aut nihil remittant, sed ita vt continuent. Deinde aliæ feruorem ingentem habent, aliæ tolerabilem, aliæ quotidie pares sunt, aliæ impares, atque inuicem altero die leniores, altero vehementiores, aliæ tempore eodem postridie reuertuntur, aliæ vel seriùs vel celerius, aliæ diem noctemque accessionem & decessionem implent, aliæ minus, aliæ plus, aliæ cum decedunt sudorem mouent, aliæ non mouent: atque aliàs per sudorem ad integritatem venit, aliàs corpus tantum imbecillius redditur. Accessiones etiam, modò singulæ singulis diebus fiunt, modò binæ, pluresve concurrunt. Ex quo sæpe euenit, vt quotidie plures accessiones, remissionesque sint. Sic tamen vt vnaquæque alicui priori respondeat. Interdum verò accessiones quoque confunduntur, sic vt notari neque tempora earum, neque spatia possint. Neque verum est, quod dicitur à quibusdam, nullam febrem inordinatam esse, nisi aut ex vomica, aut ex inflammatione, aut ex vlcere. Facilius enim semper curatio foret, si hoc verum esset. Sed quod euidentes causæ faciunt, facere etiam abditæ possunt. Neque de re, sed de verbo controuersiam mouent, qui cum aliter aliterque in eodem morbo febres accedant, non easdem inordinatè redire, sed alias, aliasque subinde oriri dicunt. Quod tamen ad curandi rationem nihil pertineret, etiam si verè diceretur. Tempora quoque remissionum modò libera, modò vix vlla sunt.

Frigus.

Horror.

libera



## ENARRATIO.

**F**EBRIS est calor præter naturam; aliàs quidem manu mordax, aliàs mitis; aliàs non mordax, sed increescens, ut cap. I. De diff. feb. disputat Galenus. Atque hic quidem calor aliàs ex alio incipit; aliàs enim spiritus, aliàs humores, aliàs solidas particulas accendit, quæ Hippocrates continentia, contenta & impetum facientia vocare solet: ac prout hoc vel illud occupauerit, varia sortitur nomina: nam quæ spiritibus accensis oritur febris, diaria vocatur; quæ solidis particulis incensis, hectica; quæ humores occupat febrilis calor, putridas gignit, varias quidem variisque paroxysmis pro humoris peccantis differentia discrepantes: sunt enim quæ quotidie, quotidianas; sunt quæ de tertio in tertium, tertianas nominamus; atque rursus sunt quæ de quarto in quartum accessiones suas faciant, quarternas vocat; quibus tardius moventur quæ de quinto in quintum, de sexto in sextum, & de septimo in septimum accessiones suas faciunt, quintana, sextana ac septimana ob id appellata. Præter has etiam sunt nonnullæ continentes dictæ, quod citra ullam remissionem corpus affligant.

## Interdum etiam longiore circuitu.

**ACCESSIONVM** periodi raro ultra quartanam extenduntur; quare Celsus raro id enenire rectè asserit: nam & Galenus nullam se ultra quartanā quæ certam periodon seruaret, ait vidisse accessionem. Alexander tamen Aphrodisens secundo libro Problematum una cum Hippocrate, quintanam, sextanam & nonnam ponit, ac intervalla hæc periodorum fieri asserit pro materia peccantis quantitate. Dicit autem: Quo minus materia subest, eo lentius redit accessio; quæ ratione quintana, sextana & nonana fieri potest, pro materia vitiosa quantitate. ita enim à natura comparatum est; ut sanguis, qui nostra aleret corpora, esset largior, continuūque putrescens suc-

cenderet febrem: secundum verò locum pituita obtinet, nam & hæc corpus alere potest: bilis verò staua tertium occupat, quoniam ob sui acrimoniam nihil alimenti præstat. At atra bilis fortis est postrema, natura infesta, quæ membra exedit & interimit. Hæc ille, quæ si ita sunt, inter omnes periculi maximè exors erit nonana, ut quæ à paucissima materia originem trahat, & quæ uberrimum, corpus & vires reficiendi tempus concedat. adde quod & eadem ratione inter reliquas à melancholia originem trahentes, breuissima erit; citius enim atque facilius discentiunt, atque enincetur à natura pauca quàm copiosa materia. hanc ordine sequetur septana; deinde quintana, atque ita quartana simplex dicta: in eo enim omnes conueniunt, quod duplex magna ex parte longior sit & periculosior; continua etiam non raro morifera. Hippocrates tamen in Epidemias septanam atque nonnam reliquis longiores esse asserit; at quintanam omnium periculosissimam: etenim & ante tabem, & iam tabidis superueniens, inquit, interimit: quod quous etiam feltes facient, quando calore febrili, si quid superest humidi illius innati, exigitur, vale mortem in tabidis accelerari necesse est. Si cui tamen Hippocratis auctoritatem hic tueri in animo sit, velim aliam quàm Aphrodisens statui intervalli periodorum in febris causam in medium producat. Nam quas ex Auicenna in medium asserit Michael Sannarola si recipiamus, eam quæ per longissima intervalla periodos facit, reliquis periculosiorem fateamur necesse est; quando ea ex phlegmate vitreo adusto melancholia mixto originem suam ducat, huic quamproximè accedere, quæ de septimo in septimum, ut quæ puritate salta atra bili commixta ortu suum tribuat; atque hæc rursus contra mentem Hippocratis minus periculosam quæ de quinto in quintam accessiones facit, ut quæ ex melancholia phlegmati naturali commixta fiat.

At quar-



### At quartanæ quidem simpliciores.

SIMPLICIORES vocat quartanas non minus mixtas, sed mitiores, atque ita passim apud Hippocratem accipi auctor est Galenus: ac quod quartana omnium lenissima, ac minimè mortifera sit, docet idem senex; siquidē 1. De morbis vulgaribus, At verò, inquit, omnium est quartana securissima, facillima, longissima; hæc enim non est ipsa quidem per se tantum talis, sed etiam à magnis aliis vindicat morbis: nam & comitiales morbos à quartana diu infestante discussos auctor est Galenus.

### Incipiunt ferè ab horrore.

SECUNDO De differentiis febrium Galenus, Quartanis, inquit, accidit rigor, qualis potissimè in forti frigore refrigeratis, non qualis interdum per astum aut lassitudinem, vel medicamentum calidum ac mordax ulceri adhibiturum.

### Tertianarum verò duo genera sunt.

BILIS quum extra venas putruerit, atque id quod putruit, resoluitur, priusquam alia portio putruerit, oritur tertiana intermittens, sic dicta, quod ad infebrecitationem perveniat; atque hæc quartana modo, statis circuitibus, quanquam brevioribus, hoc est de tertio in tertium accessiones suas facit. Contra si intra venas bilis putruerit, singulae ex venæ à corde remotæ, continua tertiana agnoscitur, quæ cum tertio quoque die exacerbetur, ad perfectam tamen infebrecitationem non pervenit.

### Alterum longè perniciosius.

QUÆ ex continua quotidiana & tertiana intermittente fit, semiteriana vocatur; quod videlicet utriusque febris symptomatum particeps sit: nam sicuti tertiana cum rigore, quotidiana cum frigore, ut docet Galenus, innadit; ita hemiterianus seu semiteriana cum horrore (qui in medio utrius-

que, rigoris dico & frigoris, consistit) magna ex parte incipit. quare an rectè tertiana ascripserit, penes alios iudicium esto: ego cerè neque Hippocratem neque Galenum, neque quemvis alium id fecisse memini; quum nō simplicem aliquam sed compositam febrem semiterianam definiant. Ac proinde quod dicit triginta sex tantum horis occupare per accessionem, id quoque à natura semiteriane (quam Hippocrates in genere nonintermittentium, atque earum potissimum quæ perniciosissima sunt constituit) alienissimum est. Nam quantumvis uno die leniores sunt, altero iterum gravius invadentes; omnino tamen non intermittunt, quod altero die duæ simul febres corpus occupent, altero unica, quotidiana videlicet continua, cuius ea natura est, ut nunquam intermittat, aut quietem aliquam febre vacantem admittat.

### Quotidianæ verò variae sunt.

VIDETUR hic Celsus tertianas quartanasque duplices cum quotidianis confudisse, aut alioqui quotidianas pro continuis dixisse; neque enim ea est varietas quotidianarum: siquidem omnes hand quaquam cum rigore primo statim die invadunt, sed temporis spatio, persfrictione magis quam rigore moleste sunt, sensumque frigiditatis calor mitis subsequitur, propter putritiam. Quanquam si quis hic lipyrias, epialasque febres comprehensas velit, per me integrum est; ut quotidianas cum frigore, epialam cum calore, lipyriamque cum horrore invadere dicamus: nam sicuti in hac interiora calent, exterioraque frigent; ita in illa viscera, excepto corde, frigent, exterioraque calent; ac proinde in utrisque simul calor & frigus sentitur.

### Frigus voco, ubi extremæ.

MORBIDVM horrorem atque rigorem vocat Galenus, quum à nulla exteriori causa violenta corpus, sed ex sese, talem habet dispositionem: est autem rigor nativi caloris affectus: solent autem Græci tribus gradibus febrium frigora dimetiri; quorum extremum,



irenum, vigorem; medium, ut diximus, horrorem; ac mitissimum, frigus appellare solent. Celsus suo more hic ut in alius vigorem cum horrore confundit.

### Rursus alia sic desinunt.

QUOTIDIANÆ non minus quam tertiana aut quartana in intermittentes & continuas dividuntur: intermittentium quidem paroxysmus horarum octodecim, quies sex tantum, atque ea quidem talis est, ut non ex toto remissionem, aut in febri itationem sentiat eger, quum semper fiat humorum evaporatio à materia crassa. Sunt tamen alia ex genere intermittentium; quæ quum tenuiorem pituitam, & quæ à natura facilius evinci possunt, mali originem faciant, breviores simul & minores paroxysmos fortiantur, quæ etiam corpori salutem quietem concedunt, ut ex toto subsequatur integritas. Continua verò quum continuas ingessæque accessiones faciant, nihil prorsus remittunt, neque quietem aliquam corpori admittunt.

### Deinde alia feruorem.

VIDETUR Celsus febrium hanc differentiam ex Epidemion sexti Aphor. XXVIII. sumpsisse, ubi sic Hippocrates: Febrim hæc quidem manu mordaces, illa verò mites, quædam verò non mordaces, sed incrementes; alia acuta, verum ab ipsa manu denitæ; nonnulla confestim exardentes, quædam semper debiles atque sicca, cui per omnia respondet Celsus, nisi quod τὸ ἀγνὸν ad febriles paroxysmos potius, quam calorem retinuisse videatur: nam ideo τοῦτο πρὶν πυρεθὺς ἀγνὸν vocat Hippocrates hoc loci, quod velocem ac citò deficientem calorem habent, haud aliter quam acutos morbos nominare solemus, qui citò ad statum pertingunt. Reliqua quoque quæ ad paroxysmos Cornelius noster retulit, Hippocrates ad febrilem calorem tanquam febris substantiam accommodavit.

### alia quotidie pares sunt.

DISPESCIT singulas febrium differentias; siquidem alia alias innadunt, sunt enim

quæ spiritibus, sunt quæ humoribus, sunt quæ solidis particulis accessis fiant: accidunt porro in se invicem differentes febriles accessiones pro materia differentia in qua calor febrilis accenditur: nam si spiritus occupavit, diariam oriri certum est; si solidas corporis partes, hecticam aut miasmaticam; si humores, putridam consequi ratio dicitur, atque hæc quidem pro humoris peccantis differentia varias facit accessiones.

### alia quum discedunt, sudorem movent.

FEBRES omnes nisi in longius producantur tempus, quadisariam indicantur: aut enim per vomitum, aut sanguinis fluxum è naribus, aut alinde, aut per alii fluorem, vel sudores finiuntur: nam alioqui in abscessus terminantur, ut memoria prodidit Hippocrates. Cæterum quæ sudorem movent febres ferè mitiores sunt, neque tactu mordaces, ut ait Hippocrates, sed quæ idem in Epidemion τὸ πρῶτον, hoc est ad manum humiditas appellat.

### Accessiones etiam.

QVALES sunt ea quæ semitertianas vocamus, aut planetes erraticæ febres; cuiusmodi in mulieribus suppressis mensibus contingere solent.

### Sed quod evidentes.

CAUSARUM duo sunt genera, τὰ ἐξ ἑαυτῶν quam & τὰ ἐκ τῶν ἄλλων, Latini extrinsecus advenientem extrinsecus vocant; idque non quod perpetuò extra corpus sit, sed quod à rebus externis, hoc est à substantia corporis diversa proveniat, aut quod ab anima quæ alia est à corpore oriatur. Celsus evidentem vocat, quod quibusvis etiam plebeis, non solum medicis, perspecta sit: hæc medicorum vulgus primitivam vocat. Abditam seu internam, præcedentisve causæ Græci τὰ ἐκ τῶν ἑαυτῶν dicta, sic appellantur quod in animantis consistunt corpore; hæc non solum in principio morbos gignunt, sed & eos iam factos augent atque conservant: nam, ut Galenus in libello adversus Iulianum,



nunt, augmentum morborum à precedentibus sit causis; qua enim omnino post generationem morborum inceptum, eas augere eosdem quoad simile quid effecerint necesse est. adeo rectè à Celsò dictum est, abditas causas idem facere posse quod euidentibus.

## CAPVT IIII.

*De curationum diuersis generibus.*

ET febrium quidem ratio maximè talis est. Curationum verò diuersa genera sunt, prout auctores aliqui habent. Asclepiades officium esse medici dicit, vt tutò, vt celeriter, vt iucundè curet. Id notum est, sed ferè periculosa esse nimia, & festinatio & voluptas solet. Qua verò moderatione vtendum sit, vt quantum fieri potest, omnia ista contingant, prima semper habita salute in ipsis partibus curationum considerandum erit. Et ante omnia quaeritur, primis diebus æger qua ratione continendus sit. Antiqui medicamentis quibusdam datis concoctionem moliebantur, cò quòd cruditatem maximè horrebant: deinde eam materiam, quæ lædere videbatur, ducendo sæpius aluum subtrahebant. Asclepiades medicamenta sustulit, aluum non tories, sed ferè tamen in omni morbo subduxit. Febre verò ipsa præcipuè se ad eius remedium vt professus est. Conuellendas enim vires ægri putauit, luce, vigilia, siti ingenti: sic, vt ne os quidem primis diebus elui sineret. Quo magis falluntur, qui per omnia iucundam eius disciplinam esse contendunt. His enim vltioribus quidem diebus cubantis etiam luxuriæ subscripsit: primis verò tortoris vicem exhibuit. Ego autem medicamentorum dari potiones, & aluum duci non nisi rarò debere, concedo. Et id non ideo tamen agendum, vt ægri vires conuellantur, existimo: quoniam ex imbecillitate summum periculum est. Minui ergo tantam materiam superantem oportet, quæ naturaliter digeritur, vbi nihil noui accedit. Itaque abstinendus à cibo primis diebus est, in luce habendus æger, nisi infirmus interdiu est, quoniam corpus ista quoque digerit, isque cubare quàm maximo conclauì debet. Quod ad sitim verò somnumque pertinet, moderandum est, vt interdiu.

\* In febre  
eo reme-  
dio vii

\* Et is e-  
nim

\* & ex

\* detraha-  
tur,



\* q. d. ci-  
buni  
al. quat-  
tum diem  
cibo.

\* imbecil-  
lum  
\* fami pro-  
dat.

\* demere-  
tur:

diu vigilet: noctu, si potest, conquiescat: ac neque potet, ne-  
que nimium siti crucietur. Os etiam eius elui potest, vbi &  
siccum est, & ipsi foetet, quamuis id tempus aptum potioni  
non est. Commodeque Erasistratus dixit, saepe inferiore par-  
te humorem non requirente, os & fauces requirere, neque ad  
rem male haberi agrum pertinere. Ac primò quidem sic  
tenendus est. Optimum verò medicamentum est, opportu-  
nè cibus datus, qui quando primùm dari debeat, quæritur.  
Plerique ex antiquis tarde dabant, saepe quinto die, saepe se-  
xto, & id fortasse vel in Asia, vel in Aegypto cæli ratio pati-  
tur. Asclepiades vbi agrum triduo per omnia fatigârat, \* quar-  
to die cibo destinabat. At Themison nuper, non quando  
cœpisset febris, sed quando desisset, aut certè leuata esset,  
considerabat, & ab illo tempore expectato die tertio, si non  
accefferat febris, statim: si accefferat, vbi ea vel desierat, vel, si  
assiduè inhærebat, si certè se inclinauerat, cibum dabat. Ni-  
hil autem horum vtrique perpetuum est. Nam potest primo  
die primus cibus dandus esse, potest secundo, potest tertio,  
potest non nisi quarto, aut quinto, potest post vnam accessio-  
nem, potest post duas, potest post plures. Refert enim qua-  
lis morbus sit, quale corpus, quale cælum, quæ ætas, quod  
tempus anni. Minimeque in rebus multum inter se diffe-  
rentibus, quod intermittendum non est, perpetuum esse præ-  
ceptum temporis potest. In morbo qui plus virium aufert,  
celerius cibus dandus est, itemque eo cælo quo magis digerit.  
Ob quam causam in Aphrica nullo die æger abstinere rectè  
videtur. Maturius etiam puero, quàm iuueni; ætate, quàm  
hyeme dari debet. Vnum illud & semper & vbiq; seruan-  
dum est, vt ægri vires subinde assidens medicus inspicat, &  
quamdiu supererunt, abstinentia pugnet: si imbecillitatem  
vereri cœperit, cibo subueniat. Id enim eius officium est, vt  
ægrum neque superuacua materia oneret, neque \* imbecilli-  
tatem \* fame perdat. Idque apud Erasistratum quoque in-  
uenio, qui quamuis parùm docuit, quando venter, quando  
corpus ipsum exinaniretur, dicendo tamen hæc esse vincen-  
da, & tum cibus dandus, cùm corpori \* deberetur: satis  
ostendit,



ostendit, dum vires superessent, dari non oportere: ne deficerent, consulendum esse. Ex his autem intelligi potest ab vno medico multos non posse curari, cumque (si artifex est) idoneum esse, qui non multum ab ægro recedit. Sed qui quæstui seruiunt, quoniam is maior ex populo est, libenter amplectuntur ea præcepta, quæ sedulitatem non exigunt, ut in hac ipsa re. Facile est enim dies, vel accessiones numerare his quoque, qui ægrum rarò vident. ille assideat necesse est, qui quod solum opus est, visurus est, quando nimis imbecillus futurus sit, nisi cibum acceperit. In pluribus tamen ad initium cibi dies quartus aptissimus esse consuevit. Est autem alia etiam de diebus ipsis dubitatio, quoniam antiqui potissimum impares sequebantur, eosque, tanquam tunc de ægris iudicaretur, *χειρίους* nominabant. Hi erant diesterius, quintus, septimus, nonus, vndecimus, quartusdecimus, vnus & vigesimus, ita ut summa potentia septimo, deinde quartodecimo, deinde vni & vigesimo daretur. Igitur sic ægros nutriebant, ut dierum imparium accessiones expectarent, deinde postea cibum quasi leuioribus accessionibus instantibus, darent, adedò ut Hippocrates, si alio die febris defisset, recidiuam timere sit solitus. Id Asclepiades iure ut vnum repudiavit, neque in vllò die, quia par, imparve esset, his vel maius, vel minus periculum esse dixit. Interdum enim peiores dies impares fiunt, & opportunius post earum accessiones cibus datur. Nonnunquam etiam in ipso morbo, dierum ratio mutatur, sitque grauior, qui remissior esse consueuerat, atque ipse quartusdecimus par est, in quo esse magnam vim antiqui fatebantur. Qui cum octauum primam naturam habere contenderent, ut ab eo secundus septenarius numerus inciperet, ipsi sibi repugnabant, non octauum, neque decimum neque duodecimum diem \*sumendum quasi \*sumendo potentiores. Plus enim tribuebant nono & vndecimo. Quod cum fecissent sine vlla probabili ratione, ab vndecimo non ad tertiumdecimum, sed ad quartumdecimum transibant. Est etiam apud Hippocratem, ei quem septimus dies liberaturus sit, quartum esse grauiissimum. Ita illo quoque

n

auctore



*Sed si octauum  
primam naturam  
habet: unde  
cibus quartus,  
non quintus  
erit.*

auctore in die pari & grauior febris esse potest, & certa futuri nota. Atque idem alio loco quartum quemque diem, vt in vtrumque efficacissimum apprehendit, id est, quartum, septimum, vndecimum, quartumdecimum, decimum septimum, in quo & ab impari ad paris rationem transit: & ne hoc quidem propositum conseruauit, cum à septimo die vndecimus, non quartus, sed quintus sit: aded apparet quacunque ratione ad numerum respeximus, nihil rationis sub illo quidem auctore reperiri. Verum in his quidem antiquos tunc celebres admodum Pythagorici numeri fefellerunt, cum hic quoque medicus non numerare dies debeat, sed ipsas accessiones intueri, & ex his coniectare, quando dandus cibus sit. Illud autem magis ad rem pertinet, scire, tunc oporteat dari, cum iam bene venæ conquieuerunt, aut etiam num manentibus reliquiis febris. Antiqui enim quam integerrimis corporibus alimentum offerebant. Asclepiades inclinata quidem febre, sed adhuc tamen inhærente. In quo  
 \* vnā \* vanam rationem secutus est, non quod non sit interdum maturius cibus dandus, si maturè timetur altera accessio: sed quod scilicet quam sanissimo dari debeat. Minus enim cor-  
 \* non va- rumpitur quod integro corpori infertur. Neque tamen \* ve-  
 num est, rum est, quod Themisoni videbatur, si duabus horis integer futurus esset æger, satius esse tunc dare, vt ab integro corpore potissimum diduceretur. Nam si diduci tam celeriter posset, id esset optimum. Sed cum hoc breue tempus non præ-  
 \* est stet, satius \* esse principia cibi à decedente febre, quam reliquias ab incipiente excipi, ita, si longius tempus secundum est, quam integerrimo dandus est: si breue, etiam antequam  
 \* & ex toto integer fiat. Quo loco verò integritas est, eodem \* est  
 \* si qua remissio, \* quæ maximè in febre continua potest esse. At hic  
 al. quanta quoque quaeritur, vtrum tot horæ expectandæ sint, quot fe-  
 maxima brem habuerunt, an satis sit, primam partem earum præteri-  
 \* accidat, ri, vt ægris iucundius \* infidat, quibus interdum \* non vacat.  
 \* minimū Tutissimum est autem ante totius accessionis tempus præ-  
 v. terire, quamuis vbi longa febris fuit, potest indulgeri ægro maturius, dum tamen antè minimè pars dimidia præteatur.



tur. Idque non in ea sola febre, de qua proximè dictum est, sed in omnibus ita seruandum est.

## ENARRATIO.

QUANQVAM ea sit medicina conditio, ut naturam ducem sequens praeproperam festinationem, ut quae periculosa sit, semper exosam suspectamque habeat, & grauissimis nonnunquam (ut monet Hippocrates) agrotantes doloribus afficiat, puta quum aut secunda, incidenda aduendaeue sit aliqua particula corporis: tamen si quis Asclepiadis hoc dictum penitus limiteur, non est quod aut festinationem aut voluptati incusare possit; quum securitas illa, quam celeritati atque voluptati comitem esse voluit, maturitatem quandam denotet. Nam, per deum immortalem, quis non desideret medicum, qui primis morbi insulibus quam ocysimè resistens, morbum statim & citra molestiam, hoc est, tunc & iocundè repellat? adeò, ut quamuis alia ferè omnia, praeter rationem & dixisse, & fecisse sciamus Asclepiadem; hoc certè eum diuinum quoddam oraculum enunciaisse credamus, dignum quod quivis artem medicam professus pectori insculpat, quod secum obmurmuraret quotidie, atque inter quotidianos sermones usurpet; sicut Octavius Augustus (quemadmodum docet Aulus Gellius Notum Atticarum libro x. cap. xi) suum illud Festina lente, quod non secus ac Asclepiadem hoc, Cito, tunc, & iocundè, moderationem quandam & maturitatem in capeffendis exequendisque consiliis denotat.

Et ante omnia quaeritur,  
primis diebus.

PRIMOS dies vocat morbi principium.

Antiqui medicamentis.

HANC methodum observarunt, Hippocrates, Galenus, & qui eos sequuti sunt verae illius atque antiquae medicinae cultores. Nam in longis morbis semper ante materiae purgationem, medicamentis quibusdam datis

fluxibiliorem reddiderunt, & concoctionem eiusdem moliti sunt. In acutis etiam raro in principio non praeparata ad expulsionem materia purgabant, & nisi admodum turgeret, concoctionem adiunabant. in quem usum Galenus etiam in principio acutorum morborum, si occasio ferat, decoctum origani, tragorigani, hyssopi & similium exhibendum docet; idq; Hippocratis auctoritate, qui concocta medicari, & mouere; non cruda praecepit. Verum de his si quis plura consideret, primam Aphorismorum sectionem consulat, ubi varios in hanc sententiam Aphorismos reperiet.

## Asclepiades medicamenta sustulit.

ASCLEPIADES hic, ut praecedente libro dictum est, Pompeij Magni aetate floruit, è rhetore factus repente medicus: omnia ferè placita veterum subuertit, totamq; medicinam ad causam renocando, coniecturam fecit; negavitque cibos à natura in ventre & partibus corporis confici, sed crudeos in corpus digeri contendit. Acernos illos atomorum & vacuum Epicuri recepit, diuinitates rerum, & consensum partium abstulit. Quare quando, ut tertio Crisium monet Galenus, quod ea quae sunt in corpore concoquantur, vel non concoquantur, Hippocratis non Asclepiadis sit dogma, rectè Celsus medicamenta ea potissimum quae concoctionem adiuvant, eundem sustulisse auctor est, quum eadem cruda, & à natura prius non confecta in corpus distribui contendat.

aluum non toties.

QUANDO & in quibus ducenda sit aluus, praecedente libro abundè dictum est: quare non est opus eadem repetere.



### Conuellendas agri vites.

QUAM fuerit sibi per omnia similis, hoc est vana Asclepiades, vel hinc conicere licet, quod quum medici officium esse dixerit, ut celeriter, ut tuto & iocunde curet, nunc incunctatis illius, quam securitati cum celeritate comitem esse voluit, planè immemor, carnificem potius quàm medicum primum agit diebus, atque nihil minus quàm iocunde curet: adeò fallaces sunt atque vana, aura popularis cupidi homines.

### Itaque abstinendus à cibis.

PRÆCEDENTE quoque libro cibandi tempora distinximus: quare qui loci huius pleniori explanationem flagitat, in eundem librum nostras legat Enarrationes, & Galeni therapeutice methodum consulat, ubi multis argumentis, & prolixè admodum contra methodicos & diatritarios agit.

### Quod ad sitim.

QUANDOQVIdem natura minister est medicus, sui officij esse consequens est, ut natura functiones muniaque promoneat in melius, ita ut si quæ suo tempore, aut modo non obeantur, ad pristinum reducat statum: & quoniam natura ita constitutum est, ut nox requies, dies vigiliis dicata sit, in hoc totus esse debet medicus, ut somnum nocte conciliet; ita enim fiet, ut materia peccans quodammodo concoquatur, & facilius per halitum discutiatur: quanquam si contra naturæ ductum contingat interdum somno opprimi, atque nocturnas vigilias infestare, non suaferim subito diurnum illum somnum interrompere: vtrum considerandum moneo iuxta Hippocratis præscriptum, laborem faciat nec ne: nam si dolor subsequatur & gravitas, malus profectò hic erit somnus; sin leniter ferat, promouendus est, ut qui natura duce obitur.

### Os etiam elui potest.

NON solum eluendum os aqua frigida est, sed & interdum eadem potui data est; nam, ut x. Methodi Galenus, frigida potio

febris aptissima est; etenim qui sani adhuc dum frigida potioni assueverunt, si febrientes eam bibant, summum lenamen consequuntur; præsertim quum caloris febrilis copia quasi munimen quoddam sit contra frigida noxam: tuto igitur in febribus exhibebitur, nisi obstructio, putrisve humor non concoctus obstat, aut nisi in principe aliqua particula tumor aliquis consistat, ex phlegmonis, ædematis aut scirrhi genere: nam hisce frigida potio omnino contraria est; ut quæ tumores, atque obstructions auget. atque huc respexisse Celsum verisimile est, dum oris factorem & siccitatem suspectam habet; adeò rectè Erasistratus pronunciatum reliquit, inferiore parte non requiente humorem, os sanctisque eundem desiderare: quamquam Galenus x. Methodi potione frigida phlegmonem argere maui, quàm sinere hominem hecticam incurere.

### Optimum verò medicamentum.

CIBVS importunè exhibitus, morbum non modo non tollit, sed eundem auget; & si non fuerit, eiusdem causa existit: in principis enim abstinendum monet Hippocrates; & non pura corpora quanto magis nutries, tanto magis lades.

### Nihil autem horum perpetuum est.

EST quando primo statim die cibandi sunt agri: nam si qui ex inedia, ardore solis, ira, labore, siccitateve in febres inciderunt, his nequaquam famem præscribemus: sed statim cum cibo frigidam propinabimus. Est etiam quando in secundum aut tertium diem differenda sit cibus: nam, ut dicitur Methodi Galeni, sunt natura quibus aut non magno opere, aut nihil inegrimoder tridui inedia.

### Refert enim qualis morbus sit, quale corpus.

IUXTA secundum primæ sectionis Aphorismum, inspicere oportet & ætatem, & tempus, & ætatem, & morbos, & quibus conueniat,



conueniat, aut non: siquidem quando vires legitimus robur suum adhuc habent, & morbi summus vigor maturè expectatur, tenuissimo victu uti licet sine graui noxa; sed adicere ad nutrimenta tantum oportet, quantum est de robore virium imminutum.

### Maturius etiam puero.

HIPPOCRATES sectionis primæ Aphorismo XIII. Senes, inquit, facillimè ieiunium ferunt: secundo loco qui consistentem etatem habent; minis adolescentes; omnium minime pueri, præsertim qui inter ipsos sunt iuniores, quod videlicet (ut sequente hunc Aphorismo docet) plurimum caloris innati habeant qui crescunt, ac proinde quo plus habeant natini caloris, tanto plus alimenti desiderant, & plus appetant; plusque longis inediis afficiantur.

### æstate quàm hieme dari debet.

NI SI iam antè dixisset in Africa nullo die ægrum abstinentiam tolerare posse, parua dictionum metathesi locum sibi mutarim: hieme quàm æstate: quod videlicet, quum ventres hieme & vere natura calidissimos, seminosque longissimos dicat Hippocrates, unde & plus appetant, & sumptos cibos melius conficiant, consequens quoque videatur, ut hieme quàm æstate maturius cibemus. Verum quum æstate acuti morbi magis innadant, atque ij potissimum qui vires prosterunt (quando & calore ambientis nos aeris nativus ille calor, vita nostra assiduus fomes, dissipetur) maturius quidem, sed tenuius parciusque quàm hieme cibandum est, conservandum virium causa.

### Vnum illud.

CONJECTARE (inquit Hippocrates sectione prima Aphorismorum,) oportet, an æger cū victu sufficiat perdurare donec morbus consistat; & numquid prius ille deficiat, nec possit cū victu perdurare, vel morbus ante deficiat atque hebescat.

### Est autem alia etiam.

DECRETVM aliquando fuerat hic Hip-

pocrati, contra Asclepiadem & Celsum nostrum, patrocinari; præsertim quando hodie nonnulli reperiantur qui his subscribere malint (quum non considerent quàm sit propria quedam dierum decretoriorum natura) quàm Hippocrati, viro, ut scitè dicit Galenus, admodum veraci, & in dierum decretoriorum natura admodum versato. Verum quoniam argumentum hoc à Galeno abundè tractatum est, libro præsertim De diebus decretoriis, de crisitis & suis in Epidemion libros & Aphorismos commentariis, consultum putauimus lectorem ed relegare, atque locos quos hic auctor citat adscribere.

### eosque tamquam tunc de ægris.

DIES alios *νεκροτικούς* seu decretorios, alios contemplabiles seu *θεραπευτικούς* vocant: decretorios quidem appellabant, ubi subito turbatio in morbo orta salutem aut exitum portendat; Contemplatorios seu indices nominat Hippocrates, & Galenus in quibus aliquod signum apparet futura indicationis, indicatiuum in altero aliquo indicantium dierum, quos Hippocrates, tum in Aphorismis, tum in Prognosticis unamquamque septimanam in duas diuidens partes, in quaternarios digessit: Septenorum, inquit, quartus est index; alterius septimana octauus principium; est autem & undecimus contemplabilis; ipse enim quartus est alterius septimana: Rursus vero & decimus septimus contemplabilis est; ipse enim quartus est à decimoquarto, septimus vero ab undecimo.

### ita ut summa potentia septimo.

PVLCHERRIMA allusione Galeni: libro De diebus decretoriis, diem septimū regi, sextumque tyranno comparat, quod septimus, Hippocrate teste, perfectissimè indicet; sextus imperfectè, ac recidivam minetur. Ac rursus, quod septimus clementior tanquam bonus aliquis princeps, iis quos indicat, vel supplicij periculi attinet vel illultrat victoriam; sextus contra vel perniciem illius



illius quem indicandum suscepit gaudet, vel salute dolet, quaritque ubi animum expleat, & malè agrum tractet, tum longa pernicie exerceat.

### Igitur sic ægros nutritiebant.

SECTIONIS primæ Aphorismo XI. ait Hippocrates, In accessionibus à cibo abstinere oportet; siquidem cibum dare nocuum est: & si qui per circuitum accessiones obtinent morbi, in ipsis accessionibus cibum fugere conuenit, quod natura non sufficiat, & morbo & cibo oblato; atque adeò quod, quum natura à materia morbi ad cibos distrahatur, humores morbum efficientes adaugeat.

### adeò ut Hippocrates.

FEBRICITANTEM, inquit Hippocrates, nisi diebus imparibus febris reliquerit, solet recidmare. & Aphorismorum quarto, Aphorismo XXXVI. Sudores febricitantibus si euenierint, tertio die, & quinto & septimo, & nono, & undecimo, & decimoquarto, & decimo septimo, & xx, & xxvii, & xxxi, & xxxiiii, boni sunt; ij enim sudores morbos indicant; qui autem secus eueniunt, laborem significant longitudinemque morbi, & recidnam. Similiter & primo Prognosticon: Sudores, inquit, saluberrimi censentur ij in omnibus acutis morbis, si diebus indicatoriis oriantur, febrimque finiant; contra inutiles, qui id efficere non possunt.

### Nonnunquam etiam in ipso morbo.

Id non tam ratione ipsius morbi, quam eorum que exterius accidunt vitio contingit: nam sit ut incuria medici, ingluvie, aut ægroti intemperantia, astantium importunitate, aut alio quouis modo dierum ratio mutetur.

### atque ipse quartusdecimus par est.

QUANDOQV IDEM usque adeò urget

Celsus, & neque omnino à ratione aliena esse videantur iis qui Galenum non satis legerint, aut non intellexerint, operaprecium fore duxi, hic periodos nonnullas ex Ioanne Morisoto, quod Hippocratis in hac re fidsimus assertor extiterit, & Galeni omnia tamquam in compendium redegerit, ascribere. Scribit autem in hunc modum in enarratione aphorismi LX segmenti quarti ubi ex professo locum hunc explanandum sibi proponit. Prima, inquit, omnium que fiunt principia sunt duo, & πρῶτον & sine inordinatum, & quod ordine semper ornatiue procedit: illud ex ista mundi materia proficiscitur; hoc è celestibus originem ducit. Caelustum verò sol veluti rex est, qui & presens diem, & absens noctem, & alius astatem, & humilis hiemem, & mediocriter obliquus virumque solstitium facit. Luna verò ut princeps inter illum & nos medium, reliquos planetas vicinitate superat, & cuiusque mensis dies disponit, ex solis aspectu mutandi facultatem consecuta. Eius enim tanta portio illucescit, quantam sol aspicit: hinc decem illa figura (ut tradunt Mathematici quidam) gena, orius, surgens in cornua, & ημίστροφος, διχόστροφος, παροδῶντος: tursus semidivisa, diuisa, surgens in cornua, & coitus: vel, ut alij volunt, undecim, ut quidam παροδῶντος sine plenilunio fulsciant πλεῖσι φάει, quum & πλεῖστον οὐρανόν appelliant; quanquam alij malint septem tantum esse; alij coitum etiam adiciant, atque octo statuant: nos octo sequemur, ut dies decretorios commodius demonstrare possimus. Surgit ergo in cornua, quum LX partes abest a sole; dimidia est quum nonaginta; gibbosa quum cxx; plera quum CLxxx; tursus sit gibbosa quum cxx; dimidia quum xc; surgit in cornua quum lx; eiciens quum sub limine solis fertur, qua & silens dici solet. Prima figura est in sexangulo mundi schemate, siue, ut alij loquuntur, in aspectu sextili, die serè quarto; secunda in quadrangulo schemate, siue aspectu quadrato, die septimo; tertia in triangulo schemate, siue aspectu trino die xi; quarta in diametro siue oppositione die xlii; quinta in eodem



eodem schemate cum tertia, XVII die; sexta in eodem schemate cum secunda die XX; septima in eodem schemate cum prima, die XXIII; octava in coniunctione die XXVII.

## ASCENSVS.



## DESCENSVS.

Sunt igitur indicatorij, quartus, septimus, XI, XIII, XV, XVII, XIX, XXI, XXIII, XXV, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVII, XXXIX, XL, XLII, XLIV, XLVI, XLVIII, XLX, LI, LIII, LV, LVII, LVIX, LXI, LXIII, LXV, LXVII, LXIX, LXXI, LXXIII, LXXV, LXXVII, LXXIX, LXXXI, LXXXIII, LXXXV, LXXXVII, LXXXIX, XL: nec mirum est quod ex XXXI secundi mensis quartum, ex XXXIII septimum; & ex XXXV undecimum; ex quadragesimo decimum quartum colligere possimus. Quamquam Hippocrates eos in quaterniones

& hebdomadas distinguat: & ex ternis septimanis circuitum facit absolutum: in menses tamen dividere placuit, ut ex natura celestium vis eorum omnino perspiceretur. Reliquum igitur est, ut qua ratione numerentur hi dies, ostendamus. Hippocrates Praesagiorum segmento tertio in hunc modum scribit: Igitur accessiones ipsae ex acutissimis morbis per quatuor in viginti auctae finiuntur: sed nihil horum potest diebus integris annumerari; nec enim annus nec menses, integris diebus natura numerari queunt. Ut igitur, inquit Galenus, annus ad trecentos sexaginta quinque dies particulam diei maiorem quarta adiectam habet, tum mensis ad xxx dies absolventos unius dimidia desiderat;



desiderat; sic & septimana, sexta maximè dici parte, ut septem integros habeat indiget. Quamobrem tres septimane non unum & viginti dies integros, sed minùs ferè tota unius dimidia parte consequuntur. Quod ut facilius intelligi queat, rem paulo aliùs repetemus. Moitiones quæ in corporibus nostris accidunt; due iraduntur: una propria quæ ex circuitu zodiaci nascitur; communis altera, quæ ex menstruo tempore progignitur: ex hoc si tres còtus dies sustuleris, quod reliquum erit tempus manifesta apparitionis atque efficacis dicitur: constat autem ex diebus viginti sex & dimidio. Signiferi verò circuitus, intra viginti septem dies, & tertiam unius partem expletur. hos porro dies si coniunxeris, deinde in duas æquales partes divideris, viginti sex dies & horas duas & viginti esse dimidium inuenies. Quod si in partes æquales rursus distribuas, facies hebdomadas quatuor ex senis diebus & denis septenis horis, & hora dimidio. Tres igitur septimane ex xx diebus & horis quatuor, atque unius hora dimidio constabunt. unde fit ut prima septimana seuincta sit à secunda; secunda contra cum tertia cohereat: nam si prima cum secunda coniungeretur, & eorum in decimumnonum; si rursus distincta essent, in xxi incidere. Est autem hæc periodus absoluta: siquidem quadragesimum, Lx, Lxxx, centesimum, & centesimum & vigesimum vigesimo sapiùs aucto fieri videmus; ac nec septimus id præstare potest, nec decimusquartus: nam illo vigesimum primum, vigesimum octauum, xxv, xlii, hic similiter xxviii, & xlii si adueatur coniungit: qui dies ut non sunt decretori, ita nec septimus est perfectus circuitus nec decimusquartus. Est igitur duplex periodus; perfecta & inchoata. sed & perfecta ex ternis inchoatis conflata est, ut inchoata ex binis quaternionibus: atque ita si perfectam divideris, quaterniones senos inuenies; non aliter utique quàm sunt sex periodi perfecta. Hucusque Morisius indicatoriorum dierum rationem ex luna motu doctissimè descripsit: cui quum & ipsa experientia (quam non minoris, quàm ipsam rationem hic facit Ga-

lenus) indices accedat, non est quòd Asclepiadem aut ei succedentem Celsum audiamus.

### Est etiam apud Hippocratem.

HIPPOCRATES segmenti quarti Aphorismo LXXI: Quibus septimo die indicatur morbus, iis quarto die nubesculam habet vrina rubicundam, & alia signa proportionè; ut antè diximus septimi quartum esse indicem seu contemplabilem.

### Verùm in his.

DE Pythagoricis numeris permulta Macrobius in commentariis quos edidit in Sennium Scipionis: In summa, Pythagoras omnem philosophia rationem ad numeros iraxit: quem sequutus Plato, in Timæo præsertim, obscuram admodum reddidit, atque nebulas offudit, locumq; proverbio præbuit, ut auctor est Cicero, Platonis numero obscurus.

### Illud autem magis ad rem.

TRIA uniuersim sunt capita, quibus victus ratio comprehenditur: vnum, quod ad qualitatem; alterum, quod ad quantitatem; tertiumque, quod ad usus modum attinet. Qualitatem quidem ac quantitatem variare par est pro morbi differentia. Ac quod ad usus quidem modum (ut xxi methodi Galenus) aptissimum in febribus quæ intermittunt & repetunt tempus est, quum exhalare ceperit febrilis calor. statim enim corpus ad nutrimentum præparant; huius quoque oportuno tempore ex duplici coniectura respectu, nempe summo accessione præcedentis vigore, & futura principio. Ad hæc namque spectantes operam dabimus, ut quàm longissimè ab viroque nutriamus. Ergo si spatium quod inter summum prioris accessione vigorem, & sequentis principium interuenit, satis sit amplum, facile est idoneum tempus inuenire; sin exiguum id fuerit, alterum facias necesse est, ut aut agrum adhuc admodum calentem nutrias, aut sequentis accessione inuassione iam iam affutura. Quo magis præfagio medici huiusmodi febris indiget, qui primis statim diebus quanto spatio duratura



duratura sit febris, coniciet. Quippe si continens fuerit, constat brevi finiendam. Si igitur ultra septimum progressura non videtur, prorsus à cibo continendus est ager, utique si virtutem non desecturam coniciamus: Sin ad nonum aut undecimum, aut decimumquartum usque progressura vide-

tur, aut etiam in septimo finienda, ceterum ager vires infirmiores habere, quam ut in tantum tempus sufficiat; necesse erit nutrire, ac deligere sicut in re ancipiti convenit, quod minus sit noxium, distinguendo id discernendoque ab eo quod magis sit nociturum.

## CAPUT V.

*De febrium speciebus, & singularum curationibus:  
& primò, quando cibus febricitantibus dandus sit.*

**H**AEC magis per omnia genera febrium perpetua sunt, nunc ad singulas earum species descendam. Igitur si semel tantum accessit, deinde desit, eaque vel ex inguine, vel ex lassitudine, vel ex æstu, aliave simili re fuit, sic ut interior nulla causa metum fecerit, postero die cum tempus accessionis ita transiit, ut nihil mouerit, cibus dari potest. At si ex alto calor venit, & grauitas vel capitis vel præcordiorum secuta est, neque apparet quid corpus confuderit, quamuis vnâ accessionem secuta integritas est, tamen quia tertiana timeri potest, expectandus est dies tertius: & ubi accessionis tempus præterit, cibus dandus est, sed exiguus, quia quartana quoque timeri potest. Et die quarto demum, si corpus integrum est, eo cum fiducia utendum. Si verò postero, tertiove, aut quarto die secuta febris est, scire licet morbum esse. Sed tertianarum, quartanarumque, quarum & certus circuitus est, & finis integer, & quia liberaliter quietia tempora sunt, expeditior ratio est: de quibus suo loco dicam. Nunc verò eas explicabo, quæ quotidie vrgent. Igitur tertio quoque die cibus ægro commodissime datur, ut alter febrem minuatur, alter viribus subueniat. Sed \* his dari debet, si quotidiana febris est, \* is quæ ex toto desinat, simul atque corpus integrum factum est, \* si quamuis non accessiones, febres tamen iunguntur, & \* sin' quotidie quidem increscunt, sed sine integritate tamen remittunt, cum corpora se habet, ut maior remissio non expectetur.



peccetur. Si altero die grauior, altero leuior accessio est, post grauiorem. Ferè verò grauiorem accessionem leuior nox sequitur: quò fit, vt grauiorem accessionem nox quoque tristior antecedit. At si continuatur febris, neque leuior vnquam fit, & dari cibum necesse est, quando dari debeat, magna quidem dissensio est. Quidam, quia ferè remissius matutinum tempus ægris est, tunc putant dandum. Quod si responder, non quia manè est, sed quia remissio est ægris, dari debet. Si verò ne tunc quidem vlla requies ægris est, hoc ipso peius id tempus est, quòd cùm sua natura melius esse debeat, morbi vitio non est, simulque insequitur tempus meridianum: à quo cùm omnis æger ferè peior fiat, timeri potest, ne ille magis etiam, quàm ex consuetudine vrgeatur. Igitur alii vespere tali ægro cibum dant. Sed cùm eo tempore ferè \* pessimi sint, qui ægrotant, verendum est, ne si quid tunc mouerimus, fiat aliquid asperius. Ob hæc ad mediam noctem \* decurro, id est finito iam grauissimo tempore, eodemque longissime distante, secuturis verò antelucanis horis, quibus omnes ferè maximè dormiunt: deinde matutino tempore, quod natura sua leuissimum est. Si verò febres vagæ sunt, quia verendum est, ne cibum statim subsequantur, quandoque quis ex accessione leuatus est, \* tunc debet assumere. At si plures accessiones eodem die veniunt, considerare oportet, paræne per omnia sint, (quod vix fieri potest) an impares. Si per omnia pares sunt, post eam potius accessionem cibus dari debet, quæ non inter meridiem & vespere definit. Si impares sunt, considerandum est, quò distent. Nam si altera grauior, altera leuior est, post grauiorem dari debet: si altera longior, altera breuior, post longiorem: si altera grauior, altera longior est, considerandum est, vtra magis affligat, illa vi, an hæc tempore, & post eam dandus est. Sed planè plurimum interest, quantæ, qualesque inter eas remissiones sint. Nam si post alteram febrem motio manet, post alteram integrum corpus est: integro corpore, cibo tempus aptius est. Si semper febricula manet, sed alterum tamen longius tempus remissionis est, id potius eligendum est, adèd vt vbi accessiones continuantur.

\* pessimè

\* decurro,

Febres vagæ.  
32.

\* hunc



continuantur, protinus inclinata priore dandus cibus sit. Et enim perpetuum est, ad quod omne consilium dirigi potest, cibum quàm maximè semper ab accessione futura reducere, & hoc saluo, dare quàm integerrimo corpori. Quod non inter duas tantum, sed etiam inter plures accessiones seruabitur. Sed cum sit aptissimum tertio quoque die cibum dare, tamen si corpus infirmum est, quotidie dandus est: multo-que magis si continentes febres sine remissione sunt, quanto magis corpus affligunt, aut si duæ pluresve accessiones eodem die veniunt. Quæ res efficit, ut & à primo die protinus cibus dari quotidie debeat. Si protinus venæ conciderunt, & sæpius eodem die, si inter plures accessiones subinde vis corpori deest. Illud tamen in his seruandum est, ut post eas febres minus cibi detur, post quas, si per corpus liceret, omnino non daretur. Cum verò febris instet, incipiat, augeatur, consistat, decedat, deinde in decessione consistat aut finiatur, scire licet, optimum cibo tempus esse febre finita: deinde cum decessio eius consistit: \* tertium, si necesse est, quando cunq. de- \* tertio cedit, cætera omnia periculosa esse. Si tamen propter infirmitatem necessitas urget, satius esse consistente iam incremento febris aliquid offerre, quàm crescente. Satius esse instante, quàm incipiente: cum eo tamen, ut nullo tempore is qui deficit, non sit sustinendus. Neq. hercule satis est, ipsas tantum febres medicum intueri, sed etiam totius corporis habitum, & ad eum dirigere curationem, seu supersunt vires, seu desunt, seu quidam mali affectus interueniunt. Cum verò semper ægros securos agere cõueniat, ut corpore tantum, non etiam animo laborent, tum præcipuè, ubi cibum sumpserunt: \* at- \* itaque que si qua sunt, quæ exasperatura eorum animos sunt, optimum est, \* eadem agrotantium no- fieri non potest, sustinere tamen post cibum \* usque somni titiæ sub. tempus, & cum expperecti sunt, tum exponere. \* adusque

## ENARRATIO.

**E** PHEMERAS seu diarias Hippocrates simplicissimas vocare solet, quod brevissima, lenissima, mitissimaq; sint ac mini-

mè malefica, cum securitatis indicium, sine malis accidentibus, ut plurimum diem integrum non excedunt, ob id quod materia in qua.



qua consistunt, nempe spiritus facillimè discutitur. Mala autem accidenti easdem commitari non solent; siquidem calor in blando vapore mitis ac suavis est, quo fit ut Galenus primo artis curatim ad Glanconem, febricitantes ex diaria statim ad balneas usitatumque victus rationem ducendos suadeat, quid ex longiore inedia, febres & accenderentur & redderentur aciores, atque adeo in putridas facillè degenerarent.

eaque, vel ex inguine.

IN bubonibus, inquit Hippocrates, febres omnes male, præter diarias. Celsus suo more ex inguine, pro inguinum bubone dicere maluit; fortè quod suspectas habueris febres ex bubone ortas, quod ha videlicet ex delitescente intus causa (vipera viscerum inflammatione, plenitudine humorum, aut malignitate, aut pestilenti etiam humore) ortus sui causam habeant; ac proinde, non in diarium, sed putridarum genere potius recensenda sint. Quo fit ut Aetius quoque febrientibus ex inguinum inflammatione vnam statim undat priusquam materia putrescat, & febrem putridam accendat. Verum quandoquidem (ut de febrium differentiis cap. VII. Galenus) sunt nonnulla febres ex bubone in genere diarium, utpote quæ ex evidentibus causis ortum habent (evidentes causas voco, hunc, dolorem, itum, & similia quæ iuxta magnas venas vel arterias existunt) ut cruris tñidem, si in inguine; manuum verò, si in alis; quemadmodum & capitis, si secundum aures affectus sit: rectè Celsus inter diarias eas quoque quæ ex inguine sunt, constituit; easque potius quam quæ sub aliis aut secundum aures consistunt ascripsit, quod iisdem frequentiores sunt.

vel ex lassitudine.

AETIVS brevisissimam & exactissimam diaria febricitantium victus rationem præscribit. Dicit autem: Dieta in febribus diariis omnibus communem scopum habet, ut sit ex edulis boni succi, & quæ omnino concoquantur, & nusquam circa meatus derinantur. His quidem qui ex ardore aut ira

februnt, quæ simul frigescent & humectant, frigescent vero minus alentia & moderatè calefacientia: His autem qui vigilarunt aut tristes fuerunt, aut curis vexati, humidus aut somnificus cibus congruit; fatigatis autem plurimus & maximè nutrens. At quibus intemperatura corporis calidior & siccior facta est, eos oportet aliquando circa principium exacerbationis impetum nutrire.

ut interior nulla causa.

ITA enim suspicio esset repetitivam accessionem, atque adeo aut putridam aut hecticam in periculo esse.

At si ex alto calor venit.

HOC iam manifestam atque evidentem viscerum inflammationem, atque adeo invalescentem febrem denotat: nam neque ex alto veniet calor, nisi admodum extraneo calore accenso corde, neque præcordiorum gravitas subsequetur, nisi eorundem inflammatione orta sit, aut per consensum hepar cordi coafficiatur: & in summa, capitis gravitas non aderit, nisi calore cordis atque hepatis petum caput, eisdem condolescat.

expectandus est dies  
tertius.

CELSVS hic passim methodicos sequitur, diatrio plus satis tribuit, carnisficiis potius hac in re, ut docet Galenus, officium, quam medici, exercens: nam præterquam quod commodi nequicquam asserat febrientibus exacta mirificaque diatrios, etiam ex longiore inedia acerrimas acutissima quæ parit febres, à quibus promptus est in hecticas transitus, atque ab his rursum in torridum marasimum, aut si os ventriculi facillè iniuriis patet, eum qui *εὐρυγὰν*, id est animi defectum, infert. Ceterum de hac diatrio qui plura desiderat, quartum, octavum, undecimumque Methodi Galeni libros consulat. Porro cibandi methodus ex primo Aphorismorum petenda est: nam ubi peracutus est morbus, inquit, statim etiam extremos habet labores, & extrema tenuissima victus ratione



ratione vii necesse est; ubi verò non, sed plenius licet reficere, tantum indulge, quanto morbus extremus est mollior; ubi morbus in vigore consistit, vivendi ratione tenuissima tunc vii necesse est. Observare autem oportet etiam egrotantem, an sit huiusmodi rationi ad morbi vigorem usque suffecturus, & an prius defecturus sit, & non suffecturus prescripto victui, an morbus ante sit defecturus, ac futurus hebes. Quibus ergo statim vigor est, statim eos tenuiter refice; quibus autem vigor erit postea, his & in ipso vigore, & paulo ante illum auferendum, sed ante uberius reficere, ut sit suffecturus egrotans. Usque adeo perpetuum ac firmum nihil est, quin usu ac ratione interdum id variari non contingat: nam quis in hoc rigido sepremitone egrotis (nihil minus quare inedia assuetis) irriduanam illam cibi potusque abstinentiam prescribat? quis pueros voraces admodum, a cibis, nisi omnino carnis ex, abstinere cogat? quis in summa ætate, & vere eandem victus rationem prescribere audeat? quis peracutos acutosque & ex decidentia acutos dictos, eadem victus normam sustinent?

### Ferè verò graviorem accessiorem.

SENTENTIA sumpta est ex Hippocratis secundo Aphorismorum: Quibus crisis, id est, indicatio sit, iis nox gravis ante accessiorem; qua verò subsequitur, magna ex parte lenior sit. neque id mirum est, quoniam indicationem præcedant deliria, spirandi difficultas, oculorum caligo, temporum gravitas, & alia innumera, natura se ipsam à supernaturalibus humoribus corpus molestantibus exonerante: quò sit ut & qua sequitur dies, aut nox lenior quoque sit.

### At si continuatur.

CONSVETUDINIS hic potissima habenda ratio est: nam si quò consueverint tempore cibum assumere, cibaveris; opportunissime id feceris: nam & tum ipsi egroti tolerantissime eosdem acciperint. Quare non usque adeo magnipendendum est, ve-

spertinum ne an matutinum, meridianum ac pomeridianum tempus sit; quum ipsa egroti tolerantia & antea vite consuetudo ratio, ut rectè monet Celsus, in continentibus & similibus, quæ unicam tantum accessiorem habent, si vires in ediam non serant, tempus opportunum cibationi denotent.

### Si verò febres vagæ sunt.

FEBRES vagas videtur eas intelligere, quæ incertas habent accessiones, neque certum aliquem materiae motum; ut quas neque simpliciter tertianas, nec quaridianas dicere possis: quarum natura ferè talis esse solet, ut interim eodem die duas aut plures accessiones faciant, interim etiam post aliquot dies, non habito certo aliquo ordine, quemadmodum in tertianis & aliis intermittentibus fieri consuevit. Fiunt autem ob victus rationem non rectè insistentem, aut quia variè in variis corporis partibus humores putrescunt; hos siquidem humores partes quæ denique citius, alia tardius accendunt, ex quibus etiam alij ut accendantur promptiores sunt, alij minus prompti. Ceterum quando hic cibandum sit, & ipsa morbi constitutio & consuetudo & egri vires docebunt; si etenim consent vires, alternis tantum diebus tenuiter quidem, non tamen in extremo, quò frequentius in longum protrahantur tempus, nutricabimus. Id interim curandum est, quemadmodum auctor noster docet, ut statim ubi ad infebrecitationem ventum est, cibemus; ne videlicet cibationem nova statim subsequatur accessio.

### At si plures accessiones.

SEMITERTIANAS intelligit: hæc etenim vii nunquam febre vacans tempus relinquunt, ita plures interdum eodem die accessiones faciunt; quarum altera quidem longior in qua ferè est, altera brevior quidem, verum vehementior. Porro cibationis tempus hic quoque, ut in præcedentibus, à consuetudine, viginti robore, & morbi constitutione petendum est, limitatione habita, quemadmodum auctor noster docet: ut si per omnia pares sint accessiones, post eam



potius cibus detur, quæ non inter meridiem & vespertam definit, quod satius aliquanto sit aut prandij tempore, aut paulo ante illud cibasse, observata nimirum hypothesi quæ à consuetudine sumitur, quam inter omnes maximi semper faciendâ docet Hippocrates.

### Etenim perpetuum est.

EIVS medicina partis quæ victui medetur (inquit Hippocrates libro De ratione victus in morbis acutis) maximum est, febrium tum intentiones, tum declinationes, non in acutis modò, verum & in longis quoque, observare, ut tempora quibus cibi offerendi non sunt, & tunc, & quibus offerendi existunt, cognoscas, atque adhuc quando plurimum ab intentione aberint. Cognoscemus autem in acutis morbis nutriendi tempus ex pedum caliditate: nam, ut eodem libro testatur Hippocrates: Quum purgaveris, sorbitionibus quibusdam vitior, observatis ita febrium accessibus, ut nunquam quum adsint, neque quum finire sunt, exhibeas; sed vel quum cessent, vel quieverint, & maximè à principio recesserint. frigentibus ergò pedibus, neque potum neque sorbitionem, neque aliud quippiam huiusmodi dabis, sed maximum astinato, si id tantisper observaveris, donec valdè incaluerint, deinde ita quod confert exhibe. Frigiditas siquidem pedum parte plurima febris accessura signum existit: quo tempore si quid porrigas, prorsus peccabis; nempe & morbum non parum augeris. At vero quum febris defuerit, pedes reliquo corpore calidiores sunt; nempe quum augetur, pedes refrigerat, inrensque ex thorace ad caput flammam mittit. Calore igitur toto ad supernas partes concurrente, atque ad caput expirante, non absque causa pedes frigescent, utpote qui natura & carne vacent & nervis abundent: præterea & à calidissimis separati locis refrigerantur, sese ad thoracem colligente calore.

### Sed cum sit aptissimum.

EX hoc colligere licet Celsum nostrum diuturno methodicorum multum tribuere solitum, sed ita tamen ut eadem laceffendus

agri vires haud quaquam censuerit: siquidem si vires non consistent, atque corpus infirmum sit, non habita mirifica illius diatriæ ratione, quotidie cibus.

### Si protinus venæ con- ciderunt.

SIGNVM hoc exhausti exuccique corporis est, quod per inediam ad talem facillimè deduceretur. Sic Galenus x. Methodi, iuveni (qui re ita postulante plus itineris confecerat) horrenti iam ac febricitanti proximo, in ipso horrore dilutum panem exhibuit: atque ita non solum horrorem, sed ingruentem etiam febrem compefcuit; idg; experientia à se compertum affirmat, atque eò securius inhiberi febrem, quanto citius eodem cibaveris.

### si inter plures accessiones.

VNICVS fere in morbis nutritionis scopus est, virium robur: nam frustra in peracutis, nisi cum virium robore, summe tenuem victum præscribemus; virium siquidem imbecillitas sæpius quidem, sed paulatim cibandum dicitur; sed & corpus benè diffabile ad cibationem stimulat, & quod tenuis habet succos, id cibandum indicat.

### deinde in decessione.

EXEMPLAR Torrefsum, contra quàm reliqua exemplaria, decessione habet; idg; melius: quemadmodum rectè annotavit Pantiuus.

### Si tamen propter &c.

CONSISTENS incrementum febris, non ipsum vigorem propriè dictum, sed particularem ipsius augmenti statum, appellat; sic ut quivis paroxysmus in quatuor tempora distinguitur, principium dico, augmentum, statum, & declinationem; quod innuisse videtur, quum consistens incrementum ab increfcente distinxit: nam aliqui Hippocratis theorematibus paulo antè recitatis planè repugnantis dixerit; siquidem is in morbi vigore omnino abstinentum suasisit.

neque



Neque hercule satis est.

HIPPOCRATES libro De morbis acutis: Conicere oportet & robur & morbi cuiusque speciem, hominis item naturam, atque ægrotantis in victu consuetudinem, non in cibis solum, verum etiam in potionibus.

Cum verò semper ægros securos.

HÆC sunt quæ Hippocrates τ' ἔχουσιν

sine externa vocare solet: atque ea quidem quam vim atq. efficaciam habeant in ægris, auctor est Hippocrates tum primo Aphorismorum, tum sexto Epidemion: nam quum affectus animi tales sint, ut valens corpus alterare possint, & diariam statim concitare; quomodo eadem valetudinarium, & febribus subiectum non afficient, ac citandi omnem occasionem, si non surripient, saltem subvertent; quum & cibi concoctionem impediant, & nouo paroxysmo iter seruant?

## CAPUT VI.

*Quando potiones febricitantibus dari expediat.*

SEd de cibo facilior quidem cum ægris ratio est, quorum sæpe stomachus hunc respuit, etiam si mens concupiscit. De potione verò ingens pugna est, eoque magis, quo maior febris est. Hæc enim sitim accendit, & tum maximè aquam exigit cum illa periculosissima est. Sed docendus æger est, ubi febris conquieuerit, protinus sitim quoque quieturam, longioremque accessionem fore, si quod ei datum fuerit alimentum. Ita celerius eum desinere sitire, qui non bibit. Necesse est tamen quanto facilius etiam sani famem, quàm sitim sustinent, tanto magis ægris in potione, quàm in cibo indulgere. Sed primo quidem die nullus humor dari debet, nisi subito sic venæ conciderunt, ut cibus quoque dari debeat. Secundo verò, cæterisque etiam, quibus cibus non dabitur, tamen si magna sitis vrgebit, potio dari potest. Ac ne illud quidem ab Heraclide Tarentino dictum ratione caret, ubi aut bilis ægrum, aut cruditas malè habet, expedire quoque per medicas potiones misceri nouam materiam corruptæ. Illud videndum est, ut qualia tempora cibo leguntur, talia potioni quoque: ubi sine illo datur, \* deligantur, aut cum \* delig. cum ægrum dormire cupiemus. Quod ferè sitis prohibet. Satis autem conuenit, cum omnibus febricitantibus nimius humor



mor alienus sit, tum præcipuè esse foeminis, quæ ex partu in  
 febres inciderunt. Sed cum tempora cibo potionique febris  
 & remissionis ratio det, non est expeditissimum scire quan-  
 do æger febricitet, quando melior sit, quando deficiat. Sine  
 quibus dispensari illa non possunt. Venis enim maximè cre-  
 dimus fallacissimæ rei, quia sæpe istæ \*leniores, celerioresve  
 sunt, & ætate & sexu & corporum natura. Et plerunque sa-  
 tis sano corpore, si stomachus infirmus est, nonnunquam  
 etiam incipiente febres subeunt & quiescunt, ut imbecillus is  
 videri possit, cui facile laturo grauis instat accessio. Contra  
 sæpe eas concitat, & resoluit sol, & balneum, & exercitatio,  
 & metus, & ira, & quilibet alius animi affectus, adedò, ut cum  
 primum medicus venit, sollicitudo ægri dubitantis quomodo  
 \*illi \*ille se habere videatur, eas moueat. Ob quam causam pe-  
 riti medici est, non protinus ut venit apprehendere manu  
 brachium, sed primum residere hilari vultu, percunctarique  
 quemadmodum se habeat, & si quis eius metusest, cum pro-  
 babili sermone lenire, tum deinde eius corpori manum ad-  
 mouere. \*Quam Quas venas autem conspectus medici mouet,  
 quàm facile mille res turbant. Altera res est, cui credimus,  
 calor, æquè fallax. Nam hic quoque excitatur æstu, labore,  
 somno, metu, sollicitudine. Igitur intueri quidem etiam  
 ista oportet. Sed his non omnia credere, ac protinus quidem  
 scire non febricitare eum, cuius venæ naturaliter ordinatæ  
 sunt, teporquè talis est, qualis esse sanis solet. Non protinus  
 \*posse autem sub calore motuque febrem \*fese concipere, sed ita, si  
 summa quoque arida inæqualiter cutis est, si calor & in fron-  
 te est, & ex \*intimis præcordiis oritur, si spiritus ex naribus cum  
 feruore prorumpit, si color aut rubore, aut pallore nouo mu-  
 tatus est, si oculi graues, & aut persicci, aut subhumidi sunt,  
 si sudor cum sit, inæqualis est, si venæ non aquis interuallis  
 mouentur. Ob quam causam medicus neque in tenebris,  
 neque à capite ægri debet residere, sed illustri loco aduersus  
 eum, ut omnes notas ex vultu quoque cubantis \*perpiciat.  
 Vbi verò febris fuit, atque decreuit, \*expectari oportet, num  
 tempora, partésve corporis alia paulum madescant, quæ su-  
 dorem

Venarum  
pulsus.

\*leniores,

\*illi

Officium  
medici.

\*Quam

\*posse

\*intimis

\*perci-  
piat.  
\*expe-  
ctare



dorem venturum esse testentur. Ac si qua nota est, tunc demum dare potui calidam aquam, cuius salubris effectus est, si sudorem per omnia membra diffundit. Huius autem rei causa continere æger sub veste satis multa manus debet, eademque crura, pedesque contegere, qua malè plerique ægros in ipso impetu febris, pessimeque ubi ardens ea est, malè habent. Si sudare corpus cœpit, linteum tepescere oportet, paulatimque singula membra detergere. At ubi sudor omnis finitus est, aut si is non venit, ubi quàm maxime \* potuit, idoneus esse cibo æger videtur, sub veste leniter vngendus est, tum detergendus, deinde ei cibus dandus. Cibus autem febricitantibus humidus est aptissimus, aut humori certè quàm proximus, utique ex materia quàm leuissima, maximeque sorbitio, eaque si magnæ febres fuerunt, quàm tenuissima esse debet. Mel quoque despumatum huic rectè adiiçitur, quo corpus magis nutriatur: sed id, si stomachum offendit, superuacuum est, sicut ipsa quoque sorbitio. Dari verò in vicem eius potest, vel intrita ex aqua calida, vel alica elota, si firmus est stomachus: & compressa aluus ex aqua mulsa: si vel ille languet, vel hæc profluit, ex posca. Et primo quidem cibo ita satis est: secundo verò aliquid adiiçiri potest, ex eodem tamen genere materiæ vel olus, vel conchylum, vel pomum. \* Et dum febres quidem increscunt, hic solus idoneus cibus \* Ac est. Vbi verò aut desinunt, aut leuantur, semper quidem incipiendum est ab aliquo ex materia leuissima: adijciendum verò aliquid ex media, ratione habita subinde & virium hominis & morbi. \* Ponendi verò ægro varii cibi (sicut Asclepiades præcepit) tū demū sunt, ubi fastidio vrgetur, neq. satis vires sufficiunt, ut paulum ex singulis degustando famem vi-  
 tet. At si neque vis, neque cupiditas deest, nulla varietate sollicitandus æger est, ne plus assumat, quàm concoquat. Neque verum est, quod ab eo dicitur, facilius concoqui cibos varios: \* eduntur enim facilius, ad concoctionem autem materiæ, genus & modus pertinent. Neque inter magnos dolores, ut neque increscente morbo tutum est ægrum cibo impleri, sed ubi inclinata iam in melius valetudo est. Sunt

\* tepuit,

\* Ac

\* Appo-  
nendi\* educun-  
tur

P

aliæ



alia quoque observationes in febribus necessariae, atque id quoque videndum est, quod quidam solum præcipiunt, an astrictum corpus sit, an profluat: quorum alterum strangulat quod continet, alterum digerit. Nam si astrictum est, ducenda alius est, mouenda vrina, eliciendus omni modo sudor. In hoc genere morborum sanguinem etiam misisse, concussisse vehementibus gestationibus corpus, in lumine habuisse, imperasse famem, sitim, vigiliam prodest. Vtile est etiam

\* inducere \* ducere in balneum, prius demittere in solum, tum vngere, iterum ad solum redire, multaque aqua fovere inguina, interdum etiam oleum in folio cum aqua calida miscere, uti cibo rarius & serius tenui, simplici, molli, calido, exiguo, maximeque oleribus, qualia sunt lapathum, vrtica, malua, vel iure etiam concharum, muscutorumve, aut locustarum, neque danda caro, nisi elixa est. At potio esse debet magis liberalis, & ante cibum, & post hunc, & cum hoc ultra quam sitis cogget. Poteritque à balneo etiam \* pinguius aut dulcius dari vinum, poterit semel aut bis interponi Græcum salsum. Contrà verò si corpus profluat, sudor coercendus, quies adhibenda erit, tenebris, somnoque quodcumque volet utendum, non nisi \* leui gestatione corpus agitandum, & pro genere mali subueniendum. Nam si venter fluit, aut si stomachus non continet, ubi febris decreuit, liberaliter oportet aquam tepidam potui dare, & vomere cogere, nisi aut fauces, aut præcordia, aut latus dolet, aut vetus morbus est. Si verò sudor exercet, duranda cutis est vel nitro, vel sale, quæ cum oleo miscentur. At si leuius id vitium est, oleo corpus vngendum est: si vehementius, rosa vel melino, vel myrteo cui vinum austerum sit adiectum. Quisquis autem fluore æger est, cum venit in balneum, prius vngendus, deinde in solum demittendus est. Si in cute vitium est, frigida quoque, quam calida aqua melius vteretur. Vbi ad cibum ventum est, dari debet \* is valens, frigidus, siccus, simplex, qui quam minime corrumpi possit, panis tostus, caro assa, vinum \* asperum, vel certe subausterum. Si venter profluit, calidum: si sudores nocent, vomitusque sunt, frigidum.

ENAR-



## ENARRATIO.

**N**ON mirum si famem facilius ferant febrientes quam sitim: quando nausea cibi; fastidium communia quadam accidentia sunt omnium in ventriculo redundantium humorum. Sitis autem quoniam duplici de causa fiat; altera videlicet ob humiditatis inopiam; altera ob caliditatis redundantiam; in febrilibus maxime molesta est, quum in iisdem utraque causa affligant: caliditas enim in illis multa est, & siccitas, ut docet Aëtius, succedit, multa humiditate per violentiam febris consumpta. Si quidem igitur sine detrimento bibere possent quando vellent, hanc sanè sitis medelam amplecterentur statim. quandoquidem verò & mensuram & tempora potus decernere oportet, lenimenta quadam sitis excogitanda sunt: nam intempestive sumptus potus, non solum sitim non extinguit, sed eandem etiam interdum auget. In principiis enim exacerbationum, omnes materia febre accendentes, ad profundum declinant, & propterea sitim intendunt. Datus igitur in illo tempore potus, à materia multitudine superatur, & simul vitiat, accessio fit mali. Quare in principiis & augmentis potus exhibitio nem prohibere convenit; deinde declinatione incipiente potum dare, in remissione verò etiam volentes aliquando coguntur potum assumere, ut ne humore indigi ad exacerbationis accessionem delati, rescissentur atque exsiccantur.

## Sed primo quidem die.

**COLLAPSÆ** vena summam siccitatem & calorem indicant. quare si marasmius subterfugere mens est, consultum est huiusmodi non solum potum rescire, sed etiam, uti precedente capite dictum est, plenius quam morbi ratio postulat, & maturius cibare oportet.

## Acne illud quidem ab Heraclide.

**TARENTINVS** hic Heraclides Em-

piricorū posterior atque probabilior omnium apud suos invenitur, ut auctor est Celsus Siccensis. Ceterum quod is dicebat (ut hic infert Celsus) potionibus medicis noniam materiam miseri corrupta, id quidem non omnino à ratione alienum est in iis febrilibus quæ originem suam humorum cruditati tantum acceptam ferunt. In iis autem quas bilis solummodo concitavit, & quæ macilentum strigosumque quodammodo corpus sortitæ sunt, non solum non materiam peccantem angebimus, sed eandem & imminuimus, & eiusdem calorem refrenabimus.

## Satis autem convenit.

**QUAMQVAM** dicat alio loco Hippocrates victum humidum febricitantibus convenire, non tamen malè hic infert Celsus, omnibus febrientibus alienum esse nimium humorem; quum tantum detrimenti ipsa humoris copia sit allatura, quantum ipsa qualitas commodi. Ac proinde quod mulieribus quæ ex partu febricitant, inimicissimus sit nimius humor, mirum non est, quando febres originis suæ causam acceptam ferè ferant interceptis humoribus, qui aliqui toto puerperij tempore expurgari solebant. Hic autem obiter admonere lubet, locum hunc non citra mendæ suspicionem legi: nam propterea esse mulieribus, hisce mulieribus legere malim.

## Sed cum tempora.

**HIC** quoque locus mendosus esse videtur; siquidem quantum conicere possum, negatina non redundat: Sed cum tempora cibo portioniq. febris & remissionis ratio det, est expeditissimum scire quando æger febricitet. nam nisi ita legamus, sibi ipsi statim contradicet, quum ait, Sine quibus illa dispensari non possunt.

## Venis enim maxime credimus.

**VENAS** hic suo more cum arteriis con-



fundit, quamquam rectius arterias, aut vasa spiritus, sicut Hippocrates, dixisset; quas non immerito fellaces appellat Celsus: nam etiam si quam maximè certa sit de pulsibus disciplina, ei præsertim, qui Galeni de hisdem libris degustavit, tamen singulorum eorum, ad quos accedit medicus pulsuum differentias exactè diiudicare non poterit, nisi sanorum prius probè & exactè exploratum pulsum habuerit: atque ita tandem discernere possit, quantum à sani pulsus discedat ac discrepet: quod Galenus libro De præsignis ex pulsibus faciendū suadet: Nam omnium, inquit, alterationum quæ corpori accidunt, certissimam assequimur in illis corporibus cognitionem, quorum noscimus naturam.

quomodo ille se habere videatur.

RECTE hinc legendum mones Panti-  
nus, illi pro ille.

quàm facilè mille res  
turbant.

CÆSARIUS in alio quodam exemplari legi dicit, cui facile adhuc laturo.

Altera res est.

BENE monet Celsus fallacem, si quem alium, esse calorem: nam præterquam quod is in febribus, aliàs mitis, aliàs mordax, aliàs increscens sit, ita nonnunquam oritur ex aliis causis, quas Cornelius noster hic recitat: nam etiam si quàm maximè ab æstu, sole, labore, & similibus exciteretur calor, nisi à corde in totum corpus diffundatur dispergatūque, atque actiones ledat, febrilis calor nequam dici poterit.

Igitur intueri.

GALENUS De arte curatiua ad Glauconem primo: Maxima signa & præcipua in febricitantibus omnibus ex pulsibus & urinis petuntur: nam partes quas febres maximè occupant, sunt cor, arteria, & vena. Itaque præcipue in febribus notæ ex harum partium actione laesa, & excrementis petuntur; hoc est ex pulsibus, urinis & excrementis.

Alia omnia signa, quæ hic ex Hippocrate Celsus asseruit, obscura, & tanquam minus præcipua vocare solent; quamquam & hæc quoque singula consideranda moneat Galenus, quod nimirum morbi magnitudinem aut contra denotent.

Non protinus autem.

CELSUS hic multa diversaque inter se signa confundit: nam neque omnibus commune est cutim inæqualiter aridam esse, sed tertianis nonnullis tantum febribusque potissimum hec tici; siquidem quotidiana febris, ut originem suam à putrida habet, corporis aut putrida natura, aut studio, ocio, vitæque intemperantia phlegmatica reddita, inuadit, ita cutim aridam non efficit statim. Et neque arteriarum pulsus inæqualis, omnibus febribus communis est: nam ut ex Galeno Aërius, est etiam in tertianis febribus ordo pulsuum exquisitus, & æqualitas: excitatur autem in progressibus exacerbationum pulsus ipse ad vehementiam, magnitudinem ac densitatem. In quotidianis autem febribus in pulsibus manifesta ordinis confusio & inæqualitas adest; rempore irruptionis, exacerbationis præsertim, & velocitas ac vehementia motus ipsis non adest. Et rursus tertianarum spiritus ex naribus magni ac densi cum fenore quodammodo prorumpunt, ac velut flammam quandam efflant, quando sunt, si quæ alia febris, hæc inducat, idque maximè in vigore, hominemque exurat, adeo ut se deinde, & abiciat vestitum. Quotidiana autem neque densam respirationem, neque crebras efflationes excitat. Atque ita de reliquis pronuntiandum censeo: quamquam si quis omnia hæc signa coniuncta velit, maiusmodi febri optime conuenire dixerimus.

Ob quam causam.

IDQUE ex præscripto Hippocratis, qui singula momenta in agrotis perspicenda dicit.

Vbi verò febris fuit.

SVDORIS procreationem breuissimè clarissimèque describit Hippocrates libro De flatibus,



statibus, & De morbis dicit autem: Sudor fit hac de causa, quicunque morbi in indicatorum diebus indicantur, & febrilis ignis dimittit, in his de pinnis & bile quod tenuissimum est eliquatur & secerunt, & secedit, partim extra corpus, partim intus, & isthic quod in corpore relinquitur, partim præ caliditate attenuatur, & vapor fit, & cum spiritu permixtum foras procedit, atque hæc quidem huiusmodi sunt, & ab his sudor generatur. Celsus ad præciliendum sudorem, calidam potui dat, quod hæc humorum repletionem per balium quodammodo digerat, atque excalescat.

### Si sudare corpus cœpit.

NE videlicet sudore iam quodammodo concreto atque frigefacto pori obstruantur, atque adeo naturæ motus interturberetur intercipiaturque.

### At ubi sudor omnis.

QVOD nimirum aduersus vim febris, humiditas quæ unctiōe comparatur remedio sit: nam etsi Hippocrates libro De dieta, unctiōem humectare, calefacere, & mollires dicat, intelligendum tamen est, non usque adeo calefactoriam esse, ut hinc periculum aliquod expectandum sit, quando idem senex quatuor Acutorum, febricitantibus quibus inter initia tenues fuerant urinae, non purgabat, sed quieti permittabat, inungebat, & equaliter coniegebat, nullamque aquosam bibendam & piscinæ cremorem sorbendam dabat: quam curandi methodum hic auctor noster expressisse videtur; nisi quod pro aquosa missa, calidam aquam suo more subtiliter, eamque potui det. Ac proinde, ut edeneniamus unde digressi sumus, non solum quod humectet, febricitantibus utilis censetur unctio, sed quod demulceat ac leniat; quibus maxime opus est his quæ concoquantur maturanturque; ad hæc quod modico calore humoribus vaporibusque discutiendis sit idonea.

### Cibus autem febricitantibus humidus.

FEBRICITANTIBVS (inquit Hippocrates sectione prima Aphorismorum, Apho-

risimo XVI.) omnis victus humidus conuenit; maxime verò pueris, & iis qui tali victu uti consueverunt: si etenim febris calida, & sicca passio est, victus humidus, qui huic ex diametro opponitur, optimè conueniet. humidum autem victum vocat, sicut rectè monet Enchirius, cuius potissimum qui potentia talis sit: quauquam si actu quoque humidus ac liquidus sit, plus proderit. Quod Celsum quoque voluisse verisimile est, quum dicit, aut humori certè quàm proximis. Proderit autem talis victus non solum ea ratione quod humectet, sed etiam quod faciliè concoquatur ac distribuatur. Ciborum autem facultates sigillatim hic recensere longius esset, quàm presens exigat locus. quare si quis eorundem plenioris explanationem desideret, nostras in præcedentem librum Enarrationes consulat.

### ratione habitâ subinde & virium.

CONIECTVRARI enim, ut docet Hippocrates, oportet an aeger cum victu sufficiat perdurare donec morbus consistat, & numquid prius ille deficiat, nec possit perdurare cum victu, vel morbus ante deficiat atque hebescat.

### Ponendi verò ægro varii, &c.

CONCEDO varietatem ciborum, si eisdem oculos tantum pascamus, ac varietate ciborum illecti, vnius alicuius appetitus teneamur: nam alioqui nihil alienius à natura, quæ simplicissimis contenta est, quàm ferculorum opsoniorumque varietas: siquidem, ut auctor est Galenus commento in Hippocratem De ratione victus in morbis acutis, cibi multiplices, & præsertim qui facultate dissimiles sunt, magnam in ventre prægignunt perturbationem; quæ ad cibi concoctionem nihil aduersatur magis.

### ut neque increfcente morbo.

RECTE dicit impleri cibo, quando autem moderationem præscripsit pro ratione virium hominis & morbi: nam certum est quod



quod ad indicationem usque aliquid subtra-  
hendum sit cito; si vires ferant, tenuissimo  
extremè victis in acutissimis morbis viden-  
dum est.

atque id quoque viden-  
dum est.

HOC ex methodicorum placitis sumptum  
est, ut docet Galenus primo De morbis &  
symptomaticis; illi etenim vitium ob-  
structioni, atque eorundem resolutioni, ac  
laxitati omnes morbos acceptos ferebant:  
quod quàm sit à ratione alienum, facile  
intelligit qui in Galeno utinque ver-  
satus est.

Nam si astrictum est.

OBSTRUCTIO citiore alio aut vri-  
nae subitanea eruptione, aut sudore aut san-  
guinis etiam missione, nonnunquam discen-  
ditur. Ceterum an coëctio vehemens eidem  
prodesse queat, nondum satis assequor: nam  
si in febrilibus obstructio molesta sit, coëctio  
aut agitatio vehemens adeò nihil profecerit,  
ut fomitem febrili calori potius addat, atque  
materiæ crudam adhucdum distributioni  
non satè idoneam in venas totumque cor-  
pus rapiat, atque adeò obstructionem potius  
augeat. Quæ de fame, siti vigiliæque sub-  
iungit, antè explicata sunt. De balneo au-  
tem quamquam præcedente libro abundè di-  
ctum sit, hoc tamen dixisse conveniebat, quòd  
obstructionibus præsentissimo sit remedium: nam  
laxitudinem solvit; præsertim si calidum sit,

& humorum repletionem per halitum di-  
gerit, ac poros cutis obstructione liberat.

Contrà verò si corpus, &c.

QUIES & somnus concoquunt, purga-  
tiones tam arte quàm spontè provenientes  
reprimunt; motus contrà easdem exagitat:  
nam, ut in Aphorismis Hippocrates, quoties  
magis purgare volueris helleborum, moneto  
corpus. indicat autem navigatio turbatione  
moveri corpus.

Nam si venter fluit.

VETUS axioma est, fluxum fluxu se-  
dari; sic fluxa alio laborantibus materiam  
avertimus, & vomitorium exhibemus; quan-  
quam id non semper & ubique tutum sit:  
nam inflammatione vexatæ præcordiis aus-  
latere (ita enim præcordia dolentia in-  
telligit Celsus) inflammatio vomitus exagita-  
tione augetur, & neque repida portio  
sufficiens erit ad compeſcendū malum, quum  
stomachum planè sulnerat: quare & in  
his quibus nihil continet stomachus, repida  
nihil alienius est, ut præcedente libro dixi.

rosâ vel melino.

ROSACEI irritatio aut irrigatio non  
solum sudorem cohibet, sed & quodammodo  
suum mitigat: nam, ut auctor est Aëcius,  
Inunctio rosacei, melini aut myrrini olei su-  
dorem cohibet, non solum sua frigidi-  
tate & astrictione; sed & emplastica qualitate vi-  
præditum est. Rosam autem hîc aliisque lo-  
cis Celsus pro rosaceo ponit.

## CAPUT VII.

*Quomodo pestilentes febres curari debeant.*

DESIDERAT etiam propriam animadversionem in fe-  
brilibus pestilentiae casus. In hanc minimè utile est, aut  
fame, aut medicamentis uti, aut ducere aluum. Si vires si-  
nunt, sanguinem mittere optimum est, præcipueque si cum  
dolore febris est. Si id parum tutum est, ubi febris aut tenua-  
ta est, aut leuata est, vomitu pectus purgare. Sed in hoc ma-  
turius,



turius, quàm in aliis morbis, ducere in balneum opus est, vinum calidum & meracius dare, & omnia glutinosa. Inter quæ quoque carnem generis eiusdem. Nam quo celerius eiusmodi tempestates corripunt, eo maturius auxilia, etiam cum quadam temeritate rapienda sunt. Quòd si puer est qui laborat, neque tantum robur eius est, ut sanguis mitti possit, siti ei utendum est, ducenda aluus, vel aqua, vel ptisanæ cremore, tum demum is leuibus cibis nutriendus. Et ex toto, non sic pueri ut viri curari debent. Ergo, ut in alio quoque genere morborum, parcius in his agendum est. Non facile sanguinem mittere, non facile ducere aluum, non cruciari vigilia, faméve, aut nimia siti, non vino curare satis conuenit. Vomitus post febrem eliciendus est, deinde dandus cibus ex leuissimis, tum is dormiat: postero quoque die si febris manet, \*abstineatur. Tertio ad similem cibum redeat. Danda-  
 \*absti-  
 neat.  
 que opera est, quantum fieri potest, ut inter opportunam abstinentiam cibosque opportunos, obmissis cæteris nutriatur. Si verò ardens febris extorret, nulla medicamenti danda portio est, sed in ipsis accessionibus, oleo & aqua refrigerandus est, quæ miscenda manu sunt donec albescant, & conclauitendus, quòd multum & purum aërem trahere possit, neque multis vestimentis strangulandus, sed admodum leuibus tantum velandus est. Possunt etiam super stomachum imponi folia vitis in aqua frigida tincta. Ac ne siti quidem nimia vexandus est, alendus maturius est, id est, à die tertio, & ante cibum iisdem perungendus. Si pituita in stomacho coit, inclinata iam accessione, vomere cogendus est, & tunc dandum frigidum olus, aut pomum ex his; quæ stomacho conueniunt. Si siccus manet stomachus, protinus vel ptisanæ, vel alicæ, vel oryzae cremor dandus est, cum quo recens adeps cocta sit. Cum verò in summo incremento morbus est, utique non ante diem quartum magna siti antecedente, frigida aqua copiose præstanda est, ut bibat etiam ultra satietatem: & cum iam venter & præcordia ultra modum repleta, satisque refrigerata sunt, vomere debet. Quidam ne vomitum quidem exigunt, sed ipsa aqua frigida tantum ad satietatem data pro medica-



medicamento vtuntur. Vbi vtrumlibet factum est, multa veste operiendus est, & collocandus vt dormiat. Fereque post longam sitim & vigiliam, post multam satietatem, post infractum calorem plenus somnus venit, per quem ingens sudor effunditur, idque presentissimum auxilium est. Sed in his tamen in quibus præter ardorem, nulli dolores, nullus præcordiorum tumor, nihil prohibens, vel in thorace, vel in pulmone, vel in faucibus, non vlcus, non \* deiectio, non profluuium alui fuit. Si quis autem in huiusmodi febre leuiter tussit, is neque vehementi siti conflictatur, neque bibere aquam frigidam debet, sed eo modo curandus est, quo in cæteris febribus præcipitur.

\* deiectio,

### ENARRATIO.

IN pestilentibus, inquit Aëtius, & carbunculosis febribus venæ quidem sectio- nem adhibemus statim in principio; non autem cibi contrahitionem: fames enim peiorem materiam facit, & vires in his conseru- dat quas integras seruare volumus, maxime in pestilentibus.

aut medicamentis.

NE SCIO quam rectè Celsus in pestilentibus febribus vereatur medicamentis sollicitare aliam; præsertim quando Galenus, Egineta, Aëtius, & quotquot sunt alij, plenum corpus vacuant, impurum purgant, sicca humectant, vdaque exicare non verentur; siquidem, vt rectè docet Ruffus, ventris summa habenda ratio est, itemque per urinas & ex toto corpore facta purgatio, aliaque in hoc casu viles sunt. Quanquam si ex debilitate virium malum aliquod in periculo sit, non admodum tuta erit alui per medicamenta purgatio, quemadmodum etiam si ex intemperie medicamenti purgantis plus periculi immineret, quam lenamini ex materia peccantis ablatione. legimus enim in Epidemius quã fuerit multis perniciofa alui fluxa: Quare, consultiissimum erit, ventrem astrictiorem mollire (vt vocat Hippocrates)

sorbitionibus attractoriis, ac cauere à vehementioribus illis pharmacis.

præcipueque si cum dolore.

PER dolorem, vt iam sapius dictum est, inflammationem aut tensionem alicuius partis intelligere oportet.

Si id parum tutum est.

QUANDO tutum sit venam tundere, præcedente libro dictum est; ac quod in morbis constitutionibusque pituitosis non admittatur sanguinis missio, autè mentionimus, & quod stomachus pituita fluctuans vomitu expurgandus sit, primo libro docuit Celsus, & sequenti capite demonstrat, quum dicit, Si pituita in stomacho coit inclinata iam accessione, vomere cogendus est: neque id iniuriã; quando videamus in pestilentibus febribus, sponte vomitiones non solum pituitosas, sed & biliosas fieri. non sunt tamen ad vomitum leui de causa urgendi.

Sed in hoc maturius quam in aliis.

QUOD nimirum sudores foras euocant, ac materiam venenosam ab interioribus ad exteriora eliciant: quanquã & non inutilia fuerint



futura sint balnea, si leni fluxione vexetur alius; sicuti inidonea sunt, quibus eadem valde fluxa est, & qui ex sudoris copia animo facile deficiunt.

### vinum calidum & meracius.

NESCIO qua ratione in pestilentibus febribus vinum calidum & meracius dare præcipiat; quando alij omnes si ardore astuet ager, & flamma usque ad pectus pertingat, portionē frigidam offerant; idq; non in parua quantitate, nam magis hoc pacto accenditur febrilis calor, verum confertim, ut flammam extinguat. nisi forte Celsum nostrum ad arcendam ulteriorem putredinem conservandasq; vires meracum propinare dicamus, sicuti primo libro in conservatione à peste, idem alternis diebus modò aquam, modò vinum præscribit. Verum etsi quàm maximè hoc concedamus, non poterimus tamen negare, quin vino materia febrilis augeatur intendaturque; adeò ut si deliria phrenitidesque non præcesserint, statim subsequutura constans suspitio sit: auctor enim est Galenus, nonnullos ob meraci vini potum liberaliorem in causam incidisse. Quare si in febribus aliquo modo conservandam virum gratia exhibendum sit, id erit tenue & oligophorum; neque enim quæ in prophylactice bono sunt, in morbi curatione semper locum habent.

### & omnia glutinosa.

GLUTINOSA omnia carnem quoque eius generis exhibent, quod in stomacho non ita facile corrumpunt; præstaret tamen hæc exhibere quæ parva mole multum nutrant, ut ita robori virinum consilium foret, & ne copia cibi vires, cum ad grane aliquod onus fatiscerent.

### Nam quo celerius.

CELSVS hic eam quæ ex anni tempestatibus oritur, pestem tantum videtur intellexisse: quæ, si Galeno credimus, inter omnes periculosissima est, ac extremos habet labores; ac proinde exirentē exquisitè remedia

efflagitat: adeò ut non oblata commoda occasione, non habita morbi ratione, intempestivum nonnunquam remediumque remedium (ne vi morbi suffocetur ager) experiri satius sit quàm nullum.

### Quod si puer est.

QVOD in pueris sanguinem mittere liberum non sit, dictum est: at quod iisdem pestilenti febre correptis sitis iniungenda sit, non omnino verisimile videtur; præsertim quando Hippocrates febrientibus victum humidum, idq; maximè pueris & qui tali victu vii consueverunt, utilem dixit. Nisi forte quis Celsum pueros sui laceffendos dixisse dicat, quod quum temperie humidiorē sint, egeant conversione quadam in diuersum, quod & calor ipse febrilis, & abstinentia potus facillimè efficiant. Penes alios tamen iudicium esto, sitisne an moderata potio iisdem præscribenda sit: nam & paulo post, nimia sitim in pueris suspectam habet.

### ducenda aluus.

PTISANA viscositas, ut auctor est Hippocrates, lenis est, continua, iocunda, lubrica, & mediocriter humens, sitim minimè infert; & si quid abluī debet, probè abluir; neque astringit, neque malè turbat, neque in ventre tumescit. Bene ergo Celsus ptisana cremorem ut medicamentum & cibum propinat; neque enim vehementiora tulerint, quum substantia eorum continue dissetur. Rectè etiam parcius in eis agendum est, tum ob vitæ antea consuetudinem, tum ob vires, tum ob corporis constitutionem: nam quum ad somnum propensi sint, vigilas non ferent; & quum natura voraces sint, inediā famēque nullo modo tulerint: nam qui crescunt, ut ait Hippocrates, plurimum habent calidi innati, plurique indigent alimento. & alio loco, Senes, dicit, optimè ieiunium ferunt; secundo loco qui aetatem consistentem habent; minus adulescentes; omnium minimè pueri, præsertim qui inter ipsos sunt vinidiores.

q.

non.



### non vino curare satis conuenit.

NIHIL pueris aequè aduersatur quàm vinum; adeò ut Galenus vinum pueris datam aequiparet oleo quod igni infunditur. Vomitus autem provocandum post febres dicit, tunc ut si quæ crudæ suspicio in ventriculo sit, per vomitum expellatur; tum ut biliosa, quæ stomachi villis adhærere solent, vniâ remoueantur.

### Si verò ardens febris.

PANTINVS hic mendum subesse suspicatus, si verò febris ardens exerceat legendum censeat: ego scire (ut eius bona eius venia dicam) quemadmodum mecum habet exemplar, extorret legere malim, quod tunc τὸ καὶ τοῦ συνδεδωκότος, (ut sunt lingua ariditas, crassities & nigredo, deiectiones pallide, sitis vehemens, ventriculi rostitio, vigilia deliriumque) torrefactionem quandam præ se ferant.

### nulla medicamenti danda portio.

PRIMA in ardente febre auxilia sunt, ut ex Philumeno Aërius, decubitus in locis frigidis qui ad purum ærem patenti ac persistantur, stratum molle ac sapius renouatum, amictula assidue permutata, & satia gracilia non sordida; lectus sit abunde amplius, quæ possint membra calefacta subinde ad alias atque alias eius partes transferri; & per flabellum aer ignior concitetur: epithemata pectori ac stomacho conueniunt imposita, palmule cum vino aut rosaceo aut melico irite. sunt & frigescentia comoda; velut sunt pampini vitis iriti, seris, polygonum, plantago, ramenta cucurbitæ, riuex acutæ. Singulis autem admisceantur mica panis præmadefacta, aut polenta. oportet tamen assiduos horum usus vitare. Celsus conclauis in quo liberum ærem trahere possit, contentus, lecti, cuius non parua habenda est ratio, non meminit.

### alendus maturius est.

MATURAM cibationem vocat, non præ-

proptam, sed quæ cum præmeditatione in tempore, hoc est, post elapsos dies indicat, ut, si virium robor impedimento sit, fiat. sic Hippocrates sortitionem, nisi dies indicatorem transferint, non dat.

### si pituita in stomacho coit.

CELSVS hic per pituitam non quamvis sed saltem tantum quæ ardentis febris nonnunquam origo est, intellexisse videtur. Sic Hippocrates non solum si pituita in stomacho coit, sed & si os amarum fuerit, chyleres & vomitiones conferre dicit, quod videlicet quæ os amarum reddit, vomitione & enematis expurgetur.

### & tunc dandum.

SCILICET ut expurgato illo falso humore, robur ventriculo addatur, obimendaturque falsedo, & ne vomitione inanius ventriculus exerceatur.

### Si siccus manet stomachus.

NIHIL est quod exucis exhaustisque partibus magis comode quàm cremor pituitæ hordeaceæ, quum mediocriter humidus sit, lubricus & viscosus; cui recentis adipem admiscendum suadet, ad maiorem humectationem.

### Cum verò in summo incremento.

SOLO frigida potu extinxisse se ardentissimas in tota febris, auctor est Ægineta. Tempus autem exhibitionis frigida est, inistente vigore totius morbi. Cauendum tamen est ne principalis aliquod viscus afficiatur, ut docet Galenus libro Methodi; exhibendumque est quantum æger bibere potuerit: nam, ut docet Hippocrates, huic aqua mellea; ceteræ, & aquosæ quantum voluerit bibenda da: siquidem (ut Galenus De differentiis febrium primo XII. capite) in hecticam febrem sæpe incidunt ex acuta ardentique febre plerique eorum qui male curantur, maximeque qui frigidam aquam ubi postulasent, adeò nihil eiusmodi biberunt, ut nec



ut nec ullum aliud in frigidans remedium  
thoraci aut hypochondriis adhibere.

& cum iam venter.

AQUA quod natura frigida sit tardè  
peneirat; & quum quàm plurimo tempore  
in præcordiis maneat, corrumpitur, atque  
obstructiones parit: quare Celsus post per-  
fectam refrigerationem, ne obstructione ve-  
xetur hepar, alæque viscera, vomitionem  
prescribit. Aëtius, si quid sit quod frigida  
potionem vetat, eandem temperat cum quin-  
tuplo aqua calide, aut cum modico olei ro-  
sacei: Nam ipsum, inquit, rosaceum, non  
valde frigefacit, & oleositas eius corporibus  
inuis obliata, non permittit ipsa à frigida  
aqua ladi; & simul firmitatem quandam  
exhibet ventri rosaceum, & lubricitatem  
propter oleaginositatem.

Vbi vtrumlibet fa-  
ctum est.

UT ardens febris perfectè solvatur, è  
duobus alterutrum fieri necesse est: aut enim  
extinguendus ardor est; aut biliosi humores  
excernendi sunt: excernuntur autem vomiti-  
one, sudore, & alui excretionem. Sudorem  
hic mouendum dicit Celsus febre in vigore  
existente, aut concoctionis signis in urina ap-

parentibus; si non sit visceris alicuius inflam-  
matio, aut tumor: quamquam & id quoque  
balneo tentasse proderit; nam præterquam  
quod sudores prouocat balneum, quibusdam  
etiam per aluum biliosas deiectiones mouet.

Si quis autem in huius-  
modi febre.

CELSVS hic Hippocratis Aphorismum  
quodammodo innertit: nam is sectione quar-  
ta Aphorismo LIIII. Quibus, inquit, plu-  
rimum secæ tussis leuiter irritantes in febrili-  
bus ardentibus sunt, non multum siti in-  
stantur: neque id mirum est, ut docet Ga-  
lenus: nam si tussis eiusmodi fiant, aut ob  
humidam intemperiem instrumentorum re-  
spirationi inferuentium, aut ob tenuem ali-  
quem paucumque humorem in faucibus aspe-  
ritates distillantem, necessum est tussim par-  
nam esse, madefactis locis quæ ad asperam  
arteriam pertinent. frustra ergo Celsus mo-  
net hosce non granandos vehementi siti, nec  
propinandam frigidam, quod per se ipsi, ut  
rectius monuit Hippocrates, siticulosi om-  
nino non sint, & sauces affectæ frigidam  
non admittant. Quo fit ut suspicer periodon  
hanc à sciolo quodam assutam potius, quàm  
à Celso ita pronunciatam; præsertim quando  
Pinzannum exemplar eam omittat.

## CAPVT VIII.

Curatio semitertianæ febris, quæ  
hemitritæos dicitur.

AT vbi id genus tertianæ est, quod hemitritæon Medici  
appellant, magna cura opus est, ne id fallat. Habet enim  
plerunque frequentiores accessiones, decessionesque, ut aliud  
morbi genus videri possit. \* porrigitque febris inter horas vi-  
ginti quatuor & triginta sex, ut quod idem est, non idem esse  
videatur. Et magnopere necessarium est, neque dari cibum, ni-  
si in ea remissione, quæ vera est: & vbi ea venit, protinus da-  
ri, plurimique sub alterutro curantis errore subito moriun-  
tur:

\* porriga-  
turque f. i.  
h.



tur: ac nisi magnopere aliqua res prohibet, inter initia sanguis mitti debet, tum dari cibus, qui neque incitet febrem, & tamen longum eius spatium sustineat.

## ENARRATIO.

**D**E semitertiana natura, prolixè admodum contra Agathinu libro De differentiis febrium secundo, capitibus VIII, IX, X, & XI. agit Galenus. Est autem duplex modus generationis eius, aut dualis exacerbationibus uno tempore incidentibus, aut statim ab initio utrisque inter sese permixtis. Quando igitur tertiana prapollat febris, magis horrida efficitur febris, & rigoris etiam nonnihil per accessionem assu- mit; quando autem quotidiana superat, perfrictiones quidem summa exercent, pauci verò horrores. At ubi aequales magnitudi- ne fuerint & tertiana intermittens & quo- tidiana continua, inuasio exacerbationis cum horrore contingit, vocaturque semitertiana exquisita: Hippocrates horridam vocare solet, quod per totam ferè accessionem pro- ducatur horror; dicit enim: Febres horri- dica, continua, acuta omnino non intermit- tentes; modus erat semitertiarius, uno die leniores, altero gravior iterum invadentes.

Et magnopere neces-  
sarium est.

GALENVS undecimo methodi sub finem, cibandi opportunissimum tempus in omnibus febribus describit. Scribit autem in hunc modum: Porro aptissimum in febribus qua intermittunt & repetunt, tempus est, quum exhalare iam coeperit febrilis calor; statim enim corpus ad nutrimentum preparant: Huius quoque opportuno tempore ex duplici

coniectato respectu, nempe summo preceden- tis accessionis vigore, & futura principio, ad hac namque spectantes operam dabimus, ut quàm longissimè ab utroque nutrimus. Ergo si spatium quod inter summum prioris accessionis vigorem, & sequentis principium intervenit, satis sit amplum; facile est ido- neum tempus invenire. sin exiguum id fue- rit, alterum facias necesse est, ut aut agrum admodum adhuc calentem nutrias, aut se- quentis accessionis inuasionem iam iam af- futura.

Ac nisi magnopere aliqua  
res prohibet.

SEMITERTIANA quando ex tertiana intermittente & quotidiana continua fit, curationem mixtam quodammodo sortitur: nam neque tantum refrenanda bilis acrimo- nia, atque calori incumbendum est, quan- tum in tertianis exquisitis; neque usque ad incidentibus atque secantibus medicamentis, ut in quotidianis opus est: sed iis qua medio quodam ordine inter hac situata sunt. quare rectè inter initia, quando videlicet in non intermittentibus febribus phlebotomamus, nisi quid obstat, sanguinem mittendum monet. Nam etsi sanguinis visio in tertianis ex- quisitis à Galeno parum probeatur propter bi- lis acrimoniam, in semitertiariis tunc adhibe- tur, quod bilis aliqua ex parte refrenata sit, accessione pituitosa materia.

## CAPVT IX.

## Curatio lentarum febrium.

**N**ON NVNQVAM etiam lentæ febres sine vlla remissio- ne corpus tenent, ac neque cibo, neque vlli remedio lo- cus est. In hoc casu medici curæ esse debet, ut morbum mu- tet. For-



tet. Fortasse enim curationi opportunior fiet. Sæpe igitur ex aqua frigida, cui oleum sit adiectum, corpus eius pertractandum est, quoniam interdum sic euenit, vt horror oriatur, & fiat initium quoddam noui motus, exque eo, cum magis corpus incaluit, sequatur etiam remissio. In his frictio quoque ex oleo, & sale, salubris videtur. At si diu frigus est, & torpor, & iactatio corporis, non alienum est in ipsa febre dare mulsi tres aut quatuor cyathos, vel cum cibo vinum bene dilutum. Intenditur enim sæpe ex eo febris, & maior ortus calor, simul & priora mala tollit, & spem remissionis in ea curatione ostendit. Neque hercules ista curatio noua est, qua nunc quidam traditos sibi ægros (qui sub cautiorebus medicis trahebantur) interdum contrariis remediis sanant. Si quidem apud antiquos quoque ante Herophilum & Erasistratum, maximeque post Hippocratem fuit *πέρων* quidam, • Petro qui febricitantem hominem, vbi acceperat, multis vestimentis operiebat, vt simul calorem ingentem, sitimque exciteret. Deinde vbi paulum remitti cœperat febris, aquam frigidam potui dabat: ac si mouerat sudorem, explicuisse se ægrum iudicabat: si non mouerat, plus etiam aquæ frigida ingerebat, & tum vomere cogebat. Si alterutro modo febre liberauerat, protinus suillam assam, & vinum homini dabat. Si non liberauerat, decoquebat aquam sale adiecto, eamque bibere cogebat, vt mouendo ventrem purgaret. Et intra hæc omnis eius medicina erat. Eaque non minus grata fuit his, quos Hippocratis successores non refecerant, quam nunc est his quos Herophili, vel Erasistrati æmuli, diu tractos non expedierunt. Neque ideo tamen non est temeraria ista medicina, quia plures, si protinus à principiis excepit, interemit. Sed cum eadem omnibus conuenire non possint, ferè quos ratio non restituit, temeritas adiuuat. Ideoque eiusmodi medici melius alienos ægros, quam suos nutriunt. sed est circumscripti quoque hominis; & nouare interdum, & augere morbum, & febres accendere: quia curationem vbi id quod est non recipit, potest recipere id quod futurum est.



## ENARRATIO.

**P**ER lentas febres hoc loco Celsus quotidianas continuas intelligit; ea enim si reliquis comparentur, accessiones lentas magis faciunt, & in longius tempus protrahuntur: ac proinde quando quotidiana continua, præterquam quod ingi paroxysmorum insultu vires prosteruat, ac medicamentis cibationique tempus nullum concedat, & in longius quam vires citra refectiorem ferant, protrahatur tempus, medico imprimis id conandum suadet, ut morbus immutetur; ita videlicet, ut ex continuâ intermittens procreetur: sic enim fiet, ut & cibationi & remedio locus sit.

### Sæpe igitur ex aqua frigida.

**V**ERVM quidem est horrore superveniente posse sanari febrem continuam: siquidem, ut ait Galenus libro De sympt. causis II. cap. VII. ardentem febrem rigor succedens solvit, auctore Hippocrate, quod bilis qua interim in venis continebatur, à natura per carnes ad cutim indicatoriè excutatur. & secundo libro Crisiani cap. 111. dicit, In adurentibus febribus singula accessiones ad integritatem non perveniunt, quoniam qui earum causa est humor, non expurgatur, sed una cum sanguine in venis continetur. verum quando in his bilis vehementius agitur, ac veluti effervesceat, quæque à natura insalescente impellitur, tum rigor supervenit, & febris solvitur; idq; eò magis si signa concoctionis præcesserint, & die critico fiat: nam aliqui Hippocrates suspectos habet rigores, atque indicium difficile asserre dicit, qui dictus parvus fuit. Et ut ad auctoris nostri sententiam veniamus, nondum induci possum ut credam, laudandum rigorem, qui ex perirratatione frigida oritur in continuâ febrili, quando is horrex fuit po-

ius ex repercussione quadam contractu frigida, quam ab expulsiōe materie febrilis ad exteriora. Lauderim igitur frictiōnem magis ex oleo tenui, ut qua possit citius relaxare, & per halitum digerere.

### non alienum est in ipsa febre.

**Q**UI mulsi, febriumque naturam perspectam habuerit, satis intelliget quàm conveniat in ipso febris insultu cyathos tres aut quatuor mulsi propinare: sed nec in ipsa febre tutum erit cibum exhibere, eique admiscere vinum admodum dilutum, quamquam consultius fuerit (si modò alterutrum concedendum sit) dilutum vinum exhibere, quàm mulsum. quare si reliqua quæ sequuntur ordine methodum aliquam præ se ferrent, pro mulso, nullam substiterem, acutè febrieutius non inconuenientem: verum quoniam quæ subiungit, omnia ferè à vera methedo quàm alienissima sunt, nihil immutare statimur; ut videant quibus aliquid iudicii superest, quàm liberè quondam (quod & nunc quoq; nonnulli Egyptæ cum maxima impunitate faciunt) aliorum periculis experimenta conquisuerint. Nam quis nisi amens scim per se aliqui satis molestam excitabit in febribus? quis cyathos aliquot mulsi febrilis caloris fomitem in ipso febris impetu ingeret? quis demum vinum, & suillam assam ex febrilibus conualescenti propinare audeat? Quare si quis exactiorem curandi febres methodum desiderat, Galenum consulat: neque enim consultum est, morbum augere, febresque accendere; sed veri medici est, ardorem ipsum, febremque deinde, atque obuiam in morbo, nec quoquo modo eundem exagitare, i.e. morbi violentia vires collatantur.

CAPVT



## CAPVT X.

*Remedia in febribus ad capitis dolorem, & præcordiorum inflammationem, & ariditatem  
& scabritiem lingue.*

CONSIDERANDUM Metiam est febre sine solæ sint, an alia his quoque mala accedant: id est, num caput doleat, num lingua aspera, num præcordia intenta sint. Si capitis dolores sunt, \*rosam cum aceto miscere oportet, & in id \*ingere, deinde habere duo pitacia, quæ latitudinem frontis longitudinemque æquent. Ex his inuicem alterum in aceto & rosa habere, alterum in fronte, aut intinctam iisdem lanam succidam imponere. Si acutum offendit, pura rosa utendum est. Si rosa ipsa lædit, oleo acerbo: si ista parum iuuant, teri potest vel iris arida, vel nuges amaræ, vel quælibet herba ex refrigerantibus. Quorum quidlibet ex aceto impositum dolorem minuit, sed magis aliud in alio. Iuuat etiam panis cum papauere iniectus, vel cum rosa, cerussa, spumæve argenti. Olfacere quoque vel serpyllum, vel anethum non alienum est. At si in præcordiis inflammatio & dolor est, primò superimponenda sunt cataplasmata reprimentia, ne si calidiora fuerint, plus eò materiæ concurrat. Deinde ubi prima inflammatio se remisit, tunc demum ad calida & humida veniendum est, ut ea quæ remanserint, discutiant. Notæ verò inflammationis sunt quatuor, rubor & tumor, cum calore, & dolore. Quo magis errauit Erasistratus, qui febrem nullam sine hac esse dixit. Ergo si sine inflammatione dolor est, nihil imponendum est. Hunc enim statim ipsa febris soluit. At si neque inflammatio, neque febris, sed tantum præcordiorum dolor est, protinus calidis & siccis fomentis uti licet. Si verò lingua sicca est, & scabra, detergenda primùm penicillo est ex aqua calida. Deinde ungenda mistis inter se rosa & melle. Mel purgat, rosa reprimat, simulque siccescere non sinit. At si scabra non est, sed arida, ubi penicillo deterfa est, ungi ros. debet, cui ceræ sit paulum adiectum.

\*ros. id est,  
rosaceum  
\*ingere  
duo pitacia.

ENAR-



## ENARRATIO.

**H**ic semel monendum est, uniuersalia dicta remedia, particularia semper praecedere debere. Quare nihil applicandum etiam maximè dolenti capiti, nisi post conuenientem materiae euacuationem, & in accessuum declinationibus; ac tum quidem contritiò fime rosam, hoc est oleum rosaceum, fronti temporibusque applicabimus; digerit enim atque repellit: atque ei iurò admiscimus acetum, tum quòd genuina quadam facilitate, capitis doloribus sedandis accommodum sit, tum quòd rosaceum oleum sua tenuitate ad interiora deducat. exhibemus autem hac si aestas sit, & febris calida, frigida; sin hiems, neque aduersus febris, calida aut tepida.

vel iris arida.

**Q**UOD iris capitis dolores sedet, auctor est praeter alios Dioscorides; qui eandem cum rosaceo & aceto capite dolentibus utiliter illini dicit: Pliniusque, qui illam cum cotoneis & struthis illinit. Verum an rectè frigidis ascripserit herbis, alij diiudicent: clarum siquidem est ex ordine calefacientium irin esse. Hic etiam expendendum moneo, num satis rectè amarum nucem inter refrigerantia collocarit; quando omnes quatuor sunt, (sola Anacardium excepto) amara calida esse pronuntiavimus.

Iuuat etiam panis.

**I**D tantum faciendum est si dolor vehementius ingruat, & si aestas sit: nam, ut docet Aëlius, si dolor capitis vehementius incumbat, hyoscyami folia viridia, aut papaueris cum micis panis conueniunt.

Olfacere quoque.

**Q**UOD serpillum capite dolentibus rectè applicetur, docet Dioscorides: Serpillum, inquit, capitis dolores sedat coctum, adiecto rosaceo, & aceto madefactum, potum & illitum. atque idem planè testatur Plinius & Aëlius, ac Paulus ex Æginâ medicus. At

quòd anetho non solum discutiendi, sed & somnum conciliandi facultas insit, priore libro dictum est.

At si in præcordiis inflammatio.

**Q**UID si inflammatio, & quæ eiusdem notæ, docet Galenus initio XII. Methodi Therapeutica; & quòd hac non solum febres subsequatur, sed & easdem pariat, praesertim si viscera occupat, clarius est quàm ut longiore egeat enarratione. Adhibemus autem in principis inflammationis reprimentia, quòd fluxum materiae impediunt, atque ipsius inflammationis impetum compefcant. In augmento post principia, reprimentibus discussoria sunt admiscenda, ut in vigore, dum vehementissimi sunt dolores, mitigatoria applicamus; in declinatione verò ea quæ discutiendi vim habent. Celsus primò cataplasmata reprimentia ponit, deinde ad ea quæ calida & humida sunt venit, ut eadem inflammationis reliquias discutiant.

Ergo si sine inflammatione.

**H**IPPOCRATES ait: Quilus circa præcordia dolor sit absque inflammatione, iis febris superueniens morbum soluit: statusque enim spiritus, aut in aequalis intemperies, quæ doloris causa fuerat, calore febrili dissipatur.

At si neque.

**C**ALEFACERE præcordia, cataplasmatibus, irrigationibus aut fomentis, non semper tutum est; sed in iis tantum, ut quibus nulla superfluitas in corpore oletat.

Si verò lingua sicca.

**L**INGVA in febribus, ut docet Aëlius, aliquando siccatur, & opus habet humectatione; aliquando verò exasperatur magis aut minus, aut diffringitur, aut nigrescit, aut carbonis speciem induit, quod à viscerum inflammatione



inflammatione contingere solet. Paulus non  
solum deterget & inungit linguam, sed  
sternutationes pronocandas dicit, quod lin-  
guas quous alio plenius humectent. Decu-

ritum præterea in latum connenire docet :  
nam supinus cubitus exiccat. adhuc inter  
ut conneniente ore iaceat; hiatus enim ma-  
dorem absorbit.

## CAPUT XI.

*Remedia contra frigus, quod febrem præcedit.*

**S**OLET etiam ante febres esse frigus, idque vel molestissi-  
mum morbi genus est. Vbi id expectatur, omni portione  
prohibendus æger est. Hæc enim paulo antè data, multum  
mali adiicit. Item maturius veste multa tegendus est: admo-  
uenda partibus his, pro quibus metuimus, sicca & calida fo-  
menta, sic, ne statim vehementissimi calores incipiant, sed  
paulatim increſcant. Perfricandæ quoque eæ partes mani-  
bus unctis ex vetere oleo sunt, ei que adiciendum aliquid ex  
calefacientibus. Contentique medici quidam una frictione  
etiam ex quolibet oleo sunt. In harum febrium remissioni-  
bus, nonnulli tres aut quatuor sorbitionis cyathos, etiam num  
ultrà manente febre dant. Deinde, ea bene finita, reficiunt  
stomachum cibo frigido, & \* leni. Ego tum hoc puto ten- \* leui.  
tandum, cum parum cibis semel, & post febrem datus pro-  
dest. Sed curiose perspicendum est, ne tempus remissionis  
decipiat. Sæpe enim in hoc quoque genere valetudinis iam  
minui febris videtur, & rursus intenditur. Itaque ei remis-  
sioni credendum est, quæ etiam immoratur, & iactationem  
fæctoremque quendam oris (quem ὄζον Græci vocant) mi-  
nuit. Illud satis conuenit, si quotidie pares accessiones sunt,  
quotidie paruum cibum dandum: si impares, post grauiorem,  
cibum; post leuiorem, aquam mulsam.

## ENARRATIO.

**Q**UOD ante frigus, & in ipso frigore  
ab omni portione abstinendum sit, capite  
sexto dictum est.

aliquid ex calefacientibus.

QUALIA sunt, piper, castoreum, ca-

chry, chamæmelum, & id genus alia.

Sæpe enim.

EXEMPLARIA hic variant: nam om-  
nia fere iam minimi legunt: Pinzauium  
reliquis melius iam minui febris habet.

r

CAPUT



## CAPVT XII.

*Curatio horroris in febris.*

**H**ORROR autem eas ferè febres antecedit, quæ certum habent circuitum, & ex toto remittuntur. Ideoque tutissimæ sunt \* maxime quæ curationes admittunt. Nam ubi incerta tempora sunt, neque alui ductio, neque balneum, neque vinum, neque medicamentum aliud rectè datur. Incertum est enim quando febris ventura sit: ita fieri potest, ut si subitò venerit, summa in eo perniciēs sit, quod auxiliij causa sit inuentum. Nihilquē aliud fieri potest, quàm ut primis diebus bene abstineat æger, deinde sub decessu febris eius, quæ grauissima est, cibum sumat. At ubi certus circuitus est, facilius omnia illa tentantur, quia facilius proponere nobis & accessionum & decessionum vices possumus. In his autem cum veterauerunt, utilis fames non est. Primis tantummodò diebus ea pugnandum est, deinde diuidenda curatio est, & antè horror, tum febris discutienda. Igitur cum primùm aliquis inhorruit, & ex horrore incaluit, dare ei oportet potui tepidam aquam, subsalsam, & vomere eum cogere. Nam ferè talis horror ab his oritur, quæ biliosa in stomacho resederunt. Idem faciendum est, si proximo quoque circuitu æquè cessit. Sæpe enim sic discutitur. Iamquē quod genus febris sit, scire licet. Itaque sub expectatione proximæ accessionis, quæ instare tertia potest, deducendus in balneum est, dandaquē opera est, ut per tempus horroris in solio sit. Si ibi quoque senserit, nihilominus idem sub expectatione accessionis quartæ faciat, siquidem eo quoque modo sæpe \* id discutitur: si nec balneum quidem profuit, ante accessionem allium edat, aut bibat calidam aquam cum pipere, siquidem ea quoque assumpta calorem mouent, qui horrorem non admittit. Deinde eo modo, quo in frigore præceptum est, antequàm inhorrescere possit, operiatur. Fomentisquē protinus validioribus totum corpus circumdare conuenit, maximequē inuolutis extinctis testis & titiōibus. Si nihilominus hor-

\* maxime.  
quæ cur.

Vomitum.

\* ita



nus horror perripit, multo oleo calefacto inter ipsa vestimenta perfundatur, cui æquè ex calefacientibus aliquid sit adiectum, adhibeaturque frictio, quantam is sustinere poterit, maximeque in manibus & \* pedibus, & spiritum ipse continet, neque desistendum est etiam si horror est. Sæpe enim pertinacia iuvantis, malum corporis vincit. Si quid euomuit, danda aqua tepida, iterumque vomere cogendus est, vten-  
 dumque eisdem est, donec horror finiat. Sed præter hæc, ducenda alius est, si tardius horror quiescit: siquidem id quoque exonerato \* corpori prodest. Ultima quoque post hæc auxilia sunt, gestatio & \* frictio. Cibus autem in eiusmodi morbis maximè dandus est, qui mollem aluum præstet, caro glutinosa, vinum, cum dabitur, austerum.

\*cratibus,

\*corpore

\*vegetatio.

Al. itio vel  
deambu-  
latio.

## ENARRATIO.

IAM sapius dictum est Celsum indifferenter, horrorem, pro rigore ac horrore febrili ponere: Hic autem semel dixisse convenit nec frigori, nec rigori qui crisis ratione promerit occurrendum, nec eius vehementiam obtundendam; verum ei tantum qui ex frigidissima copiosissimaque pituita oritur.

Ideoque tutissima sunt.

RECTE Pantinus hic mendum subesse dicit, legendumque maximeque: nam notus est Hippocratis Aphorismus, Febres quocunque modo intermittentes minis periculose.

In his autem.

IVXTA illud Hippocratis, Viçtus tenuis in morbis longis semper periculosus.

Primis tantummodò diebus.

CIBATIONIS tempora capite sexto abundè explicamus.

Igitur cum primum.

AN vomitus biliosus horrore magnopere conducatur, deliberandum censeo; præsertim quando materia horrida non in stomacho sed in venis potius consistat, ut cuius, qui rigoris horroisque originem perspectam ha-

bet, planum est: rigor siquidem fit, ubi à venis per insensibiles partes, bilis veloxi motu ad exteriora fertur.

Itaque sub expectatione proximæ accessionis.

AVDI quæso Galenum an ubique conveniat balneum: scribit enim in hunc modum libro decimo Methodi: Horrore sanè causam esse dico rodentium excrementorum confertim actuum citatiorem motum. Proinde quilibet est horum abundantia, cavo verò ac cutis densa, sine balneo sunt ingresi, sine steterint in sole, sine quoquo modo vel gestati vel perfricti vel exercitati fuerint, vel vehementius dimoti, utique iis horror incidet. Contrà quibus hæc pauca sunt, & corporis habitus ut remittatur laxeturque à balnei calore promptus, ij non modò non horrent, sed etiam meliores redduntur; utpote excrementis ob id vacuatis. Quo rationalius est, nec in febrilis significationis principio, nec in incremento quisquam agrotantem lauet: Quippe densata est hoc tempore coarctataque & cutis ipsa, & quæ sub hac habetur carnea substantia. Frustrà igitur sub expectatione tertie aut quartæ accessionis in



uis in balneum deducendus est aeger, nisi morbus ipse iam inclinaverit, ac cutis ipsa rara ac perspirata facilis sit, atque humores sales sint, qui ne copia, nec qualitate morbum naturae aliquo modo impediunt.

ante accessionem allium edat.

QVOD de balneo iam diximus, idem de allio quoque & aliis quae subiungit Celsus, pronunciandum cenſeo: nam si cutis astricta sit, atque ante totius morbi remissionem, aut allium aut simile quid propines, quod mate-

riam ad exteriora propellat, non solum non curabis horrorem, sed eundem augebis; ex horrore rigorem faciens, materia confertim illuc lata: huc adde, qualitate ipsius allij calida, febrilem calorem augeri. Satius igitur fuerit ante accessionem cutem abrotano, calamintha arida, thymbra cum floribus, cum folijs, vel costo vel pyrethro, viroque quidem horum cum oleo perficuisse; id namque optimè conveniet, ut testatur Galenus, cum quod poros aperiat atque referet, cum quod leuiter materiam peccantem euocet atque eliciat, & corporis superficiem vinido quodam colore perfundat.

### CAPVT XIII.

#### *Curatio quotidiana febris.*

HAE C ad omnes circuitus februm pertinent: discernendae tamen singulae sunt, sicut rationem habent dissimilem. Si quotidiana est, triduo primo magnopere abstinere oportet, tum cibis altero quoque die uti. Si res inueterauerit, post febrem experiri balneum & vinum, magisque si horrore sublato haec superest.

### ENARRATIO.

CELSVS hic suo more diutius plus satis tribuit: nam quantumvis attenuantem victum desideret quotidiana febre laborantes, triduanam tamen inedia non facile sustulerint. Danda igitur opera est, ut non solum tenuem, sed & incisiorum praescribamus; deinde sub statum vomitorij &

pituitam purgantibus medicamentis vtendum est; ac demum, si nulla supersit cruditatis suspicio, morbusque ipse in longius protrahatur tempus, non fuerit inconsultum experiri balneum siccatum, ut auctor noster ostendit.

### CAPVT XIII.

#### *Curatio tertianae febris.*

SI tertiana verò, quae ex toto intermittit, aut quartana est; medijs diebus & ambulationibus uti oportet, aliisque exercitationibus & vntionibus. Quidam ex antiquioribus medici



dicis Cleophrantus, in hoc genere morborum, multo ante accessionem caput ægri multa calida aqua perfundebat, deinde vinum dabat. Quod quamvis pleraque eius viri præcepta secutus est Asclepiades, rectè tamen præteriiit. Est enim anceps. Ipse, si tertiana febris est, tertio die post accessionem dicit aluum duci oportere, quinto post horrorem vomitum elicere, deinde post febrem (sicut illi mos erat) adhuc calidis dare cibum, & vinum. Sexto die in lectulo \* detineri. \* detinere. Sic enim fore, ne septimo die febris accedat. Id sæpe fieri posse verisimile est. Tutius tamen est vt \* ipso ordine vta- \* hoc ipso mur. Tria remedia, vomitus, alui ductionis, vini potus per triduum, id est, die tertio, & quinto, & septimo tentare, nec vinum nisi post accessionem die septimo bibat. Si verò primis diebus discussus morbus non est, inciditque in vetustatem, quo die febris expectabitur, in lectulo se contineat, post febrem perfricetur, tum cibo assumpto bibataquam: postero die, quo \* cibo vacat & ab exercitatione vñctioneque, aqua \* à cibo tantum contentus conquiescat. Et id quidem optimum est. Si verò imbecillitas vrgebit, & post febrem vinum, & medio die paulum cibi debet assumere.

## ENARRATIO.

**L**EUES obambulationes, & qua circa laborem defatigationemq; obcuntur, in febribus intermittentibus concedi possunt; si tamen vehementiores sint, ac lassitudinis sensum quodammodo inducant, periculo non vacant; potissimum quando quies, vt que humectet, febrientibus optimè conueniat: nam, vt in Epidem. testatur Hippocrates, somnus & quies concoquunt.

## Quidam ex antiquioribus.

**V**IDETVR hic contrarium quodammodo innuere quā Hippocrates segmento Aphorismorum VII. ubi in hunc modum scriptum reliquit: Si febris non ex bile nata sit, aqua copiosa ac calida affusa bilem soluit. nam eo Aphorismo Hippocrates (vt seirè do-

cet Philotheus) putridas febres qua in humoribus consistunt, bilem pro reliquorum humorum exemplo ponens, secludit: atque vtile dicit balneum, diuini hēcticiq; febribus, & in qua ex lassitudine, vñctione, obli- patione cutis in febrem incidunt. Non nego tamen esse putridas in quibus concedatur balneum, sicut rectè dicit Galenus; sed in hā- benda ratio est, vt putridi omnes noxique humores prius expurgati sint; de' immū qui- dem horandi sunt agri, vt quantum eius fieri potest, in balneo morientur. Sed neque aberrauerimus, si bis lauerimus eos qui balneum amant, & que affueri sunt. Est autem balneum ex aqua potabili & calida; talis enim bilis aliquid educit, & humectat, at- que facultate refrigerat.

I 3

deinde



deinde vinum dabat.

VINUM priusquam morbus concoquat<sup>ur</sup> (inquunt Galenus, Aëlius & Aegineta) ex toto circumcidendum est, simulatque concoqui ceperit: tunc aquosum modicum primo exhibendum est; prope solutionem vero uberius. quod alluisse videtur Celsus, dum nisi die septimo post accessionem concedendum dicit quando in tertianis concoctionis puris manifesta signa apparere solent.

### Tria remedia.

QUAE in supremum ventrem confluunt, consultum est per vomitum euacuare, in ipso accessionis initio, ut auctor est Galenus libro Quos purgare oporteat, quod sub id tempus natura illuc bilem protrudat. Quae vero per infernum subeunt, similiter per infernam excretionem in accessionis remissione, quod

natura tunc humorem peccantem, aut ad cutem, aut ad inferiora pellat: tentabimus autem id potius enematum, quam cathartici per superiora ingestis, ne violentia purgantia medicamenti angeatur febris. Omissit autem hic Celsus sudores, & urinae excretionem, quae sola nonnunquam à febrilibus liberant: quare & diuretica exhibenda sunt, & sudor omnibus quo ad fieri potest modis eliciendus est.

aqua tantum contentus  
conquiescat.

ISTUD quidem si nulla suspicio sit inflammationis obstructionisve alicuius visceris, non prorsus alienum erit, ut quod inflammationem arceat: verum quoties alterutra iam innaserit, non sine periculo sumetur. Rectius ergo pituita cremorem aut acetum mulsum exhibueris.

## CAPUT XV.

### Curatio quartanae febris.

EADEM in quartana facienda sunt. Sed cum hæc tardè admodum finiatur, nisi primis diebus discussa est, diligentius ab initio præcipiendum est, quid in ea debeat fieri. Igitur si cui cum horrore febris accessit, eaquæ desit, eodem die, & postero tertioque continere se debet, & aquam tantummodò calidam primo die post febrem sumere, biduo proximo, quantum fieri potest, ne hanc quidem. Si quarto die cum horrore febris reuertitur, vomere, sicut antè præceptum est: deinde, post febrem modicum cibum sumere, vini quadrantem. Postero tertioque die abstinere, aqua tantummodò calida (si sitiet) assumpta: septimo die balneo frigus præuenire, abstinere, continere se debet, & aqua tantummodò calida, si sitiet: ac tum ita septimo die balneo frigus præuenire: si febris redierit, ducere aluum: ubi ex eo corpus conquieverit, inunctione vehementer perfricari, eodem modo sumere cibum, & vinum, biduo proximo se abstinere, frictione seruata: decimo die rursus balneum experiri: & si posita

\* sitis est

\* uti tant.

\* nono  
al. octauo



itea febris accessit, æquè perfricari, vinum copiosius bibere:  
 ac si proximum est, \* quies tot dierum, vt abstinentia cum  
 cæteris quæ præcipiuntur, febrem tollant. Si verò nihilomi-  
 nus remanet, aliud ex toto sequendum est curationis genus.  
 Idque agendum, vt quod diu sustinendum est, corpus faciliè  
 sustineat. Quominus etiam curatio probari Heraclidis Ta-  
 rentini debet, qui primis diebus ducendam aluum, deinde  
 abstinendum vsque in septimum diem dixit. Quod vt susti-  
 nere aliquis possit, tamen etiam febre liberatus vix refecti-  
 oni valebit. Adèd si febris sæpius accesserit, concidet. Igitur si  
 tertio decimo die morbus remanebit, balneum neque ante fe-  
 brem, neque post eam tentandum erit, nisi interdum iam  
 horrore discusso. Horror ipse per eadem quæ suprà præscri-  
 pta sunt, expugnandus. Deinde post febrem oportebit vngi,  
 & vehementer perfricari, cibum & validum & fortiter assu-  
 mere, vino vti quantum libebit, postero die cum satis quie-  
 uerit, ambulare, exerceri, vngi, perfricari fortiter, cibum ac-  
 cipere sine vino. Tertio die abstinere. Quo die verò febrem  
 expectabit, antè surgere, & exerceri: dareque \* operam non  
 oportet, vt in ipsam exercitationem tempus febris incurrat. \* operam  
 Sic enim sæpe illa discutitur. At si in opere occupauit, tum  
 demum se recipere. In eiusmodi valetudine medicamenta  
 sunt, oleum, frictio, exercitatio, cibum, vinum. Si venter  
 astrictus est, soluendus est. Sed hæc faciliè validiores faciunt,  
 \* si imbecillitas occupauit, pro exercitatione gestatio est. Si  
 ne hanc quidem sustinet, adhibenda tamen frictio est: si hæc  
 quoque vehemens onerat, intra quietem, & vntionem, &  
 cibum sistendum est, dandaque opera est, ne qua cruditas in  
 quotidianam id malum vertat. Nam quartana neminem iu-  
 gular, sed si ex ea facta quotidiana est, in malis æger est. Quod  
 tamen nisi culpa vel ægri vel curantis \* nonnunquam fit. \* nunquā

## ENARRATIO.

QVANTVM hic passim à vera me-  
 thodo deuier Celsus, qui aliqua ex par-  
 te in Galeno versatus est, facile intellexit:

nam præterquam quòd diatriam quandam  
 hic, vt in aliis, sudeat inculcare, totam  
 etiam methodum inuertit, ac præposteram  
 quandam



quandam errandi rationem inuebit; in ea præsertim febre, quæ summam diligentiam exactissimumque iudiciū, & maximam in morbus exercitationem requirit: quum quartana talis sit, ut leniter blandèque tractari velit, quod nimirum humor qui eam efficit, difficile medicamentis obtinere: agere enim per initia, & antequam concoctionem sit expertus, irahens medicamentum sequitur; tum propter crassitatem ac frigiditatem; tum quod viis angustis per quas transit obstruat; tum quod in carnoso genere residet, & infarsus meatibus sit. Non sunt igitur quartanarij excrucian di inedia in principis: & neque post decimum quartum diem crasso cito atque eo fortiter assumpio (ut paulo post dicit) rescicndi; verum per initia (sic tamen ut in accessionibus abstinemus) adhibendus est cibis boni succi, omni flatu expers, qui ne vires quæ longitudini morbi sufficiens seruet augereque, atque sanguinem sua substantia augeat. In vigore tamen morbi, ut in reliquis omnibus febribus, tenuiore victu utendum est, iubendūq; sunt acri diu quiescere, tantū abest ut exercitia hic quicquam prosint. Ceterum quod de calide propinatione dicit, id quidem nonnunquam, si natura ad vomitum propiniores sit, a cibo faciendum est, ut quæ cum digesto cito per vomitum noxiū humor educatur.

#### Septimo die balneo frigoris præuenire.

GALENVS De arte curatiua ad Glauconem primo, A frictionibus siquid balneis, ambulationibus, aliisque consuetis, arcendi penitus non sunt; verum si a balneis abstinere omnino possent, solis contenti frictionibus, plurimum mirarentur, quod videlicet, quatenus refrigerent, balnea obstant; quatenus autem foras euocant, obstructionis periculum afferunt, maximeque si corpus reddidat excrementis crudis.

#### si febris redierit, ducere aluum.

QVVM atra bilis, quæ quartanæ origo est, alias ad entim feratur, nunc ad stomac-

chum, nonnunquam etiam in venis visceribusque, liepe præsertim, delitcat; diuersos purgandi scopos requirit. Bene igitur adhibetur frictio ad euocandum si quid ad eum latum sit: nec inconsultum est propinare medicamentis purgantia, ut si quid per aluum expurgari possit, purgeatur. Verum an id à septimo statim die faciendum sit, non possum induci ut credam; præsertim quando, ut iam dictum est, humor non sit expurgandus ante concoctionem, contumaciorene sit quàm ut tantillo temporis intervallo incidi atque expulsionem idoneus reddi possit.

#### Deinde post febrem oportebit vngi.

QVAMVIS Galenus loco iam antè citato, frictiones, ambulationes, & id genus alia consueia, non penitus intermittenda dicat, non tamen admittit vehementiores obambulationes aut frictiones, quod obstructionis periculum faciant: verum permittendas tantum dicit, idq; minus quàm per sanitatem consueuerimus: neque enim tam crebro tamque vehementer fricare, ambulare, aut alio quouis modo corpus exercere licet, quàm per sanitatem; & neque id statim post febrem tentandum est, sed inter accessiones, & quàm potest feri ab isdem longissime.

#### vinum.

CVIVS generis est tenue, album, mediocriter calidum; hoc enim sua tenuitate, crassitudinem humoris melancholici extenuat, caloris mediocritate, corpus humore melancholico refrigeratum sic satis calefacit, & urinas pronocat. Crassum verò & calidum humiditatem resoluit, crassum humorem digerit, atque diffusius concoquitur.

#### Horror ipse.

Id hunc usum Galenus exhibet iheriacen, & medicamen quod ex liquore Cyrenaco fit.

#### dandaque opera est.

PER quotidianam quæ ex quartana facta sit, hoc & secundo ab hoc capite, intelligere videtur



videtur quartanam continuam; eam etenim quod quotidie inuadat, at quo accessiones suas faciat, quotidianam nominat.

### Nam quartana.

QUARTANA quidem si simplex sit, atque nullius visceris obstructionem cōcomitur, simplex est & neminem ingulat: nam, ut auctor est Hippocrates primo Epi-

demion, quartana omnium est seuerissima, longissima, facillima; hæc enim non est ipsa per se tantum talis, sed etiam magnis aliis vindicat malis; verum si obstructionem aut lienis aut hepatis subsequatur, non solum non mitis est, sed & subinde sæuissima superinducit accidentia; qualia sunt, respirationis difficultas, & incurabilis hydrops.

### CAPVT XVI.

#### *Curatio duarum quartanarum.*

AT si duæ quartanæ sunt, neque hæ, quas proposui, exercitationes adhiberi possunt, aut ex toto quiescere opus est: aut, si id difficile est, leuiter ambulare, considerare diligenter inuolutis pedibus & capite. Quoties febris accessit & desit, cibum modicum sumere & vinum: reliquo tempore, nisi imbecillitas vrget, abstinere. \* Aut si duæ febres penè iunguntur, \* At post vtrāq. cibum sumere. Deinde vacuo tempore & moueri \* aliquid, & post vnctionem cibo uti. Cū verò vetus \* aliquantum, quartana rarè, nisi vere soluatur, utique eo tempore attendendum est, ne quid fiat, quod valetudinem impediat. Prodestque in vetere quartana mutare subinde victus genus, à vino ad aquam, ab aqua ad vinum, à lenibus cibis ad acres, ab acris ad lenes transire, esse radicem, deinde vomere, iureve pulli gallinacei ventrem resolvere, oleum ad frictiones adicere, calefacientia ante accessionem sorbere, vel aceti cyathos duos, vel vnum sinapis, cum tribus Græci vini salsi, vel mista paribus portionibus, & in aqua diluta, piper, castoreum, laser, myrrham. Per hæc enim similiaque corpus agitandum est: ut moueatur ex eo statu quo detinetur. Si febris quieuit, diu meminisse eius diei conuenit, eoque vitare frigus, calorem, cruditatem, lassitudinem. Facile enim reuertitur, nisi à sano quoque aliquandiu timetur.

f

ENAR-



## ENARRATIO.

**B**ENE admodum hîc maiorem quietem iniungit, quod corpus maiore humectatione opus habeat, & quod quies ipsa per se duorum dierum continuatis accessibus, recreandis viribus summè sit necessaria.

## Cum verò vetus quartana.

INTER anni tempora autumnus, si quis alius, quartana procreanda idoneus est: quare quæ extra autumnum quartanae invadere solent, raro in longius tempus protrahuntur; nam & æstiva quartana brevis sunt, ut antè dictum est, autumnales verò longæ, & maxime quæ hiemem attingunt, neque ante ver solvuntur, & si vere non finiantur, in integrum annum prorogantur: Nam, ut docet Hippocrates, qui vere gignuntur morbi, eos in autumno solummodo expectandum est; autumnales morbos vere terminari necesse est. Bene igitur sub ver cavendum monet Celsus, ne quid attentemus quod valetudini nocuum sit: nam & lenissima causa naturam crisi morbi intentam in officio retardaverimus, & inceptam iam crisin impediemus, morbumque non solum annum (praesertim si duplex quartana sit,) sed & exitialem prorsus faciemus.

## Prodestque in veterè quartanâ.

VICTVS ista alteratio non omnino aliena erit, si incisoria attenuansque, ac nullius lentior sit particeps: nam hîc unice studendum est, ut præcedente capite dictum est, ut materia expulsionem aliquam rebellis ac contumax, quoniam modo incidatur attenueturque.

## à vino ad aquam.

NE SCIO quàm sit hæc mutatio à vino ad aquam libera, ei præsertim qui longa quartana detinetur, cui magna ex parte solet esse comes visceris alicuius obstructio, frigida (si quod aliud) respo-

## Si febris quicuit.

QUARTANÆ origo est melancholia, quæ ut tardè accenditur atque accessiones facit, nunquam etiam dies aliquot intus delitescit, febrisque suspicionem omnem amonet; ita ut nisi convenienter victus ratione utatur patiens, post multos dies regredi soleat.

## CAPUT XVII.

## Curatio quotidiana febris, quæ ex quartana facta sit.

\* initio

**A**T si ex quartana quotidiana facta est, cum id \* vitio inciderit, per biduum abstinere oportet, frictione uti, aquam tantummodo vespere potui dare. Tertio die sæpe fit, ne febris accedat: sed siue fuit, siue non fuit, cibus post accessions tempus est dandus: at si manet, per biduum abstinentia, quanta \* maximè imperari corpori potest, frictione quotidie utendum est.

\* maxima

ENARR-



## ENARRATIO.

QVARTANA continua, si quæ alia febris, pernicioſa eſſe ſolet, quod acceſſionum continuo inſultu vires labſcant, neque perdurare poſſint dum morbus conſiſtat. Cæterum an hic tidiſſima illa aſtinentia, quam nuſquam non Celfus noſter inſinuat, conueniat; & an frictio ſit ex re, nondum induci poſſum ut credam; præſertim quando

Galenus in breuibus quidem quartanis frictiones admittat, in longis autem, quales continua eſſe ſolent, non uſque adeo commendet. Cibandum igitur quotidie, quantum vires ac morbus eſſagiat, frictionibusque utendum non quotidie, ſed quando naturam expulſionem moliri coniectura eſt.

## CAPVT XVIII.

*De tribus inſania generibus, & primò de eius curatione, quæ à Græcis phrenitis dicitur.*

ET februm quidem ratio expoſita eſt. Superſunt verò alii <sup>• curatio</sup> corporis affectus, qui huic ſuperueniunt, ex quibus eos, <sup>• his</sup> qui certis partibus <sup>• aliis poſſunt</sup> assignari non poſſunt, protinus iungam. Incipiam ab inſania, primamque huius ipſius partem aggrediar, quæ & acuta, & in febre eſt, Græci phrenitis appellant. Illud ante omnia ſcire oportet, interdum in acceſſione agros deſipere, & loqui aliena. Quod non quidem leue eſt, neque incidere poteſt, niſi in febre vehementi, non tamen æquè peſtiferum eſt. Nam plerumque breue eſſe conſuevit, leuatoque acceſſionis impetu, protinus mens redit. Neque id genus morbi remedium aliud deſiderat, quàm quod in curanda febre præceptum eſt. Phrenitis verò tum demum eſt, <sup>Phrenitis.</sup> cum continua dementia eſſe incipit, aut cum æger, quamuis adhuc ſapiat, tamen quaſdam vanas imagines accipit: perfecta eſt, ubi mens illis imaginibus addicta eſt. Eius autem plura genera ſunt. Siquidem ex phreneticis alii hilares, alii tristes ſunt, alii facilius continentur, & intra verba deſipiunt, alii conſurgunt, & violenter quædam manu faciunt: atque ex his ipſis alii nihil niſi impetu peccant, alii etiam artes adhibent, ſummamque ſpem ſanitatis in captandis maiorum operum occaſionibus præbent, ſed exitu deprehenduntur.

f 2

Ex his



Ex his autem eos qui intra verba desipiunt, aut leuiter etiam manu peccant, onerare a superioribus coercitionibus superuacuum est. Eos verò qui violentius se gerunt, vincere conuenit, ne vel alteri vel sibi noceant. Neque credendum est, si vinculus aliquis, dum leuari vinculis cupit, sanum iam se fingat, quamuis prudenter & miserabiliter loquatur, quoniam is dolus insanientis est. Ferè verò antiqui tales ægros in tenebris habebant, eò quòd eis contrarium esset exterreri, & ad quietem animi tenebras ipsas conferre aliquid iudicabant. At Asclepiades, tanquam tenebris ipsis terrentibus, in lumine habendos esse dixit: neutrum tamen perpetuum est. Alium enim lux, alium tenebræ magis turbant, reperiunturque in quibus nullum discrimen deprehendi vel hoc, vel illo modo possit. Optimum itaque est vtrunque experiri, & habere eum, qui tenebras horret, in luce, eum qui lucem, in tenebris. At vbi nullum tale discrimen est, æger si vires habet, loco lucido, si non habet, obscuro continendus est. Remedia verò adhibere, vbi maximè furor vrget, superuacuum est: simul enim febris quoque increscit. Itaque tum nihil nisi continendus æger est. Vbi verò res patitur, festinanter subueniendum est. Asclepiades perinde esse dixit, his sanguinem mitti, ac si trucidentur: rationem hanc secutus, quòd neque infania esset, nisi febre intenta: neque sanguis, nisi in remissione eius rectè mitteretur. Sed ipse in his somnum multa frictione quæsiuit, cùm & intentio febris somnum impediatur, & frictio non nisi in remissione eius utilis sit. Itaque hoc quoque auxilium debuit præterire. Quid igitur est? Multa in præcipiti periculo rectè sunt, aliàs omittenda. Et continuata quoque febris habet tempora, quibus & si non remittit, non tamen crescit. Estque hoc, vt non optimum, sic tamen secundum remedii \* genus. Quod si vires ægri patiantur, sanguis quoque mitti debet. Nec minus deliberari potest, an alius ducenda sit: tum interposito die conueit caput ad cutem \* rondere, deinde aqua fouere, in qua verbenæ aliquæ decoctæ sint, vel \* ex reprimmentibus: aut prius fouere, deinde rondere & iterum fouere, ac nouissimè rosa caput nareisque implere,

\* tempus.

\* radere.

\* aliud ex



implere, offerre etiam naribus rutam, ex aceto contritam, mouere sternutamenta medicamentis \* in id efficacibus. \* ad id Quæ tamen facienda sunt in his, quibus vires non defunt. Si verò imbecillitas est, rosa tantum caput, adiecto serpyllo, similiq; aliquo madefaciendum est. Vtiles etiam in quibuscunque viribus herbae duæ sunt, Solanum & Muralis, simul ex vtraque succo expresso caput impleatur. cum se febris remiserit, frictione vtendum est, parcius tamen in his, qui nimis hilares, quàm in his qui nimis tristes sunt. Aduersus omnium autem sic insanientium animos, gerere se pro cuiusque natura necessarium est. Quorundam enim vani metus leuandi sunt, sicut in homine prædiuite famem timente \* acci- \* incidit, dit, cui subinde falsæ hereditates nuntiabantur. Quorundam audacia coercenda est, sicut in his fit, in quibus continendis plagæ quoq; adhibentur. Quorundam etiam intempestiuus risus & obiurgatione & minis prohibendus est. Quorundam discutiendæ tristes cogitationes, ad quod symphoniarum, & cymbala, strepitusque proficiunt. Sæpius tamen assentiendum, quàm repugnandum est, paulatimque & non euidenter ab his, quæ stultè dicuntur, ad meliora mens eius abducenda est. Interdum etiam elicienda ipsius intentio, vt fit in hominibus studiosis litterarum, quibus liber legitur, aut rectè, si delectantur, aut perperam, si id ipsum eos offendit. Emendando enim, conuertere animum incipiunt. Quinetiam recitare, si qua meminerunt, cogendi sunt. Ad cibum quoque quosdam non desiderantes reduxerunt hi, qui inter epulantes eos collocauerunt. Omnibus verò sic affectis, somnus & difficilis, & præcipuè necessarius est. Sub hoc enim plerique sanescunt. Prodest ad id, atque etiam ad mentem ipsam componendam, crocinum vnguentum cum irino in caput datum. Si nihilominus vigilant hi, quidam somnum moluntur potui dando aquam, in qua papauer, aut \* hyoscyamos decocta sit: alii mandragoræ mala puluino subiiciunt: alii vel amomum, vel sycamini lacrymam fronti inducunt. Hoc tamen apud medicos reperio. Sed cum Græci morum sycaminum appellant, mori nulla lacryma est. Sic verò significatur lacryma

\* hyoscyamos  
misd. stræ



\* sycomor-  
son

\* compell-  
lerent.

\* & aqua

\* saliens.  
Georgius Val.  
Silanum pro  
vino exponit.

\* ieiunio

\* valentis-  
simam  
\* remouen-  
dam.

lacryma arboris in Aegypto nascentis, quam ibi \* morosycon appellant. Plurimi decoctis papaueris corticibus, ex ea aqua subinde spongia os, & caput fouent. Asclepiades ea superuacua esse dixit, quoniam in lethargum sæpe \* conuerterent. Præcipit autem ut primo die à cibo, potione, somno abstineretur, vespere ei daretur potui aqua, tum frictio ad moueretur lenis, ita ut ne manum quidem qui fricaret, vehementer imprimeret: postero deinde die iisdem omnibus factis, vespere ei daretur sorbitio \* ex aqua, rursusque frictio adhiberetur. Per hanc enim nos consecuturos, ut somnus accedat. Id interdum fit, & quidem ad eum, ut illo consistente nimia frictio etiam lethargi periculum afferat. Sed si sic somnus non accessit, tum demum illis medicamentis accersendus est, habita scilicet eadem moderatione, quæ hic quoque necessaria est, ne quem obdormire volumus, excitare. postea non possumus. Confert etiam aliquid ad somnum \* Silanus iuxta cadens, vel gestatio post cibum & noctu, maximeque suspensi lecti motus. Neque alienum est, si neque sanguis antè missus est, neque mens constat, neque somnus accedit, occipitio inciso cucurbitulam ad mouere. Quæ quia leuar morbum, potest etiam somnum facere. Moderatio autem in cibo quoque adhibenda. Nam neque implendus æger est, ne insaniat, neque ieiunio utique vexandus est, ne imbecillitate in cardiacum incidat. Opus est autem cibo infirmo, maximeque sorbitione, potione aquæ mulsæ, cuius ternos cyathos bis hieme, quater æstate dedisse satis est. Alterum genus insanientiæ est, quod spatium longius recipit, quia ferè sine febre incipit, leues deinde febriculas excitat, & consistit in tristitia, quam videtur bilis atra contrahere. In hac utilis detractio sanguinis est. Si quid hanc prohibet, prima est abstinencia, secunda per album veratrum vomitumque purgatio, post utrumlibet adhibenda bis die frictio est. Si magis valet, frequens etiam exercitatio. In \* ieiunio vomitus, cibus sine vino dandus ex media materia est. Quam quoties posuero, scire licet etiam ex infirmissima dari posse, dum ne ea sola quis vratur, \* valentissima tantummodo esse \* remouenda. Præter hæc seruanda aliis



da alius est quàm tenerrima, remouendi terrores, & potius bona spes afferenda, quærenda delectatio ex fabulis ludisque, quibus maxime capi sanus assueuerat. Laudanda si qua sunt ipsius opera, & ante oculos eius ponenda. Leuiter obiuſganda vana tristitia. Subinde admonendus in his ipsis rebus, quæ sollicitant, cur non potius lætitiæ, quàm solitudinis causa sit. Si febris quoque accessit, sicut aliæ febres, curanda est. Tertium insanix genus est ex his longissimum, aded vt vitam ipsam non impediatur, quod robusti corporis esse consuevit. Huius autem ipsius species duæ sunt. Nam quidam imaginibus, non mente falluntur, qualem insanientem Aiaceum vel Orestem poetarum fabulæ ferunt: quidam animo desipiunt. Si imagines fallunt, ante omnia videndum est, tristes an hilares sint. In tristitia nigrum veratrum deiectionis causa, in hilaritate album, ad vomitum excitandum dari debet. Idque si in potione non \* accepit, pani adiciendum est, quo \* accipit. facilius fallat. Nam si bene se purgauerit, ex magna parte morbum leuabit. Ergo etiam si semel datum veratrum, parum profecerit, interposito tempore iterum dari debet. Neque ignorare oportet, leuiorem esse morbum cum risu, quàm seridò insanientium. Illud quoque perpetuum in omnibus morbis, vbi ab inferiore parte purgandus aliquis est, ventrem eius antè soluendum esse: vbi à superiore, comprimendum. Si verò consilium insanientem fallit, tormentis quibusdam optimè curatur. Vbi perperam aliquid dixit, aut fecit, fame, vinculis, plagis coëreendus est. Cogendus est & attendere, & ediscere aliquid, & meminisse. Sic enim fiet, vt paulatim metu cogatur considerare quid faciat. Subitò etiam terreri & expauescere, in hoc morbo prodest. Et ferè quicquid animum vehementer perturbat. Potest enim quædam fieri mutatio, cum ab eo statu mens in quo fuerat, abducta est. Inter est etiam si ipse sine causa subinde rideat, an moestus, \* demissusque sit. Nam dementis hilaritas terroribus his (de \* demissusque quibus supra dixi) melius curatur. Si nimia tristitia est, prodest lenis, sed multa bis die frictio. Item per caput aqua frigida infusa, \* demissumque corpus in aquam & oleum. Illa \* demittitque communia



communia sunt, insanientes vehementer exerceri debere, multa frictione uti, neque pinguem carnem, neque vinum assumere, cibis uti post purgationem ex media materia quàm leuissimis. Non oportere esse vel solos, vel inter ignotos, vel inter eos, quos aut contemnant, aut negligant, mutare debere regiones, & si mens redit, annua peregrinatione esse iactandos. Rarò, sed aliquando tamen, ex metu delirium nascitur. Quod genus insanientium \* specie similiq̃ue victus genere curandum est, præterquàm quòd in hoc insanix genere solo rectè vinum datur.

\* sp. simile, simile vict.

### ENARRATIO.

**C**ELSVS insanix species inter se confundit; primò tamen de phrenitide mentionem facit, quòd hæc acuta sit; & cum febribus (quarum comes esse solet) quippiam commune habet. Est autè phrenitis membranarum cerebri inflammatio; sic ut ipsum quoque cerebrum, eodem modò consisteret, modò calore remoto æstuet. Causa morbi esse solet vel sanguis superans, vel biliosus humor, nonnunquam etiam flava bilis perusta.

Illud ante omnia scire oportet.

Hoc nemo rectè phrenitidem appellavit aut insaniam, qui unica accessione, & nonnunquam ante paroxysmi solutionem finitur.

Eius autem plura genera sunt.

**P**LVRA quidem sunt phrenitidis genera: attamen Galenus libro De locis affectis quarto, tres tantum ponit phrenitidos differentias: Nam sunt quidam, inquit, phrenitici, qui de iis quæ oculis offeruntur (quantum ad sensitivam notitiam pertinet) indicant, cogitando verò à naturali iudicio aberrant. Alij verò cogitatione falluntur minimè, sensibus tamen difformiter moriuntur. Sunt præterea qui simul & sensus, & cogitationis vitia laborant.

alii hilares.

**Q**UIBUS sanguineus humor morbum facit, cum risu insanunt; quibus flava bilis, ferociter; quemadmodum quibus atra vitium contraxit, tam immaniter saniant, ut coerceri nequeant, omnia quæ dicunt faciunt, & obliviscuntur.

Ex his autem eos.

**L**ENITER enim blandèque tractandi sunt atque alloquendi; quanquam si ita non proficimus, acerbius nonnunquam increpandi sint.

Eos verò qui violentiùs se gerunt.

**N**ON solùm vincendi sunt, ne se aut alios ledant, sed ut in quiete, quoad fieri potest, contineantur: nam inordinata motio vires conuellit. Pedes autem non ob hæc tantummodò causam deninciendi sunt, sed & ut deligatoris constrictioneque humores deorsum reuellantur: quapropter non incensum suorum extremis quoque eorundem particulas manus contrahant.

Ferè verò antiqui.

**I**NTER hos fuit Heraclides Tarentinus Empiricus, is etenim phreniticum obscuro loco iacere inebat; siquidem luce, inquit, soram mens exasperat.

At



## At Asclepiades.

HOC quidem rectè, si quid aliud, Asclepiades: id enim curandum est, ut docet Trallianus, ut domus in qua egër decumbit, neque crassum, neque statulentum, neque vaporosum aerem recipiat; sed & cauendum monet, ne idem frigidus admodum sit, quod constipet; neque adeo calidus, ut caput teneat; verum studendum ut quasi in medio utrorumque redactus sit, quo frigidior spiritus euadat, & remittatur temperie. Nam quantumvis alij ferè omnes amicorum ad patientem consueverunt admittant, Trallianus tamen eorundem quantumvis maximè necessariorum frequentiam suspectam habet, quod nimirum hominum frequentia aerem turbet ac crassorem reddat. Non negauerim tamen esse nonnullos (ut tenè hìc subiungit Celsus) qui tenebris melius afficiantur, aliosque qui libero aëre rectius habeant; atque in his vitandas intentiones curatorias, quare qui ad lucem offerantur, ut auctor est Aëtius, in tenebrosa domo decumbant; qui verò ad lucis splendorem respiciunt, in lucida domo degant.

## Asclepiades perinde esse dixit.

ASCLEPIADES hìc eos qui cum dolore fuerant & grotantes phlebotomabz, alios omnes à phlebotomia alienissimè esse dicit, & magis specialiter phreneticos: quod quàm sit verum, norunt qui Hippocratis aliorumque scripta excusserint: nam quòd in phreneticis statim in initio, nisi aliud quid obster, mittendus sit sanguis, auctores sunt Galenus, Paulus, Aëtius & Trallianus; idq; aut ex cubito facienda sunt, aut ex pectore in medio frontis est. Cauendum tamen est ne ad animi usque deliquium sanguine mittamus: nam satius est minus quàm oportet detrahi, propter plurimam in illis ex vehementi motu factam resolutionem.

## tum interposito die.

Id quoque supernaculum dixit Asclepiades: Accurrit enim, inquit, intusque capil-

lorum materies, & porò denique & capilli post tonsuram crassescunt, atque fortiores sunt: quapropter etiam si homines, si post cibum toronderint, insicula, atq. catarrho vel lippitudine vexantur; debine si lanis caput post tonsuram tegere curamus, quanto melius si naturali tegmine capillorum lateat obiectum? quasi verò ea vitia non sint potius accepta ferenda crapula, quæ tonsuram statim auertit, quàm ipsi tonsura, quæ poros aperit, cutimq; perspiratu facilem reddit. Et etiam si quammaximè per se nihil prodesset, eo tamen nomine commendata esse debebat, quòd sine illa localia commodè adhiberi non possint.

## Deinde aqua fouere.

FOMENTA hæc non usque adeò curant quòd partes subiectas refrigerent: quare si quando eorundem usus sit necessarius, cautio adhibenda est, ne qua pars frigore afficiatur.

## offerre etiam naribus rutam.

Id quoque non in omni phrenitide tentandum est, sed in ea tantum qua cum virium robore in longius protrahatur tempus; ita enim fiet ut crassi vapores fatilius transpirent.

## Si verò imbecillitas est.

HIC variant exemplaria & rosa tantum capite adiecto. Pythæum ac Tormentum caput (idq; aliis rectius) legunt: Ceterum in phreneticis oxymelino efficacius nihil exhiberi potest, cui si scriptum quoque addas, discussorium magis mellicamen efficit: curandum autem est ut si quando applicetur, actus tepidum sit, quòd cerebri membrana, quam *membrana* vocant, frigidiorem resicere non admittat; constat enim frigidum densare, ac prohibere ne superfinitates & capite exhalent. At si actus calidum sit, & id quoque noxium erit, quòd calorem atque adeo inflammationem adaugeat & displicetque. Exactè igitur tepidum adhibendum est rosaceum, æstate quidem cum modico aceto, hieme verò moderatè calidum.

## Vtiles



### Vtiles etiam in quibuscunque.

MVRALIS seu perdicium, vini habet, abstergendi, ac refrigerandi: quare phlegmones omnes inter iniuria & in augmento usque ad statum sanat; idq; potissimum calidus, ut auctor est Galenus. Quo fit ut recte in omnis adhiberi dicat auctor nos: sicut etiam solanum quod hortense vocant; id panque a Celso tantummodo intellectum existimo, refrigerat siquidem & astringit, & capitis dolores illum per se sanat.

### cum se febris remiserit.

LONGA frictione, inquit precedente libro, neque in acutis morbis, neq. in incrementibus uti conuenit; praterquam quum phreniticis somnus ea requirit: parcius tamen in his fricandum qui nimis hilares sunt, quod periculum sit ne frictione sanguis exagietur, atque ad locum affectum regrederetur.

### Quorundam enim vani metus leuandi.

HIC Pinzani exemplar perperam lauandi legit.

### ad quod symphonix & cymbala.

CELIUS Methodicus, Vivunt etiam, inquit, decantationis tibiarum ustra modulatione, quarum alteram Phrygiam vocant, que sit iocunda, atque excitabilis eorum qui ex massitudine in furore poscuntur: Aliam chram, vel qua occupata mente puriorem suadet, iniecto rigore, ut in bello, quam Δόξα appellat, in his qui risu vel puerilibus cachinnis afficiuntur, quum cantilena sonus caput implet; ut etiam recte valentibus aperissime videatur, vel recte, ut plerique memorant, accendant aliquos in furore, quo sepe vaticinantes deum accipisse videntur. Sic Pythagoras, quemadmodum in Miscellanis nostris meminimus, ebrium adulescentem sub Phrygiæ modi sona

incitatum, sponte incensu reddidit mitiorem, & sui quodammodo compotem.

### & præcipue necessarius.

NECESSARIUM dicit, quod duplici compendio phreniticis prodest, somno enim humectatur & refrigeratur cerebrum; quibus accedit quod quiete ad se quodammodo redeant laborantes.

### Si nihilominus vigilant.

ISTUD non tentandum est in omni phrenitide, sed vehementi tantum, neque quouis tempore, sed solummodo in declinatione exacerbationis. si enim datum fuerit in vigore, prouocat quidem somnum, ceterum febris excitatur: quo fit ut ager ad ambo partitus grauius ferat quod contingit. Auctores sunt Posidonius & Aetius.

### Asclepiades ea superuacua esse dixit.

NON immerito stupefacientium, pharmacorum videlicet, potiorum, illitionum, irrigationumq; usum suspectum habuit; præsertim si assiduus continuusque sit: facillime enim in his qui immodice refrigerantur, transitus est a phrenitide in lethargum, quem saepenumero interitus subsequi solet.

### Præcipit autem.

ASCLEPIADES, eisi quammaxime sub vesperum accessiones augeri fateatur (vesperum enim, inquit, ob aeris crassitudinem, densata instat corpora, atque initium generat accessionis), præter omnem tamen rationem, sub vesperam cibis, fricat, atque gestationem adhibet; quum neque sanis a cibo frictio aut gestatio conueniat.

### Confert etiam aliquid ad somnum.

IOHANNES Casarius in anuotationibus suis in hunc modum scribit: Erat quando hic saliens riuus legendum putarem: ac sanè hoc loco Silanus, saliens riuus sublituisse; nisi fortè formam incidissem in Sextum Pompeium libro XVII. ubi sic legimus: Tullios alij dixerunt Silanos: quem



quem ex Sexto reperit Georgius Valla, & Silanum pro vino exponit.

### Neque alienum est.

NON solum si sanguis non sit missus, sunt adhibenda cucurbitula; verum etiam post phlebotomiam, si facies rubicunda & incontracta, occipitio ante exacerbationem easdem affigemus, ac moderata scarificatione facta sanguinis quod satis est auferemus; auertunt enim, ut auctor est Trallianus, per partem diuersam materiam ad superiora tendentem.

### Moderatio in cibo.

CIBVS esto humectans & frigesaciens, tantumque nutriendus quantum conseruationi virium opus: videndum tamen est, ne aut in accessionibus aut vigore eundem exhibeamus; cauendaque omnis modis inedia est, quod vires prosteruat, ac corpus exerceat ac biliosum reddat, quo alienius in phreniticis nihil est.

### Alterum genus insaniam.

ALTERVM genus insaniam vocat, quam nos melancholicam dicimus; et siquidem magna ex parte sine febre sit, & consistit in tristitia, timore ac solitudine. Nam quum melancholicus humor per se ater sit, rationis locum non secus ac tenebra obumbrat, ac timores mœstitiâque generat: sicuti videmus pueris in profundis tenebris accidere. Sunt autem, ut docet Galenus & Aëtius, melancholica deliria multiformia, ob particulares corruptas imaginationes. In genere tamen à venae sectione aspicienda curatio est, si totum corpus sanguine melancholico abundet; quod si minus fiat, eadem opus non erit, sed alia via aliâque ratione eisdem subueniendum est: nam aut purgandi sunt per veratrum, aut hieram dictam; aut abstinentia coercendi sunt, ut terreus ille humor tandem absorbeatur. frictio, motus exercitiumque ante cibum admodum conuenientia censentur, & si ventriculus non probe concoquat, non fuerit inconsultum uti balneo.

### In ieiuno vomitus.

RVFFVS, Vomant, inquit, ex longioribus internallis, etiam à cibis; verum à rha-

phano, aut thymo, aut origano ieiuni. Non tamen fortioribus vomitoriis vrendum est, sunt enim talia his notia, erumnam ventri ac stomacho addentia iam antea ex morbo afflicto; videntur enim aliqui ex efficacioribus vomitoriis melancholia correpi.

### cibus sine vino.

ADMITTITVR tamen vinum quod οὐλινός vocant Graeci, hoc est tenue & album, & quod non sit admodum vetus. Ceterum quascunque tandem potus sit, moderate exhibendus est, ne cibus in ventre fluctet.

### Tertium insaniam genus.

PER tertium insaniam genus videtur accipere eam quam nos simpliciter insaniam aut maniam vocare solemus: nam ea quoque bisariam dispecitur; siquidem in omnibus leditur imaginatio & ratio, integra seruata memoria: ridet namque alij immo dicere, versantibus ipsis ob oculos imagunculis visu dignis; alij etiam sanguine illo magis adusto reddito, terrores & spectra quadam somniat, sicuti Orestes Electra furiales ventus exanisse dicitur. Rursus sunt alij ab his plane diuersi quos animo desipere dicit; atque hi quidem serena quadam dementia detinentur, quod accidit quoties bilis fuerit superassata, & crassior facta, atque adeo substantiae cerebri eiusque membranarum visci instar agglutinata.

### Neque ignorare oportet.

SYMPTA est hæc sententia ex sexto Aphorismorum Hippocratis, ubi sic dicit: Deliria quæ cum risu accidunt, interiora; quæ vero serid, periculosiora: nam quæ cum risu fiunt, à solo sanguine paululum adusto aut sola caliditate sue vitioso humore oriuntur; quæ serid fiunt, ab atra vel flava bile superassatis nascuntur.

### Illud quoque perpetuum.

Hoc quoque ex Hippocratis Aphorismis mutatum est: siquidem Hippocrates sectionis VII. Aphorismo LXVII. Corpora, inquit, ubi quis purgare voluerit, oportet fluida



fluida facere; & si per superiora, aluum sistere; si vero per inferiora, humectare.

### fame.

METHODICVM id est: suspicabant enim illi fame compesti insaniētes, non secus ac bruta animalia inedia cicuramus; quod à vera curandi ratione longè alienissimum est, quum periculum sit ne inedia praestratis viribus, eadem ferende morbi longitudini impares reddantur, ac ager ipse succumbat: adde quod nominis multos insaniētes, quibus citius omnis suspectus est, & qui nisi coacti edant.

### vinculis.

SATIVS tamen esset, si res familiaris admitteret, familiarum aut astantium opera in officio detineri, quod denique partes quodammodo concutiantur. Quamquam non inconsultum sit in omni insania specie, ut iam antè dixi, extremos artus vinculis constringere ad auerendam materiam.

### Cogendus est.

EANDEM ferè curandi methodum habet Celsus Methodicus libro Chronion; verum paulo prolixius, quam & hic ascribere opere precium visum fuit, dicit autem: Tunc acopis & malagmaticis veterum, quæ nulla nimietate percutiant, motum quoque gestationis adhibentes: & primò gestatoria sella, tunc vehiculo manibus actò, atque toto fortificato corpore, erunt in deambulationem cogendi, & vocis exercitium quod cuique conueniat. Nam literalis etiam lectio adhibenda est, & quæ sit aliqua falsitate culpata, quo interius mentem exerceant agrotantes. Quapropter interrogationibus quoque erunt satigandi, ut nunc mendacii causa, nunc promendi quod querimus exerceri videantur. Tunc sibi dimittendi, data lectione, quæ non sit intellectu difficilis, ne plurimo labore vexentur. Hac enim si supra vires fuerint, non minùs afficiunt, quàm corporis immodice gestationes. Item post lectionem aliqua composita vel mimica sunt

offerenda, si inæstidine furentes laborent; aut rursus tristitiam vel iracundiam timorem habentia, si puerili luxu furentes afficiantur. Oportet enim contrarietate quadam alienationis corrigere qualitatem, quo animi quoque habitus, sanitatis medicritatem agnoscat. Tunc proficiente curatione erunt pro possibilitate meditationes adhibenda, vel disputationes; nunc quoque similiter ordinata, ut principia leni voce promantur; narratio verò & demonstrationes extensæ atque maiore; tunc epilogus demissa & indulgenti: sicut hi qui de exercenda voce, quam ἀναφωνεῖν Græci vocant, iradiderunt. Adhibendi denique auditores sunt agrotanti assueti, qui favore quodam atque laude dicta prosequentes, dicentis animū laxent. Etenim iocunda exercitamenta corporis adiuvant sanitatem. Tunc post meditationem vel disputationem deducendus mox est atque perungendus leniter agrotans, & deambulatione leni mouendus. Et autem qui literas nesciat, immittende quæstiones erunt, quæ sint eius artis propriæ, ut rustico rusticationis, gubernatori navigationis; ac si ex omni parte iners fuerit curandus, erunt vulgaria quedam quæstionibus iradenda, vel calculorum ludus, habet enim quiddam quod animum exerceat, & magis si peritior agrotanti colludat. Tunc post requiem adhibita deambulatione, erunt diligentius perungendi; & primò parua atque simplici defricatione mulcendi, dehinc profectū apparenē, etiam deuexo ductu post humeros atque colla defricatione potiore ac leni deductione, quam Græci ὑποπλάγιον vocant: ultimò fricandum etiam caput; quod si fuerit releuatum, lenacrum erit adhibendum. Hac Celsus ille Siccensis. Verū quod Celsus dicit insaniētes omnes multa frictione esse exercendos, quàm sit verum, non dictum est; & quidd tenuis vini portio concedatur, diximus: illis tamen magis ex usu erit, qui flatibus distenti hypochondriis in vitium inciderint.



## CAPVT XIX.

*Cardiaci morbi curatio.*

**H**VIC morbo præcipuè contrarium est id genus, quod Cardiacum à Græcis nominatur, quamuis sæpe ad eum phrenetici transeunt. Siquidem mens in illis labat, in hoc constat. Id autem nihil aliud est, quàm nimia imbecillitas corporis, quod stomacho languente, immedico sudore digeritur. Licetque protinus scire id esse, ubi venarum exigui, imbecilli que pulsus sunt. Sudor autem supra consuetudinem, & modo & tempore, ex toto thorace & ceruicibus, atque etiam capite prorumpit, pedibus tantummodo & cruribus siccioribus atque frigentibus. At ubi id morbi genus est, curatio prima est, supra præcordia imponere quæ reprimant cataplasmata: secunda, sudorem prohibere. Id præstat acerbuni oleum vel rosa, vel melinum aut myrteum. Quorum aliquo corpus leuiter perungendum, ceratumque ex aliquo horum tum imponendum est. Si sudor vincit, delinendus homo est, vel gypso, vel argenti spuma, vel cimolia creta, vel etiam subinde horum puluere respergendus. Idem præstat puluis ex contritis aridi myrti vel rubi foliis, aut ex austeri, & boni vini arida sæce. Pluraque similia sunt, quæ si desunt, satis utilis est quilibet ex via puluis iniectus. Super hæc verò, quo minus corpus insudet, leui veste debet esse contactus, loco non calido, fenestris patentibus, sic, ut perflatus quoque aliquis accedat. Tertium auxilium est imbecillitati iacentis, vino ciboque succurrere. Cibus non multus quidem, sed sæpe tamen nocte ac die dandus est, ut nutriat, neque oneret. Is esse debet ex infimissima materia, & stomacho aptus. Nisi autem necesse est, ad vinum festinare non oportet. Si verendum est ne deficiat, tum & intrita ex hoc, & hoc ipsum austerum quidem, sed tamen tenue meracum. Egelidum subinde & liberaliter dandum est adiecta polenta, si modò is æger parum cibi assumit. Idque vinum esse debet, neque nullarum virium, neque ingentium: recteque tota die ac nocte,



\* duas, vel

cte, \* vel tres heminas æger bibet. Si vastius corpus est, plus etiam. Si cibum non accipit, perunctum antè perfundere aqua frigida conuenit, & tum dare. Quòd si stomachus resolutus parum continet, & ante cibum & post eum sponte vomere oportet, rursusque post vomitum, cibum sumere. Si ne id quidem manserit, sorbere vini cyathum, interpositaque hora sumere alterum: si id quoque stomachus reddiderit, totum corpus bulbis contritis superillinendum est. Qui ubi inaruerunt, efficiunt, ut vinum in stomacho contineatur, exque eo toti corpori calor, venisque vis redeat. Vltimum auxilium est, in aluum ptisanæ vel alicæ cremorem ex inferioribus partibus \* indere, siquidem id quoque vires tuetur. Neque alienum est, naribus quoque æstuantis admouere, quod reficiat, \* id est rosam, & vinum. Et si qua in extremis partibus frigent, vinctis & calidis manibus fouere. Per quæ si consequi potuimus, ut & sudoris impetus minuatur, & vita prorogetur, incipit iam tempus ipsum esse præsidio. Vbi in tuto esse videtur, verendum est tamen, ne ad eandem imbecillitatem citò recidat. Itaque vino tantum remoto, quotidie validiorem cibum debet assumere, donec satis virium corpori redeat.

\* iniicere,

\* ut est rosa,

## ENARRATIO.

**C**ARDIACVS morbus, si affectum locum spectes, & mentem, quæ serè constat, insania contrarium mortis dici potest: nam sicut omnes insania species, præter eam quæ hypochondriaca dicitur, cerebro primariò affecto originem suam acceptam ferunt, ita cardiacus ore ventriculi (quem & ædiacum Veteres Græci vocauerunt) affecto accidere consuevit; ut auctor est Hippocrates, qui eundem καρδιακὸν solet nominare. Fuisse tamen alij quibus opinio hæc suspecta esset, atque aliam loci affecti sedem constituerent: nam Erasistratus, & Asclepiades, cor (ipsius morbi magnitudine, & ædiac nomine, quod cor quoque significat, decepti) in cardiacis pati dixerunt; alij membranam quæ cor circumambit, περικαρδιον vocant;

nonnulli, diaphragma; alij iecur; nonnulli etiam pulmonem. Porro cognoscimus eos qui cardiaci dicuntur, ut docet Aërius, quum acuta febre & maximè astuosa affliguntur, hoc modo: Pulsus si inuenero densum & obscurum (Celsus imbecillum & exiguum vocat) & extremitatum paruum frigiditatem, sudores circa faciem & ad pectus usque glutinosos, & odorem corporis terrestrem nares usque percellentem, & pulsus circa ipsum & vehementiores & magnos, & adhuc accedant desperatio, angor animi, corporis iactatio. Os verò ventris primum est quod in ipsis afficitur, per assensum vehementer oblatus cor ipsum, propter vicinitatem.

Si su-



## Si sudor vincit.

IMPRIMIS verò thoraci, collo, ac locis  
sub alis atque inguinibus sunt adhibenda.

## gypso.

GYP SVM, si quod aliud, siccatoria  
atque obducens meatu facultatis est: quare  
non solum sudori compeſcendo, sed & san-  
guinis fluxu cum omni candido commodè  
adhibetur. Argenti quoque spuma, quam  
lithargyron vocant, siccatur: qua ratione  
sudorilis restringendus erit accommodatissima,  
presertim si cum cinolia, amylo aut omni can-  
dido circumalimatur.

## Super hæc verò.

MEDICI studium in cardiacis est, ut  
cuius densetur ac refrigeretur: quapropter  
aerem frigidum domus paramus, frigidos  
ventorum flatus inducentes; aut si id non  
possumus, ventilatione corpus frigescentes,  
pavimenta sternentes, irrorantesque iis que  
astringente, & frigida facultate prædita  
sunt: quare in umbrosis & subterraneis lo-  
cis collocandos docet Soranus. Atque in  
summa, si sudoribus exolvatur corpus, stra-  
gula ipsa tollere oportet, & operimenta ipsa,  
quibus integuntur, mollia esse debent, & usi  
prioris detrita, hoc est, ut dicit Celsus, lenia,  
ita ut lenia non solum ad pondus, sed & ad  
qualitatem referatur. Lecti etiam latitudo  
atque spatium probatur, quantum sufficiat  
agro alterna conversatione alterius loci fri-  
gus accipere.

## Tertium auxilium est.

CIBVS in morbi remissione incunctan-  
ter offerendus est qui corruptioni quam ma-  
ximè aduersetur, & qui nutriet, non oneret  
stomachum; in quem usum summè commen-  
dantur pedes suilli, ac mala punica.

## Nisi autem necesse.

ACRES siquidem humores qui os sto-  
machi vellicant, vino magis exasperarentur:  
quare non nisi summa urgente necessitate  
vinum exhibemus; id vnum quod auste-  
rum simul & dilutum sit, ut astrictioni  
patiter, & virum robori studeamus. Neque  
fuerit inconsultum, potentiam panem, amy-

lam, halicam aut quidvis aliud eius generis  
infusum vino (id enim per intrita intelligit)  
exhibere, quod vires maxime recreent atque  
reficiant, stomachumque roborent; ad id ut  
memoria proditum sit Democritum his in-  
tritis ab orco quodammodo renocatum.

recteque tota die ac nocte.

COTVLA vel hemina continet vini  
uncias decem: qua sit ut nimis quam con-  
ueniat liberalis, Celsi hæc moderatio esse vi-  
deatur.

## Sic cibum non accipit.

NAM perunctione blanda & moderata  
totius corporis frictione eliditur cibi fasti-  
dium, ut auctor est Ægineta.

Quòd si stomachus re-  
solutus.

ANTE cibum sollicitandus vomitus est,  
ut materiam stomacho innatantem, ac eius  
subuersionem facientem educamus, ac deinde  
post cibum iterum vomitum ciet, ut quod  
iam tenacius stomacho adhærebat, vna cum  
cibo expellatur: vinum autem postmodum  
dat, quod subausterum sit & mediæ ætatis;  
hoc siquidem stomachum roborat, & si quod  
aliud, amicum est. Ceterum quod de bulbis  
scribit, animaduersione dignum est: neque  
enim usquam legisse memini tantum præro-  
gatina iisdem ascriptum esse: nam quan-  
tumvis Eudemus, Asclepiades, Themison,  
aliique eius farinæ, cataplasmata ex bulbis,  
pipere, cachi & ammoniaco prodesse dixe-  
runt; non tamen bulbos eo quo Celsus noster  
elogio extulerunt. Nam quum ea sit bulbo-  
rum natura, ut in cataplasmatibus glutinent  
simul & siccent, rectè languenti stomacho  
(quamvis id neget Siccensis Celsus) adhibet:  
verum an tanta sint efficacia, ut quum in-  
aruerint, vinum in stomacho contineri fa-  
ciant, nondum experientia comprobare con-  
tigit.

## Vltimum auxilium.

ETS I præter vulgi opinionem esse vi-  
deatur, alimentum per posticum suggeri  
posse, ratione tamen & auctoritate com-  
probari



probari potest: nam si enema quod vigorosius sit (ut secundo De medicamentorum compositione, & xiiii. Methodi ostendit Galenus) reuelando non solum ventriculū & mesericon euacuat, verum etiam sinam hepatis expurgat; cur alimentorum facultates per alium iniectione in ventriculū atque hepar non subibunt, natura ipsa attractricem facultatem sollicitante? quod & post Galenū Abenozar libro i. tract. x. cap. xviii. fieri posse demonstrat. Rectus, inquiens, & certus & verax est ex prefatis causis gule paralyti affectus nutriendi modus, ut prius intestina cū clysteribus absterisus purges, & vesicam capra lacte, aut decocta ex tritico sorbitione referam, per cannulam argenteam eius collo alligatam, annique inseram manu coarctatam totam exprimas, quod minuta successione per intestina vis ventriculi attractrix & intestinorum alimenti auida, ad stomachi fundum usque alliciet. Idem quoque Oribasius libro v. cap. xxxviii. indicatum voluit: Alia calamitas quandoque contingit, inquit; ad quam tollendam clysteribus est opus: nonnulli tam vehementer ab alimentis abhorrent, ut periculum consequatur, ne ob alimonia defecationem pereant, quibus clysteres ij sunt idonei, qui alere corpus possunt: quales ij sunt, prisa cremor, aut tritici aut farina ablutio, aut halice cremor, aut res quæ sunt generis eiusdem: Debet autem cornu clysterie, si usquam alibi, tunc hoc loco esse quàm longissimum, & manitus compellendus magna vi clyster est, ut ad remotas supernasque partes quàm maximè conscendat. Celius tamen Methodicus hic prisanam susce-

ptam habet quod intestina lubrica facit: Nam si omnis spes, inquit, fuerit absumpta, erit per clysterem cibus iniiciendus; sed neque prisa, aut cuiusquam labilis qualitatē, quod facile lubrica faciat intestina: est enim hoc in cardiacis perniciosissimum; quippe fastidio attestante ventris fluorem commouere. quapropter erunt hæc ex lenticula adhibenda, & primò paruisima: tunc vino cum aqua panis attritus & expressus. sic enim corpori fiet additio, atque vires resurgent, & stomachus iam dudum supinus roborabitur. Nos felici admodum successu non semel tentauimus cum continuo pulli, & iure caruimus, in quo dissoluta essent omnia lutea.

### Neque alienum est.

Id, si quod aliud, in cardiacis faciendum est; siquidem si accessionū vehementia cibationem prohibeat, hoc ruid obiri potest.

### Et si qua in extremis partibus.

Non solum calidis manibus extremas partes fanendas docet Aetius, sed & illuminandas (si duriora corpora sunt) pipere, bulbis, pyrethro, sulphure vino, & similibus: nam mollibus corporibus sufficere testant inunctiones ex glancino aut sycionis cum multa frictione.

### Vbi in tuto.

Vinum si ansterum sit, nulla ratione remouendum est; verum aqua potius attemptandum: id enim, si quod aliud, vires totius corporis augeat, atque stomachum roborat.

## CAPVT XX.

### De Letargo, & eius curatione.

**A**LTER quoque morbus est, aliter phrenetico contrarius. In illo difficilis somnus, prompta ad omnem audaciam mens est: at in hoc marcor, & inexpugnabilis pænè dormiendi necessitas (ληθαργος Græci nominant) atque id quoque



quoque genus acutum est, & nisi succurritur, celeriter iugulat. \* Hos ægros quidam subinde excitare nituntur, admotis his, per quæ sternutamenta euocantur, & his, quæ odore fœdo mouent, qualis est pix \* cruda, lana succida, piper, veratrum, castoreum, acetum, allium, cepa, iuxta etiam galbanum incendunt, aut pilos, aut cornu ceruinum. Si id non est, quodlibet aliud. Hæc enim cum comburuntur, \* odorem fœdum mouent. Tharrias verò quidam accessionis esse id malum dixit, leuarique cum ea decessit. Itaque eos qui subinde \* excitant sine vsu, malè habere. Interest autem in decessione expurgiscatur æger, an cum febris non leuetur, aut leuata quoque ea somnus vrgeat. Nam si expurgiscitur, adhibere ei vt sopito superuacuum est. Neque enim vigilando melior fit, sed per se, si melior est, vigilat. Si verò continens ei somnus est, vtrique excitandus est, sed his temporibus quibus febris leuissima est, vt & excernat aliquid, & sumat. Excitat autem validissimè repente aqua frigida infusa post remissionem. Itaque perunctum oleo multo corpus tribus aut quatuor amphoris totum per caput perfundendum est. Sed hoc vtemur, si æqualis ægro spiritus erit, si mollia præcordia. Sin aliter hæc erunt, ea potiora, quæ supra comprehensa sunt. Et quod ad somnum quidem pertinet, commodissima hæc ratio est. Medendi autem causa caput radendum, deinde postea fouendum est aqua, in qua laurus aut ruta decocta sit. Altero die imponendum castoreum, aut rufa ex aceto contrita, aut lauri baccæ, aut hederæ cum rosa & aceto. Præcipueque proficit & ad excitandum hominem naribus admotum, & ad morbum ipsum depellendum capiti frontive impositum sinapi. Gestatio etiam in hoc morbo prodest, maximeque opportunè cibus datus, id est in remissione, quanta \* maxime inueniri poterit. Aptissima autem sorbitio est, donec morbus decrescere incipiat: sic, vt si quotidie grauis accessio est, hæc quotidie datur. Si alternis, post grauiorem sorbitio, post leuiorem, multa aqua. Vinum quoque cum tempestiuo cibo datum, non mediocriter adiuuat. Quod si post longas febres eiusmodi tor-

\* Hoc

\* vsa, &  
lana\* odore fœ-  
do mouer,  
nempe ster-  
nutamenta.  
\* exerci-  
tantur

\* maxima



por corpori accessit, cætera eadem seruanda sunt. Ante accessionem autem in tribus quatuorve horis castoreum (si venter astrictus est) mixtum cum scammonea: si non est, per  
 \* Et si seipsum cum aqua dandum est. \* Si præcordia mollia sunt, cibis vtendum est plenioribus. Si dura, in iisdem sorbitionibus subsistendum, imponendumque est præcordiis, quod simul & reprimat, & emolliat.

## ENARRATIO.

**V**ETERNVM vocant Latini, quem Græci ληθαργίον. Est autem lethargus, si morbi causam & accidentia consideres, phrenitidi prorsus contrarius: sin affectum locum spectes, contrarium nequaquam rectè dixeris; quum in utroque cerebrum rationis sedes afficiatur. Sunt autem contrarie cause: nam in phrenitide febris acuta est, membranarum cerebri inflammatio atque calor; Lethargum contra febris lenta comitatur, sitq; quoties pituita sua frigidityte & humiditate cerebri imbuerit: unde pro materie peccantis varietate ac differentia, æquum est inter se discrepare accidentia; siquidem in lethargo sopita, pigra, atque ad omnes quodammodò actiones inepta membra conspiciuntur; in phrenitide agitationem, concussionemque totius ferè corporis percipimus: in utrisque tamen ratiocinatoricis animæ noxa est.

## Hos ægros quidam subinde excitare nituntur.

**I**D faciebat Asclepiades. Præstat tamen ab odoramentis incipere; deinde, si hac non proficiant, consultum erit ad sternutamenta veniri ex pipere, struthio, veratro: ceterum eadem crebrius adhibenda non sunt; ut quidam temerè faciunt, quod concussionem atque exagitationem ægrorum vires præsternantur, atque suffocentur, ac longè plus periculi inde expectandum sit, quàm commodi ex materia peccantis euacuatione: quare quum laborandum sit, ut materia expellatur, & locus affectus corroboretur, in ipsis

morbi primordiis oxycanthodorum in quo castoreum, pulegium, nepita, aut aliud quid eius generis decoctum sit, capiti infundunt; id siquidem caput plurimum confortat, & dum reprimat, humorum consusum arcet, & incisoriæ facultatis nanciscitur per ea quæ incoquantur. Hoc non inferius est quod Galenus faciendum suadet, dum in aceto origanum, pulegium, aliæque id genus incidendi facultate prædita decoquit, atque naribus odoranda exhibet, ut vapor ad cerebri delatus crassitudinem humorum diffuset.

## Itaque eos qui subinde excitant.

**SENSILES** enim atque delicata admodum sunt cerebri membra facillimèque afficiuntur: videndum igitur est ut & τὸ καίρῳ quod factio opus est faciamus: nam sicuti morbus præceptus admodum est atque acutus, ita tempus & occasionem exhibendum remedium valdè præcipitem habet: nam quantumvis intentio medici esse debet, ut **XII. Therapeutica** methodi docet Galenus, excitare naturam, ac noxæ humoris crassitudinem difficere; id tamen nulla violentia tentandum est: sed primùm à mitigantibus pedetentim, natura morboque ita exigente, ad vehementiora denotandum est.

## ut &amp; excernat.

**INIECTIS** videlicet acutis enematis. Cibandum autem est post statum solummodo, nisi diuturnior sit morbus, atque vires debilio-



debiliores. Cibus autem talis esto qui simul incidat, reficiet, & vires conferet.

### Excitat autem.

IDEM suadet Soranus: verum utrum agrotantis ex usu fuerit, nondum induci possum: ut credam; potissimum quando in confesso sit, frigidum densare, atque meatus obstruere: nam quantumvis repentina illa frigida affusio agrum passit excitare, nihil tamen de morbo tollit.

### Itaque perunctum.

IN hunc usum commodissimum erit hyconium, aut aliud quodvis simile oleum; quanquam ante perfusionem aut inunctionem praestiterit perficuisse coxendices extremitatesque artus.

### Medendi autem causa.

ID Soranus affirmabat; Asclepiades hic, ut in nephriticis quoque, suspectum habuit; Alexander Trallianus tonnendum caput dicit, si morbus perniciosus admodum & atrox & dururnus sit.

### deinde postea fouendum.

LAUDAVIT id Heracides Tarentinus, & neque in simplici aqua decoquebat, sed in posca, ut esset tenuiorum partium: Aërii quoque atque Aegineta parvi affecta infusiones & cataplasmata adhibent, quod Tralliano quodammodo suspectum est: nam etiam si balneum convenire dicat, quod habet mores qui eum obsederunt, eo facillime disintantur; cavendum tamen monet, ne caput agrotantis aqua perfundatur: nam si id factum fuerit, dicit, tantum abest ut

tantillum opis sentiat, ut longe maioribus cruciatibus infestetur, quam si calidum nunquam vidisset.

### Gestatio etiam.

UBI morbus inclinare ceperit, gestatio continua utilis est: atque hanc ita vehementem esse volebat Soranus, ut ad viginti vel xxx. stadia agitaretur.

### Apertissima autem sorbitio.

QUALIS est tum prisana, tum ipsius cremor; proderit etiam sorbitiunculas preparare quae incisoria sint facultatis, utpote in quibus aut hyssopum aut pulegium, aut simile quippiam decoctum sit; hæc modò quotidie, modò alternis diebus danda sunt.

### Vinum quoque.

VINUM esto subaquosum, tenue, album, & subastringens, quod in declinatione tantum utile esse docet Trallianus.

### Ante accessionem autem.

HOC in vehementibus tantum leibargis faciendum suadent alij, exhibebantque ante unam accessionis horam, ut dicit Trallianus; Celsus tribus aut quatuor ante accessionem horis propinat. Est autem calefaciens & extenuans castoreum, marcescentemque ac molestantem in corpore punitam arefacit. Addebant autem eadem dactydyum aut scammonium, si astrixiore esset alius & corpus cacoethymum; ita ut dabbus castorei scrupulis dactydyi ℥. ss. commiscerent: sic enim fieri, ut materia expulsionis rebellis citra molestiam subsequatur.

## CAPUT XXI.

### De Aqua inter cutem, hoc est Hydropico morbo.

SED hic quidem acutus est morbus. Longus verò fieri potest eorum, quos aqua inter cutem male habet, nisi primis diebus discussus est, *ὕδρωμα* Græci vocant. Atque eius tres species sunt. Nam modò ventre vehementer inten-



to, creber intus ex motu spiritus sonus est. Modò corpus inæquale est, tumoribus aliter aliterque per totum id orientibus. Modò intus in \* vnum aqua contrahitur, & moto corpore ita mouetur, vt impetus eius conspici possit. Primum *τυμπαίνω*, secundum *λιδκοφλεγματία* vel *υποσάρκα*, tertium *ἀσκήτην* Græci nominant. Communis tamen omnium est humoris nimia abundantia, ob quam ne vlcera quidem in his agris facillè sanescunt. Sæpe verò hoc malum per se incipit. Sæpe alteri vetusto morbo, maximeque quartanæ superuenit. Facilius in seruis, quàm in liberis tollitur, quia cùm desideret famem, sitim, mille alia tædia, longamque patientiam, promptius his succurritur, qui facillè coguntur, quàm quibus inutilis libertas est. Sed ne hi quidem, qui sub alio sunt, si ex toto sibi temperare non possunt, ad salutem perducuntur. Ideoque non ignobilis medicus, Chrysippi discipulus, apud Antigonom regem, amicum quendam eius notæ intemperantiæ, mediocriter eo morbo implicitum negauit posse sanari. Cùmque alter medicus Epirotes Philippus se sanaturum polliceretur, respondit illum ad morbum ægri respicere, se ad animum. Neque eum res fefellit. Ille enim cùm summa diligentia non medici tantummodo, sed etiam regis custodiretur, tamen malagmata sua deuorando, bibendoque \* se se suam vrinam in exitium \* se præcipitauit. Inter initia tamen non difficillima curatio est, si imperata sunt corpori, quies, sitis, inedia. At si malum inueterauerit, non sine magna molestia discutitur. Metrodorum tamen Epicuri discipulum referunt, cùm hoc morbo tentaretur, neque æquo animo ferret necessariam sitim, vbi diu abstinerat, bibere solitum, deinde euomere. Quòd si redditur quicquid receptum est, multum tædio demit: si à stomacho retentum est, morbum auget. Ideoque in quolibet tentandum non est. Sed si febris quoque est, hæc in primis submouenda est per eas rationes, per quas huic succurri posse propositum est. Si sine febre æger est, tum demum ad ea veniendum est, quæ ipsi morbo mideri solent. Atque hinc quoque quæcunque species est, si nondum nimis occupauit, iisdem auxiliis opus est. Multum ambulan-



ambulandum, currendum \* aliquando est. Superiores ma-  
ximè partes sic perfricandæ, vt spiritum ipse contineat, euo-  
candus est sudor, non exercitatione tantummodo, sed etiam  
in arena calida, vel laconico vel clibano, similibusque aliis,  
maximèque vtilis naturales & siccæ sudationes sunt, quales  
super Baias habemus in myrtetis: balneum atque omnis hu-  
mor alienus est. Ieiuno rectè catapotia dantur facta ex ab-  
sinthii duabus, myrrhæ tertia parte. Cibus esse debet ex me-  
dia quidem materia, sed tamen generis durioris. Potio non  
vltrà danda est, quàm vt vitam sustineat, optimaque est, quæ  
vrinam mouet. Sed id ipsum tamen molliori cibo, quàm me-  
dicamento melius est. Si tamen res coget, \* ex his aliquid,  
quæ id præstent, erit decoquendum, eaque aqua potui dan-  
da. Videntur autem hanc facultatem habere iris, nardum,  
crocum, cinnamum, amomum, cassia, myrrha, balsamum,  
galbanum, ladanum, cœnanthe, panace, cardamomum, he-  
benus, cupressi semen, vua tyminia, quam *σαφίδα ἀγρία*  
Græci nominant: abrotanum, rosæ folia, acorum, amaræ nu-  
ces, tragoriganum, styrax, \* costum, iunci quadrati, & rotun-  
di semen, illud cyperon, *χοῖνον* hoc Græci vocant. Quæ  
quoties posuero, non quæ hîc nascuntur, sed quæ inter aro-  
mata afferuntur, significabo. Primò tamen quæ \* leuissima  
ex his sunt, id est rosæ folia, vel nardi spica, tentanda sunt. Vi-  
num quoque vtile est & \* austerum, sed quàm tenuissimum.  
Commodum est etiam lino quotidie ventrem metiri, & qua  
comprehendit aluum, notam imponere, postero die videre,  
si plenius corpus sit, an extenuetur. Id enim quod tenuatur,  
medicinam sentit. Neque alienum est metiri & potionem  
eius & vrinam. Nam si plus humoris excernitur, quàm assu-  
mitur, ita demum secundæ valetudinis spes est. Asclepiades  
in eo, qui ex quartana in hydropa deciderat, se abstinentia  
bidui & frictione vsum, tertio die iam & febre & aqua libera-  
to, cibum & vinum dedisse, memoriæ prodidit. Hactenus  
communiter de omni specie dici potest. Si vehementius  
malum est, diducenda ratio curandi est. Ergo si \* inflama-  
tio & ex ea dolor creber est, vtilis quotidianus aut \* alterno  
quoque

\*aliquid

\* vt ex his  
aliquid de-  
tur, præ-  
stanter id  
decoquen-  
dum,

\*costus,

\* lenissima

\*lene &  
auft.

\*inflatio

\*altero



\*inflatio-  
nes

quoque die post cibum vomitus est. Fomentis siccis, calidisque vtendum est. Si per hæc dolor non finitur, necessariae sunt sine ferro cucurbitulae. Si ne per has quidem tormentum tollitur, incidenda cutis est, & tum his vtendum. Vltimum auxilium est, si cucurbitulae nihil profuerunt, per aluum infundere copiose aquam calidam, eamque recipere. Quinetiam quotidie ter quaterve opus est vti frictione vehementi, cum oleo & quibusdam calefacientibus. Sed in hac frictione à ventre abstinendum est. Imponendum verò in eum crebrius sinapi, donec cutem erodat, ferramentisque candentibus pluribus locis venter exulcerandus est, & seruanda vlcera diutius. Vtiliter etiam scilla cocta delinitur cutis, sed diu post has inflammationes abstinendum est ab omnibus inflantibus. At si id vitium est, cui leucophlegmatias nomen est, eas partes quæ tument, subiicere soli oportet, sed non nimium, ne febricula incidat: si is vehementior est, caput velandum est, vtendumque frictione madefactis tantum manibus aqua, cui sal & nitrum & olei paulum sit adiectum, sicut aut pueriles, aut muliebres manus adhibeantur, quo mollior earum tactus sit. Idque si vires patiuntur, ante meridiem rota hora, post meridiem semihora fieri oportet. Vtilia etiam sunt cataplasmata, quæ reprimunt, maximeque si corpora teneriora sunt. Incidendum quoque est super talum quatuor ferè digitis ex parte interiore, quæ per aliquot dies frequens humor feratur, atque ipsos tumores incidere altis plagis oportet. Concutiendumque multa gestatione corpus est: atque vbi inductæ vulneribus cicatrices sunt, adiciendum & exercitationibus est, & cibis, donec corpus ad pristinum habitum reuertatur. Cibus valens esse debet, & glutinosus, maximeque caro. Vinum (si per stomachum licet) dulcius. Sed ita, vt inuicem biduo triduoque, modò aqua, modò id bibatur. Prodest etiam lactuca marinae (quæ grandis iuxta mare nascitur) semen, cum aqua potui datum. Si valens est qui id accipit, ei scilla cocta (sicut supra dixi) delinitur. Auctoresque multi sunt inflatis vesicis pulsandos tumores, esse. Si verò id morbi genus est, quo in uterum multa aqua contrahitur, ambulare,



bulare, sed magis modicè oportet, malagma quod digerati-  
 positum habere, idque ipsum super imposito triplici panno,  
 fascia non nimium tamen vehementer astringere. Quod à  
 Tharria profectum, seruatum esse à pluribus video. Si iccur  
 aut lienem affectum esse manifestum est, ficum pinguem  
 contusam adiecto melle superponere. Si per talia auxilia ven-  
 ter non siccatur, sed humor nihilominus abundat, celeriore  
 via succurrere, ut is per ventrem ipsum emittatur. Neque  
 ignoro Erasistrato displicuisse hanc curandiviam. Morbum  
 enim hunc iocinoris putauit. Ideoque \* ita illum esse sanan- \* antea  
 dū, frustra que aquam emitti, quæ vitiato illo subinde nasca- al. non ita  
 tur. Sed primū non huius visceris vnus hoc vitium est.  
 Nam splene affecto, & in totius corporis malo habitu fit:  
 deinde, ut inde cœperit, tamen aqua nisi emittitur, quæ con-  
 tra naturam ibi subsistit, & iocinori & cæteris \* interioribus  
 partibus nocet. Conuenitque corpus nihilominus esse cu- bus  
 randum. Neque enim sanat emissus horror, sed medicinæ  
 locum facit, quam intus inclusus impedit. Ac ne illud qui-  
 dem in controuersiam venit, quin non omnes in hoc morbo  
 sic curari possint, sed iuuenes robusti, qui vel ex toto carent  
 febre, vel certè satis liberales intermissiones habent. Nam  
 quorum stomachus corruptus est, quæ ex atra bile huc de-  
 ciderunt, quique malum corporis habitum habent, idonei  
 huic curationi non sunt. Cibus autem quo die primū hu-  
 mor emissus est, superuacuuus est, nisi si vires defunt. Inse-  
 quentibus diebus & his vinum meracius quidem, sed non ita  
 multum dari debet, paulatimque euocandus æger est ad exer-  
 citationes, frictiones, solem, sudationes, \* nauigationes, & \* fatiga-  
 idoneos cibos, donec ex toto conualescat. Balneum rarum tiones,  
 res amat, frequentiore in ieiunio vomitum. Si æstas est, in  
 mare natare commodum est. Vbi conualuit aliquis, diu ta-  
 men alienus ei Veneris usus est.

ENAR-



## ENARRATIO.

**A**SCLEPIADES Hydropa acutum vocavit, non qui cito finiretur ( ut recte hic acutum morbum definit Celsus ) sed qui repente constituitur; ut tardum, qui cum tarda passione vexat; rursusque hydropem alium cum febris, atque alium sine iisdem definiuit.

## Atque eius tres species.

**DIOCLES** tamen tantum duplicem esse hydropem dixit, hypofarcam videlicet, & ascitem: vanum nanque esse & intellectum carens sine ullo humore superfluo laborantem hydropem vocare. Demetrius tamen Herophili sectator, alium hydropem sine ullo humore constitui dixit, sed sola inflatione surgente, alium ex alio humore, & eum quidem nunc per totum corpus diffundi, nunc inter peritonaeum & intestina. Idem asserere videtur Hippocrates libro De ratione victus in morbis acutis, dicens: Hydropum duae sunt naturae; quarum alter sub carne si fieri aggreditur, inenitabilis est; qui vero cum inflationibus sit, multa bona fortuna habet opus, maxime autem arumnis & temperantia. Galenus locum hunc suspectum habet, & Hippocratis esse negat. Proculus aliter hydropis differentias confundeat: Initium enim aqua intercutis esse dicebat leucophlegmatiam, quum videlicet secundum carnem fieri mutationes viderimus; statum vero tympanitem, quando summa tenso secundum ventrem fuerit facta; declinationem vero ascitem, quum quadam indulgentia inflatio fuerit relaxata. Dura admodum nec satis commens collatio: nam quantumvis aliquis statui appositae tympanitem, ut qui reliquis molestior & periculosior sit, collatum dixerit; assequi tamen non possum, cur ascitem declinationi, anasarcamque principio comparavit.

## Communis tamen.

**IN** tympanite tamen est stultius potentius humoris abundantia: ob quam causam Hippocrates quarta sectione Aphorismo-

rum, eandem siccam aquam inter cutem vocavit.

## ob quam.

**ID** in anasarca potissimum, deinde in ascite, locum habet: nam si, ut ait Hippocrates, ulcera non prius ad cicatricem perducuntur, quam sufficienter exiccata sint, in anasarca, in qua totius corporis miscella, spongia instar, humida & laxa existit; & in ascite, in qua inter peritonaeum & intestina potissimum copiosus humor aquosus continetur, ulcera difficillime cicatricem admittunt: quibus si addas totius sanguinis vitium (cuius, si quod aliud, bonitas requiritur ad inducendam cicatricem, atque substantiam deperditam restaurandam) nihil difficilius erit in omnibus etiam hydropis speciebus, quam ulcera carne implere, ac iisdem cicatricem obducere; adeo recte ex Hippocrate hic infert Celsus, aqua inter cutem laborantibus, ulcera quae in corpore sunt, non facile sanari.

## Saepe vero hoc malum.

**HEPATIS** nimirum functione primario vitata, quum gignendo sanguini parum valet: unde in alienam quandam substantiam mutato succo, alendo corpori usui esse non potest; quem dum in subiectas ac maxime vicinas partes roriat, in vastum tumorem corpus attolli necesse est, secundum ventrem praesertim & viscera.

## Saepe alteri vetusto morbo.

**MULTI** enim ex podagra aut coxendacum dolore, alij ex orthopnea, nonnulli ex peritonaei aut vulvae in mulieribus scirrhus, aut duricie, alij ex dysenteria, plurimi etiam ex arquato, & malo corporis habitu in hydropem inciderunt; ut etiam multi ex mensibus haemorrhoidibusque suppressis; facile enim aliis visceribus, puta lieni, pulmone, ventriculoque, coarctantur hepar.

## maximeque quartanae.

**QUARTANA** si longior sit, sepe in aquam



aquam inter cutem, ut ante dictum est, degenerat, quod in ea magna sit lenis obstructio.

### Facilius in seruis quam in liberis tollitur.

ISTHVC quam sit verum, docet Antonius Beniuenus capite XIII. Siquidem is à rustico quodam interrogatus, qua potissimum ratione à morbo iam inueterato liberari posset, subridens respondit, opus esse non vltra biberet, quam ut vitam sustineret. Discessit ille, ac toto anno ab omni potu abstinens, reuertitur ad Beniuenum, rogatque an ulteriore potus abstinentia opus esset. Admiratus ille hominis constantem abstinentiam, insit paulatim vino assuescere, ac ita tandem cuiusda potione usus pristina sanitati restitutus est.

### Inter initia tamen.

SI lenis tantum obstructio sit hepatis, circa scirrhusam aliquam duriciem, facile inter initia citroque curatur hydrops; praesertim si quiete ad concoquendos cibos sufficiente, siti, atque inedia agrotantem detineamus, ita enim fiet, ut & aquosus humor dissipetur, exicceturque, & vires ex ingesto cibo reficiantur, alioqui semper in longissimum tempus producet, & difficillime medicamentis cedit.

### Quod si redditur.

VOMITVS si quo modo pronocari potest, in hydropicis commodissimus est: quare in incipiente hydropisi omnibus modis sollicitandum monet Aërius. Non mirum igitur, si Methrodorus ille Epicureus ex aqua quam vomitu reiecit, lenamen sensit, ut puta qua simul & sitim sopierit, & vomitione peccantis materia portionem aliquam expurgarit.

### Si febris quoque.

AB aqua inter cutem, inquit Hippocrates, non valde fortis febris, neque diuturna oritur: nam igni non valde bonum alimentum ex aqua prebet. Studendum tamen est, ut si qui hydropici febricent, febris intermissione carentur, ac tum quidem,

ab acrioribus, calidioribusque cibis abstinendum est: quin etiam nocuum est, cataplasmata, inunctionesque calefacientes admodum precordiis; neque intra sunt cuiuscunque generis pharmaca aciora. In summa, ita actionem nostram moderari studebimus, ut vehementiori magisque urgenti omnibus, quoad fieri potest, modis subueniamus.

### Atque hic quoque.

NON tamen omnes Hydropis species inter initia iisdem auxiliis opus habent: siquidem etsi purgationem omnes requirant; sola leucophlegmatia (potissimum quæ suppressos aut menses, aut hæmorrhoides sequitur) sanguinis missione ante omnia flagitat.

### Multum ambulandum.

HIPPOCRATES libro De morbis vulgaribus, etiam defatigandos laboribus dicit hydropicos; id enim exiccat, & cutem poroque, sicut frictio reliqua que subinnat, laxiores reddit, ac serofos humores per sudores elicit. Frictio autem ipsa mediocris esse debet, ut docet Trallianus, ut humores facilius enaporent, & tanquam ex superficie summe cutis extrahantur: nam alioqui si vehementior sit, violentia quadam materia ex imo raperetur.

### sed etiam in arena calida.

QVAM sit salubris post euacuationem Hydropicis arene suggestio, precedente libro, ubi de insolatione egi, abunde declaratum est: multi etenim fatentur sese aqua inter cutem laborantes ad pristinum reduxisse statum, solius marinæ arene aggestione: ea autem ita faciendâ est, ut agroti corpus defodiatur sub arena, ac eadem obtineatur, solo excepto capite: quod tamen velatum esse conuenit, ne calore solis ladeatur, porrigendâque ab astante ministro frequentius recens arena est; ita enim fiet ut sudor felicius subsequatur, & aquosus humor educatur. Si autem marina arena ad manum non sit, in eius locum substituere licet flumiaticam, cui modicum salis admixtum sit; est tamen marina leuior & magis reficcans.

x

Potio



**Potio non vltra danda est.**

**PLVRIMVS** frequensq; potus incommodus, ut qui maxime est Hydropicus; neque enim (ut ait ille) sitim pellunt, nisi causa morbi. Dandum igitur tantum, quantum & ad sustentandam vitam, & infringendam sitim satis sit. Potus ergo esto vinum vetus, tenue & austerrum; id enim non modo urinam promocat, sed & humiditatem superfluum exiccat: à dulcibus re- centibusque vinis in totum abstinendum est.

**Sed id ipsum.**

**NAM** praterquam quod citius familia- rior natura est, etiam in propriam substan- tiam facilius alteratur; medicamenta verò omnia quatenus talia sunt, à natura aliena censentur; alia enim vesicam commouent, alia intestina lacerando ulcerant, alia tor- mina faciunt, alia stomachum subvertunt, fastidiumque cibi generant, & sitim ex- tendunt.

**iris.**

**EXTENDENDI** calefaciendique vini obtinet: succus autem eius maxime hydra- gogum medicamen est, si denariorum duo- rum pondere sumatur; ut multiplici experi- mento compertum est.

**nardum.**

**CALEFACTORIVM** & exiccans est, compositum ex substantia multum astrin- gente & acri, calida non multa, & qua- dam modica subamara; iecori amicum, at- que urinæ promocanda utilissimum.

**crocum.**

**ID** quoque urinam promocat: eiusdem plarè energia sunt, cinamomum, animum, casia, myrrha &c. atque id quidem alia aliis intensius.

**vua tyminia.**

**TAMINIA** legendum est: nam, ut ait Plinius, Staphidiagian, aut Staphin quidam falso vnam taminiam vocant: maturescit cum vindemia, nigrescitque cum taminie rubeles nonerit acinos. hoc Plinius. Pro- dest autem Hydropicis, quod, si intus suma-

tur, per vomitum crassam ac pituitosam materiam reiciat. Cupressi autem semen, quousodo hoc elogio celebrari, non video; nisi forte idem prodesse dicat, quod cum astri- ctione caliditatem quandam coniunctam ha- beat; unde & exiccat, & robur laxis par- ticulis subministret.

**rosæ folia.**

**ROSARVM** vis ex aquea calida sub- stantia, dualius aliis qualitatibus, astringente videlicet & amara mixta, composita est: quo fit ut & fluentem alium compe- scant, præsertim si sicca atque exicca fuerint; & vice versa, longo rerum usu compertum habemus, eandem succum, bilem & aquas expurgare: quanquam id veterum nonnulli non animaduertierint, aut saltem non creminerint.

**Neque alienum est.**

**NAM**, ut Hippocrates libro De indica- tionibus, in his qui hydropse detinentur, si aquositas per ventrem ad vesicam aut ven- trem sit, solutio fit; & si à pituita alba oc- cupatio alui profluvium vehemens accide- rit, solutio fit: nam etiam si copiosa mictio morbo nihil adimat, quod tamen ferè facit; indicat tamen bonam concoctionem: nam, ut in Aphorismis Hippocrates, mictio nocturna plurima facta, parvam significat fore de- tentionem.

**Asclepiades in eo.**

**LONGIOR** ac difficiol ex quartana est hydrops, quam ut tantillo negotio curari posse credam.

**Ergo si inflammatio.**

**HIC** variant exemplaria: nam Pin- zani inflatio legit; reliqua malè, ut bene annotavit Paxinus, inflammatio substituerunt; ita ut per inflationem hydro- pem tympanitem intelligamus: huic etenim fomenta sicca calidæque optima sunt, & cucurbitula sæpius repetita præsentissima sunt remedio, siue cum scarificatione, siue absque eadem affigantur.

**Vltimum auxilium est.**

**SI** simplicem aquam iniicias, parum profeceris;



profeceris; sin discutientia eidem adieceris, plurimum adiuveris.

### Quin etiam quotidie.

CVR totum corpus, solo exceptio ventriculo, qui flatibus maxime distenditur, fricari velit, mirandum est, alius contrarium longe asserentibus, ac dicentibus ventrem tantisper perfricandum aspero linteo, dum vinido quodam colore cutis efflorescat, atque ructore suffundi incipiat: neque id inintia; nam si frictio continentes meatus aperit, humores desiccat, flatus discutit, extenuat, disiccat, recte eidem parti quæ maxime afficitur adhibetur, ac nisi adhibeatur, obstructis meatibus flatuosi spiritus peritonæum ipsiusque ventrem magis distendunt; quod sentiens Celsus, sibi per omnia non satis constans ventri sinapismos applicat, candentibus plumbeis exulcerandum ventrem pluribus locis admonet, eademque ulcera diu aperta seruanda docet: quo sit ut empyo inducar ut credam, locum hunc non citra mendæ suspensionem legi, atque sic, ni quid obstat, restituendum: Sed in hac frictione, à ventre abstinendum non est, imponendumque in eum crebrius sinapi. quanquam si quis aliam lectionem seruare malit, per me integrum est; præsertim quando ex antedictis constet satis Celsum hinc inde, modò ex empiricorum, nunc methodicorum placitis sine ordine in suum volumen redegerisse.

### Vtiliter etiam scilla.

QUOMODO VNQUE vianur, scilla maximi usus est: nam quum acris sit & tenuium partium, extrinsecus apposita, cutim quodammodo exulcerat: in vino autem ad terrias decocta, cochlearis vini aut alterius mensura sumpta, citra molestiam aquosum humorem euacuat.

### At si id vitium.

LEVCOPHLEGMATIAM modò anasarcam, nunc hyposarcam & hyposarcidion nominant.

eas partes quæ tument.

Non solum velandum capiti est, si sol

calidior sit, sed totum etiam corpus ab insolatione arce-dam est: periculum enim esset si supercalexeretur corpus, ne febres accenderentur, vnaque cum ipsarum februm generatione tumores duplicarentur, atque id multo magis, ut auctor est Aetius, quum febres remittunt, ac tumores refrigerationem capiunt.

### Vtilia etiam.

EA vide nec quæ robur visceribus ad-dunt, & reficere simul possunt: qualia sunt quæ ex cotoneis, myris baccis, malicorio, & similibus consunt.

### Incidendum quoque est.

ISTHVC præsentissimum esse in hydropicis remedium affirmabat Asclepiades, peracta incisione ea profunditate, qua venam secare soleamus: nam posteaquam tenuis quidam aquosusque sanguis effluerit, sensim indefinenterque aquosus humor effluere incipit, qui non compefcitur antequam totus euauerit. Atque id quidem adeò necessarium nonnulli esse contenderunt, ut nisi statim fieret, aliis in locis, quæ breui intumescerent (puta seroto, & similibus) obeunda esset scitio.

### Concutiendumque.

ID post inunctionem faciendum est, ac tum quidem si sudor premānet, linteis abstergendus est, ne obspiciantur meatus.

### Cibus valens esse debet.

HOC ex præscripto Hippocratis libro. De ratione victus in morbis acutis facere videtur, qui suillas carnes hydropicis dandas dicit, ut aduersus arduas resisterent obambulationes: quanquam id quoque non in omnibus faciendum suadeat Galenus; verum in iis tantum qui & validi sunt & florentes aetate: nam alioqui concoctioni repugnabunt, & viscerum obstructions parient.

### Vinum (si per stomachum, &c.

DVLICIA vina nullumque, si quod aliud, vitanda sunt, nisi eadem substantia tenuia sint, atque urinam pronocent; siquidem



dem hydropicis id tantum vinum ex usu est, quod tenue sit & pauciferrum, quodque lotium cieat.

### Auctoresque multi sunt.

AVCTORES sunt Archigenes, & Herodotus, qui pulsandos tumentes locos vesicis bubulis, aut etiam aliis magnis ac probe inflatis ac vacuis afferebant; inde enim citra molestiam carnem condensari, neque dolore neque reperensione duriore resiliante.

### Si verò id morbi genus.

CVR in ascite, quam tympanite aut anasarca, minus ambulandum dicat, valde demoror; præsertim quando hic, si usquam alibi, exercitium, ut quod exiccet, & poros referet, usui esse possit,

### malagma quod digerat.

ITA ligamenti constringendus est ager, ut ab inferioribus partibus incipiamus, ac ligamentorum distributionem ad superiores partes faciamus, ita ut sæpe (sicut monet Aëtius) super ipsa ligamenta spongas posita imbutas in xta tumefactas maximè partes imponamus.

### Si per talia.

HIPPOCRATES sexto Epidemion, ὁδὴ τὰς δὲ καὶ τὰς τὰς, hoc est hydropicos citius secare oportet: aut per τὸ τὰς τὰς, punctiones intelligens, quas Græci πνεύματα nominant.

### Neque ignoro.

QVAMVIS non solum Erasistrato, sed & Ptolemao & Thessalo atque Euenori

eorumque sectatoribus suspecta fuerit hydropis ascites per paracentesin curatio, quod quum passionis causam dicant esse iecinoris duriciem, supercreatam verò humoris infusionem, paracentesis humorem detrahens passionem non minnat, siquidem non auferat causam ex qua humor sit creatus. Hippocrati tamen, Aëtio, Paulo Æginetæ, atque aliis summè semper commendata est: nam præterquam quod tensionem difficultatēque spirandi amoneat, medicine etiam locum facit, dum enacnato humore, tutum sit localia medicamenta applicare, quæ alioqui irrita essent. Non ferunt tamen omnes hanc curandi rationem, verum ij tantum, qui & viribus polleant, & ætate floreat; tales enim sola paracentesi restitutos legimus.

### Nam splene affecto.

QVAMVIS obstruccionem splenis, malum corporis habitum, mensum aut redundantiam, aut suppressionem, & id genus alia innumera hydrops comitari soleat, ex simplici tamen lienis obstruccionē, cachexia, & similibus nunquam superueniet, nisi per sympathiam coaffecto hepate: quare bene Erasistratus hepar affectum esse dixit.

### Si æstas est.

LOCORVM & aquarum mutatio est adhibenda, & peregrinatio magis maritima, inquit Galienus: est enim lacerantior, & corporis apertionibus magis efficax maritimus aër, ob salseridinem.

## CAPVT XXII.

### De Tabæ, & eius speciebus, & curationibus.

DIVITIJS sæpe & periculosius Tabes eos malè habet, quos inuasit. Atque huiusquoque plures species sunt. Vna est, qua corpus non alitur, & naturaliter semper aliquibus decedentibus, nullis verò in eorum locum subeuntibus, summa macies oritur, & nisi occurratur, tollit: ἀσθία hanc Græci vocant. Ea duabus fere de causis incidere consuevit.

Aut



Aut enim nimio timore aliquis minùs, aut auiditate nimia plusquàm debet, assumit: ita vel quod deest, infirmat: vel quod superat, corrumpitur. Altera tabis species est, quam Græci καχεξία appellant, vbi malus corporis habitus est, ideoque omnia alimenta corrumpuntur. Quod ferè fit, cùm longo morbo vitiata corpora, etiam si illo vacant, refectiõnem tamen non accipiunt, aut cùm malis medicamentis corpus affectum est, aut cùm diu necessaria defuerunt, aut cùm inusitados & inutiles cibos aliquis assumpsit, aliquidve simile incidit. Huic præter tabem illud quoque nonnunquam accidere solet, vt per assiduas pustulas aut vlcera summa cutis exasperetur, vel aliquæ corporis partes intumescant. Tertia est, longèque periculosissima species, quam Græci φθίσις nominauerunt. Oritur ferè à capite, inde in pulmonem destillat: huic exulceratio accedit, ex hac febricula leuis fit, quæ etiam cùm quieuit, tamen & repetit. Frequens tussis est, pus excreatur, interdum cruentum aliquid. Quicquid excreatum est, si in ignem impositum est, mali odoris est. Itaque qui de morbo dubitant, hac nota vtuntur. Cùm hæc genera tabis sint, animaduertere primùm oportet, quid sit in quo laboratur. Deinde, si tantummodo non ali corpus apparet, causam eius attendere: & si cibi minus aliquis quàm debet, assumit, adicere, sed paulatim, ne si corpus insuetum, subita multitudo onerauerit, concoctionem impediat. Si verò plus iusto quis assumere solitus est, abstinere vno die, deinde ab exiguo cibo incipere, quotidie adicere, donec ad iustum modum perueniat. Præter hæc conuenit ambulare locis quàm minimè frigidis, sole vitato, per manus quoque exerceri. Si infirmior est, gestari, vngi, perfricari, si potest, maxime per seipsum, sæpius eodem die, & ante cibum & post eum sic, vt interdum oleo quædam adiiciantur calefacientia, donec insudet. Prodestque ieiuno prehendere per multas partes cutem, & attrahere, vt relaxetur, aut imposita resina & abducta subinde idem facere. Vtile est etiam interdum balneum, sed post cibum exiguum. Atque in ipso solio rectè cibi aliquid assumitur, aut si sine hoc frictio fuit, post eam



protinus. Cibi verò esse debent ex his, qui facile concoquuntur, qui maximè alunt. Ergo vini quoque, sed austeri necessarius vsus est, mouenda vrina. At si malus corporis habitus est, primùm abstinendum est, deinde aluus ducenda, tum paulatim cibi dandi, adiectis exercitationibus, vnctionibus, frictionibus. Vtilius his frequens balneum est, sed ieiunis etiam vsque ad sudorem. Cibi verò opus est copiosis, variis, boni succi, quiq̃ue etiam minùs facile corrumpantur, vino austero. Si nihil reliqua proficiunt, sanguis mittendus est, sed paulatim quotidieq̃ue pluribus diebus, cum eo, vt cætera quoque eodem modo seruentur. Quòd si mali plus est, & vera phthisis est, inter initia protinus occurrere necessarium est. Neque enim facilè is morbus cum inueterauerit, euincitur. Opus est, si vires patiuntur, longa nauigatione, calì mutatione, sic, vt densius quàm id est, ex quo discedit ager, petatur. Ideoq̃ue aptissimè Alexandriam ex Italia itur. Fereq̃ue id posse inter principia corpus pati debet, cum hic morbus ætate firmissima maximè oriatur, id est ab anno \* duodecimo ad annum quintum & trigèsimum. Si id imbecillitas non finit, naue tamen non longè gestari commodissimum est. Si nauigationem aliqua res prohibet, lectica, vel alio modo corpus dimouendum est, tum a negotiis abstinentum est, omnibusq̃ue rebus, quæ sollicitare animum possunt, somno indulgendum, cauendæ destillationes, ne si quid cura leuaret, exasperetur, & ob id vitanda cruditas, sinuiq̃ue sol & frigus. Os obtegendum, fauces velandæ, tussicula suis remediis finienda, & quàm diu quidem febricula incurSAT, huic interdum abstinentia, interdum etiam tempestiuis cibus interdum. Eoq̃ue tempore bibenda aqua. Lac quoque, quod in capitis doloribus, & in acutis febribus, & per eas facta nimia sitis, siue præcordia tument, siue biliosa vrina est, siue sanguis fluxit, pro veneno est, in phthisi tamen, sicut in omnibus longis difficilibusq̃ue febribus, recte dari potest. Quòd si febris aut nondum incurSAT, aut iam remisit, recurrendum est ad modicas exercitationes, maximeq̃ue ambulationes, item lenes frictiones. Balneum alienum est. Cibus esse debet

\* duodecimo  
ecclamo



bet primò acer, vt allium, porrum, idque ipsum ex aceto, vel ex eodem intubus, ocymum, lactuca. \* Dein lenis, vt sorbitio \* Deinde ex ptisana, vel ex alica, vel ex amylo, lacte adiecto. Idem oryza quoque, & si nihil aliud est, far præstat. Tum inuicem, modò his cibis, modò illis vtendum est. Adiciendaque quædam ex media materia, præcipueque vel ex aprugna, cerebellum, vel pisciculus, & his similia. Farina etiam cum seuo ouillo, caprinove mista, deinde incocta, pro medicamento est. Vinum assumi debet lene, austerum. Hactenus non magna mole pugnatur. Si vehementior noxa est, ac neque febricula neque tussis quiescit, tenuarique corpus apparet, validioribus auxiliis opus est. Exulcerandus est ferro candenti, vno loco sub mento, altero in gutture, duobus ad mammam vtramque: item sub imis ossibus scapularum (quas *ὀστέα* Græci vocant) sic ne sanescere vlcerà sinamus, nisi tussis finita. Cui per se quoque medendum esse, manifestum est. Tunc ter quaterque die vehementer extremæ partes perfricandæ, thorax leui manu pertractandus, post cibum intermittenda hora, & perfricandæ crura, brachiaque. Interpositis denis diebus deimitendus est æger in solium, in quo sit aqua calida, & oleum: cæteris diebus bibenda aqua, tum & vinum: si tussis non est, potui frigidum dandum: si æstas est, egelidum. Vtile est etiam cibos in remissionibus quotidie dari, frictiones, gestationesque similiter adhiberi: \* itemque acria \* eadem acria quarto aut quinto die sumere, interdum herbam sanguinalem ex aceto, vel plantaginem esse. Medicamentum etiam est, vel plantaginis succus, per se, vel marrubium ex melle concoctum, ita vt illius cyathus sorbeat, huius cochleare plenum paulatim delingatur, vel inter se mista & incocta resinæ terebenthinæ pars dimidia, butyri & mellis pars altera. Præcipua tamen ex his omnibus sunt victus, vehiculum, & nauis, & sorbitio. Alius cita vtique vitanda est. Vomitus in hoc morbo si frequens est, perniciosus est, maximeque sanguinis. Qui meliusculus esse cœpit, adicere debet exercitationes, frictiones, cibos, deinde ipse se, suppresso spiritu, perfricare, diu abstinere à vino, balneo, Venere.

ENAR-



## ENARRATIO.

**Q**UÆ Latinis tabes vocatur, Græcis φθίσις aut φθορά dicitur: ea autē quam varias causas diuersosque morbos subsequatur, ferē pulmonis ulcerationem adiunctam habet: nam siue sanguinis spissationes, siue empyicos, siue peripneumonicos, seu etiam pleuriticos subsequatur tabes; unus tamen idēque morbus est, atque eandem sedem affectam habet. Quare improprie admodum malum corporis habitum & nutrimenti cessationem, quam ἀτροφία vocant, inter tabis species recensuit Celsus: rectius congeneres, ut qui longa strigosaque macie corpus consumant, vicināsque phthisi passionēs dixisset: quo loco haberi etiam posset empyema, peripneumonia, atque pleuritis; ut quæ, nisi recte curentur, in eandem, ut dixi, degenerent.

## Ατροφία.

**A**B accidenti nomen sumpsit malum; estque potius morbi symptoma quam morbus dicendus, quum longus morbus succedere soleat.

## Altera tabis species.

**VITIVM** hoc aqua intercuti potius quam phthisi ascripseris, quum tota corporis miscella laxior, mollior ac fungosior, in modum leucophlegmatici, quodammodo reddatur; quin & si diutius perseneraverit vitium, in aquam intercutē conueriti solet.

## Tertia est.

**PERICVLOSA** dicitur tabes ex ulcere pulmonis, tum quod pharmacorum vires ad vlcus peruenire nequeant, prius quam in ventre permittentur; tum quod propter continuum pulmonis motum ulcera difficillimē conglutinentur, sed tussiendo quodammodo lacerantur: nam quum pulmo aliās expurgari nequeat, quā per se creatum aut tussim, sit ut tussis vehementia labra vlcere quæ iam quodammodo coharebant, iam iterum diuellantur, atque disrumpantur: quin etiam (quod rarius tamen fit) si diu-

turna pulmonis ulcera curationem admittant, perfectam tamen cicatricem nunquam obduxeris, sed quæ fistulosa quodammodo sit, & quam lenissima occasione refricueris.

## Quicquid excreatum est.

**EXTREMAM** enim humorum putrefactionem qui in pulmone sunt denotat. Sumpta est sententia ex quinta sectione Aphorismorum Hippocratis, ubi sic scriptum reliquit: Si is qui tabe infestatur, spiritum quod tussiendo excreant, graniter olet carbonibus impostum, & capilli à capite desunt, lethale est. Celsus desunt capillorum non meminit; quod non secus ac ipsum spiritum considerandum monet Galenus, ut quod alimenti defectionem, & humorum corruptionem denotet.

## Deinde, si tantum modò.

**TRANSGREDITVR** ad atrophiam; cuius curationem optima methòdo proficitur.

## sole vitato.

**CONTRARIVM** assererat Themison, quanquam malè, qui loco igneo vel ferventi, atque sole torrente, præsatis, sudoribusque dissolutis fricari vult.

## Prodestque ieiuno.

**I**N hunc usum dropacibus, malagmatisque, & articulorum lenibus complicationibus viebantur.

## mouenda vrina.

**I**D rectè adhiberi docet Pantinus, in atrophia orta à copia alimenti.

## At si malus corporis habitus.

**CACHECTICI**, si viriosi humores in causa sunt, statim in principio purgandi sunt: frustra ergò hîc Celsus Methodicorum Cyclum inculcat; siquidem quorsum hic







triat. Veteres, ut quinto Methodi docet Galenus, phthorē laborantibus mulierem lactantem aſtare voluerunt, cum quod id familiare nobis eſſe cenſuerint, cum quod ſumi voluerint, antequam ab aëre nos ambiente refrigeraretur. Quare & hodie à medicis obſervatum video, ut recens mulctum lac, aſtante etiam animale, reliquis magis commendatum habeant, atque id uſu ita exigente bibendum dent; cui modò ſalem, ut libro De alimentorum facultatibus docet Galenus, modò mel admifcent.

### Cibus eſſe debet.

CAVENDVM tamen eſt ne nimis acer cibus ſit: nam, ut Hippocrates, cibaria & opſonia dentur neque pingua, neque nidoſa, neque valdè acia. Porrum tamen aliſiſque pulmonis ulceribus conueniunt, propter abſtergendi vim aliquam, quā peſtoris exſecrationes eliciunt. Præſtiterit tamen eadem, ut docet Paulus, exhibere poſteaquam chondri & piſſana iure macerata contabuerint.

### apruna.

BENE monet hic Pantinus legendum eſſe aprugna.

### cum ſeuo ouillo.

HIS non inefficacior eris adeps cernuus recens in ſorbitionibus eliquatus.

### Exulcerandus eſt ferro candenti.

CAVENDVM, tamen eſt ne prius conſer-

tim eſſuat; periculum enim eſſet, ut ſexto Aphoriſmorum Hippocrates, ne interirent aut vitam cum morte committerent: nam, ſicut ideni libro De internis affectionibus docet, Si prius in thoracem prorumpat, quā tibi monſtrare videretur, illic poſiſſimum ſecans aut urens, priuſ id exiguum puris emit-  
tito.

### ſcapularum.

PERPERAM hic Pinzanum exemplar omotidas legit: verum, ſicut reliqua exemplaria habent, ὁμοπλάτας legendum eſt.

### ceteris diebus bibenda aqua.

CÆLESTIS poſiſſimum aqua, ſi qua alia, danda eſt, atque inde conſecta muſſa.

### Medicamentum etiam eſt.

INTER reliqua omnia medicamentum hoc exaſſerata lenit, fluxus cohibet, ac diuulſa conglutinat.

### Aluſcita vitanda.

HIPPOCRATES ſeptimo Aphoriſmorum: A puris ſputo tabes & ſtuor; quum verò ſputum retinetur, moriuntur. & ſeſtione quinta, XII. Aphoriſmo: Quibuſcunque tabe laborantibus capilli à capite deſtillant, iſi alui profluuium ſupervenientiſ lethale.

## CAPVT XXIII.

### De Comitialis morbi curationibus.

INTER notiſſimos morbos eſt etiam is, qui Comitialis, vel maior nominatur. Homo ſubitò concidit, ex ore ſpumæ mouentur, deinde interpoſito tempore ad ſe redit, & per ſeipſum conſurgit. Id genus ſæpiùs viros quàm ſcæminas occupat, ac ſolet quidem etiam longum eſſe, uſque ad mortis diem, & vitæ non periculoſum. Interdum tamen cum recens



cens est, hominem consumit; & saepe eum, si remedia non  
sustulerunt, in pueris veneris, in puellis menstruorum ini-  
tium tollit: \* modò cum distentione membrorum aut neruo- \* ac modò  
rum prolabitur aliquis, modò sine \* illa quidem. Hos \* illa. Qui-  
quoque iisdem, quibus lethargicos excitare conantur: quod dam hos  
admodum superuacuum est, & quia ne lethargicus quidem  
his sanatur, & quia cum possit iste nunquam expergisci, atque  
ita fame interire, hic ad se utique reuertitur. Vbi concidit  
aliquis, si nulla neruorum distentio accessit, utique sanguis  
mitti debet. Si accessit, non utique mittendus est, nisi alia  
quoque hortantur. Necessarium autem est ducere aluum,  
vel nigro veratro purgare, vel vtrumque facere, si vires pa-  
tiuntur: tunc caput tondere, oleoque & aceto perungere, ci-  
bum post diem tertium, simul cum transit hora, qua conci-  
dit, dare. Neque sorbitiones autem his, aliique molles &  
faciles cibi, neque caro, minimeque suilla conuenit; sed me-  
diæ materiæ. Nam & viribus opus est, & cruditates ca-  
uendæ sunt, cum quibus fugere oportet solem, balneum,  
ignem, omniaque calefacientia: item frigus, vinum, vene-  
rem, loci præcipitis conspectum, omniumque terrentium,  
vomitum, lassitudinem, sollicitudines, negotia omnia. \* Vbi \* & vbi  
tertio die cibus datus est, intermittere quartum, & inuicem  
alterum quenque, eadem hora cibi seruata, donec quatuor-  
decim dies transeant. Quos vbi morbus excessit, acuti vim  
deposuit. At si manet, curandus iam ut longus est. Quod  
si non quo die primum id incidit, medicus accessit, sed is  
qui cadere consuevit, \* ei traditus est, protinus eo genere vi- \* post ei  
ctus \* habito, qui supra comprehensus est, expectandus est \* dabitur,  
dies, quo prolabor, vtendumque tum vel sanguinis missio-  
ne, vel ductione alui, vel nigro veratro, sicut præceptum est.  
Insequentibus deinde diebus per eos cibos quos proposui, vi-  
tatis omnibus, quæ cauenda dixi, nutriendus. Si per hæc  
morbus finitus non fuerit, confugiendum erit ad album ve-  
ratrum, ac ter quoque aut quater eo vtendum, non ita mul-  
tis interpositis diebus: sic tamen, ne iterum vnquam sumat,  
nisi conciderit. Mediis autem diebus vires eius erunt nu-  
triendæ,



\* supra  
scripta

rienda, quibusdam, præter ea quæ scripta sunt, adiectis. Vbi manè expectatus est, corpus eius leuiter ex oleo vetere, cum capite (excepto ventre) permulceatur, tum ambulatione quàm maxime longa & recta vtatur: post ambulationem loco tepido, vehementer & diu, ac non minus ducenties, nisi infirmus erit, perfricetur: deinde per caput multa aqua frigida perfundatur, paulum cibi assumat, conquiescat, rursus ante noctem ambulatione vtatur, iterum vehementer perfricetur, siq; vt neque venter, neque caput contingatur, post hæc coëset, interpositisque tribus aut quatuor diebus, vno aut altero acra assumat. Si ne per hæc quidem fuerit liberatus, caput radatur, vngatur oleo vetere, adiecto aceto & nitro, perfundatur aqua salia, bibat ieiunus ex aqua castoreum, nulla aqua nisi decocta potionis causa vtatur. Quidam iugulati gladiatoris calido sanguine epoto, tali morbo sese liberarunt. Apud quos miserum auxilium, tolerabile miserius malum fecit. Quod ad medicum verò pertinet, vltimum est iuxta talum, ex utroque crure paulum sanguinis mittere, occipitium incidere, & cucurbitulas admoquere, ferro candente in occipitio quoque & infra, quâ summa vertebra cum capite committitur, adurere duobus locis, vt per ea perniciosus humor euadat. Quibus si finitum malum non fuerit, prope est, vt perpetuum sit. Ad leuandum id tantummodo vtendum erit, exercitatione multa, frictione, cibisque his, qui supra comprehensi sunt, præcipueque vitanda omnia, quæ ne fierent, excepimus.

ENARRATIO.

COMITALIS morbus variis atque inter se differentes binario fortius est denominationes: siquidem modo Sacer appellatur, vel quod diuinum quid eidem inesse crediderit antiquitas, vel quod magnus ac vehemens sit, maiora siquidem vulgus Sacra vocare solet: sic Sacrum mare, Sacram domum dicimus. Apuleius autem iecoriorum, hoc est factum morbum à iecore dictum esse vult, quod anima ipse ratio nalem, quæ longe diuinissima est, violenter. Vnde via autem dicitur, quod sensum ac mentem simul apprehendat: Puerilis verò morbus, quod eidem ætati familiaris: Herculeus autem, vel ab ipsa morbi magnitudine; vel quod Herculem eidem morbo proximè fuisse fama sit: Comitialis ideo nominatus est, quod si quis illo correptus in comitiis contidisset, eadem interrumpere: Lunaticus autem vocatur, quod si quis interlunio



interlunio concepti aut nati sunt, eodem morbo ferè torripantur: de quo Sammonicus: Est subiti species morbi, cui nomen ab illo est

Quod fieri nobis suffragia iusta recuset,

Sæpe etenim membris atro languore caducis

Concilium populi labes horrenda dimittit,

Ipse deus memorat dubiæ per tempora lunæ

Conceptum, talis quem sæpe ruina profudit.

ex ore spumæ.

E A oriri solet ex motus agitationisque vehementia.

Id genus sæpius viros.

ISTHVC an verum sit ambigo; præsertim quando mulieres viris temperie sint humidior ac frigidiore, morbusque sit pituitosus & in pituitosis consistens naturis, ut docet Hippocrates.

Interdum tamen.

VT si acutas admodum faciat accessiones: nam tum ferè hominem consumere, atque lethalis esse solet, nisi magna adhibeatur diligentia, atque impetus morbi refrenetur.

in pueris.

HIPPOCRATES Aphorismorum sectione secunda, Aphorismo XLV. Quicumque, aut, iuvenes morbo comitiali laborant, mutatione maximè etatis, & temporum, & locorum, & victum quoque liberantur. & libro quinto Aphorismo VII. Quicumque morbi comitiales ante pubertatem eueniunt, mutationem capiunt; quibus autem vigesimo quinto, is magna ex parte commemorantur. Solet namque hic affectus pubertatis tempore, siue noue in foeminis purgationis, aut primi partus puerperio aboleri, critica quadam atque naturali expurgatione peccante materia educta.

Vbi concidit aliquis.

THESSALYS statim in principio phle-

botomandos afferebat, alij in tertium diem differendam phlebotomiam consueverunt. Soranus alios statim in initio, ut si morbus urgeret, neque ciborum cruditas obflaret, sanguinis eductione curabat; aliis quibus cibos crudos & incoctos adhucdum inesse putabat, tertio tantum die tundendam venam arbitratum est. Aegineta post accessiones, si nihil prohibeat, sanguinem è cubito mittit.

Neque sorbitiones.

VICTVS enim incidens attenuansque epilepticis conuenit: quare neque qui facillè corrumpitur aut in alienam qualitatem transmutatur, neque crassi succi cibus, neque qui flatulentus est, iisdem conuenit.

Balneum.

PAVLVS tamen Aegineta, ubi satis purgati sunt, balneo eosdem credit.

Venerem.

NIHIL aequè epilepticis nocuum est, atque concubitus seu Venus: quam non immeritò quidam paruam epilepsiam vocauerunt, quod similem faciat membrorum motum, diuerso contractu, anhelatione & sudore atrescente, & oculorum conuersione, cum rubore vultus, ac deinde post effectum displicere faciat sibi, corpus cum pallore & quadam debilitate vel inæstitudine.

loci præcipitis conspectum.

NON solum præcipites loci, sed & gurgites rapidique fluij, ac rotarum circumrotationes nocua sunt, sicuti omnis strepitus, terror, nimia perspiratio, odores aut nimis boni, aut mali, quorum aliqui suffitus epilepticos statim concidere faciunt, ut est bitumen, gages, cornu cerui, bdellium, storax, atque id genus alia.

Vbi tertio die.

ET hic suam diuisionem obseruat, quum tamen iam opus esse virilis dixerit: sed neque si decimum quartum transgrediantur diem, acuti vim deposuerit, quum & vigesimo & quadagesimo indicari possit, atque absolute curari. Talis enim non est epilepsia, ut inter acutos simpliciter, quos Hippocrates



poocrates in xliij. diebus finire docet, recenseri debeat; verum potius inter acutos ex decidentia: quamquam interdum, licet rarius, eosdem etiam ante decimumquartum diem finire videamus.

#### tum ambulatione.

NON solum obambulationes, sed & omnis generis exercitationes in palastra, & gestationes quae equo fiunt, utiles sunt, si ante cibum fiant: incipiendum tamen semper à blandioribus minoribusque exercitiis, sensimque ad vehementiora deveniendum est; terminus autem seu finis obambulationis exercitationisque sui anhelitus alteratio.

#### deinde per caput multa - aqua frigida.

Id suspectum habet Alexander Trallianus: Nam si quando, inquit, in solium descendit, neque caput identidem immergat, neque larga aqua madefaciat; verum semel atque iterum, seu tertio ad summum.

#### sic ut neque venter.

FRITIONIS ratio haec sit: Primum à brachiis auspicandum est; secundo ad pe-

ctus descendendum, & ad ventrem; deinde ad coxendices: sit autem valida frictio, ut aliquid caloris corpori accedat, atque humores euocentur. postremo quando particulis robur aliquod aut firmitas affuerit, caput quoque, sed lenius, perfricandum est; periculum enim esset ne si primo à capite frictionem ordiamur, omnis materia confertim eò conflueret. Ventrem autem quare intratum esse voluerit Celsus, nondum assequor.

#### castoreum.

CALEFACIT, exsiccet, extenuandaeque vi prae ditum est castoreum, nervis laborantibus, affectibusque ex copia humorum ortis utiliter exhibetur.

#### Quidam iugulati.

Hic Plinium videre licet, apud quem eadem fere quae hic dicit Celsus, leguntur in praefatione libri XXVIIII. Sanguinem, inquit, quidam gladiatorum bibunt, ut bibentibus populis procul sint comitiales morbi, quod spectare facientes eadem arena ferarum quoque horror est. Scribonius Largus idem tribuit hepati gladiatoris iugulati.

### CAPUT XXIIII.

#### De Regij morbi curatione.

• quemq; **A**EQUE notus est morbus, quem interdum Arquatum, interdum Regium nominant. \* Quem Hippocrates ait, si post septimum diem febricitante agro superuenit, tutum esse, mollibus tantummodo praecordiis substantibus. Diocles ex toto, si post febrem oritur, etiam prodesse: si post hunc febris, occidere. Color autem cum morbum detegit, maxime oculorum, in quibus quod album esse debet, fit lutum. Solentque accedere & sitis, & dolor capitis, & frequens singultus, & praecordiorum dextra parte durities, & ubi corporis vehemens motus est, spiritus difficultas, membrorumque resolutio, atque ubi diutius manet morbus, totum corpus cum pallore quodam inalbescit. Primo die abstinere agrum



ægrum oportet, secundo ducere aluum, tum si febris est, eam victus genere discutere. Si non est, scamoneam potui dare, vel cum aqua betam albam contritam, vel cum aqua mulsa nucas amaras, absinthium, anisum, sic ut pars huius minima sit. Asclepiades aquam quoque falsam, & quidem per biduum, purgationis causa bibere cogebat, iis quæ urinam mouent reiectis. Quidam superioribus omissis, per hæc & per eos cibos, qui extenuant, idem se consequi dicunt. Ego ubique, si satis virium est, validiora, si parum, imbecillia auxilia præfero. Si purgatio fuit, post eam triduo primo modicè cibum oportet assumere ex media materia, & vinum bibere græcum, falsum, ut resolutio ventris maneat; tum altero triduo validiores cibos, & carnis quoque aliquid esse; intra aquam manere, deinde ad superius genus victus reuerti, cum eo, ut magis satietur, omisso græco vino, bibere integrum austerum: atque ita per hæc variare, ut interdum acres quoque cibos interponat, interdum ad falsum vinum redeat. Per omne verò tempus utendum est exercitatione, frictione, si hyems est, balneo; si æstas, frigidis \* nationibus: lecto etiam & conclauis cultiore clauso loco \* uti, ludis, lasciuiis, per quæ mens exhilaratur. Ob quæ Regius morbus dictus videtur. Malagma quoque quod digerat, super præcordia datum prodest, vel arida ibi ficus impolita, si iecur aut lienis affectus est.

\* nationibus  
\* ut & lasciu  
dis

## ENARRATIO.

**V**ARIA item nomina & hic morbus fortius est: nam nunc Icterus dicitur, à similitudine ad animalculum quod iuncus appellatur, sine vinerra, hoc est mustela sylvestris, quæ auricolores habet oculos, ut habet Aëtius; vel potius, sicut Plinio placet, ab ictero ane, quæ, ut idem dicit, à colore sic vocatur: quæ si spectatur, sanari id malum tradunt; anem autem mori. hanc putat Latine vocari Galgulum. Arquatius verò à celestis arcus similitudine: Anrigo autem ab anri pallore, quem bilis per vniuersum corpus dispersa representat, dictus est. Re-

gius autem signatur nomine morbus, ait Serenus Sammonicus, Molliter hic quoniam celsa curatur in aula; hoc est, quod mulsi potione, quæ in regum erat deliciis, curetur.

## Quem Hippocrates ait.

**H**IPPOCRATES sectione quarta Apborismorum: Quibus in febris regius mortuus ante diem septimum accidit, malum est. & paulo post: Quibus in febris septimo, vel nono vel XI, vel XIIII. morbus regius successerit, bonum; nisi dextrum hypochond-



hypochondrium duxum fuerit: Celsus molliciem praecordiorum adesse voluit, quod idem est: nam ut duricies hepatis, si in dextero latere; lienis, si in sinistro, inflammationem denotat; ita mollicies securitatem ab eadem pollicetur.

### Diocles.

IDEM Plinius & Auerrhoës senserunt, qui etiam ante septimum diem, superuenientem in febribus icterum non formidauerunt.

### Color autem.

SIC Plinius libro XXVI, Morbum regium, inquit, in oculis praecipue nitari est, tenuitatem illam densitatemque tunicularum felle subeunte.

### praecordiorum dextrâ parte.

NON semper sequitur praecordiorum dextra parte duricies: neque enim semper (ut De locis affectis docet Galenus) in morbo regio locus affectus est hepar: siquidem videmus nonnunquam icterum nequaquam affecto, per morbi indicationem effundi ad cutem bilem pallidam; quo modo abscessus quoque aliqui euenire consueverunt. Videmus etiam aliquando citra morbi indicationem, sanguinem ab extraneâ aliquâ occasione corruptum, biliosum effici; qualis etiam à feris mordentibus fieri solet. Accidere

etiam potest, ut icteroris secundum naturam temperatura mutata, humores huiusmodi vitio afficiantur. & quidem citra obstructionem; aut inflammationem, aut febrim. Quin etiam manifeste quandoque videmus, vniuersum corpus herbis candenti pallore similari; interdum plumbeum, aut etiam magis fuscum colorem referre, interdum etiam alias quasdam ineffabiles colorum proprietates, quae ictere suo munere non fungente accidere solent. Sic ob splenis quoque vitia huiusmodi colores eneniunt, sed multo nigriores quam ab hepate. Hæc Galenus.

### secundo ducere aluum.

IN principio tamen, ut recte monet Aërius, purgandum non est, sed statim depilantibus vitendum, hisque attenuanda est, ac quodammodo ad intestina reducenda; atque tum demum medicamento fortius ducenda aluus est: qua ratione & scamoneam potui dandam auctor est Celsus.

### lecto etiam & conclau.

SIC ut iam dixi, Serenus Sammoniacus, Regius est, inquit, signatus nomine morbus, Molliter hic quoniam celsa curatur in aula. Varro autem ac Plinius quod multis positione, quæ in regum erat delictis, curaretur, Regium morbum dictum voluit.

## CAPUT XXV.

### De Elephantia curatione.

IGNOTVS autem penè in Italia frequentissimus in quibusdam regionibus is morbus est, quem *ελεφαντίαση* Græci vocant, isque longis annumeratur. Totum corpus afficitur, ita ut ossa quoque vitari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas, crebrosque tumores habet. Rubor harum paulatim in atrum colorem conuertitur. Summa cutis inæqualiter crassa, tenuis, dura, mollisque; quæ si squamis quibusdam exasperatur, corpus emacrescit, os, suræ; pedes intumescent.

Vbi



Vbi vetus morbus est, digiti in manibus pedibusque sub tumore conduntur, febricula oritur, quæ faciliè tot malis obrutum hominem confumit. Protinus ergo inter initia sanguis per \*biduum mitti debet, aut nigro veratro venter solui, adhibenda \*tum quanta sustineri potest, inedia est; paulum \*triduum tamen deinde vires reficiendæ, & ducenda aluus: post hæc, vbi corpus leuatum est, vtendum est exercitatione, præcipueque cursu, sudor primùm labore ipsius corporis, deinde etiam siccis sudationibus euocandus, frictio adhibenda, moderandumque inter hæc, vt vires conseruetur, balneum rarum esse debet. Cibus sine pinguibus, sine glutinosis, sine inflantibus. Vinum præterquàm primis diebus, rectè datur. Corpus contrita plantago, & illita, tueri optimè videtur.

## ENARRATIO.

PLINIVS Historia Naturalis libro xxvi. Diximus, inquit, elephantiasin, ante Pompeij Magni aetatem non accidisse in Italia; & ipsam in facie sæpius incipientem, in nare prima veluti lenticula, mox inualescente per totum corpus maculosa variis coloribus, & inæquali cute, alibi crassa, alibi tenui, dura seu scabie aspera, ad posterum verò nigrescente, & ad ossa carnes ap-primente, intumescens digitis in pedibus manibusque. Aegypti peculiare hoc vitium; & quum in reges incidisset, populis funebre; quippe in balneis solia temperabantur humano sanguine ad medicinam eam. Galenus Satyriasis appellat, quod eo morbo affecti faciem habeant Satyris similem; nasum videlicet sinum, & labia crassa: alij Leoniasin nominare maluerunt. Anicennas, vt ante Euchesium doctissimè disserit Ioannes Mainardus, lepram nominat; sicuti etiam ad unum omnes Arabes elephantiasin Gra-

corum in suam lepram conuerterunt, ita vt certum sit longè aliam esse Græcorum elephantiasin, ab elephantiasi Arabum; & rursus aliud esse Arabum lepram, aliud Græcorum.

aut nigro veratro.

Id interpositis aliquot diebus post sanguinis missionem faciendum est, neque semel tantum, sed bis, ter, & amplius; sic tamen vt intermedio tempore, conueniente victus ratione, aegroti vires reficiantur.

adhibenda.

Idque potissimum vt tota corporis miscella immutetur.

Vinum.

PAVLVS à vino & Venere per totum morbi curriculum, abstinendum docet; si tamen vires à purgatione superflua labascant, ad easdem refocillandas pauxillum vini tenuis ac diluti dumtaxat concedit.

## CAPVT XXVI.

De Attonitis, & eorum curatione.

ATTONITOS quoque rarè videmus, quorum & corpus & mens stupet. Fit interdum ictu fulminis, interdum morbo,



morbo, *ἀποπληξία* hunc Græci appellant. His sanguis mittendus est. Veratro quoque albo, vel alui duactione yrendum. Tum adhibendæ frictiones, & ex media materia minimè pingues cibi, quidā etiam acres, & à vino abstinendum.

## ENARRATIO.

**A**TTONITI modò dicuntur qui tonitru aut fulminis ictu obstupefcunt; eaq; est nominis propria significatio: interdum etiam dicuntur ij qui morbo (quem *ἀποπληξία* Græci vocant; quòd tanquam ex lethali percussione repentinū faciat casum) correpti, motu & sensu particularum totius corporis privati sunt; idq; quando commune neruorum principium, nempe cerebrum, affectum est.

His sanguis mittendus est.

POTISSIMUM si à sanguinis copia confertim in cerebrum irruentis, apoplexia orta sit; ac tum quidem tantum sanguinis detrahendum est, quantum vires citra iacturam ferre possint: commouere enim sanitum oportet, non exoluere vires, aut innatum calorem extinguere. Inspiciendus enim agri pulsus & faciei color, & respiratio in euacuatione, & si nihil mali ex viriū im-

becillitate subsequatur, non verebimur iam iteratò venam tundere.

Veratro quoque albo.

HELLEBORVM album exhibet ad educendum, si fieri potest, per superiora, hoc est, per vomitionem. Per alui autem deiectionem eam intelligit quæ per enemata obitur.

Tum adhibendæ frictiones.

NON modò adhibenda sunt frictiones, sed & innunctiones illitionesq; ac magna cucurbitula.

& ex media materiam.

CVIVSMODI erit qui mollis ac lenis est, nec distributioni rebellis, & qui simul calidus sit, ac exteriora vi præditus. A vino autem in totum abstinendum; locòque eius mulsæ, aut simile quid propinandum est.

## CAPVT XXVII.

*De resolutione neruorum, quæ Apoplexia  
vel πλεξίσις dicitur.*

**A**T resolutio neruorum, frequens vbique morbus est. Sed interdum tota corpora, interdū partes infestat. Veteres auctores illud *ἀποπληξία*, hoc Paralyfin nominauerūt. Nunc vtrumque Paralyfin appellari video. Solent autem qui per omnia membra vehementer resoluti sunt, celeriter rapi, ac si \* correcti non sunt, diutius quidē viuunt, sed rarò tamen ad sanitatem perueniunt, & plerunque miserum spiritum trahunt, memoria quoque amissa. In partibus verò nunquam acutus, sæpè longus, fere \* sanabilis morbus est. Si omnia membra vehementer resoluta sunt, sanguinis detractio vel occidit, vel liberat. Aliud curationis genus, vix vnquam sanitatem

\* correpti

\* insanabilis



tatem restituit, sæpe mortem tantum differt, vitam interim infestat. Post sanguinis missionem, si non redit & motus & mens, nihil spei superest. Si redit, sanitas quoque prospicitur. At ubi pars resoluta est, \* proderit malo corporis, vel sanguis missus, vel alius ducta. Cætera eadem in utroque casu facienda sunt. Siquidem vitare præcipue conuenit frigus, paulatimque ad exercitationes reuertendum est, sic, ut ingrediatur ipse protinus, si potest. Si id crurum imbecillitas prohibet, vel gestetur, vel motu lecti concutiatur, tum id membrum, quod deficiet, si potest, per se: si minus, per alium moueatur, & vi quadam ad consuetudinem suam redeat. Prodest etiam \* torpentis membri summam cutem exasperasse, vel vrticis cæsam, vel imposito sinapi, sic ut ubi rubere cœperit corpus, hæc remoueantur. Scilla quoque contrita, bulbi que contriti cum thure rectè imponuntur. Neque alienum est, resina cutem tertio quoque die diutius vellere, pluribus etiam locis, aliquando sine ferro cucurbitulas admouere. Vnctioni verò aptissimum est vetus oleum, vel nitrum aceto & oleo mistum. Quinetiam fouere aqua calida marina, vel si ea non est, tamen salsa magnopere necessarium est. At si quoloco vel naturales, vel etiam manu factæ tales natationes sunt, iis potissimum vtendum est, præcipueque in iis agitanda membra, quæ maximè deficiunt. Si id non est, balneum tamen prodest. Cibus esse debet ex media materia, maximeque ex venatione: potio sine vino aquæ calidæ. Si tamen vetus morbus est, interponi, quarto vel quinto die purgationis causâ vinum Græcum salsum prodest. Post cænam ytilis vomitus est. Interdum verò etiam neruorum dolor oriri solet. In hoc casu non oportet vomere, non medicamentis vrinam mouere, \* non sine exercitatione sudores, ut quidam præcipiunt, expedit. Bibenda aqua est bis die. In lectulo leniter satis diu corpus perfricandum est, deinde retento \* spiritu, ab ipsa exercitatione potius superiores partes mouendæ, balneo raro vtendum, mutandum subinde peregrinationibus cælum. Si dolor est, ea ipsa pars sine oleo nitro ex aqua perungenda est, deinde inuoluen-



da, & subicienda pruna lenis, & sulphur, atque ita id suffu-  
 migandum, idque aliquandiu faciendum. Sed ieiuno, cum  
 bene iam concoxerit, cucurbitulae quoque saepe dolenti parti  
 admouendae sunt, pulsandusque leuiter inflatis vesicis bubu-  
 lis is locus est. Vtile est etiam seuum miscere cum hyoscya-  
 mi & vrticæ contritis seminibus, sic, ut omnium par modus  
 sit, idque imponere, fouere aqua, in qua sulphur decoctum  
 sit. Vtricoli quoque rectè imponuntur aqua calida repleti,  
 aut bitumen cum hordeacea farina mixtum, atque in ipso  
 potissimum dolore vtendum gestatione vehementi est, quod  
 in aliis doloribus pessimum est. Tremor autem neruorum  
 æquè vomitu, medicamentisque vrinam mouentibus\* inten-  
 ditur. Inimica etiam habet balnea, assasque sudationes. Bi-  
 benda aqua est, acri ambulatione vtendum, item vnctioni-  
 bus, frictionibusque maximè per seipsum, pila, similibusque  
 superiores partes dimouendae, cibo quolibet vtendum, dum-  
 modo concoctioni vtique studeatur. Secundum cibum cu-  
 ris abstinendum. Rarissima Venere vtendum est. Siquan-  
 do quis in eam prolapsus est, tum oleo\* leuiter diuque in le-  
 ctulo perfricari manibus puerilibus potius, quam virilibus  
 debet. Suppurationes autem, quæ in aliqua interiori parte  
 oriuntur, vbi notæ fuerint, primum id agere oportet per ea  
 cataplasmata quæ reprimunt, ne coitus inutilis materia fiat.  
 Deinde, si hæc victa sunt, per ea malagmata quæ digerunt,  
 dissipentur. Quod si consecuti non sumus, sequitur ut euo-  
 cetur, deinde ut maturescat, omnis tunc vomicae finis est, ut  
 rumpatur. Indiciumque est, pus vel aluo, vel ore redditum:  
 sed nihil facere oportet, quominus quicquid est puris exce-  
 dat. Vtendum maximè forbitionibus est & aqua calida. Vbi  
 pus\* fieri desit, transeundum ad faciles quidem, sed tamen  
 validiores & frigidos cibos, frigidamque aquam, sic ut ab ege-  
 lidis tamen initium fiat, primoque cum melle quædam eden-  
 da, ut nucleii pinei, vel Græcæ nyces, vel æuellanæ. Postea sub-  
 mouendum id ipsum, quo maturius induci cicatrix possit.  
 Medicamentum eo tempore vlceri est succus assumptus, vel  
 porri, vel marrubii, & omni cibo porrum ipsum adiectum.  
 Oporte-

\* impedi-  
 tur.

\* leniter

\* ferri



Oportebit autem uti in his partibus, quæ non afficiuntur, frictionibus, item ambulationibus lenibus. Vitandum erit, ne vel luctando, vel currendo, vel alia ratione sanescientia vlcera exasperentur. In hoc enim morbo perniciosus, ideoque omnimodo cauendus sanguinis vomitus est.

## ENARRATIO.

**I**N quo differat apoplexia à nervorum resolutione, quæ παράλυσις dicitur, docet Galenus libro tertio De locis affectis: nam in apoplecticis sensus & motus simul deperditur; in paralyticis motus tantum: siquidem, Μάστιγος μὲν οὖν inquit, ἡ παράλυσις ἐπὶ τῇ τῆς κινήσεως ἀπολλυμένη: ὥσθις apoplexia creberrime succedere solet paralyxis, sensu videlicet recuperato, motuque abolito. Non negaverim tamen nonnunquam apud veteres, atque adeo ipsum Hippocratem, denominationes hoc confundi: nam in segmento septimo Aphorismorum, Aphorismo XL: Ἡ ἡ γλῶσσαι ἐξείφθη ἀπερὶ τὴν γένηται, ἢ ἀπὸ πλῆτος π τοῦ σώματος, μελὲς, καὶ τοῦτο γινέται. hoc est: Si lingua subitò infirma fiat, aut pars aliqua corporis resolvetur, hoc à melancholico humore accidit. Clarius tamen est quam ut longiore egeat explicatione, aliud esse Hippocrati apoplexiam, aliud resolutionem vel paralyxin. Themison autem capitis vel in capite paralyxin cum mentis impedimento propriè apoplexiam vocabat: Diocles verò, Praxagoras, ac Titiensis quidam Asclepiades, dicebant apoplectos toto corpore vitiatos paralyxi, paraplectos verò particulis. At quod paralyxis & pro resolutione, & pro fideratione dicta usurpetur, nondum apud quēquam, quod sciam, præter Celsum nostrum, legisse conigir.

## Solent autem.

SENTENTIA hac de apoplectis potius quam paralyticis intelligenda est: nam quantumvis sensus motisque privationem paralyticis concedamus, raro admodum, aut unquam cerebrum, animæ principem, in eisdem affici concedimus.

## Si omnia membra.

**HABITA** tamen ratione plenitudinis: nam nisi hac infestet, ab humorum purgatione curationem ordiri expedit. Caterum oportet moderatam esse, si quando fiat, sanguinis detractionem; ne dum prodesse studemus, egrotum ingulemus nimia perfictione, quæ ex superflua, aut capiosa aliqui sanguinis profusione, facile subsequeretur: quod voluisse Celsum verisimile est, dum dicit vel occidit vel liberat. occidit enim si plus iusto auferatur, aucto morbo nimia perfictione; solet enim frigiditas conuncta aut siccitati, aut humiditati affectionem inducere; unde & paulo post frigus summè vitandum dicit.

## At ubi pars resoluta.

**AB** incolumiore parte semper detrahendus sanguis est.

## Scilla quoque contrita.

**EFFICACIOR** erit, si XL. diebus in oleo vetere in sole macerata fuerit.

## pluribus etiam locis.

**SI** plures partes resolutæ fuerint, pluribus etiam locis, distinctisque post purgationem applicandæ sunt cucurbitulæ; sin pauce, uni tantum: sed neque eas sine ferro, hoc est sine scarificatione, ut hic infert Celsus, verum grandes primò cum cutis incisione, ut multum sanguinis attrahant, ac deinceps moderatiores, ut docet Aëtius, adhibebimus. Caterum sunt affigendæ partibus affectis, si aptæ sunt; si minus, vicinis.

## præcipueque in iis.

**NIHIL** æquè instrumentales partes roborat,



borat, ac exercitium: nam & ad actiones reddit fortiores, & ut affectionibus potenter resistent, praepravat: nam, ut Galenus libro methodi sanitatis tuendae, Exercitationibus firmitas quaedam membris accedit; quum & naturalis calor accenditur, & ex partium inter se attritu, duritia quaedam indolentiaque comparatur. sic sexto Epidemion Hippocrates: Labor, inquit, articulis & carnibus; cibus verò ac somnus visceribus prodest.

### potio sine vino aquae calidae.

QVOD vinum resolutis donec morbus deferat, inconueniens sit, notum est: at quòd iisdem ex usu sit aqua calida, non ita receptum puto. Nam quum morbus mali originem ad frigiditatem ac humiditatem referat, parum hic proderit aqua calens, nisi ad prouocandum vomitum eadem utarum. Quo sit ut nesciam, cur hic, & paulo post, bis in die aqua potui dandam dixerit: rectius mulsam, cui aut salvia, aut cinamomum, aut simile quippiam incoctum sit, exhibuerit.

### non medicamentis urinam mouere.

AETIVS tamen alimentis admiscenda monet qua urinam mouent.

### pulsandusque leuiter.

ALII cucurbitulas corneae in hunc usum commendarunt, quòd ore sugentes ex alto humores citra tensionem aliquam, aut inflammationem euocent.

### atque in ipso potissimum dolore.

VERVM est quòd labor aut vehemens exercitatio nervosis partibus conueniat: at virum eadem expediat in nervorum dolori-

bui, nondum induci possum ut credam; praesertim quando immodica illa agitatio facillimè defluxum materia ad partes dolentes concitaret.

### Tremor autem nervorum.

VARIIS ex causis oritur tremor; ut auctor est Galenus libro De tremore & palpitatione; quas ut varias diuersasque sortitur, ita variam atque eam diuersam curationem postulat: si tamen à valido violentoque frigore occupante oriatur, eandem omnino curationem cum paralyti efflagitat. Porro per assam sudationem, nisi eam intelligamus quam Vitruvius concameratam nominat, (in qua erat fornacula quam Graeci ἀλίσκων vocant) & quam Cicero in alterum apodyterij angulum promouet, ac nonnulli πᾶσι τοῖς πύλοις, hoc est à stipando suffocandoque, Propnigeton dictum volunt; non scio quomodo tremori nervorum obesse possit; praesertim quando praecedente libro ex Aërio ischiadicis, sideratis resolutisque sudationes, quae per insolationem, aut calidam arenam aggestionem fiunt, non inutiles pronuncianerimus: nisi ex stipatione illa ac suffocatione plus expectemus incommodi, quam utilitatis ex transpiratione.

### Suppurationes autem.

ADDVBITO vehementer num qua hic subsequuntur, antedictis cohaereant: mihi certe fini XXI 1. capitis annexenda videntur, quòd eodem capite de tabidis, & pulmone suppuratis agat.

### Indiciumque est pus.

HIPPOCRATES septimo Aphorismorum: A tuberculi intus ruptione, exolutio aut vomitio, aut animi defectio sit. in cuius Aphorismi explanatione Galenus dicit suppurationum ad intestina ruptiones, prorsus facere deiectiones.

AVRE-



A V R E L I I  
C O R N E L I I C E L S I

D E

R E M E D I C A

L I B E R Q V A R T V S,

A B A L D V I N O R O N S S E O *Gandensi, medico,*  
*Enarrationibus illustratus.*

C A P V T I.

*De humani corporis interioribus sedibus.*



A C T E N V S reperiuntur ea genera mor-  
borum, quæ in totis corporibus ita sunt, vt  
iis certæ sedes assignari non possint. Nunc  
de iis dicam, quæ sunt in partibus. Faci-  
lius autem omnium interiorum morbi cu-  
rationesque in notitiam venient, si prius  
eorum sedes breuiter ostendero. Caput

igitur, eaque quæ in ore sunt, non lingua tantummodo, pa-  
latoque terminantur, sed etiam quatenus oculis nostris expo-  
sita sunt. In dextra sinistraque circa guttur venæ grandes,  
quæ *σφαγίτιδες*, nominantur, itemque arteriæ (quas \* paroti-  
das vocant) sursum procedentes ultra aures feruntur. Atque  
in ipsis ceruicibus glandulæ positæ sunt, quæ interdum cum  
dolore intumescunt. Deinde duo itinera \* incipiunt. Alte-  
rum asperam arteriam nominant, alterum stomachum. Ar-  
teria exterior ad pulmonem: Stomachus interior ad ventri-  
culum fertur. Illa spiritum, hic cibum recipit: à quibus cum  
diuersæ viæ sint, qua coeunt, exigua in arteria sub ipsis fauci-  
bus lingua est, quæ cum spiramus attollitur, cum cibum po-  
tionemque assumimus, arteriam claudit. Ipsa autem arteria,  
dura,

\* carotidas

\* excip.

*Stomachus hic  
pro ipsa gula  
accipitur, vt &  
infra libro 4.  
c. 5. quamvis  
aliquando &  
pro ventriculi  
parte inferiori  
stomachi voca-  
bulo utatur  
Celsus, vt cum  
ait, Stoma-  
chus vero  
intestino-  
rum præci-  
puum est.*



\*residit.

\*residet. Constat ex circulis quibusdam compositis ad imaginem earum vertebrarum, quæ in spina sunt: ita tamen, ut ex parte exteriori aspera, ex interiori stomachi modo lævis sit, eaque descendens ad præcordia cum pulmone committitur. Is spongiosus, ideoque spiritus capax & à tergo spinæ ipsi iunctus in duas fibras vngulæ bubulæ modo, diuiditur. Huic cor annexum est, natura musculosum in pectore, sub sinistro mamma situm, duosque quasi ventriculos habet. At sub corde atque pulmone transversum ex valida membrana septum est, quod à præcordiis utrumque diducit æquè nervosum, multis etiam venis per id discurrentibus à superiore parte, non solum intestina, sed iecur quoque lienemque discernit. Hæc viscera proxima, sed infra tamen posita dextra sinistraque sunt. Iecur à dextra parte sub præcordiis ab ipso septo ortum, intrinsecus cavum, extrinsecus gibbum, quod prominens leuiter ventriculo insidet, & in quatuor fibras diuiditur. Ex inferiore verò parte ei fel inhæret, at lienis sinistra non eidem septo, sed intestino innexus est, natura mollis & rarus, longitudinis, crassitudinisque modicæ, isque paulum à costarum regione in utrumque excedens ex maxima parte sub his conditur, atque hæc quidem iuncta sunt. Renes verò diuersi, qui lumbis sub imis coxis inhærent, à parte earum resimi, ab altera rotundi, qui & venosi sunt, & ventriculos habent, & tunicis super conteguntur. Ac viscerum quidem hæc sedes sunt. Stomachus verò, qui intestinorum principium est, nervosus à septimæ spinæ vertebra incipit, ac circa præcordia, cum ventriculo committitur. Ventriculus autem, qui receptaculum cibi est, constat ex duobus tergoribus, isque inter lienem & iecur positus est, utroque ex iis paulum super eum ingrediente. Suntque etiam membranulæ tenues, per quas inter se tria ista connectuntur, iungunturque ei septo, quod transversum esse supra posui. Inde imi ventriculi pars paulum in dexteriores partes conuersa, in summum intestinum coarctatur. Hanc iuncturam *πυλωρον* Græci vocant, quoniam portæ modo in inferiores partes, ea quæ

Renes.

Stomachus.

Ventriculus.

\*omnia



quæ excreturi sumus,emittit. Ab ea ieiunum intestinum in-  
cipit, non ita implicitum: cui tale vocabulum est, quia nun-  
quam quod accipit, continet: sed protinus in inferiores partes  
transmittit. Inde tenue intestinum est, in sinus vehementer  
implicitum. Orbes verò eius per membranulas singuli cum  
inferioribus connectuntur, qui in dexteriores partes con-  
uerſi, & è regione dexteroris coxæ finiti, superiores tamen  
partes magis complent. Deinde id intestinum cum crassiore  
altero transuerso committitur, quod à dextra parte incipiens,  
in sinisteriorem peruium & longum est, in dexteriores non  
est, ideoque cæcum nominatur. \* Ad id quod peruium est,  
latè fufum atque ſinuatum, minusque quàm superiora inte-  
ſtina neruoſum ab vtraque parte huc atque illuc volutum,  
magis tamen ſiniſteriores inferioresque partes tenens, con-  
tingit iecur atque ventriculum. Deinde cum quibusdam  
membranulis à ſiniſtro rene venientibus iungitur, atque hinc  
dextra recuruat in imo dirigitur quæ excernit, ideoque id  
ibi rectum intestinum nominatur. Contegit verò vniuerſa  
hæc omentum ex \* interiore partè leue & \* ſtri-  
ctum, ex ſupe-  
riore mollius. Cui adeps quoque innas-  
citur, quæ ſenſu, ſicut  
cerebrum quoque & medulla, caret. At à renibus ſingulæ  
venæ colore albæ ad veſicam feruntur, ἐπιτρίπας Græci vo-  
cant, quod per eas inde deſcendentem vrinam in veſicam de-  
ſtillare concipiunt. Veſica autem in ipſo ſinu neruoſa & du-  
plex, ceruice plena atque carnoſa, iungitur per venas cum in-  
teſtino, eoque offe, quod publi ſub eſt. Ipſa ſoluta atque libe-  
rior eſt, aliter in viris atque in fœminis poſita. Nam in viris  
iuxta rectum intestinum eſt potius in ſiniſtram partem incli-  
nata. In fœminis ſuper genitale earum poſita eſt, ſuperque  
\* elapſa ab ipſa vulua ſuſtinetur. Tum in maſculis iter vrinæ  
ſpatioſius, & compreſſius à ceruice huius deſcendit ad colem.  
In fœminis breuius & plenius ſuper vuluæ ceruicem ſe oſten-  
dit. Vulua autem in virginibus quidem admodum exigua  
eſt. In mulieribus verò, niſi vbi grauidæ ſunt, non multo  
maior, quàm vt manu comprehendatur. Ea recta conti-  
nuataque ceruice (quem canalem vocant) contra mediam

Ieiunum in-  
teſtinum.Tenue in-  
teſtinum.\* At id  
Cæcum in-  
teſtinum.Rectum in-  
teſtinum :  
Omentum.

\* illapſa

Canalē.

A A

aluum



alium orsa, inde paulum ad dexteriores coxas conuertitur, deinde super rectum intestinum progressa, illis foeminae latera sua innectit. Ipsa autem ilia inter coxas & pubem imo ventre posita sunt, à quibus ac pube abdomen sursum versus ad praecordia peruenit, ab exteriori parte euidenti cute, ab interiori laxi membrana inclusum, quæ omento iungitur, *περιτόριος*; autem à Græcis nominatur.

## BALDVINI RONSSEI

## ENARRATIO.

itemque arteriæ ( quas  
parotidas, &c.

**P**AROTIDES glandule sunt iuxta aures sitæ, carotides confirmantes: quo fit ut hic mendum subesse suspicer, substituentiumque carotides: siquidem quum experientia compertum sit, arterias has aliquo modo pressas, ligatas, aut complicatas, veterosum somnum, & torporem quendam apoplecticum, quem *καρσος* Græci vocant, afferre; carotides appellarunt: alij apoplecticas nominare maluerunt.

## Stomachus.

IOANNES Casarius suis in Celsum annotationibus, sic scriptum hinc reliquit: Adheras, inquit, hic lector, stomachi vocabulum non pro ventriculo accipi, ut ferè vulgo solet, nec pro extrema gula parte, ut apud Plinium libro XI. capite XXXVII. sed pro ipsa gula; ut & infra libro IIII. capite V. quum dicit: Stomachus verò intestinorum præcipuum est. Quia in significatione accipitur & à Galeno libro Therapeutica methodi, ubi scilicet quum ventris & splenis, & stomachi mentionem fecisset, ita protinus subiungit: *Δεῖν δὲ εἶναι τὸν στήμαχον, ὅντιν ἐν τῇ κοιλίᾳ ὁνομάζουσι. ἐν δὲ τῇ ὀστέῳ καλεῖται τὸ στήμαχον γαστήρ*: quod sic Linacer vertit: Voco autem hoc loco stomachum, gulam; quam

stomachum propriè Græci appellant: nunquam etiam & ita vocatur & es ventris. Nec minus tamen stomachi vocabulo, infra pro ventriculi parte inferiore abutitur Celsus; quum ait: Stomachus verò intestinorum præcipuum est. huc usque Casarium.

longitudinis crassitudinisque modicæ.

Vide ne non hic mendum sit, atque legendum latitudinis crassitudinisque modicæ. siquidem quum splenis innata figura sit oblonga, non dixeris eam longitudinis crassitudinisque modicæ.

& tunicis.

RENES peritonæo inunguntur; eoque crasso satis: non deest tamen præter peritonæi velamē propriæ venibus tunica, ad quam parui nervuli à sexta nervorum synzygia perueniunt.

## Hanc iuncturam.

CONFVNDIT hic duodenum intestinum cum pyloro, quod tamen initium ephystæ seu duodeni intestini est; similiter & rectum intestinum cum colo. Leonarthus Fuchsius libro tertio Paradoxorum, capite primo, locum hunc ex professo excutit, atque auctorem nostrum erroris convincere nititur.

## CAPVT



## CAPVT II.

*De curationibus morborum, qui nascuntur à capite: & primò de eius dolore, deinde de morbo, qui circa faciem nascitur, tum de linguæ resolutione, postremò de deffillatione, ac grauedine.*

**H**is veluti in conspectum quendam (quatenus scire curantini necessarium est) adductis, remedia singularum laborantium partium exequar, orsus à capite: sub quo nomine nunc significo eam partem, quæ \* capillo tegitur. Nam oculorum, aurium, dentium dolor, & si quis similis est, aliàs erit explicandus. In capite autem interdum acutus & pestifer morbus est, quem *κεφαλαίαν* Græci vocant. Cuius notæ sunt horror \* calidus, neruorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, vomitus, sic vt vox supprimatur, vel sanguinis ex naribus cursus, sic vt corpus frigescat, anima deficiat. Præter hæc dolor intolerabilis maximè circa tempora, vel occipitium. Interdum autem in capite longa imbecillitas, sed neque grauis neque periculosa, per hominis ætatem est. Interdum grauior dolor, sed breuis, neque tamen mortiferus, qui vel vino, vel cruditate, vel frigore, vel igne, aut sole contrahitur. Hi quæ omnes dolores modò \* in febre, modò sine hac sunt, modò in toto capite, modò in parte, interdum sic, vt oris quoque proximam partem excrucient. Præter hæc etiam vnum inuenitur genus, quod potest longum esse, vbi humor cutem inflat, eaque intumescit, & prementidigito cedit, *ὄστρονέθαλον* Græci appellant. Ex iis, id quod secundo loco positum est, dum leue est, qua sit ratione curandum dixi, cum persequeretur ea, quæ sani homines in imbecillitate partis alicuius facere deberent. Quæ verò auxilia sint capitis, vbi cum febre dolor est, eo loco explicitum est, quo febrium curationis exposita est. Nunc de cæteris dicendum: Ex quibus id quod acutum est, & id quod supra consuetudinem intenditur, id quæ quod ex subita causa, & si non pestiferum, tamen

A A 2

vehemens



vehemens est, primam curationem habet qua sanguis mittatur. Sed id, nisi intolerabilis est dolor, superuacuum est. Satiusque est abstinere à cibo: si fieri potest, etiam à potione. Si non potest, aquam bibere. Si postero die dolor remanet, aluum ducere, sternutamenta euocare, nihil assumere, nisi aquam. Sæpe enim dies vnus aut alter totum dolorem hac ratione discutit, utique si ex vino \* vel cruditate origo est. Si verò in iis auxilii parum est, tonderi oportet ad cutem: deinde considerandum est, quæ causa dolorem excitarit: si calor, *Aqua frigida.* aqua frigida multa perfundere caput expedit, spongiam concavam imponere subinde in aqua frigida expressam, ungere rosa & aceto, vel potius iis tinctam lanam succidam imponere, aliaque refrigerantia cataplasmata. At si frigus nocuit, caput oportet perfundere aqua calida maritima, vel certè salsa, aut in qua laurus decocta sit, tum caput vehementer perfricare, deinde calido oleo implere, veste velare. Quidam etiam id deuinciunt. Alii ceruicalibus vestimentisque onerant, & sic leuantur, alios calida cataplasmata adiuuant. Ergo etiam ubi causa incognita est, videre oportet, refrigerantia magis, an calefacientia leniant, & iis uti, quæ experimentum approbarit. At si parum causa discernitur, perfundere caput primum aqua calida, sicut suprà præceptum est, vel salsa, vel ex lauro decocta, tum frigida posca. Illa in omni vetusto capitis dolore communia sunt, sternutamenta excitare, inferiores partes vehementer perfricare, gargarizare iis, quæ saluam mouent, cucurbitulas temporibus & occipitio admouere, sanguinem ex naribus detrahare, resina subinde tempora peruellere, & imposito sinapi exulcerare ea quæ malè habent, antè linteolo subiecto, ne vehementer \* arrodant: candentibus ferramentis, ubi dolor est, vlcera excitare, cibum \* per modicum cum aqua sumere: ubi leuatus est dolor, in balneum ire, ibi multa aqua prius calida, deinde frigida per caput perfundi. Si discussus ex toto dolor est, etiam ad vinum reuerti, sed postea semper antequam quicquam aliud, aquam bibere. Dissimile est id genus quod humorem in caput contrahit. In hoc tonderi ad cutem necessarium est. Deinde imponere sinapi,

\* erodat:

\* semper modicum



sinapi, sic ut exulceret. Si id parum \* profuit, scalpello utendum est. Illa cum hydropicis communia sunt, ut exerceatur, insudet, vehementer perfricetur, cibis potionibusque utatur, urinam præcipue mouentibus.

## ENARRATIO.

## In capite autem interdum.

**A**CVTVM vocat propter vehementes exacerbationes; nam aliqui, si morbum ipsum, ac tempus consideres, longum potius quam acutum dixeris; quando, ut docet Galenus, cephalæa inueteratus & ægè cedens capitis dolor appetitur, qui ex facili occasione maximas exacerbationes habet; adeo ut neque strepitus, neque vocem vehementiorem, neque lumen splendidum, neque vini potum, neque odora menta caput replentia tolerare possit.

## sic ut vox supprimatur.

**R**ARO admodum aut nunquam in cephalicis id conspicitur: nam quantumvis inter morbos qui caput infestent, ab Hippocrate talis annumeretur, in quo statim vox intercipiatur, non tamen sequetur in cephalæa vocis priuationem sequi; quum nec Galenus, nec Aetius, nec Paulus, nec quisquam alius præter Celsum nostrum, aphonia cephalæa ascripserit.

## Præter hæc dolor.

**C**VM cephalæa cephalagiam, hemis craniam reliquosque capitis dolores confundere videtur: siquidem ubi circa tempora, vel occipitum tantum dolorem esse dicit, hemis craniam subintelligit; quæ in hoc à cephalæa tantum differt, quod in illa altera tantum capitis pars excruciaci videtur, in hac autem totum caput.

## Interdum autem in capite.

**H**IC cephalagiam intelligit, quæ modò

ex sola corporis intemperie, modò ex humorum copia; interim ex utraque causa oritur: Nunc verò ex primitiua & foris incidente causa alia, nempe solis æstu, frigore, ebrietate, aut ictu &c.

## Præter hæc etiam.

**M**ALVM hoc ab aquoso humore in capite collecto denominationem sortitum est: plerumque autem aquosus humor qui colligitur, aut seculentus est, aut cruentus; semper verò lentum exitum: siquid aut ab obscura, aut manifesta causa, ut auctor est Aetius: peculiare malum, ut docet Ægineta libro sexto, pueris iam primum in lucem editis, capite à nutricibus parum dextrè presso.

## Sed id, nisi &amp;c.

**S**ANGVINIS tamen misio etiam si quammaximè non sit intolerabilis dolor, intermittenda non est, præsertim si vena ample sit, & ex sanguine ortum habeat malum; nam tunc nullum est presentius remedium, quanquam etiam nulla instantie plethora, sanguinis misio ut reuulsorium medicamentum, maxime necessaria sit.

## vngere rosa &amp; aceto.

**I**NTELLIGIT, ut iam antè sæpè dictum est, per rosam, rosaceum oleum: porro id efficacius erit, si ex oleo crudo confectum, neque nimium vetus sit.

## vel potius iis tinctam.

**H**OC enim, ut auctor est Galenus De medicamentis secundum loca, mitigatiuum est auxilium, quum vehementer infestus dolor, una cum hac quod subiecta commoet affectioni.

AA 3

Illa



## Illa in omni vetusto.

HÆC curandi methodus ab Archigene desumpta est, ut docet Galenus secundo medicamentorum localium libro, ubi ad escamen singula vocat. Dicit autem sic Archigenes: Quod si affectio perseneret, vena sectione à naso aut fronte, aut cucurbitis ad caput affixis vitior, aut sternutatorio quopiam concutito, aut per nares purgato. At vero in vehementer inueteratis, sinapi, ut moris est, adhibe, & perire: quod in materia frigida & humida plurimum prodesse Galenus quoque affirmat; in calidis vero, &

siccis temperaturis, plurimum obesse testatur. Cucurbitulas autem occipitio adhibet, tanquam resulsorium medicamen, ut humores ad oculos, aut anteriorem capitis partem ferri consuevis auertere conentur.

## Dissimile est id genus.

CAVENDVM tamen monet Aëlius si sub temporum musculis collectio fiat, ne autè hydrocephalices incidamus, quàm humor redundet; esset enim periculum ne musculus incideretur: ac post collectionem quidem iam factam à lateribus musculi sectionem facit.

## De morbo qui circa faciem nascitur, quem

Græci *κρυινδὴν ἀρασμὸν* vocant.

CIRCA faciem verò morbus innascitur, quem Græci *κρυινδὴν ἀρασμὸν* nominant. Is cum acuta ferè febre oritur. Os cum motu quidam peruertitur, ideoque nihil aliud est, quàm distentio oris. Accedit crebra coloris in facie totoque corpore mutatio. Somnus in promptu est. In hoc sanguinem mittere, optimum est. Si finitum eo malum non est, ducere aluum; si ne sic quidem discussum est, albo veratro vomitum mouere: præter hæc necessarium est vitare solem, lassitudinem, vinum. Sed si discussum iis non est, utendum est cursu, frictione, in eo quod læsum est, leni & multa, in reliquis partibus breuiore, sed vehementi: prodest etiam mouere sternutamenta, caput radere, idque perfundere aqua calida, vel marina, vel certè salsa, sic ut ei quoque sulphur adiiciatur: post perfusionem iterum perfricari, sinapi manducare, eodemque tempore affectis oris partibus ceratum, integris item sinapi, donec arrodatur, imponere. Cibus aptissimus ex media materia est.

\*item  
\*erodatur

## ENARRATIO.

SPASMVM cynicum hodie torturam oris vocant; est autem musculorum mandibularum resolutio: conueniunt

ei omnia medicamenta, quæ resolutis utilis esse diximus: quo sit, ut, nisi quid prohibeat, à sanguinis missione aspiciendum sit: exhibenda



exhibenda purgationes, & alia quæ capite de resolutione enarrauimus. Caterum quod ad topica seu localia dicta remedia attinet, ea resoluta adhibenda sunt parti, ut docet

Actum, non opposita, quod decipiantur qui mandibulam ab opposita parte distrahi contendunt.

### *De resolutione lingue.*

**A**T si lingua resoluta est, quod interdum per se, interdum ex morbo aliquo fit, sic ut sermo hominis non explicetur, oportet gargarizare ex aqua, in qua vel thymum, vel hyssopum, vel nepeta decocta sit, aquam bibere, caput, & os, & ea quæ sub mento sunt, & ceruicem vehementer perfricare, laesere linguam ipsam linere, manducare quæ sunt acerrima, id est sinapi, allium, cepam, magna vi luctari, ut verba exprimantur, exerceri retento spiritu, caput sæpe aqua frigida perfundere, nonnunquam inultam esse radiculam, deinde vomere.

### ENARRATIO.

caput, & os.

**N**ON solum his vrendum est, sed & post purgationem expedit venas sub lingua latentes rondere, cucurbitulæque sub mento adhibere.

caput sæpe aqua.

QUAM sit isthuc ex usu, nondum satis

intelligo; præsertim quando epithemata illitioneque acres, & sinapismos magis commendatos solumus. Vereor itaque ne hic mendum subsit: at quomodo resistendum sit locus, valde dubito; potissimum quando simpliciter calida aqua perfusio, nisi eadem acris sit, utilis esse non possit.

### *De Destillatione ac Grauedine.*

**D**ESTILLAT autem humor ex capite interdum in nares, quod leue est: interdum in fauces, quod peius est: interdum etiam in pulmonem, quod pessimum est. Si in nares destillat, tenuis per has pituita profluit, caput leuiter dolet, grauitas eius sentitur, frequentia sternutamenta sunt. Si in fauces, has exasperat, tussiculam mouet. Si in pulmonem, præter sternutamenta & tussim, est etiam capitis grauitas, lassitudo, sitis, æstus, biliosa vrina. Aliud autem (quamuis non multum distans malum) Grauedo est. Hæc nares claudit,



\* antem  
breu.

\* minus

\* quantum  
maxima

\* multo  
mag.

dit, vocem obtundit, tussim siccam mouet, sub eadem falsa est salua, sonant aures, venæ mouentur in capite, turbida vrina est. Hæc omnia *κορυζας* Hippocrates nominat. Nunc video apud Græcos in grauedine hoc nomen seruari, destillationes *κατασχυμεις* appellari. Hæc \* autem & breuia, &, si neglecta sunt, longa esse consueuerunt. Nihil pestiferum est, nisi quod pulmonem exulcerauit. Vbi aliquid eiusmodi sensimus, protinus abstinere à sole, balneo, vino, Venere debemus. Inter quæ vnctione, & assueto cibo nihilominus vti licet, ambulatione tantum acri, sed recta vtendum est, & post eam caput atque os supra quinquagies perfricandum. Raroque fit, vt si biduo, vel certè triduo nobis temperauimus, id vitium non leuetur. Quo leuato, si in destillatione crassa facta pituita est, vel in grauedine nares \* magis patent, balneo vtendum est, multaue aqua prius calida, post egelida fouendum os, caputque, deinde cum cibo pleniore vinum bibendum. At si æquè tenuis die quarto pituita est, vel nares æquè clausæ videntur, assumendum est vinum amineum, austerrum, deinde rursus biduo aqua, post quæ ad balneum & ad consuetudinem reuertendum est. Neque tamen illis ipsis diebus, quibus aliqua omittenda sunt, expedit tanquam ægros agere, sed cætera omnia quasi sanis facienda sunt, præterquam si diutius aliquem & vehementius ista sollicitare consueuerunt. Huic enim quædam curiosior obseruatio necessaria est. Igitur huic, si in nares vel in fauces destillauit, præter ea quæ suprà retuli, protinus primis diebus multum ambulandum est, perfricandæ vehementer inferiores partes, leuior frictio adhibenda thoraci erit, leuior capiti, demenda assueto cibo pars dimidia, sumenda oua, amyllum similiaque, quæ pituitam faciunt crassiorem. Siti \* quanta maximè sustineri potest, pugnandum est. Vbi per hæc idoneus aliquis balneo factus, eoque vsus est, adiciendus est cibo pisciculus, aut caro, sic tamen ne protinus iustus modus cibi sumatur. Vino meraco copiosius vtendum est. At si in pulmonem quoque destillat, \* multoque magis & ambulatione, & frictione opus est, eademque adhibita ratione in cibus, si non satis illi proficiunt,



ciunt, actionibus utendum est, magis somno indulgendum, abstinendumque à negotiis omnibus aliquando, sed serius, & balneum tentandum. In grauedine autem primo die quiescere, neque esse, neque bibere, caput velare, fauces lana circumdare, postero die surgere, diu abstinere à potione, aut si res coegerit, non ultra heminam aquæ assumere. Tertio die panis non ita multum ex parte interiore cum pisciculo, vel \* tam leni carne sumere, aquam bibere. Si quis sibi temperare non potuerit, quo minus pleniori victu utatur, vomere. Vbi in balneum ventum est, multa aqua calida caput & os fouere usque ad sudorem, tum ad vinum redire: postquæ vix fieri potest, ut idem incommodum maneat. Sed si manserit, utendum erit cibis frigidis, aridis, leuibus, humore quàm minimo, seruatis frictionibus, exercitationibusque, quæ in omni tali genere valetudinis necessariae sunt. \* leui

## ENARRATIO.

**V**IDETUR Celsus noster paulo aliter distillationum species distinxisse, quàm Galenus: siquidem Celsus distillationem modò ad naves fieri contendit, quæ \* rōzā appellatur; interim ad fauces, quæ \* rōzā; nunc ad thoracem vel pulmonem, quæ \* rōzā vel \* rōzā nominatur. Galenus autem libro De sanitatē tuenda sexto, & tertio De morborum symptomatis, capitis excrementa ad os & naves promptissimè ferri auctor est. Caterùm excrementi in os decursum, tum gulam, tum asperam arteriam excipere: ac proinde quoties ad os excrementum defluxit, distillationem; & grauedinem seu coryzā, quoties naves occupet; rancitatem vocat, quoties distillatio in fauces procumbat: nam quum in faucibus opportunissimè se exhibeat ad suscipiendas distillationes summa aspera arteria pars, quam larynx vocant, si ut is decidit ex capite humoribus madefactus, primò quidem rancam vocem (est enī larynx instrumentum vocis) deinde procedente tempore parvam faciat; & si longius

prorogetur malum, eandem intercipit: siquidem & cum larynge ipsa quoque arteria humectatur. Quòd si aeris quoque fluxio sit, non solum ad vocem inepta sit cum larynge arteria; sed etiam grauisima quedam erosio eis accidit; quæ talis est natura, quales sunt quas subinde in cute citra externam causam lesa, factas videmus. Ita verò & pulmo his exulceratur, & morbus tabes dicitur, Græcè \* rōzā: Celsus & cum eo Caelius Methodicus eam distillationis speciem quæ ad os fertur, sub ea quæ in fauces procumbat, comprehenderunt; quanquam id non satis propriè.

## Hæc autem &amp; breuia.

**PESTIFERVM** omnino est quod pulmonem exulcerant: nam, ut ait Galenus libro Therapēutica methodi quinto, Si vas aliquod in pulmone ruptum non conglutinetur, protinus antequam phlegmon procreatus sit, id sanabile non foret. Neque enim possunt quæ in putatione continentur, citra iussim expelli; & si iussim excitaueris, larynx

BB

GERANICIS



ceraueris atque exacerbaueris ipsum ulcus: quibus accedit, quod ingi respiratione agitur pulmo, & quod medicamenta curandis ulceribus accommodata, contingere ulcus, sicut in ventriculo, non possunt.

### Vbi aliquid eiusmodi.

HÆC enim, ut libro primo capite secundo auctor noster docet, sunt quæ distillationes pariuunt.

### ambulatione tantum.

HÆC tantum in distillatione ex materia frigida, quum calefaciant, conueniunt: nam, ut Hippocrates libro De veteri medicina, Omnibus quidem liberatio hæc est (de distillatione sermonem faciens) ut ex frigidityte quidem affecti percalescant; ex ardore vero perfrigerentur: atque hæc breui accedunt, & concoctione nulla opus habent. quod alludens Celsus, raro fieri dicit, ubi nobis temperauerimus, ut intra triduum non leuetur malum.

### balneo vtendum est.

SI quidem materia calida sit, balnea calida potabilium & dulcium aquarum con-

uenient; ita enim temperatura in melius transmutatur, & generati in capite vapores discentiuntur; sin frigida est materia distillationem faciens, tum balnea aquarum natura sua calidarum conueniunt; neque fuerit inutile oleo irino aut simili aliquo caput illinere.

### Siti quanta maximè.

SI QUIDEM, ut libro secundo inquit Theodorus Priscianus, procurata sit plurimum confert; & siuendo, ut inquit Calina Sicensis, siccantur.

### Si non satis illi proficiunt.

QUOMODO aciores cibos hic commendet, non intelligo: præsertim quando acris omnia hic cane penus & angue fugienda sint.

### Sed seriùs & balneum tentandum.

IOHANNES Cæsius, sed seriùs balneum tentandum est, legendum existimar. Pantino lectio hæc non satis placuit, sed rò tentandum in rò tentandum conuertendum suspicatus est.

## CAPVT III.

### De cervicis morbis, curationibusque.

**A**CAPITE transitus ad cervicem est, quæ grauibus admodum morbis obnoxia est. Neque tamen alius importunior, acutiorque morbus est, quàm is qui quodam rigore neruorum, modò caput scapulis, modò mentum pectori annectit, modò rectam & immobilem cervicem intendit. Priorem Græci *ὁμοδότριον*, insequentem *ἐκποδότριον*, vltimum *ῥέτριον* appellant, quamuis minus subtiliter, quidam indiscretis his nominibus vtuntur. Ea sæpe intra quartum diem \* tollunt. Si hunc euaserunt, sine periculo sunt. Omnia eadem ratione curantur, idque conuenit. Sed Asclepiades vtique mittendum sanguinem credidit. Quod quidam vitandum esse dixerunt, cò quod maximè tum corpus calore egeret, isque

\* tollit. ex Hippoc.



isq̃ue esset in sanguine. Verũm hoc quidem falsũ est. Neque enim natura sanguinis est, vt vtique caleat, sed ex his, quæ in homine sunt, is celerrimè vel calefit, vel refrigescit. Mitti verò necne debeat, ex iis intelligi potest quæ de sanguinis missione præcepta sunt. Vtique autem recte datur castoreum, & cum hoc piper vel laser. Deinde opus est fomento humido & calido. Itaque plerique aqua calida multa ceruices subinde perfundunt. Id in præsentia leuat, sed opportuniores nervos frigore reddit. Quod vtique vitandum est. Vtilius igitur est cerato liquido primũ ceruicem perungere, deinde ad mouere vesicas bubulas, vel vtriculos oleo calido repletos, vel ex farina calidum cataplasma, vel piper rotundum cum fico contusum. Vtilissimum tamen est humido sale fouere. Quod quomodo fieret, iam ostendi. Vbi eorum aliquid factum est, ad mouere ad ignem, vel si æstas est, in sole, ægrum oportet, maximeque oleo vetere, si id non est, syriaco, si ne id quidem est, adipe quàm vetustissima ceruicem, & scapulas, & \* spinas perfricare. Frictio cum omnibus in homine vertebis utilis sit, tum iis præcipuè, quæ in collo sunt. Ergo die nocteque, interpositis tamen quibusdam temporibus, hoc remedio vtendum est. Dum id intermittitur, imponendum malagma aliquod ex calefacientibus. Cauendum verò præcipuè frigus. Ideoque in eo conclau, in quo cubabit æger, ignis continuus esse debet, maximeque tempore antelucano, quo præcipuè frigus intenditur. Neque inutile erit, caput attonsum habere, idque irino vel cyprino calido madefacere, & superimposito pileo velare, nonnunquam etiam in calidum oleum totum descendere, vel in aquam calidam, in qua fœnum græcum decoctum sit, & adiecta olei pars tertia. Alius quoque ducta sæpe superiores partes resoluit. Si verò etiam vehementius dolor creuit, ad mouendæ ceruicibus cucurbitulæ sunt, sic, vt cutis incidatur, \* eadem aut ferramentis, aut sinapi \* adurendæ. Vbi leuatus est \* adurenda dolor, moueri que ceruix cœpit, scire licet cedere remediis morbum. Sed diu vitandus cibus, quisquis mandendus est. Sorbitionibus vtendum, itemque ouis forbilibus, aut \* à pul- \* hapalis, i. moll.



lis mollioribus ius aliquod assumendum. Id si bene processerit, iamque ex toto rectè se habere ceruices videbuntur, incipiendum erit à pulicula, vel intrita bene madida. Celerius tamen etiam panis mandendus, quàm vinum gustandum. Si quidem huius usus præcipuè periculosus, ideoque in longum tempus differendus est.

## ENARRATIO.

Neque tamen alius.

**Q**UEM Græci tetanum vocant, Cel-  
sus vixerem, Celsus Methodicus di-  
stentionem, uti hodiè ferè appellatur, dicere  
maluit. Procreatur autem tetanus musculis  
corporis, præsertim spinæ, gelu modo concre-  
tis, frigido nimirum humore, ut auctor est  
Ægineta, à foris & intus, partes eas astrin-  
gente; ideoque hoc malo occupati sedere  
se nequeunt. Sunt autem variae disten-  
tionis species; siquidem quoties particula cor-  
poris antrosum distenduntur, emprosthoton-  
us affectio appellatur; quum retrorsum,  
opisthotonus; atque quoties in utranque par-  
tem, tetanus seu rigor.

Ea sæpe intra quartum.

**Q**UICUNQUE tetano corripitur, in-  
quit in Aphorismis Hippocrates, in quatuor  
diebus pereunt: si verò hos effugerint, sani  
fiunt. Reddit causam Galenus in Commen-  
to, quoniam tetanus morbus peracutus sit, ut  
qui compositus est ex emprosthotono & opi-  
sthotono; & propterea citim in eo sit indi-  
catio, non ferente natura longiore tempore  
tensionis laborem.

Sed Asclepiades.

**N**ON semper probabat vena sectionem  
Asclepiades; siquidem, ut auctor est Celsus  
Siccensis, aiebat cucurbitulam utilem ma-  
gis quàm phlebotomiam probari huic pas-  
sioni: Nisi febres, inquit, prohibuerint ma-  
teria detractionem; vel in venis plurima  
fuerit plenitudo: tunc enim erit phleboto-  
mia adhibenda in ipsa vehementie summa-  
tate. Hac ex Asclepiade Celsus Methodicus.

Quod quidam vi-  
tandum.

**ET**SI Galenus curationem distentionum  
aut convulsorum, à sanguinis missione au-  
spicandam dicat, modò non penitus à san-  
guine secretus pituitosusque fuerit succus re-  
dundans; tamen cum præcautione id facien-  
dum monet, atque vitæ canendum docet,  
ne sanguinis missione omnino prosternantur  
vires: quare non univèrsim, sed pluribus  
repetitis vicibus sanguinem extrahendum  
dicit: nam quantumvis morbus ipse (inquit)  
copiosam sanguinis missionem efflagitet,  
symptomatibus tamen aliquid relinquan-  
dum est.

Itaque plerique.

**N**ON solum opportuniore vias frigori  
reddit; verum etiam caput inde reple-  
tur, ac distentioni maiorem occasionem  
suppeditat.

Si verò etiam vehem-  
entius.

**N**ON modò cerniculus adhibenda sunt  
cucurbitula; verum etiam, & virique  
spinæ parti, ut docet Paulus: adhuc pectori,  
qua est musculosus, & præcordiis. Affgen-  
da autem sunt cum incisione aut scarifica-  
tione, quod lenes, ut idem testatur, nonnam  
inferant.

Sed diu vitandus cibus, qui-  
vis madendus est.

**LEGENDVM** hic monet Pantinus quif-  
quis mandendus est; alij, meo quidem  
iudicio,



indicio, non omnino peius, quisquis mendendus est, legere maluerunt.

### Sorbtionibus vtendum.

TVM quod facilius alterationem in corpore suscipiant, tum quod dentes propter conuulsionem aut distensionem, solidiores cibum non ferant.

### Celerius tamen etiam panis.

CIRCA initia à vini potu omnino ab-

stinendum est; ubi tamen affectus bene processerit, atque remediis cesserit, licebit eo vti; in parua tamen quantitate, quod & humores attenuet, & calefaciendo conferat. cauendum interim est, ne sua quantitate aliquo modo obstitit: nam quemadmodum Galenus commento Aphorismi: Si eluius qui-ssiam de repente obtinuerit, &c. vinum sua substantia copia nervis offert conuulsionem, rursus sua qualitate sanat eam quam fecit dispositionem, nervos calefaciendo, atque exiccando.

## CAPVT IIII.

### *De faucium morbis, ac curationibus, & primum de Angina, deinde de Difficultate spirandi, vltimò de Tussi.*

VT hoc autem morbi genus circa totam ceruicem, sic alterum æquè pestiferum acutumq. in faucibus esse consuevit. Nostri Anginam vocant, apud Græcos nomen prout species est. Interdum enim neq. rubor neq. tumor vllus apparet, sed corpus aridum est, vix spiritus trahitur, membra soluuntur, id *συνάχλω* vocant. Interdum lingua faucesque cum rubore intumescunt, vox nihil significat, oculi vertuntur, facies pallet, singultus est, id *ὡς συνάχλη* vocatur. Illa communia sunt, æger non cibum deuorare, non potionem potest, spiritus eius includitur. Leuius est, ubi tumor tantummodo, & rubor est, cætera non sequuntur: id *παρσυνάχλω* appellant. Quicquid est, si vires patiuntur, sanguis mittendus est, si non abundat, secundum est ducere aluum. Cucurbitula quoque rectè sub mento, & circa fauces admouetur, vt id quod strangulat, euocet. Opus est deinde fomentis humidis. Nam sicca spiritum elidunt. Ergo admouere spongas oportet, quæ melius in calidum oleum, quàm in calidam aquam subinde demittuntur. Efficacissimusque est hic quoque salis calidi succus. Tum commodum est hyssopum, vel nepeta, vel thymum, vel absinthium, vel etiam furfures, aut



ficus aridas, aut mulsam aquam decoquere, eaque gargarizare: post hæc, palatum vngere vel felle taurino, vel eo medicamento, quod ex moris est, polline etiam piperis id rectè respargitur. Si per hæc parum proficitur, vltimum est incidere fatis altis plagis sub ipsis maxillis supra collum, & in palato  
 \* circa \* citra vnam, vel eas venas, quæ sub lingua sunt, vt per ea vulnera morbus erumpat. Quibus si non fuerit æger adiutus, scire licet; malo victum esse. Si verò his morbus leuatus est, iamque fauces & cibum & spiritum capiunt, facilis ad bonam valetudinem recursus est. At interdum natura quoque adiuuat, si ex angustiore sede vitium transit in latiore. Itaque rubore & tumore in præcordiis orto, scire licet fauces liberari. Quicquid autem eas leuauit, incipiendum est ab humidis, maximeque aqua mulla decocta, deinde assumendi molles & non acres cibi sunt, donec fauces ad pristinum habitum reuertantur. Vulgo audio, si quis pullum hirundinis ederit, angina toto anno non periclitari, seruatumque eum ex sale, cum is morbus vrget, comburi, carbonemque eius contritum in aquam mulsam (quæ potui datur) \* infricari, & prodesse. Id cum idoneos auctores ex populo habeat, necque habere quicquam periculi possit, quamuis in monumentis medicorum non legerim, tamen inferendum huic operi meo credidi.

## ENARRATIO.

ANGINA seu synanche Græcis sortita nomen est, à suspendij similitudine, quod non aliter quam laqueus præfocans interficiat: ἀγχορας enim laqueum, strangulationem, aut etiam anginam vocare consueverunt. Auctor est Aurelius Methodicus Siccensis, libro Celerum passionum, varia nomina hanc affectionem sortitam esse: nam modò κανέληρον, à canibus, quos κανέες; modò λυκάγχορον, à lupis, quos λοκοὺς; interim ἐλάγχορον, à suis, quas ἐλας nominauerunt; quod frequenter canes, lupos, sues, hoc vitium apprehendat, & quod synanchici quum strangulari cæperint, voces aut ulula-

tes caninis lupinisque similes edere solent. Alij synanchen dicere maluerunt, ἀπὸ τοῦ σπινθηρος, quod spiritum continendo spirationem præpediat. Galenus libro De locis affectis, quatuor anginae species describit: Primam videlicet, ubi fauces inflammantur; alteram, quum neque fauces, neque relique oris partes, neque etiam externarum partium ulla inflammata videatur, laborans tamen suffocationis periculum in gutture sentit; tertiam, ubi extrinsecus circa fauces inflammatio apparet; quartam, ubi gutturis partes tum externæ, tum internæ similiter affecta sunt. Paulus Æginetia peculiaribus nominibus



omnibus ita distinguit, ut angina que in faucibus interioribus inflammata accidit, synanche appelletur; quæ exterioribus, parasyanche: Cynanche autem muscularum gutturis interiorum una cum ambiente tunica inflammatio dicatur; Paracynanche verò exteriorum phlegmane. Aurelius autem Methodicus, post Aretam ita distinguit: ut alia sine manifesto tumore dicatur, quam simpliciter anginam nominat; alia cum manifesto tumore, qui si in utraque parte interiorum muscularum fuerit, cynanchen vocandam dicit, si quidem faciat difficultatem spirationis, atque oculorum prominentiam, & linguam procidentem, sicuti canibus audis sæpè vñ venire videmus, quum ea quæ minime transire possunt, ad adione natura auditate impedita minas continentes, innadunt, quæ sæpè faucibus inherentiæ, atque anticipi veniunt tardata, neque percipere, neque reddere valuerunt. Porro eam quæ in altera fuit parte, paracynanchen, sicuti in exterioribus atque utraque parte tumore constituta hyanchen appellaverunt, quod summi colla hic inflationibus sæpissime afficiantur. At si in internis atq. externis & in utraque parte fuerit tumor, tunc proprio nomine synanchen nominant; & si in altera tantum parte, parasynanchen. Hæc Aurelius ille Sicensis: Aurelius Priscianus libro 2. cap. 6. Duplex, inquit, synanchitorum species. Celsus nosse tres tantum species ponit: *συνάνχη, ὡς συνάνχη, καὶ παρασυνάνχη*. Hippocrates quoque de morbis, tres angina differentias describit. Subiungit tamē quartam insequente libro, quam *παροσυνάνχη* vocari dicit. Præterea libro De morbis vulgaribus sexto, anginosos ita parit, ut quodam evadere, alios mortis periculum vix interfugere dicat: nam qui solum, inquit, deglutire non poterant, his valdè mi- ter ac tolerati faciles erant; qui verò insuper obscure loquebantur, his molestiores ac diuturniores; quibus verò etiam vena circa tempora & cervice attollebantur, his aliquantum male erant; pessima verò his *ὅτι καὶ πρὸς τὰς ὀφθαλμοὺς ἐξέρχεται*, hoc est

quibus & spiriens sublimis coënebatur, quod Celsus nosse, quibus vix spiritus trahitur, reddidit.

### Quicquid est, si vires.

HIPPOCRATES è venis primùm quæ in brachio sunt sanguinem mittendum dicit: ac simul per inferna ducendam alium, libro De locis in homine. Ceterum sanguis ipse non confertim ac universim ducendus est; sed pluribus interpassis vicibus, ne videret confertim facta evacuatione summo deficiat ager; quo alienius in anginosi nihil est.

### Cucurbitula quoque.

EADÈM rectè cervici quoque applicabitur: quod statim in ipso principio faciendum suadet Hippocrates; quanquam alij tum primùm tentandum dicant, quum iam inueteraverit morbus. sed & in eundem usum isdem locis non inutiliter sanguisuga adhibetimus.

### salis calidi succus.

QVOD per calidi salis succum velis, non satis assequor; nisi salis intelligat spumam, quæ spumosa quidam flosculus est, attenuant simul, & discentientis faciliat; neque enim, sicut sal, densat, nec usque adeo compactæ substantia est.

### vel felle taurino.

IDÈM attribuit Galenus felli aservuo, cum elatiori & melle.

### vel eo medicamento.

QVALE sit id medicamentum diamoron quod illitioni gutturis aptum sit, nondum legisse memini: nam quod in pharmacopæiis passim asseruatur, linctibus magis quam illutionibus conveniens, parum cum felle, aut sequenti medicamento convenit.

### Si per hæc parum proficitur.

ISTHVC quamvis ex usu sit, atque Hippocraticum; methodicis tamen nequam placere potuit, quod, uti dicunt, laqueus praefocet, & strangulationis periculum afferat.

Vulgo



## Vulgò audio.

IDEM testatur Plinius libro xxx. Naturalis Historia capite iij: Sed efficaciores, inquit, ad omnia quæ ex hirundinibus monstrantur, pulli sylvestrium: figura nidorum eos deprehendit. Multo tamen efficacissime ripariarum pulli: ita vocant in riparum cauis nidificantes. Sunt qui cuiuscunque hirundinis pullum comedendum censent, ne toto anno metuantur id malum. Strangulatos cum sanguine comburunt in vase, & cinerem cum pane aut posu dant. Aëlius

vinos, non deplumes nec strangulatos, cum salis iusta quantitate in novum vas fictile bene obturatum, hirundinum pullos coniciendos dicit, ac tantisper super prunas relinquendos, dum in cinerem convertantur, usque exigente propinandos. Hodie non solum pulli, atque eorundem cineres in usu sunt, sed & eorundem nidi, cum oleo amygdalarum, rosarum, liliorum, aut simili aliquo in cataplasmatibus formam rediguntur; unde summum quicque lenamen consequuntur agrotantes.

## De Difficultate spirandi.

EST etiam circa fauces malum, quod apud Græcos aliud atque aliud nomen habet, prout se intendit. Omne in difficultate spirandi consistit. Sed hæc dum modica est, neque ex toto strangulat, δύσπνοια appellatur. Cum vehemrior est, ut spirare æger sine sono & anhelatione non possit, ἀσπυγ. Cum accessit id quoque, ne nisi recta ceruice spiritus trahatur, ὀρθόπνοια. Ex quibus id, quod primum est, potest diutius trahi. Duo insequentia acuta esse consueverunt. His communia sunt, quod propter angustias, per quas spiritus euadit, sibilum elidit, dolor in pectore præcordiisque est, interdum etiam in scapulis,isque modò \*decidit, modò reuertitur, ad hæc rufficula accedit. Auxilium est, nisi aliquid prohibet, in sanguinis detractio. Neque id satis est, sed lacte quoque venter soluendus est. Liquanda aluius, interdum etiam ducenda, quibus extenuatum corpus incipit spiritum trahere commodius. Caput autem etiam in lecto sublime habendum est, thorax fomentis, cataplasmatibusque calidis, aut siccis, aut etiam humidis adiuuandus est, & postea vel malagma superimponendum, vel certè ceratum ex cyprino vel irino vnguento. Sumenda deinde ieiuno potui multa aqua, cum qua vel hyssopus cocta, vel contrita capparis radix sit. Datur etiam vtiliter, aut nitrum aut nasturtium, \*allium frictum, deinde contritum & cum melle mistum, simulque coquantur mel, galbanum, resina terebinthina, & ubi coierunt, ex his quod fabæ ma-

\* deccedit,

\* aut all.



bæ magnitudinem habet, quotidie sub lingua liquatur, aut  
 sulphuris ignem non experti \* pondo & quadrans abrotani  
 pondo in vini cyatho teruntur, idque tepefactum sorbetur.  
 Est etiam non vana opinio vulpinum iecur, vbi siccum & ari-  
 dum factum est, contundi oportere, polentamque ex co po-  
 tionis aspergi, vel eiusdem pulmonem quàm recentissimum  
 assum, sed sine ferro coctum, edendum esse. Præter hæc sor-  
 bitionibus, & lenibus cibis vtendum est, interdum vino te-  
 nuiaustero, nonnunquam vomitu. Profunt etiam quæcun-  
 que vrinam \* augent, sed nihil magis quàm ambulatio lenta  
 panè vsque ad lassitudinem, frictio multa, præcipuè inferio-  
 rum partium, vel in sole, vel ad ignem & per seipsum, & per  
 alios, vsque ad sudorem. In interiore verò faucium parte in-  
 terdum exulceratio esse consuevit. In hac plerique extrinse-  
 cus cataplasmatibus calidis, fomentisque humidis vtuntur. Vo-  
 lunt etiam vaporem calidum ore recipi, per quem molliores  
 alii partes eas fieri dicunt, opportunioreque virio iam hæren-  
 ti. Sed si \* bene sic vitari morbus potest, tuta illa præsidia. Si  
 metus eius est, superuacua sunt. Vtrique autem perficere  
 fauces periculosum est: exulcerat enim, neque vtilia sunt,  
 quæ vrinæ mouendæ sunt apta, quia possunt dum transcunt,  
 ibi quoque pituitam extenuare, quam suppressi melius est.  
 Asclepiades multarum rerum, quas ipsi quoque secuti su-  
 mus, auctor bonus, acetum ait quàm acerrimum esse sorben-  
 dum: hoc enim sine vlla noxa comprimit vlcera. Sed id sup-  
 primere sanguinem potest, vlcera ipsa sanare non potest. Me-  
 lius huic rei lycium est, quod idem quoque æquè probat, vel  
 porri, vel marrubii succus, vel nuces Græcæ cum tragacan-  
 tho contritæ, & cum passo mistæ, vel lini semen contritum, &  
 cum dulci vino mistum. Exercitatio quoque ambulandi,  
 currendique necessaria est. Frictio à pectore vehemens toti  
 inferiori parti adhibenda. Cibi verò esse debent, neque ni-  
 mium acres, neque asperi, mel, lenticula, tragum, lac, prisa-  
 na, pinguis quoque caro, præcipueque porrum, & quicquid  
 cum hoc mistum est. Potionis quam minimum esse conue-  
 nit. Aqua dari potest, vel pura, vel in qua malum \* cydo-  
 nium,

\* pondo do-  
 nary & qua-  
 drans, abrotani  
 pondo lanary  
 in vinum

\* agūt, al.  
 vrgent,

\* bene vit.

Asclepiades.

\* cotoneū,

CC

nium,



nium, palmulæve decoctæ sunt. Gargarizationes quoque lenes: sin hæ parum proficiunt, reprimentes utiles sunt. Hoc genus neque acutum est, & potest esse non longum, curationem tamen maturam, ne vehementer & diu lædat, desiderat.

## ENARRATIO.

**C**ONGENERES scilicet passionibus sunt, suspirium, seu asthma, & orthopnoea, quibus spirandi difficultas comes esse solet. Est tamen ubi citra suspirium, aut rectam spirationem spiritus difficilis trahatur: idque frequenter in aliis morbis accidit, ac tum quidem morbi symptoma est, dyspnœa; verum ubi aut à virium imbecillitate, aut viarum spiritus angustia, aut aliunde, nullo precedente morbo spiritus difficilis sit, tum demum longus mortuus esse consuevit, in quo albo etiam censentur asthma, ac orthopnoea: nam quantumvis acutos appellet auctor nosser, id non de temporis brevis spacio, sed de suffocationis potius periculo (quod quantumvis aegros diu traxerint, tandem minantur) intelligendum est: nam sicuti crassos & lentos humores originis suæ causam habent, sic non tum facile, nisi strangulent, cedunt.

## Auxilium est.

**I**D tamen non nisi urgente necessitate faciendum suadet Ægineta; ac tum quidem tantum sanguinis demendum quantum vires patiniunt. Galenus quarto De ratione victus in morbis acutis, id potissimum auctor in orthopnoea sicca, sine sputis vel tussi, citra puris collectionem. Post sanguinis missionem ducenda alvus est, aut per clysmos, aut pharmaca: in quem usum validiora medicamenta exhibent. quare an ad solvendam alvum lactis usus suffecerit, alij viderint.

## Sumenda deinde.

**V**T crassi videlicet, & viscosi humores incidantur atque consumantur.

## aut nitrum.

**A**CTIVS tamen nitri spumam magis

in usu esse dicit; & Ægineta aphronitri drachmas tres cum tribus hydromelitis cyathis, atque cardamomo subito auxiliari auctor est.

## Est etiam non vana.

**E**O quidem elogio celebratum vulpium iecur, nondum legisse memini; pulmonem tamen suspiriosis prodesse, apud omnes in confesso est.

## interdum vino tenui austero.

**A**VSTERVUM hic expungendum existimo: quando id nulla ratione anhelosis conveniat: ita ut tenue vinum appellemus, quod & tenuium sit partium (qua ratione incidet) & quod oligophoron sit.

## frictio multa.

**E**GO non minoris fecero frictionem thoracis, atque adeo agitationem brachiorum; ut humor facilius per poros ad exteriora evocetur.

## In interiore vero.

**I**D accidit quoties fauces teneras defluxus humorum petiverit: nam & tum exasperantur fauces, & spiritus qui easdem ingreditur, ad pectus usque procedit, ac rursus effertur per eandem viam: quum autem spiritus ingrediens, in fluxum qui intus est incidit, tussis gignitur, & repellitur sursum pituita: qua quum sic habent, fauces exulcerantur, exasperantur & inflammantur, attrahuntque calefacta humorem de capite. caput autem ab aliis corporis partibus rursus attrahens, his transmittit: Auctor est Hippocrates libro De flatibus.

## Melius



## Melius huic rei.

LYCIVM ex diversis generis substantiis  
coalitum est; altera ternium, parium, ac  
diffusoria & calida; altera frigida & ter-  
rea, ex qua & moderatam astringentem ha-

bet: unde non solum glutinationi ulceris  
utile erit, verum etiam incidendo humori.  
Reliqua deinceps quæ subinigit, purgabit  
magis ulcera, atque viscosam materiam è  
pulmone educant.

## De Tussi\*.

\* & san-  
guinis ef-  
fluvio.

Tussis verò ferè propter faucium exulcerationem molesta  
est, quæ multis modis contrahitur. Itaque illis restitutis  
ipsa finitur. Solet tamen interdum per se quoque malè ha-  
bere, & vix cum vetus facta est eliditur, ac modò arida est,  
modò pituitam citat.\* Oportet hyssopum altero quoque die  
bibere, spiritu retento currere, sed minimè in pulvere, ac le-  
ctione uti vehementi, quæ primò impeditur à tussi, post eam  
vincit, tum ambulare, deinde per manus quoque exerceri, &  
pectus diu perfricare. Post hæc quàm pinguißimæ ficus vn-  
cias tres supra prunas incoctas, esse. Præter hæc si humida  
est, profunt frictiones validæ, cum quibusdam calefacienti-  
bus, sic, ut caput quoque siccum vehementer perfricetur.  
Item cucurbitulæ pectori admotæ, sinapi ex parte exteriori  
faucibus impositum, donec leuiter exulceret potio ex men-  
tha, nucibusque Græcis & amylo, primoque assumptus panis  
aridus, deinde aliquis cibus lenis. At si sicca tussis est, cum  
ea vehementissimè vrget, adiuuat vini austeri cyathus as-  
sumptus, dum ne amplius id interposito tempore aliquo,  
quàm ter aut quater fiat. Item laseris quàm optimi paulum  
deuorare opus est, porri vel marrubij succum assumere, scil-  
lam delingere, acetum ex ea, vel certè acre sorbere, aut cum  
spica alij contriti duos vini cyathos. Vtilis etiam in omni tussi  
est peregrinatio, nauigatio longa, loca maritima, natationes.  
Cibus interdum mollis, ut malua, vel vrtica: interdum acer,  
ut lac cum allio coctum, sorbitiones quibus laser sit adie-  
ctum, aut in quibus porrum incoctum tabuerit, ouum sorbi-  
le sulphure adiecto, potus primùm aqua calida, deinde inui-  
cem aliis diebus hæc, aliis vinum. Magis terreri potest ali-  
quis, cum sanguinem expuit. Sed id modò minus, modò

\* Si arida  
est, oportet



plus periculi habet. Exit enim modò ex gingiuis, modò ex ore, & quidem ex hoc interdum etiam copiose, sed sine tussi, sine vlcere, sine gingiuarum vllò vitio, ita vt nihil excreetur. Verùm vt ex naribus, sic ex ore aliquando prorumpit. Atque interdum sanguis profluit, interdum simile aquæ quiddam, in qua caro recens lota est. Nonnunquam autem is à summis faucibus fertur, modò exulcerata ea parte, modò non exulcerata, sed aut ore venæ alicuius ad aperto, aut tuberculis quibusdam natis, ex \* his sanguine erumpente. Quod \* hicque  
 \* quicquā  
 ex  
 \* extrudit. vbi incidit, neque lædit porio aut cibus, neque \* quicquam  
 aut ex vlcere excreatur. Aliquando gutture & arteriis exulceratis, frequens tussis sanguinem quoque \* extundit. Interdum etiam fieri solet, vt aut ex pulmōe, aut ex pectore, aut ex latere, aut ex iocinore feratur. Sæpe fœminæ, quibus sanguis per menstrua non respondet, hunc expuunt, \* veteresq.  
 medici fe-  
 runt, \* auctoresq.ue medici fuerunt, vel ex ea parte aliqua sanguinem exire, vel rupta, vel ore alicuius venæ patefacto. Primam διαίρωσις, secundam πρὸς μόχθουσις, tertiam αἰσθόμωσις appellant. Vltima minimè nocet, prima grauissimè. Ac sæpe quidem euenit, vti sanguinem pus sequatur: interdum autem qui sanguinem ipsum suppressit, satis ad valetudinem profuit. Sed si secuta vlcera sunt, si pus, si tussis est, prout sedes ipsa est, ita varia & periculosa genera morborum sunt. Si verò sanguis tantum fluit, expeditius & remedium & finis est. Neque ignorari oportet, eis quibus fluere sanguis solet, aut quibus spina dolet, coxæve, aut post cursum vehementem vel ambulationem, dum febris absit, non esse inutile sanguinis mediocre profluvium, idque per vrinam redditum, ipsam quoque lassitudinem soluere. Ac ne in eo quidem terribile esse, qui ex superiore loco decidit, si tamen in eius vrina nihil nouabit. Neque vomitum huius afferre periculum, etiam cum repetit, si antè confirmare & implere corpus licuit: & ex toto nullum nocere, qui in corpore robusto, neque nimius est, neq. tussim aut calorem mouet. Hæc pertinent ad vniuersum. Nunc ad ea loca quæ proposui veniam. Si ex gingiuis exit, portulacam manducasse satis est: si ex ore,



ex ore, continuisse eo merum vinum: si id parum proficit, acetum: si inter hæc quoque grauitè erumpit ( quia consumere hominem potest) commodissimum est, impetum eius admota occipitio cucurbitula, sic vt cutis quoque incidatur, auertere. Si id mulieri, cui menstrua non feruntur, euenit, eandem cucurbitulam incisus inguinibus eius ad mouere. At si ex faucibus, interioribusve partibus processit, & merus maior est, & cura maior adhibenda: sanguis mittendus est, & si nihilominus ex ore processit, iterum, tertioque, & quotidie paulum aliquid. protinus autem debet sorbere vel acetum, vel etiam cum thure plantaginis aut porri succum, imponendaque extrinsecus supra id quod dolet lana succida ex aceto est, & id spongia subinde refrigerandum. Erasistratus horum crura quoque & femora, brachiaque pluribus locis deligabat. Id Asclepiades adeò non prodesse, vt etiam inimicum esset, proposuit. Sed id sæpe commodè respondere experimenta testantur. Neque tamen pluribus locis deligari necesse est, sed sat est infra inguina & super talos, summosque humeros, etiam brachia. Tum si febris vrget, danda est sorbitio, & potui aqua, in qua aliquid ex iis quæ aluum astringunt, decoctum sit: \* ac si abest febris, vel elota alica, vel panis ex aqua frigida, & molle quoque ouum dari potest potui, vel idem quod supra scriptum est, vel vinum dulce, vel aqua frigida, sed sic bibendum erit, vt sciamus huic morbo sitim prodesse: præter hæc necessaria sunt quies, securitas, silentium. Caput huius quoque cubantis sublimè esse debet, recteque tondetur. Facies sæpe aqua frigida fouenda est. At inimica sunt vinum, balneum, Venus, in cibo oleum, acriora omnia, item calida fomenta, conclaue calidum & inclusum, multa vestimenta corpori iniecta, etiam fricationes, vbi bene etiam sanguis conqueuit. Tum verò incipiendum est à brachijs, cruribusque à thorace abstinendum. In hoc casu per hyemem locis maritimis, per æstatem mediterraneis opus est,



## ENARRATIO.

**F**AVCES Græci φάεζα appellunt, intelliguntq; locum illum intra os, ubi tum gula, tum aspera arteria extrema conveniunt: quo fit ut aut necessum sit generalius faucium appellatione abutens Celsus, aut malè eundem tussis pleraque causas earundem exulcerationi ascripisse. nam etiamsi quammaximè humore in fauces decumbente, aut iisdem exasperatis tussis oriatur: non raro tamen eandem accidere videmus, ut docet Galenus libro secundo De symptomatum causis, si instrumenta respirationi servientia, intemperie frigida detineantur: quin & stomachus ipse lumbricis infestatus, aut acri humore gravatus, tussis causa esse potest. Oribasius ita distinxisse videtur, ut tussis in alto nascatur, in sicula verò in faucibus.

spiritu retento currere.

CAVENDVM tamen est ne dum ultra modum cohibent, ac retinent spiritum agrotantes, tussim potius exasperent atque alterent, quam mitigent.

profunt frictiones validæ.

VALIDAS frictiones pectoris admiserim; capitis autè temperie sicci nequaquam: nam valida frictione caput ipsum, alioqui natura siccum, cogetur, indurabitur, astringeturque, & si quid humoris in inferioribus sit, frictione ad superiora allucietur, quod pro tempore quidem tussim lenalit, sed eandem rursus concitabit, capite humores rursus ad inferiores partes propulsante.

nucibusque Græcis.

QVId nucēs Græcas vocet, nondum mihi certò constat: sunt enim qui easdem amygdalas esse putent, quas & Thasias dicunt; in qua opinione Plinius fuisse videtur, qui libro Naturalis historie xv. capite xxii: Tertia, inquit, ab his natura amygdalis, tenuiore sed simili inglandinum summo operimento; nem secundò putami-

nis. Nucleus dissimilis latitudine, & acriore callo. Hæc arbor an fuerit in Italia Catonis atare, dubitatur; quoniam Græcas nominat; quas quidam in inglandinum genere servant. Idem libro xxiii. cap. viii, nucēs Græcas ab amygdalis distinguit, atque amygdalis subiungit: nam posteaquam de utrisque amygdalis sermonem fecisset, Nucibus Græcis, cum apsinthij semine, inquit, ex aceto sumptis, morbus regium sanari dicitur: item illis per se vitia sedis, & prinatim condilomata, item tussis & sanguinis reiectioni prodest. Quare sine amygdalas, sine alias nucēs intelligat, alij indicent.

At si sicca tussis.

SICCAM tussim vocat, ut docet Galenus, in qua nihil exspuitur: fit autem aliquando ob intemperiem instrumentorum, qua inferniunt respirationi; aliquando verò in faucium asperitate aliquo tenni, & paucos humore distillante: sed hæc tussis neque violenta esse solet, neque coacta; sed adeò exigua, ut & supprimi, & ne eveniat prohiberi possit, idq; vel in totum vel magna ex parte. Si igitur intemperies frigida siccam tussim excitat, spiritum cohibere imperat Galenus: Nam spiritus retentione, inquit, nisi vehemens admodum tussis fit, prohibetur, spiritus retento calorem in instrumentis spiritualibus argente. quibus accedit, quòd quum spiritus faciliè abutissimas partes penetraret, totam spiritalium membrorum compagem, ad iustam temperiem quam ocyssimè reducat. Contrà si calida sit intemperies, proderit aerem frigidum recipere; tantum abest, ut vel austerum vinum, aut acida, aut acra in sicca tussi, uti facit Celsus, exhibeamus, quando iustem magis irritandos ægros pro conperto habeamus, magisque reficiendos lenientibus, ac mordacitatem arcentibus.

Utile est etiã in omni tussi.

NAM si ex influxu humorum fiat, exercitio dissipantur ac dissipantur materia pec-

ca 15;



caus; si in tussis secca sit, mutatione loci ad contrarium sanitas recuperatur.

### Magis terreri potest.

QUIA, ut docet Trallianus, vix est mortui periculosior, quam sanguinis reiectionis aut spiritio; non tam quod per se ingi inanitione hominem exanimat, quam quod exitialis atque chronica cum horrenda mentis vacillatione, nascitur affectio.

### Exit enim modò ex gingiuis.

GALENUS reiectionis sanguinis differentias sic distinguit: Sanguis, inquit, qui ex pectore, aut pulmone, aut aspera arteria educitur, omnino cum tussi reiectionis; si verò ex locis circa fauces aut gurgulionem sanguis feratur, per excreationem excernitur; si verò ex aliquo loco oris aut gingivarum, simpliciter expuitur. Aliquando autem & à capite, aut partibus gurgulionis delatus sanguis ad asperam arteriam extremum incidit, & tussim commouet, imaginationemque facit velut ex pectore educatur. Itaque si pluribus ex ordine diebus sanguinem excreet & emungat, neque capitis dolore aut gravitate aliqua quæ etiamnum adsit, antegressis, aut plaga isthic illata, considerare oportet diligenter omnium narum meatum, atque etiam oris locum illum ubi nares ad palatum sunt perforata. contingit enim aliquando hæc accessio hirudine ad locum hunc affixa. Est præterea ubi ex iecore, liene, ventriculo, vena iecoraria aliisque partibus corporis sanguis expuitur. Solent tamen ita distinguere spiritum à suo re sanguinis, ut spiritio sanguinis dicatur, quoties pituita permiscetur, modicumque ac congestum id est quod excernitur: Fluor autem quando sub quantitate multa sanguis expuitur, rutilans non congestus.

### auctoresque medici.

SIC distinguunt Hippocrates, Galenus, Erasistratus, eorumque sequaces. Bacchius quidam, ut auctor est Caelius Methodicus, quartam adiecit, quam expressionis, seu su-

ductionis vocauit, asserens ex gingiuis expui sanguinem sine ulla vulneratione, aut ulceratione: vel in curationibus fracturarum, sæpe fasciolarum ligamenta maculis sanguinolentis aspersa reperiri.

### vel exesâ parte.

PANTINVS recte hic restituit exesa aliqua parte: cum antea esset, ex eâ parte.

### Neque ignorari oportet.

HIPPOCRATES septimo Aphorismo Aphorismo XXXVII. Sanguinis, inquit, vomitus si sine febre est, salubrior est; cum febre verò, peior. curari verò hunc oportet cum astringentibus & refrigerantibus. Celsus hic quod Hippocrates τοσθησας dixit, non inutile, quanquam non satis propriè, reddidit: nam quum ante Hippocrates sanguinem supra emissum, qualiscunque tandem is fuerit, malum esse dixisset; nunc, ut distingueret quis fluxus sanguinis magis periculo vacaret, & quis facilius curaretur, hunc qui sine febre est, τοσθησας, hoc est magis saluarem, dixit. Quod autem de cruento lorio subingit, quum nihil ad præsens negotium faciat, nescio cur ascripserit; neque enim sanguis cum vrina repente redditus, tussim aut expuitionem sanguinis lenit, aut aliqui sequitur: verum solet potius oriri, ut sectione quarta Aphorismo XLVII. Hippocrates, ubi venula in renibus rupta sunt.

### Nunc ad ea loca quæ proposui.

GALENUS libro De medicamentorum compositione secundum loca: Curatio, inquit, eius quæ ex apertione osculi alicuius vasis contingit, per obturationem fit oris dilatati; eius verò quæ ex vasis rupturâ, per eiusdem conglutinationem; quemadmodum eius quæ ex erosione per renem, nem erosionem. Obturatur igitur osculum dilatatum per astringentia; conglutinatur autem ruptum, per eadem; & quæcumque ipsis in compositione miscentur citra mordicationem resiccantia, & glutinosum quid habentia.



benia. Renuntiantur verò corvosa per cibos boni succi, & pharmaca carnem generantia, sarcotica dicta.

portulacam manducasse.

ASTRINGIT enim optimè portulaca comesta; atque eà magis eiusdem succus; sicuti & acetum.

merum vinum.

ID astringens admodum sit necesse est: nam aliqui prorsus erit alienum.

admotà occipitio cucurbitula.

ALII id tantum tentandum autumant, postquam iam omnino inueteraverit, ac sedes fixerit malum.

aut porri succum.

ETSI porrum cum priscana coctum pefforis vitis mederi dicat Dioscorides, per se tamen nunquam sanguinis reiectiones cohibuerit porri succus, quum extenuet, atque urinam moveat: si tamen aliis quæ astrictoria sunt facultatis simul admisceatur, accommodissimum erit remedium. Sic etenim Dioscorides cum aceto, thure aut manna sanguinis profluvia sistere assuevit; atque ea præsertim quæ è naribus fiunt. Et Celsus cum succo plantaginis aut thure dat.

Erasistratus horum crura.

ASCLEPIADES libro Parascuasicon vituperabat, tanquam materiam imprimeret, & coercendo in latum renocaret; non intelligens per ligationes maximum emolumentum asserri, tum diversione materie,

tum quodd densitatem quandam facerent; sicuti contendebat Erasistratus.

vel vinum dulce.

nescio quàm conveniat hic vinum dulce; quando certum sit astringentia omnia, hic magis ex usu esse: nam quantumvis aliquis dulce vinum sua crassitie commendatum habeat; mihi certè, ut quod calore excedat, nisi temperatum sit aqua, aut vi (quod Celsus nostrer frequenter inculcat) alternis vicibus modò aqua, modò vino utatur ager; non satis placuerit.

sed sic bibendum erit.

OMNIMODAM sicut non probat hic, sed ita bibendum dicit, ut ne quid nimis: ac quod ad quantitatem attinet, modicus quidem sit potus; quod ad facultatem, emplastica si fieri potest, eaque frigida, prædians sit.

In hoc casu per hiemem.

MIRVM admodum est, cur in hoc casu per hiemem locis maritimis, per æstatem mediterraneis opus esse dicat. Nam si, ut libro Problematorum scribit Aristoteles, hieme mare calidius est, atque æstate frigidius, ac proinde necesse esse, ut spiritus omnes maritimi æstate frigeant, hieme repeant; contra verò æstate caleat, hieme frigeat terra, etsi maritima loca propter repentem spiritum concesserimus hieme; mediterranea certè parum ex usu erunt æstate, si conclave calidum, aliæque calida suspecta sunt: quare cur æstate mediterranea, hieme maritima laudantur, alij coniciant.

## CAPVT V.

### De stomachi morbis, & curationibus.

FAVCI BV S subest stomachus, in quo plura longa vitia incidere consueverunt. Nam modò ingens calor, modò inflatio hunc, modò inflammatio, modò exulceratio afficit. Interdum pituita, interdum bilis oritur, frequentissimumque est eius



est eius malum, quo resoluitur, neque vllare magis aut afficitur, aut corpus afficit. Vt diuersa autem vitia eius, sic etiam remedia sunt. Vbi exaestuatur, aceto cum rosa extrinsecus subinde fouendus est, imponendusque pulvis cum oleo, & ea cataplasmata, quæ simul & reprimunt, & molliunt. Potui (nisi quid obstat) gelida aqua præstanda. Si inflatio est, profunt admotæ cucurbitulæ: neque incidere cutem necesse est: profunt sicca & calida fomenta, sed non vehementissima. Interponenda abstinencia est. Vtilis in \*ieiunio potio est absinthij aut hyssopi, aut rutæ. Exercitatio primò lenis, deinde maior adhibenda est, maximeque quæ superiores partes moueat. Quod genus in omnibus stomachi vitiis aptissimum est. Post exercitationem opus est vnctione, frictione, balneo quoque nonnunquam, sed rarius, interdum alui ductione. Cibus deinde calidis, neque infantibus, eodemque modo calidis potionibus, primò aquæ, post, vbi resedit inflatio, vini austeri. Illud quoque in omnibus stomachi vitiis præcipiendum est, vt quo modo se quisque æger refecerit, eo vt sanus vtatur. Nam redit huic imbecillitas sua, nisi iisdem defendatur bona valetudo, quibus reddita est. At si inflammatio aliqua est, quam ferè tumor & dolor sequitur, prima sunt quies & abstinencia, lana sulphurata circumdata, in \*ieiunio absinthium. Si ardor stomachum vrget, aceto cum rosa subinde fouendus est, deinde cibus quidem vtendum est modicis. Imponenda verò extrinsecus quæ simul & reprimunt & molliunt: deinde his detractis, vtendum calidis ex farina cataplasmatibus, quæ reliquias digerant. Interdum aluus ducenda. Adhibenda exercitatio, & cibus plenior. At si exulceratio stomachum infestat, eadem ferè facienda sunt, quæ in faucibus exulceratis præcepta sunt. Exercitatio, frictio inferiorum partium adhibenda. Adhibendi leues & glutinosi cibi, sed citra satietatem. Omnia acria atque acida remouenda. Vino, si febris non est, dulci: aut si id inflat, certè leni vtendum, sed neque præfrigido, neque nimis calido. Si verò pituita stomachus impletur, necessarius modò in ieiunio, modò post cibum vomitus est. Vtilis exercitatio, gestatio, nauigatio,

D D



gatio, frictio. Nihil edendum, bibendumque, nisi calidum, vitatis tantum his, quæ pituitam contrahere consueverunt. Molestius est, si stomachus bile vitiosus est. Solent autem hi, qui sic tentantur, interpositis quibusdam diebus hanc, & quidem quod pessimum est, atram vomere. His rectè aliud ducitur, potiones ex absinthio dantur: necessaria gestatio, navigatio, & (si fieri potest) ex nausea vomitus, vitanda cruditas, sumendi cibi faciles & stomacho non alieni, vinum austerum. Vulgatissimum verò pessimumque stomachi vitium est resolutio, id est cum cibi non tenax est, soletque desinere alii corpus, ac sic tabe consumi. Huic generi inutilissimum balneum est. Lectiones, exercitationesque superioris partis necessariae. Item unctiones, frictionesque, hinc perfundi frigida, atque in eadem natare, canalibus eiusdem subiicere etiam stomachum ipsum, & magis etiam à scapulis, id quod contra stomachum est. Consistere in frigidis, medicatisque fontibus, quales cutiliarum \* subcutiliarumque sunt, salutare est. Cibi quoque assumendi sunt frigidi, qui potius difficulter coquantur, quàm facile vitiantur. Ergo plerique, qui nihil aliud concoquere possunt, bubulam coquunt. Ex quo colligi potest, neque aucem, neque venationem, neque piscem dari debere, nisi generis durioris. Potui quidem aptissimum est vinum frigidum, vel certè bene calidum meracum, potissimum rheticum, vel allobrogicum, aliudve, quod & austerum & resina conditum est: si id non est, quàm asperri-  
mum, maximeque signinum. Si cibus non continetur, danda aqua, & eliciendus plenior vomitus est, iterumque dandus cibus, & tum adiuuenda duobus intra stomachum digitis cucurbitula, ibique duabus aut tribus horis continenda sunt. Si simul & vomitus & dolor est, imponenda supra stomachum est lana succida, vel sponsa ex aceto, vel cataplasma, quod refrigeret. Perfricanda verò non diti, sed vehementer brachia, & crura, & calefacienda. Si plus doloris est, infra præcordia quatuor digitis cucurbitula utendum est, protinus dandus panis ex posca frigida. Si non continuit, post vomitum lenè aliquid ex his, quæ non aliena stomacho sint. Si ne  
id qui-

\* symbrui  
natumque  
De aquis cu-  
tiliis, Plinius  
lib. 2. cap. 95.  
Item lib. 31.  
cap. 2. & 6. de  
ijsdem, & Vi-  
truvius lib. 8.  
cap. 3.



id quidem tenuit, singuli cyathi vini singulis interpositis horis, donec stomachus consistat. Valens etiam medicamentum est radicula succus, valentius acidi punici mali, cum pari modo succi, qui ex dulci punico malo est, adiecto etiam intubi succo & mentha, sed huius minima parte, quibus tantundem, quantum in his omnibus est, aqua frigida quam optimè miscetur. Id enim plus quam vinum ad comprimendum stomachum potest, suppressendus autem vomitus est, qui per se venit, \* sic, si nausea est. Sed si coacuit intus cibus, aut computruit, quorum utrumlibet ructus ostendit, eiiciendus est, protinusque cibis assumptis iisdem quos proxime posui, stomachus restituendus. Vbi sublatus est praesens metus, ad ea redeundum est, quae supra praepcepta sunt. \* sic, & si

## ENARRATIO.

**E**TSI iam ante ex Ioannis Casarii annotationibus ostensum videatur, stomachum hic pro gula accipi, varietas tamen ac differentia morborum quos Celsus eidem asseribit, stomachum non pro gula (quod bona venia doctissimi viri dixerim) sed pro ventriculo accipi demonstrat.

## Vbi exaestuatur.

**SIC** Galenus septimo Methodi multos quibus exaestuaret ventriculus, se curasse spacio vnius aut alterius diei auctor est, solius aquae frigidae aut fontanae, aut eius quae in nix refrigerata esset, exhibitione.

## profunt admodum eucurbitulae.

**EAS** ex Galeno, Paulus medio ventriculi copiosa flamma ita applicandas dicit, ut totum umbilicum comprehendant; ita enim, ut XI. methodi Galenus, in flatuosis affectibus incantamenti quid simile obrirent admodum eucurbitulae, siue in intestinis, siue in alia quavis corporis parte flatuosi spiritus collecti fuerint.

## Interponenda abstinencia est.

**NAM** inedia actioni huic necessaria existit, ut ait Aëtius, praesertim ubi ex dissolutis in vaporem cibus, orta fuerit inflatio. Quod si abstinenciam ferre non possit ager, exhibendi sunt calidi, flatuque discutientes cibi, quantitate exigua, & qui facile alterentur, atque boni sint succi.

## At si inflammatio aliqua.

**STOMACHI** inflammatio morbus compositus est in magnitudine, & intemperie, & in soluta continuitate: quo fit ut eam sequatur tumor praeter naturam adeo magnus, ut à medico tactu percipi possit, gravitas ac multi caloris sensus, & dolor vehemens circa partem affectam.

## abstinencia.

**SI** vires admittant (est enim in ventriculi morbis virium maxima habenda ratio) accuratissimo omnino utendum est vitium in phlegmone ventriculi, ut docet Galenus XI. methodi Therapeutica, quia in ventriculo, aequè ac iecinore, alimentum concoqui



coqui debeat : quod si non probè fiat, praeterquam quòd nò nutritur corpus, phlegmon etiam ipse augetur, & febras accenduntur.

### lana sulphurata.

SULPHURATAM lanam Plinius pectori ipsi si cibi fastidio corripitur, prodesse auctor est, non tamen inflammationi.

### absinthium.

IDEM prorsus faciendum suadet Galenus XI. methodi Therapeutica: nam si vel minima suspicio sit, inquit, iecur ventriculi uel laborare, apsinthium protinus oleo incoquimus, atque eas particulas perfundemus. Vitandum autem semper pontico est.

### Imponenda verò extrinsecus.

REPRIMENTIA astringentia vocat: siquidem quòd in inflammationibus ardoribusque ventriculi, necessum sit astringentia relaxantibus immisceri, auctor est Galenus; periculum enim esset, ne si solis relaxantibus uteremur, animi deliquium subsequatur.

### Interdum alius ducenda.

ISTHVC tamen cum prae cautione faciendum est, semper habita virium ratione, ut sub finem methodi Therapeutica Galenus.

### cibus plenior.

COMPARATIONE videlicet eius quem in phlegmone praescripsit.

### Adhibendi leues & glutinosi cibi.

IN cibus exhibenda modò sunt, quae vlcera expurgant, unde prisa mellis aliquid admiscere solent ad excretionem, nonnumquam etiam quae dolores mitigant, & moraciditatem obtrundunt. Post repurgationem verò quae carne implent, ac postremum ea quae ad cicatricem perducunt; qualia sunt quae astringunt.

### Si verò pituita.

STOMACHVM Galenus libro Methodi medendi duobus modis expurgari auctor est:

siquidem si quid in eo molestum est, id modò per secessum, modò per vomitum educit. Celsus si quando stomachus pituita grauetur, eandem per superiora purgat, quòd ea si quando in stomacho supernaret fluctuaret, atque per se nauseam pariat, vomitorium medicamentum statim subsequatur. si tamen stomachi villis tenacius adhaeserit, frustra vomitoria tentauerimus; ac tum quidem natura ductum sequentes, per inferiora eandem ducere conabimur, medicamentis quae modicè purgant, & quorum vis super ventris & intestinorum loca non ascendat.

### Molestius est.

QUVM tres in ventriculo humores gignantur, qui bilis speciem pra se ferant (puta enim qui quòd porri colorem imitetur *πεπορεϊδης* nominatur; sicuti quoties argini similis est, *ἰσίδης*, quasi dicas arginosum; & quoties glasti glaucum colorem representat, *ιοτερειδης* dicitur) per bilem non simpliciter *χολη* dictam intellexisse videtur; verum unam aliquam ex iam dictis, atque eam praefertim, quam arginosam appellari diximus. Nam alioqui si simpliciter dictam bilem intellexisset, satius esset eam ex Hippocratis praescripto per superiora expurgare: siquidem si bilis natura calida & sicca sit, sursum rapitur, & facillimè per vomitum educitur. Quamquam si quis de alia bile, ut ex Herodoto infert Aëtius, intelligere velit, per me integrum est. Hoc tamen sciendum est, tum non per inferiora, sed superiora, sine ea atra, sine flava sit, expurgandam: nam si flava bilis vomitiones accidant, accessiones mitigant; sin atra, solvunt.

### interpositis.

NAM, ut habet Herodotus, accessiones cardiacis similes patiuntur.

### Vulgatissimum pessimumque.

PESSIMVM vitium dixit, quòd quum stomachus nihil retineat, venter interim suo officio non fungatur, atque astrictior solito sit.



fit. Nam etsi gratissima stomacho exhiberis edulia, post duos aut tres dies alius inde astringetur. Balneum autem inutilissimum esse dicit, ut quod resoluat: si tamen imo veniri adhibeatur tantum, & inferioribus partibus, non video quomodo non ex usu esse possit.

### Quales cutiliarum subcutiliarumque, &c.

IOANNES Cæsius suis in Celsum annotationibus, Cutiliarum subcutiliarumque legendum existimat, non autem, ut hactenus, subruinarum. atque sic quidem & ipse Pantinus legisse videtur. Caterum de subcutilis ita scribit Plinius: Sed subcutilia in Sabinis gelidissima, sicut quodam corpora innadunt, ut prope morsus videri possit; aptissima stomacho, nervis, uniuerso corpori. Cutiliarum autem, (Cælius Methodicus Coitilias dicere maluit,) alia temperies est: nam, ut idem Plinius, Bituminata aut nitrosa, qualis cutilia, utilis est bibendo, atque purgationibus: plerique in gloria ducunt plurimis horis perpeti calorem earum, quod est inimicissimum; namque paulo diutius quam habere vni oportet. Facit & Vitruvius mentionem, ubi de aqua ductibus tractat. Si igitur, Cutiliarum subcutiliarumque legamus (neque enim

subruinos fontes me usquam legisse memini) ad diuersa respexisse Celsum verisimile est, ita ut frigidos fontes, quales subcutilis sunt, calida intemperiei; medicatos autem (in quo albo Cutilij consentur) frigida utiles dixerit.

### Cibi quoque.

SATIVUS tamen est ex Galeni & Aëcij præscripto, olera ex oleo & garo condita, & alia quæ ventrem emollire solent, primum exhibere; atque tunc demum ad alia transire.

### & eliciendus plenior vomitus.

IVXTA illud: Vomitus vomitu, & fluxus fluxu sedatur. saepe etenim accidit, ut in ipso ventriculi sinu contentus humor vomitum exciret; qui quidem per vomitum expurgatus causa est, ut prior vomitus facile quiescat & sedetur.

### Sed si coacuit intus cibus.

NAM, ut capite tertio libri primi auctor noster dicit: Utilis est vomitus plenis & biliosis omnibus, si vel nimium sese repleverint, vel parum concoxerint. Nam sine pluri quam quod concoqui possit, periclitari ne corrumpatur non oportet; si vero corruptum est, nihil commodius est, quam id qua via primum expelli potest, eicere.

## CAPUT VI.

### De laterum doloribus.

STOMACHVS lateribus cingitur, atque in his quoque vehementes dolores esse consueverunt, & initium vel ex frigore, vel exitu, vel ex nimio cursu, vel ex morbo est. Sed interdum id malum intra dolorem est, isque modò tardè, modò celeriter soluitur: interdum ad perniciem quoque procedit, oriturque acutus morbus, qui pleuriticus à Græcis nominatur. Huic dolóri lateris febris, & tussis accedit, & per hanc excreatur: intolerabilis morbus est; pituita: si gravis, sanguis.

DD 3

Inter-



\* emolitur Interdum etiam sicca tussis est, quæ nihil \* emollitur. Idque primo vitio grauius, secundo tolerabilius est. Remedium vero est magni & recentis doloris, sanguis missus. At siue \* lenior, siue vetustior casus est, vel superuacuum, vel serum id auxilium est, confugiendumque ad cucurbitulas est, antè summa cute incisa. Rectè etiam sinapi ex aceto super pectus imponitur, donec vlcera pustulasque excitet, & tum medicamentum, quod humorem illuc citet. Præter hæc circumdare primum oportet latus \* ipsum lana sulphurata: deinde cum paulum inflammatio se remisit, siccis & calidis fomentis uti. Ab iis transitus ad malagmata est. Si vetustior dolor remanet, nouissimè resina imposita discutitur. Utendum cibis, potionibusque calidis, vitandum frigus. Inter hæc tamen non alienum, & extremas partes oleo & sulphure perfricare. Si leuata tussis est, leni lectione uti, iamque & acres cibos, & vinum meracius assumere. Quæ à medicis præciuntur, ut tamen sine his, rusticos nostros epota ex aqua herba trixago satis adiuuet. Hæc in omni lateris dolore communia sunt: plus negotij est, si acutus quoque morbus is factus est. In hoc præter ea quæ suprà posita sunt, hæc animaduertenda sunt, ut cibus sit quam maximè tenuis, & lenis, præcipueque sorbitio, eaque ex ptisana potissimum, aut ius in quo porrus cum pullo gallinaceo coctus sit. Idque non nisi tertio quoque die detur, si tamen per vires licebit: potio verò aqua mulsa, in qua hyssopum aut ruta decocta sit. Quæ quibus temporibus danda sint, ex ratione vel adiectæ, vel leuata febris apparebit, sic ut in remissione quàm maxima dent, cum eo tamen, ut sciamus non esse eius generis tussi aridas fauces committendas. Sæpe enim, ubi nihil est quod \* excreatur, continuatur, & strangulat. Ob quam causam dixi etiam prius id genus esse tussis, quod nihil, quàm quod pituitam moueret. Sed hinc vinum sorbere, ut supra præcepimus, morbus ipse non patitur, in vicem eius cremor ptisanæ sumendus est. Ut his autem in ipso morbi feruore sustinendus æger est, sic ubi paulum is se remisit, alimenta pleniora & vini quoque aliquid dari potest, dum nihil detur, quod aut refrigeret corpus, aut

\* hapso lana sulphurata:

\* excreatur,



pus, aut fauces asperet. Si in refectione quoque manserit tussis, intermittere oportebit vno die, posteroque cum cibo vini paulo plus assumere. Atque incipiente quoque tussi, tum non erit alienum (vt supra quoque positum est) vini cyathos sorbere. Sed in hoc genere valetudinis dulce, vel certè lene commodius est. Si malum inueterauit, athletico victu corpus firmandum est.

## ENARRATIO.

PER latera intelligit Celsus eas partes quæ costis circumscribuntur; non eas, quas Græci *λειτουργας*, & *νεφρωδας*, veluti quidam intelligi voluerunt.

## &amp; initium vel ex frigore.

GALENUS libro De locis affectis quinto cap. 11. sub finem, lateris dolores hoc modo distinguit: Sunt (inquit, postquam de pleuritide verba fecisset) præterea alij laterum dolores cum febre, per quos spirationem exigui reddi necesse est, sed nullum redditur sputum, vt in ea re nihil à pleuritide sine sputo constante differre videatur: verum hi facile ab illis discerni possunt; in his enim nulla omnino tussis est; illi verò qui sine sputo pleuritide laborant, sicca tussi molestantur; deinde quod neque duriciem neque tensionem ullam refert pulsus. Est & alius costalis morbus (vt capite ultimo octauo libri refert Aëtius) quoties crudi, crassi, glutinosi, humores generantur in corpore ex cruditatibus plurimis, & cibis crassis atque pituitosis; atque ij quidem humores modo in vacuum thoracis locum sese repente ingerunt, nonnunquam etiam in ipsum pulmonem, qui sua multitudine succingentem costas inuiscus membranam distendentes inferunt dolorem, spiritusque difficultatem innehunt, adde vt suspicionem vera pleuritidis præbeant; hodie pleuritidem notham vocant. Celsus Methodicus lateritios dolores ita distinguit, vt modo sine febre sint, & longo tempore perdurent; interdum celer quidam passio sit, sine varietate tamen

sputorum vel excrementorum, contra quam in pleuritide accidere solet.

## Si tolerabilis morbus est, pituita.

MIRVM est hic Celsum pleuritim eam in qua sanguis exspuitur, periculosiorem pronunciare ea in qua pituita expurgatur; quando Galenus Commento tertio De morbo vulgar. dicat eam pleuritidem esse mitem in qua cruenta exspuitur sputa: adde quod idem asserat omnes morbos qui à sanguine (vt pote omnium succorum mitissimo) sunt, aliis qui à reliquis oriuntur humoribus esse mitiores. hinc lib. secundo De febr. dicit febrim ex sanguine reliquis esse mitiorem, & simpliciorem. Quare, nisi metathesi duarum dictionum sic legamus, Si tolerabilis morbus est, sanguis; si grauis, pituita: dicendum erit Celsum hic locum Hippocratis ex libro De locis in homine, in suam sententiam traxisse, ubi dicit sanguinem quando morbum facit, dolorem inferre vltimum; pituitam verò grauitatem: ac proinde quanto dolor grauitate ipsa molestior ac grauior est, eo quoque pleuritidem sanguinea pituitosa perniciosiorem & acerbiorē esse, vt qua vehementissimos inferat dolores; qualem Galenus magna ex parte lethalem esse dixit.

## Remedium verò.

HIPPOCRATÈS vultit simul & euacuat sanguinis missione, si ad iugulum dolor extendatur; aut grauitas brachium vel mammillas, vel partes quæ supra septum transversum



nersum sunt, infestat. Nam aliqui si ad praecordia dolor pertigerit, medicamento purgat, cui contra Galenum astiplatur Trallianus; is etenim propter perturbationem in pleuritidis medicamenta suspecta habet. Dicit autem in libro De ratione victus in morbis acutis sic Hippocrates: Si vero dolor ad claviculam pertigerit, aut molesta sit vel brachio, vel mamma, vel partibus septo transverso superioribus gravitas, internam cubiti venam secare expedit: neque vero, ut copiose sanguis detrahatur, est cunctandum; sed eoque auferendum, donec rubicundior multo, vel pro puro rubidiorque liuidus effluerit: nam utrumque contingit. Si vero eas quae sub septo transverso sunt partes dolor infestat, nullumque ad claviculam signum fuerit, ventrem vel nigro veratro, vel peplio mollire oportet, &c. Hodie lenientibus, vel enematis, si astrictior sit alvus, etiam ante sanguinis missionem, non inutiliter alvum ducimus.

vel superuacuum id.

FOMENTIS enim non raro sedatur.

confugiendumque ad cucurbitulas.

SI dolor post septimum diem consistat, neque minuat, praesentissimum remedium afferent cucurbitulae natibus affixae, aut hypochondriis: quanquam etiam non inutiles erunt, vel in principio morbi, si agrotus sanguine non abundet, aut agri vires sanguinis missionem recusent.

Recte etiam sinapi.

ISTHVC quam sit ex usu, non video, quod periculum sit ne calore sinapis materia potius recrudescat atque exasperetur: post suppurationem tamen, tanquam causticum, ad evocandam materiam non inutiliter adhibuerimus; sicut de pectore suppuratis dicit Hippocrates.

Vtendum cibis.

CALIDIS videlicet actu: quia semper per sudores, aut insensiles meatus resolvitur aliquid, quod sumptione frigidi cibi aut po-

tus praepediretur; quando certum sit frigore poros densari.

si acutus quoque morbus.

HVCVSQVE de omni lateritis dolore sermonem fecisse videtur: nunc autem de eo qui proprie pleuritidis. Est autem pleuritidis exquisita, & propria inflammatio membrana intrinsecus latera succingentis, dolorem pungituum vehementer inferens cum acutissima febre.

Porrus cum pullo galinaceo.

PORRVS genere masculino usurpat; sicut paulo post cappari, neutro. Est vero porrum ad omnia pectoris vitia efficax, multiplicique coctura usui humano magis accommodum redditur, ut secundo libro diximus. Dioscorides, uti etiam Celsus, prisanam in qua porrum incoctum sit, vitia pectoris sanare auctor est.

Idque non nisi tertio.

SI phlegmonem tantum consideremus, tridua inedia non omnino inutilis erit: verum quando (ut x. Methodi docet Galenus) una salus tum pleuritidis, tum peripneumoniciis, tum synchicis, aut iecinore inflammatis sit virium robur, tantum cibi concedendum est, quantum viribus satis esse possit.

In qua hyssopum.

SI ferat tempus, ad incisionem non inutilis erit tum rusa, tum hyssopum: siquidem Galenus in Commento Aphorismi, concocta medicari & mouere, non cruda, in acutis etiam morbis, si detur occasio, decoctum tragorigani, hyssopi, origani, & similia non veretur exhibere. Exhibenda tamen maxima cum cautela sunt, ne videlicet acrimonia ipsorum, febrili calori somes addatur.

& strangulat.

HVIS rei causa est, ut libro De ratione victus in morbis acutis Hippocrates, quoniam prius quam dolor solvatur, pereunt; celeres siquidem sunt respirationes: unde viscosum & incoctum effectum spiritum, intus retinetur;



retinetur; quod intrò retentum est, prohibet  
aëris ad interna delationem, cogitque ipsam  
celeriter egredi: unde cum difficultate spi-  
randi, plerumque suffocatio aut strangula-  
tio sequitur.

Ob quam causam.

IDEM testatur libro De morbis tertio  
Hippocrates, atque sicca pleuritis causam  
recitat libro De locis in homine.

Si in refectione.

SIC Hippocrates libro De morbis, post  
balnea vinum dulce & aquosum bibendum  
dat, non frigidum, medicum ex angustis oris  
posillo; & ubi tussis inuaserint, amplius

libendum, & quamaximè siccandum, &  
potum humectandum dicit, quò pulmo humi-  
dior factus, facilius ac citius spiritum reddat,  
& tussis minus affligat.

Si malum inueterauerit.

NON video quò in inueterato lateris  
dolo summe plenus victus (qualis athle-  
tarum est) conuenire possit, quando non  
pura corpora quanto magis nutries, tanto  
magis lades. Non negauerim tamen hic  
paulo plenioris victus rationem virum  
robur efflagitare, ut quæ nisi sustententur,  
violenta ac longitudo morbi impares sint  
futura.

## CAPUT VII.

*De viscerum morbis, & primò de Pulmone;  
deinde de locinore, tum de Liene,  
postremò de Renibus.*

**A**COMPAGINE verò corporis ad viscera transeundum  
est, & in primis ad pulmonem veniendum, ex quo vche-  
mens & acutus morbus oritur, quem peripneumonicum  
Græci vocant. Eius hæc condicio est. Pulmo totus afficitur,  
hunc eius casum subsequitur tussis, bilem vel pustrahens,  
præcordiorum, totiusque pectoris grauitas, spiritus difficul-  
tas, magnæ febres, continua vigilia, cibi fastidium, tabes. Id  
genus morbi plus periculi, quàm doloris habet. Oportet, si  
satis validæ vires sunt, sanguinem mittere: si minores, cucur-  
bitulas sine ferro præcordiis admoouere. Tum si satis valet,  
gestando ægrum, digerere: si parum, intra domum tamen di-  
mouere. Potionem autè hyssopi dare, cui ficus arida sit inco-  
cta, aut aquam mulsam, in qua vel hyssopum vel ruta decocta  
sit. Eriictione uti diutissimè in scapulis, proximè ab his in bra-  
chiis, & pedibus & cruribus, \* leuiter contra pulmonem, idque  
bis quotidie facere. Quod ad cibum verò pertinet, huic nec  
falsis opus est, neque acris, neque amaris, neque aluum  
astringentibus, sed paulo lenioribus. Ergo primis diebus dan-  
da est.

EE

da est.



Aqua mul-  
sa.

\* purum

\* ventri-  
culorum,  
vel, tyrannu-  
culorum,

da est sorbitio ptisanæ, vel alicæ, vel oryzæ, cum qua recens adeps cocta sit. Cum hac sorbile ouum, nuclei pinci ex melle, panis, vel elota alica, ex aqua mulsa: potui deinde non solum pura aqua, sed etiam mulsa egelida: aut si æstas est, etiam frigida, nisi quid obstat. Hæc autem altero quoque die incrementum morbo dare satis est. Vbi in incremento consistit, quantum res patitur, ab omnibus abstinendum est, præterquam aqua egelida. Si vires defunt, adiuuandæ sunt aqua mulsa, profuntque aduersus dolores imposita calida fomenta, vel ea quæ simul & reprimunt & emolliunt. Prodest impositus super pectus sal bene contritus, cum cerato mistus, quia leuiter cutem erodit, eoque impetum materiæ, quo pulmo vexatur, euocat. Vtile etiam aliquod malagma est ex iis quæ materiam trahunt. Neque alienum est dum premit morbus, clausis fenestris ægrum continere. Vbi paulum leuatus est, ter aut quater die, fenestris aliquanto apertis, \* parum aërem recipere. Deinde in refectioe pluribus diebus à vino abstinere, gestatione, frictione uti, sorbitionibus, & prioribus cibis adiacere, ex oleribus porrum, ex carne vngulas, & summa \* trunculorum, atque pisciculos, sic ut diu \* nihil mole & lene sumatur. \* nihil nisi

#### ENARRATIO.

**PERIPNEUMONIA**, ut ait Hippocrates, talia facit: febris acuta tenet, & spiritum frequentem, & calidum respirat, & anxietas adest, & impotentia, & inactio, & dolor sub scapulis, & ad claviculam, & ad mammam, & grauitas in pectore est, & quandoque etiam delirium; quidam dolorem non sentiunt, donec insire inceperint.

#### Pulmo totus afficitur.

**SIC** Herophilus peripneumoniam tumorem in toto pulmonis corpore definiuit: Soranus totum quidem corpus in pulmonia affici, pulmonem verò vehementius vexari dixit: Asclepiades bronchia tantum: alij

alias pulmonis partes lasas esse dicunt. Illud apud omnes in confesso est, non statim in peripneumonia totum pulmonem occupari: neque enim verisimile est ex defluxu synanches in pulmones, etiamsi quammaximè iam confirmata sit pulmonia, totum pulmonem, sicuti hic infert Celsus, affici.

#### Id genus morbi.

**NAM** si pellicula pulmonis, quæ cum thorace secundum longitudinem ipsius sunt connexa, sunt inflammata, dolorem percipiunt aegri, & surrecti sedere volunt; pulmo etenim cordi incumbens, suffocationem infert. alioqui peripneumonicos grauitas tantum absque dolore consequitur.

Oportet,



## Oportet, si satis.

UTILIS, si quod aliud remedium, (quanquam id negarit Asclepiades) phlebotomia, si nullum aliud subsequatur morbum; ac tum quidem pro agri viribus sanguis detrahendus est, etiam ex utroque brachio. At si alios subsequatur morbos peripneumonia, aut si antequam in eam incidierint, phlebotomati fuerint, sanguinis missione alienum nihil est, quum periculum sit deliqui animi, cuius in omnibus inflammationibus maxima habenda est ratio.

## si minores, cucurbitulas.

LEVES cucurbita, quas *νεοφὰς* vocant, in omni morbi tempore tuto applicari possunt; reliqua non nisi in remissione.

## etiam frigida.

FRIGIDAM non concessero, quod in omnibus inflammationibus, (ut precedente capite diximus) actu frigida potiones inutilis sint, tanquam meatus obliptantes, impediensque motum natura, ut qua per

poros insensilesque meatus materiam digerit, atque per sudores resoluit.

## Profuntque aduersus dolores.

SIC balneum peripneumonia non inutile (ut quod lateris, pectoris, dorsiq; dolores demulceat, & quod spiritum maturet educatque, & spiritum facilem reddat) dicit in libro De ratione victus in morbis acutis Hippocrates, & fomentis lateritios dolores sedari auctor est.

## reprimunt &amp; emolliunt.

LOCVS hic mendoſus esse videtur; neque enim quæ reprimunt, ex usu aliquo modo esse possunt: quo fit ut leniunt & emolliunt, legere malim: atque eandem puto esse geminam auctoris nostri lectionem; præsertim quando in fine huius capituli, sic vinendum dicit, ut diu nihil nisi lenè & molle sumatur: nam & hic quoque (ut bene annotavit Pantinus) inferenda est dictio, nisi, in hunc modum: sic ut diu nihil nisi molle & lenè.

## CAPUT VIII.

## De iocinoris morbo, &amp; curatione.

ALTERIVS quoque visceris morbus, id est, iocinoris, æquè modò longus, modò acutus esse consuevit, *ἡπατιδὸν* Græci vocant. Dextra parte sub præcordiis vehemens dolor est, idemque ad latus dextrum, & ad iugulum, humerumque partis eiusdem peruenit, nonnunquam manus quoque dextra torquetur, horror \*calidus est. Vbi malè est, biliseuomitur, interdum singultus propè strangulat. Et hæc quidem acuti morbi signa sunt: longioris verò, vbi suppuratio in iocinore est, dolorque modò finitur, modò intenditur: dextra parte præcordia dura sunt, & tument, post cibum maior difficultas est, accedit maxillarum quædam resolutio, vbi inueterauit malum, venter & crura pedesque intumescunt, pectus atque humeri, circaque iugulum vtrumque extenuatur. Initio sanguinem mittere optimum est, tum ven-

EE 2

ter sol-



\* diducāt,  
i. digerant.

\* ligni

\* iactui,

\* ultra id  
f. a. i. v.  
vel adu-  
runt.

ter soluendus est: si non potest aliter, per nigrum veratrūm imponenda extrinsecus cataplasmata, primum quæ repri-  
mant, deinde calida quæ \* deducant, quibus rectè iris vel ab-  
sinthium adiicitur, post hæc malagina. Dandæ verò sorbi-  
tiones sunt, omnesque cibi & calidi, & qui non multum  
alant, & ferè qui pulmonis quoque dolori conveniunt, præ-  
terque eos qui urinam movent, potionisque ad id efficaces.  
Vtilia in hoc morbo sunt thymum, satureia, hyssopum, nepe-  
ta, amyllum, sisamum, lauri baccæ, \* pini flos, herba sangui-  
nalis, mentha, ex malo cotoneo medium, columbæ iccur re-  
cens & crudum. Ex quibus quædam per se esse, quædam adii-  
cere vel sorbitioni, vel potioni licet, sic tamen ut parçè assu-  
mantur. Neque alienum est absinthium contritum ex mel-  
le, & pipere, eiusque catapotium quotidie deuorare: absti-  
nendum utique est ab omnibus frigidis: neque enim res vlla  
magis iccur lædit. Frictionibus utendum in extremis parti-  
bus, vitandus omnis labor, omnis vehementior motus, ne  
spiritus quidem diutius continendus est. Ira, trepidatio, pon-  
dus, \* ictus, cursus inimici sunt. Perfusio corporis multa  
prodest ex aqua: si hyems est, calida: si æstas, tepida. Item li-  
beralis vinctio, & in balneo sudor. Si verò iccur vomica labo-  
rat, eadem facienda sunt, quæ in cæteris interioribus suppu-  
rationibus. Quidam etiam \* contra id scalpello aperiunt,  
ipsam vomicam adurunt.

### ENARRATIO.

ἥπατις Græci.

**A**FFECTIO hepatica peculiariter ap-  
pellata, citra tumores præter naturam  
circa ipsas partes contingit, inflammatum  
enim esse hepar, aut abscessu laborare, aut  
induratum esse, medici dicunt, aut aliud  
quippiam tale; non tamen hepaticum vocant  
hominem ipsum, cui tale quippiam accidit:  
verum quando citra manifestum aliquid in  
viscere malum, in propriis actionibus debi-  
litatur, tum hepaticum appellant egrotum.  
Auctor est Galenus libro V I I I. capite VI.

De compositione medicamentorum secun-  
dum loca.

#### Dextra parte.

**I**ECINORIS inflammationem intelli-  
git: in hac enim dextera parte sub pracor-  
dis dolor est; idemque ad ingluvi supra,  
infra ad spurias costas pervenit, eoque magis  
intenditur, si in gibba eiusdem parte inflama-  
tio consistat; tum etenim usque adeo ve-  
hemens dolor est, ut conelli eger videat-  
ur: quod voluisse Celsus videtur dum di-  
cit nonnunquam maris dextra tor-  
quetur.



quetur. Contrā si in sua parte sit inflammatio, plus fastidij & nausea oborietur, & vomitiones biliosas, & vehementem sitim inducet.

longioris verò.

LONGIOR quidem morbus est iecinoris suppuratio, quam eiusdem inflammatio, quum hæc in illam non raro degeneret. Verum non minus doloris aut periculi affert suppuratio, quam inflammatio. Nam postquam inflammatio principium permutationis ad suppurationem iam suscepit, omnes ad unum de inflammatione recensite accessiones augentur atque ingrauescunt, dolores, inquam, febres, delirium, cibi fastidium, & à rigoribus in totum febriles accessiones initium faciunt.

dolorque modò finitur.

ISTHVC ab hepatis suppuracione secludendum arbitror, annectendumque iis quæ subsequuntur: atque ita graphice scirrhum hepatis depinxerit; quippe si inueterauerit, aqua inter cutem protinus comitatur, & tota præcordia humiditate conteguntur.

Initio sanguinem mittere.

MULTITUDINEM mittendi sanguinis metiri oportet ex corporis qualitate, ætate, viribus, regione, temporis constitutione, ac magnitudine morbi: nam si vires impares sunt vehementia morbi, partienda erit phlebotomia.

primùm quæ reprimant.

IN omnibus iecorariis medicamentis, tum quæ intro sumuntur, tum quæ foris applicantur, obseruandum est, ut aliquid ex astringentibus admisceatur, quo firmitas & robur visceris conseruetur. auctor est Galenus libro XIIII. Methodi medendi.

qui urinam mouent.

QUOTIES enim cano iecoris pars affecta est, purgantia medicamenta; contrā si quando sima laborat, diuretica adhibenda sunt, ut docet ad Glauconem secundo Galenus.

columbæ iecur.

LVPINO id attribui video à Dioscoride, Galeno atque Aëtio; nusquam tamen, quod sciam, hoc elogio celebratum columbinum iecur, præterquam apud Celsum, inuenio.

abstinendum vtrique.

HIC locus rursum de acta frigida intelligendus est: certum enim est multa potestate frigida iecinori esse accommodissima; quanquam & à vehementer refrigerantibus atque astringentibus omnino cauendum sit; præsertim si in cano visceris phlegmone consistat, propterea quod arctant os meatus bilis, ac bilem ipsam excerni prohibent.

Quidam etiam.

VIDE sectionem septimam Aphorismorum, Aphorismis XLIIII & XLV.

## CAPVT IX.

De lienis morbo, & curatione.

AT lienis vbi affectus est, intumescit, simulque cum eo pars sinistra, eaque dura est, & prementi renititur, venter intentus est, aliquis etiam cruribus est tumor. Ulcera aut omnino non sanescunt, aut certè cicatricem vix recipiunt. In intenta ambulatione, cursuque dolor, & quædam difficultas est. Hoc vitium quies auget. Itaque exercitatione & labore opus est, habita tamen ratione, ne febre mista, si ni-

EE 3

mium



mium processerit, excitetur. Vnctiones, frictionesque, & sudores necessarij sunt. Dulcia omnia inimica sunt. Item lac & caseus. Acida autem maximè conueniunt. Ergo acetum acre per se sorbere, & magis etiam, quod scilla conditum est, expedit. Edenda sunt salsamenta: vel oleæ ex muria dura, tinctæ in aceto lactucæ, \* intubi que & betæ ex eodem, ex sinapi asparagus, armoracia, pastinaca, vngulæ, rostra, aues maræ, eiusdem generis venatio. Potui verò ieiuno dari debet absinthium incoctum, at post cibum aqua à ferrario fabro, in qua candens ferrum subinde tinctum sit. Hæc enim vel præcipuè lienem coërcet: quod animaduersum est in his animalibus, quæ apud hos fabros educata, exiguos lienes habent. Potest etiam dari vinum tenue, austerum, omniaque in cibis & potionibus quibus vrinæ mouendæ sunt, præcipueque ad id valet, vel trifolij semen, vel cuminum, vel apium, vel serpyllum, vel cythifus, vel portulaca, vel nepeta, vel thymum, vel hyssopum, vel saturcia. Hæc enim inde commodissimè videntur humorem deducere. Lienis quoque bubulus vtiliter esui datur: præcipueque eruca & nasturtium lienem extenuant. Imponenda quoque extrinsecus sunt, quæ leuent. Fit ex vnguento & palmulis, quod *μυεσβα* \* cum quo, *λαγρον* Græci vocant. Fit ex lini & nasturtij semine, \* quo vinum & oleum adiicitur. Fit ex cupresso viridi, & arida ficu. \* e Fit ex sinapi, cui seui hircini \* à renibus quarta pars ponderis \* sole, adicitur, teriturque in \* sale, & protinus imponitur. Multisque modis huic rei capparaptum est. Nam & ipsum cum cibo assumere, & muriam eius cum aceto sorbere commodum est. Quin etiam extrinsecus radicem contritam, vel corticem eius cum furfuribus, aut ipsum capparum cum melle contritum imponere expedit. Malagmata quoque huic rei aptantur.

## ENARRATIO.

intumescit.

SCIRRHOSI lienis signa sunt qua hic enarrat. Paulus ulcera in cruribus cicatricem non accipere auctor est: atque hoc

idem confirmat Aëtius, quum dicit: Immedicabilia enim ulcera hoc modo affecti habebunt, maximè circa crura, & colorem corporis vitiatum ad nigredinem vergen-



vergentem. Huius loci qui pleniorē emar-  
rationem desiderat, nostrum De sceleritybe  
commentariolum consulas.

### Itaque exercitatione.

PLVRIMVM etenim fiducia in exerci-  
tamentis, ut ait Aëtius, ponendum, quibus  
ante cibum uti convenit, corpore superflui-  
tatibus non abundante. Ex eorum porro ge-  
nere ex superabundanti faciunt, deambula-  
tiones & cursus. & noni sanè aliquos, qui  
ex his solis ab omni affectione sunt liberati.  
Gestationes omnes conveniunt, præsertim  
quæ fiunt in equo: sic & oportuna vocife-  
rationes, quas sub exercitiij quoque nomine  
comprehensas volumus. Habenda tamen  
semper in exercitationibus ratio febris: si-  
quidem si ea adsit, aut nihil aut leniter ad-  
modum exercitandum est, ne agitatione at-  
que concussione, febris irritetur augeaturq;.

### Ergo acetum acre.

ACETVM contra Dioscoridem mixta  
esse facultatis dixit Galenus libro De simpli-  
cium medicamentorum facultatibus: ac  
proinde, quum in spleneticis opus sit ar-  
tenuantibus pharmacis, citra manifestam  
tamen caliditatem, ut ne vehementius in-  
traffescat succus crassus in ipso obturatus,  
acetum (ut quod mixta sit facultatis, nempe  
calida pariter & frigida) & quod tenuius  
sit partium, atque ex incidentium ordine,  
ultra quod discutiat, existat; optimè indu-  
rato spleni tam per interiora sumptum, quam  
exteriori applicatum conducet.

### at post cibum aqua.

IDEM consulit Archigenes: verum ita  
temperabat, ut non febrientibus cum vino;  
febricitantibus verò solam aquam daret:  
Paulus febre carentibus cum aceti & vini

cyatho uno dat: Aëtius ferrum quod extin-  
guitur, stomoma esse vult: atque sic qui-  
dem convenientissimum spleni in scirrhum  
indurato, remedium esse dicit, gustumque non  
iniucundum.

### Lienis quoque bubulus.

RELIQVORVM quidem viscerum, ut  
auctor est Galenus, lien est suavissimus; est  
enim in eo perspicua quadam acerbitas.  
merito autem pravi quoque succi esse credi-  
tur, ut qui sanguinem melancholicum ge-  
neret: quare qua ratione bubulum lienem  
inter reliquos maxime melancholici succi  
prodesse dicat, nondum assequor; nisi id ex  
occulta proprietate, & analogia quadam  
tanquam amuletum præstare asseueret: quem-  
admodum splenem cælli manducatum lie-  
nicos sanare dicunt; alij efficacissimè auxi-  
liari contendunt splenis asmini torrefacti  
panxillum quotidie ieiuno sumptum. Hic  
interim monendus mihi lector est, locum  
hunc non citra mendæ suspicionem esse, le-  
gendumque lien quoque bubulus his  
utiliter esui datur: neque enim usquam  
præterquam hic, in nominandi casu τὸ lie-  
nis me legisse memini, nisi apud An. Gel-  
lium lib. 3. ubi sic habet: Si iecur aut lie-  
nis sit affectus. quanquam & illic syllaba  
is adiecta videri possit.

### Fit ex vnguento.

BENE annotavit Pansinus hic mendum  
esse, substituendumque ex vnguentariis  
glandibus quas *μυροβλάστους* Græci  
vocant.

### cappari.

NON solum fructus, sed & eiusdem  
cortex: nam ultra quod diffecat & ex-  
purgat, etiam lienem corroborat.

## CAPVT X.

### De renum morbis, & curationibus.

**A**T renes ubi affecti sunt, diu malè habent. Peius est, si  
frequens biliosus vomitus accedit. Oportet conquies-  
cere, cubare molliter, soluere aluum, si aliter non responder,  
etiam



\* potius,  
al. acidis,  
pomis,

\* ad hæc

\* at super

etiam ducere: sæpe desiderare in aqua calida, neque cibum, neque potionem frigidam assumere, abstinere ab omnibus sal-  
fis, acribus, acidis\* pomis, bibere liberaliter, adicere modò  
cibo, modò potioni piper, porrum, ferulam, album papauer.  
Quæ maximè inde vrinam mouere consuerunt. Auxilio  
quoque his exulceratæ sunt, si\* adhuc vlcera purganda sunt,  
cucumeris semina detractis corticibus sexaginta, nuclei ex  
pinu syluestri duodecim, anisi, quod tribus digitis sumi possit,  
croci paulum, contrita, & in duas multi portiones diuisa. Si  
verò dolor tantum leuandus est, eiusdem cucumeris semina  
triginta, iidem nuclei viginti, nuces Græcæ quinque, croci  
paululum, contrita & cum lacte potui data,\* ac insuper quo-  
que rectè quædam malagmata iniiciuntur, maximeque ea,  
quæ humori extrahendo sunt.

### ENARRATIO.

QUATVOR renales morbos libro De  
internis affectionibus describit Hip-  
pocrates, quorum priores primo hoc §.  
comprehendisse videtur; atque eorundem  
inflammationem subaudit, quum dicit pe-  
ius est. nam etiam si quammaximè lithiasis  
grauissimos dolores inferat, atque in longum  
protrahatur, vitæque morte frequenter  
perimetur; iure tamen peius, hoc est, pericu-  
losus est, quoties renes aut inflammantur,  
aut suppurentur: nam præterquam quòd  
grauissimas acceffiones faciant, citò etiam,  
ut omnis phlegmone, dubium ancepsq; peri-  
culum minuant.

#### Oportet conuiescere:

QUIES in omnibus renum affectionibus  
maximè laudatur: nam agitatione aut ex-  
ercitiis crudi humores ad ipsos faciliè trans-  
mitterentur.

#### cubare molliter:

IDEM suadet Trallianus, qui culcitram

deplumem in inflammatione renum pluri-  
mum obesse dicit. Ego tamen, si mollicies  
omnino admittenda sit, culcitram lanugine  
gossypij infariam, potius quàm plumis tur-  
gidam laudauero, quòd mollis lectus calo-  
rem, atque adeò inflammationem renum  
augere soleat.

#### sæpe desiderare.

EVOCAT enim humores ad exteriora,  
& meatus laxiores reddit; tum & ipsam  
inflammationem mitigat.

#### bibere liberaliter.

QUAM conueniat liberalis aut copiosa  
potio, inducent alij; mihi cerè placere non  
potest.

#### piper.

SI singula per se obruleris, nocebis; sin  
ex omnibus simul mixtis pharmacum com-  
ponas, accommodatissimum remedium effi-  
cies: nam & dolores mitigabit, & mate-  
riam à loco affecto per lotium expurgabit.

### CAPUT



## CAPVT XI.

*De intestinorum morbis, & primò de Cholera.*

**A**VISCERIBVS ad intestina veniendum est, quæ sunt & acutis, & longis morbis obnoxia. \* Primò æquè faci-  
 cienda mentio est cholera, quia commune id stomachi, at-  
 que intestinorum vitium videri potest. Nam simul & deie-  
 ctio, & vomitus est, præterque hæc inflatio est, intestina tor-  
 quentur, bilis suprâ infraque erumpit, primum aquæ similis,  
 deinde vt in ea recens caro lota esse videatur, interdum alba,  
 nonnunquam nigra, vel varia. Ergo eo nomine, morbum  
 hunc *χολέρα* Græci nominarunt. Præter ea verò quæ suprâ  
 comprehensa sunt, sæpe etiam crura manusque contrahun-  
 tur, virget sitis, anima deficit: quibus concurrentibus non mi-  
 rum est, si subitò quis moritur. Neque tamen vlli morbo  
 minori momento succurritur. Protinus ergo vbi ista cœpe-  
 runt, aquæ tepidæ quàm plurimum bibere oportet, & vomere.  
 Vix vnquam sine vomitu sequitur, sed etiam si non inci-  
 dit, miscuisse tamen nouam materiam corruptæ prodest,  
 parsque sanitatis est vomitum esse suppressum: si id incidit,  
 protinus ab omni potione abstinendum est. Si verò tormina  
 sunt, oportet frigidis & humidis fomentis stomachum foue-  
 re: sed si venter dolet, iisdem egelidis, sic vt venter ipse me-  
 dioeriter calentibus iuuetur. Quòd si vehementer & vomit-  
 us, & deiectio, & sitis vexant, & adhuc subcruda sunt quæ  
 vomuntur, nondum vino maturum tempus est, aqua, neque  
 ea ipsa frigida, sed potius egelida danda est, ad mouendumque  
 naribus est pulegium ex aceto, vel polenta vino aspersa, vel  
 mentha, si nondum maturâ est. At cum discussa cruditas est,  
 tum magis verendum est, ne anima deficiat. Ergo tum con-  
 fugiendum est ad vinum. Id esse oportet tenue, odoratum,  
 cum aqua frigida mistum, vel polenta adiecta, vel melle quo-  
 que assumere expedit, quotiesque aliquid aut stomachus, aut  
 venter effudit, toties per hæc vires restituere. Erasistratus  
 primò tribus vini guttis, aut quinis aspergendam potionem

FF

esse



\* sic ab  
\* metus

\* somnoq.  
qui fac. ac.  
quiescit,  
vitataque  
lasis.

esse dixit, deinde paulatim merum adiciendum. Is \* si & ab initio vinum dedit, & \* metum crudelitatis secutus est, non sine causa fecit. Si vehementem infirmitatem adiuuari posse tribus guttis putauit, errauit. At si inanis est homo, & crura eius contrahuntur, interponenda potio absinthii est. Si extremæ partes corporis frigent, vngendæ sunt calido oleo, cui ceræ paulum sit adiectum, calidique fomentis nutriendæ. Si ne sub his quidem quies facta est, extrinsecus contra ventriculum ipsum cucurbitula admouenda est, aut sinapi super imponendum. Vbi his constitit, dormire oportet, postero die utique à potione abstinere, die tertio in balneum ire, paulatim se cibo reficere \* : somno, quisquis faciliè acquiescit, itemque lassitudine, & frigore. Si post suppressam choleram febricula manet, aluum duci necessarium est, tum cibis, vinoque vtendum est, sed hic quidem morbus & acutus est, & inter intestina, stomachumque versatur, sic ut cuius potissimum partis sit, non faciliè dici possit.

### ENARRATIO.

**D**VBIUM admodum est, quis locus primario affectus sit in cholericiis: siquidem Celsus vitium commune stomacho & intestinis dicit, quod per superiora æquè ac inferiora fiat excretio: Paulus id negat, ac solius ventriculi immodicam perturbationem supra infraque erumpentem esse dicit: alij primario affici dicunt stomachum, ventrem, & intestina, aliæque omnia corporis membra isdem consensire: Galenus libro De causis symptomatum ultimo, ventriculum quidem primario, stomachum verò proprie dictum, ac ianitorum, vel pylorum secundario affici docet, expultrice facultate humorum mordacitate irritata: nam qui in summis intestina torminibus vexari contingat, idèd non statim intestinorum morbus dicendus erit, quando eadem non in principio, sed ubi iam consisterit morbus, primum innadant.

#### Primum aquæ similis.

QVI paulo exactius cholicorum vomitiones perpenderunt, eo ordine easdem ferri prodiderunt, ita ut primò corrupti cibi sicuti frequenter occurrat, & humoris atque flava bilis vomitio fiat: dehinc vitellus ovorum similis, tunc præsui atque arginosi, ac ultimò etiam nigri, quæ venis turbatio cum dolore, & secutus vomitioni non dissimiliter, subsequuntur. Quod si increseat passio, lotura carnis similis, spumosa etiam & albicans erit egestio.

#### Ergo eo nomine.

Sic Galenus libro Methodi Therapeutica secundo, Sapè, inquit, à causa putata, morbi denominationem sortiti sunt, ut *μελαγχολία* omnibus, *χολίκα* his qui à Cnido medicis. Alexander Trallianus id reprehendit: Siquidem nemo, inquit, credat, *χολίκα* appellari à Græcis, ob bilis, ut vul-

216 p. 10



qui putat, abundantiam, & χαλεκὰ νο-  
minari biliosa; sed à multo materia biliosa  
fluxu, qui per inferna & superna fit, hoc  
est intestina & ventrem & os. Prisci nam-  
que Græci χαλὰδὺς intestina laxiora, quòd  
in eis χαλὰ fundatur, appellabant, & hinc  
affectum hunc cholericum nominant. Hesi-  
chius ita definit: χαλὰ ἐστὶ ἰκκέρως  
πάτωσι διὰ γαστέρος, ἢ ἀραιὸν διὰ στόμα-  
τος ἰκκέρως: hoc est, Cholera est per inferna  
deiectio, supràque per os vomitum.

### non mirum est.

EST enim cholera, ut sentit Theodorus  
Priscianus, omnibus acutis passionibus velo-  
rior: & Galenus commento XI. Aphor.  
sección prima, anginam & cholera, & ner-  
vorum distensionem peracutos morbos no-  
minat.

### & vomere.

NIHIL enim alienius est, ut docet  
Aëlius, quàm ea quæ efferuntur in princi-  
pio, aut concervatim velle cohibere: nam  
quum inutilia sint, opus habent enacuatione:  
quare quando per se facili sequantur, &  
ager ipse natuscabundus sit, motum naturæ  
promovere studebimus, egelidamque aquam  
bibendam dabimus, caventes interim à mul-  
sa, aut hydreleo, quòd hoc fluxiones augeat,  
illa verò mordacitatem operetur, & torsio-  
nes augmentet.

### parisq̃ sanitatis est.

VERVM quidem est si humor noxius  
aliqua ex parte expurgatus sit: nam alio-  
qui periculum esset, ne grauioribus accessiones  
pareret.

### aqua.

IDEM suadet Aëlius, qui frigida qui-  
dem cyathum bibendum dat; sed interim  
cauendum dicit, ne nimis frigida sit: quare  
egelidam, hoc est eam quæ tepida frigidior  
sit, tanquam stomachi confortatiuam dan-  
dam tradit Celsus.

### vel mentha.

VARIANT hic exemplaria: Pinza-  
num enim non omnino malè, vel mentha

secundum naturam est: alij vel men-  
tha quæ nondum matura est, legunt.  
quod qua ratione fecerit nescio: nam neque  
Dioscorides, neque alius ququam, quod  
sciam, præter Celsum nostrum, usquam im-  
matura mentha eam facultatem tribuit,  
nisi quòd libro III. capite XXXV. idem  
ternos mentha ramulos cum acidi granati  
succo potos, vomitiones choleraeque sedare,  
stomachoque per se vilem dicat.

### Id esse oportet tenue.

QVALE est quod auferum, & me-  
diocriter astringens est, neque viribus vali-  
dum: atque ob id Aëlius, contrà quàm Cel-  
sus, odorum vinum suspectum habet.

### Erasistratus primò.

ERASISTRATVS hic, ut auctor est  
Calim Methodicus, si sitis, & animi defectio  
coëgerant, vino potabat Lesbio cum aqua  
frigida: verum in aqua cyatho vini guttas  
duas aut tres ad summum admiscendas in-  
bens, Ut solui, inquit, odorem vini aqua  
habere videatur, atque hoc bibendum post  
singulos imperat vomitus, & post singulas  
ventris effusiones; siq̃ febres irruerint, plus  
aqua admiscendum contendit.

### vngendæ calido oleo.

QVALE est sicyonium, irinum; aut  
castoreum.

### cucurbitula adinouenda.

EA enim tanquam incantamentum  
quoppiam, ut docet Galenus, fluxum com-  
pescit: & si diutius adhæreat, concoctionem  
adinuabit, ut auctor est Trallianus.

### Vbi his constitit.

LOCVS hic parna distionum metathesi  
sic restituendus videtur, quòd aliqui, meo  
quidem iudicio, sensus non constet: vbi is  
constitit, dormire oportet; postero  
die vtique à potione abstinere, item-  
q̃ue lassitudine, & frigore; die tertio  
in balneum ire, paulatim se cibo re-  
ficere, somno quisquis facili ac-  
quiescit, &c.



*De Cœliaco ventriculi morbo.*\* nomina-  
tus.\* vniuer-  
sim\* propor-  
tione\* arrodan-  
tur & ru-  
beant,

IN ipsius verò ventriculi porta consistit is qui & longus esse consuevit, κοιλιακὸς à Græcis \* nominatur. Sub hoc venter indurefcit, dolorque eius est. Alius nihil reddit, ac ne spiritum quidem transmittit. Extremæ partes frigesunt. Difficiliter spiritus redditur. Commodissimum est inter initia calida cataplasmata toto ventri imponere, vt dolorem leniant, post cibum vomere, atque ita ventrem exinanire. Proximis deinde diebus cucurbitulas sine ferro ventri, & coxis admoüere. Ventrem ipsum liquare dato lacte, & vino falso frigido. Si tempus anni patitur, etiam viridibus ficis, sic tamen, ne quis aut cibus aut humor \* vniuersus detur, sed paulatim. Ergo per intervalla temporis sat est cyathos binos ternosve sumere, & cibum \* proportionē huius: commodēque facit cyatho lactis cyathus aquæ mistus, & sic datus. Cibique inflantes, & acres vtiliores sunt, adeo vt lacti quoque rectè contritum allium adiciatur. Procedente verò tempore opus est gestari, maximeque nauigare, perfricari ter aut quater die, sic vt nitrum oleo misceatur, perfundi aqua calida post cibum, deinde sinapi imponere per omnia membra, excepto capite, donec \* arrodatur & rubeat, maximeque si corpus durum & virile est, paulatim deinde faciendus est transitus ad ea, quæ ventrem comprimunt. Assa caro danda, valens, & quæ non facîle corrumpatur: potui verò pluuiæ aqua decocta, sed quæ per binos ternosve cyathos bibatur. Si vetus vitium est, oportet laser quàm optimum ad pipëris magnitudinem deuorare, altero quoque die vinum, vel aquam bibere, interdum interposito cibo singulos vini cyathos sorbere, ex inferiori parte infundere pluuialem egelidam aquam, maximeque si dolor in imis partibus remanet.



## ENARRATIO.

**D**V M ea quæ Celsus noster de cæliacâ passione scribit, cum iis quæ aut Græci, aut Latini posteritati reliquerunt, confero; videtur mihi aliud longè affectum quàm ij sub cæliaci nomine intellexisse; adeo ut Alex. Benedictus distinctionem quandam comminisci coactus fuerit, duasque diversas cæliacas statuere: Nam quem Celsus ventriculi portæ, (pyloron vocant) morbum esse dicit, alij quotquot sunt, simpliciter ventriculi morbum esse asserunt, adeo ut Græci vho ore omnes ἀνὰ τὴν κοιλίαν, Latini cōtra, ut sunt Plinius Secundus, & Cælius Meibodius, à ventre, vtpote parte corporis quæ patitur ventriculorū passionem, nominant: dicuntq; quemadmodum ante alios testatur Arætan, fieri ob concoquentis caloris imbecillitatem, frigūque ventriculi, atque adeo vultum esse concoctū & digestionis; unde contingat ea quæ per os assumuntur, non probè confici nec distribuī, verū per alium cōtinuè deici, colore, odore & consistentia in primum mutata: ea siquidem quæ egeruntur, aliquando fœtida sunt, cum animi deliquij sensu; aliquando versicoloria, & instar lutei sanguinis, idq; in extremo vitæ periculo: quæ aliquando subsequuntur, ut auctor est Trallianus, & epos seu torsiones circa umbilicum. Quod fortè transuersum egit Celsus nostrum, ut dum ventris torsionem, & tensionem nonnunquam morbum subsequi intelligeret, inferret etiam distento ventre statim, nihil egeri, ac nec spiritum ipsum commodè reddi, confundens, sicuti ego conicere possum; cæliacam cum borborisima sententiam intestinorum.

## Commodissimum est.

ALII actū calida cataplasma suspecta habent, atque eadem repida adhibenda dicunt, ferèq; aliqua quæ astringunt miscent.

## post cibum vomere.

ALIOVANDO, inquit Aetius, largi

porione vtendum est, agerque ad renouendum cogendus, maxime si humores in ventre collectos percipiamus: mirabiliter enim vomitus efficaces sunt, tam à cena, quàm à ieiunio facti; vixim quæ corrupta sunt euacuant, & quæ ad intestina delapsa sunt, attrahentes, & conuerrentes, ac proprias ventris actiones renouantes. Et si recens morbus sit, vitiosissq; humoribus corpus abundet, leui purgatione iidem expurgandi sunt, præcauendūq; ne regenerentur.

## Ventre ipsū.

ISTHVC quàm sit ex usu, nescio: siquidem si serosi atque acres humores cunicis ventriculi infusi fuerint, aut si astrictior sit alius, ut inferre videtur Celsus, lacte nequaquam liquibimus alium, ni pro lacte feram lactis intelligamus. Non negauerim tamen lactis potum plurimum facere in his qui cum mordacitate ventris fluxionibus infestantur: præsertim si in principio calidum ac recens multum exhibeatur, ac deinceps ad mediū erit, aut ad tertius decoctū; ita enim non in cæliaci morbo, sed & in omnibus fluxibus redditur accommodum.

## etiam viridibus ficis.

VT inutiles omnino reicienda sunt, quando & flatulenta sunt, & stomacho aliena.

## sic tamen.

COPIA enim fluxionibus inimicissima est.

## Cibi que inflantes.

ET hi quoque cæliaci non conueniunt quod stomachum replant morbumque augeant.

## perfricari ter aut quater.

POST exercitia fricatio simplex adhibenda est, ac maxime perfricandus venter est. Calida perfrictionem vituperat Aetius, nisi ad lassitudinis, aut alterius rei molestantiam vitentur.

FF 3

CAPVT



## CAPVT XIII.

*De tenuioris\* intestini morbo.*\* & ple-  
nioris int.

**I**NTER ipsa verò intestina consistunt duo morbi, quorum alter in tenuiore, alter in pleniore intestino est. Prior acutus est. Insequens esse longus potest. Diocles Carystius tenuioris intestini morbum *χρόναιον*, plenioris *εἰλεόν* nominavit. A plerisque video nunc illum priorem *εἰλεόν*, hunc \* *καλίκον* \* *χρόναιον* nominari. Sed prior modò supra vmbilicum, modò \* in sub vmbilico dolorem mouet. Fit \* ex alterutro loco inflammatio, nec aluus, nec spiritus infra transmittitur. Si superior pars affecta est, cibus: si inferior, stercus per os redditur: si vtrumlibet vetus est, adiicitur periculo vomitus biliosus, mali odoris, aut varius, aut niger. Remedium est sanguinem mittere, vel cucurbitulas pluribus locis admouere, non vbiq; cute incisa. Id enim duobus aut tribus locis satis est. Ex ceteris spiritum euocare, abunde est. Tum animaduertere oportet, quo loco malum sit. Solet enim contra id tumere. Et si supra vmbilicum est, alui ductio utilis non est. Si infra est, aluum ducere (vt Erasistrato placuit) optimum est, & sæpe id auxilii satis est. Ducitur autem percolato ptisanæ cremore cum oleo & melle, sic vt præter ea nihil adiiciatur. Si nihil tumet, duas manus imponere oportet, supra summum ventrem, paulatimq; deducere. Inuenietur enim mali locus qui necesse est renitatur, & ex eodem deliberari poterit, ducenda necne aluus sit. Illa communia sunt, calida cataplasmata admouere, eaq; imponere à mammis vsque ad inguina & spinam, ac sæpe mutare: brachia cruraq; perfricare, demittere totum hominem in calidum oleum. Si dolor non quiescit, etiam in aluum ex parte inferiore tres, aut quatuor cyathos calidi olei dare. Vbi per hæc consecuti sumus, vt iam ex inferiore parte spiritus transmittatur, offerre potui mulsu tepidum non multum. Nam antè magna curauitandum est, ne quid bibat. Si id commodè cessit, adiacere sorbitionem. Vbi dolor & febricula quierunt, tum de-  
mum



num uti cibo pleniore, sed neque inflante, neque duro, neque valido, ne intestina adhuc imbecilla lædantur, potui verò nihil præterquam puram \* aquam. Nam siue quid vino-<sup>• aq. offer.</sup> lentum, siue acidum est, id huic morbo alienum est. Ac po-<sup>re.</sup> stea quoque vitare oportet balneum, ambulationem, gestationem, cæterosque corporis motus. Nam facilè id malum redire consuevit, & siue cum frigus subit, siue aliqua iactatio, nisi bene iam confirmatis intestinis, reuertitur.

## ENARRATIO.

**E**λάς, à symptōmate, ut secundo Methodi auctor est Galenus, nomen sumpsit: nam ἐλάς verbum Græcum, Latine idem quod voluo significat; inde ἐλάς, quasi circumuolutus, quando agris dolor circumuolutus accedit: hunc Latini voluulm nominant, Celsus intestini tenuioris morbum dicere maluit: Calius Siccensis, acutum tormentum appellat, quod in eo torqueantur intestina. Salimachus ait quosdam Pythagoricos medicos φεργυδὸν vocitasse, quod obrutis naturalibus ventris officiis fiat.

χόρδα·ζορ.

**Q**UOTIES nimirum tumor aliquis eminet in tenuiorum intestinarum parte, ut videatur intestinum ad chorda similitudinem conuolutum: nam & præci Græci, ut auctor est Calius, intestina chordas vocauerunt.

## stercus per os redditur.

**R**ATIONEM huius reddit Galenus libro III. De natural. facultat. dicit enim, ipsum quod phlegmone laborat intestinum, nec pondus nec acrimoniam tolerat excrementorum, eoque excernere, expellereque ea quam longissime à se nititur, prohibitum verò deorsum persequi, quum scilicet hoc loco grauißima pars phlegmones fuerit, in proxima suprapositorum intestinarum retrudit, itaque iam excreticis facultatis momento per continuum intestinum sursum verso, excrementa sursum ascendunt: a quo

affectu, ut sexto De locis affectis, vix unquam aliquis potuit sanus enadere.

## adiicitur periculo.

**H**IPPOCRATES sectione septima Aphorismorum, Apho. x. Ab eileo vomitus, aut singultus, aut conuulsio, aut delirium, malum portendit; quod, ut in Commento ait Galenus, alijs vomitus semper non adfit, sed tum demum quando exitiales sunt, & vehementer distorquentur.

## Remedium est.

**S**I quidem inflammatio sit, hic, ut in omnibus inflammationibus, à sanguinis missione aspiciendum erit: at si à crudis crassissq; humoribus fiat, tum à vomitione, aut purgatione per inferiora injecta aut enematis, aut inditis glandibus incipiendus est.

## Si dolor non quiescit.

**N**ON fuerit inuile si in eodem aliquid scængraci, seminis lini, aut radicem althææ cum modico aqua, ad aqua consumptionem decoquamus.

## ut iam ex inferiore.

**V**IDENDVM tamen est, inodorus sit nec ne: nam si per pedicem redditus ventus odorem tetrum præ se ferat, salutem ac morbi solutionem portendit; sin absque tetra odore reddatur, perniciosum valde est.

potui verò nihil præterquam puram aquam.

**C**VR præter aquam puram nihil concedat,



cedat, dubio: nam etsi ad arcendam inflammationem utilis aqua potio sit, periculum tamen est, ne cruditati materiam suppediet, qua voluuli causa non raro existit:

quale aut *ἐλκυσφόρον*, aut dilutum aliqui vinum potius pro ratione temporis exhibero.

## CAPVT XIII.

## De morbo intestini plenioris.

**I**s autem morbus, qui in intestino plenior est, in ea maxime parte est, quam cæcam esse proposui. Vehemens \* inflammation, vehementes dolores dextra magis parte, intestinum quod verti videtur, prope spiritum elidit. In plerisque post frigora, cruditatesque oritur, deinde quiescit, & per ætatem sæpe repetens, sic cruciat, ut vitæ spatio nihil demat. Vbi is dolor cœpit, admouere sicca & calida fomenta oportet, sed primò lenta, deinde validiora, simulque frictions, ad extremas partes, id est, crura, brachiaque materiam reuocare. Si discussum non est, qua dolet cucurbitulas sine ferro defigere. Est etiam medicamentum eius rei causa comparatum, quod *κωλικόν* nominatur. Id se reperisse Cassius gloriabatur. Magis prodest potui datum, sed impositum quoque extrinsecus, digerendo spiritum, dolorem leuat. Nisi finito verò tormento, rectè neque cibus neque potio assumitur. Quo victu sit vtendum \*, qui hoc genere tentantur, iam mihi dictum est. Confectio medicamenti, quod *κωλικόν* nominatur, ex his constat: Costi, anesi, castorei, singulorum P. denariorum *ii i.* \*. petroselini P. denariorum *ii i.* piperis longi, & rotundi, singulorum P. \*. \* *i i.* papaueris lacrymæ, iunci rotundi, myrt hæ, nardi, singulorum P. \* *v i.* \*. quæ melle excipiuntur. id autem & deuorari potest, & ex aqua calida sumi.

## ENARRATIO.

**C**OLON, inquit Paulus, crassioris intestini pars est: in dextra iliorum parte collocatur, & in sinistram deferitur in zona modum. in hoc vehementissimi dolores fiunt, ut primo, secundo, & sexto De locis affectis testatur Galenus, ad eò ut ob doloris ve-

bementiam Sammonicus, colon iunius morbi genus non verum sit dicere.

Vbi is dolor cœpit.

NON semper à fomentis aspiciendum est; sed modò a sanguinis missione, modò a pharmaci



pharmacum sumptione, sicuti etiam non raro à clysterum infusione: dicit enim Galenus libro De locis affectis primo, se quoties mordax humor ad affectu intestini tunicas defluxisset, medicamento quod ex aloë fit dato colicos sæpenumero curasse.

### cucurbitulas sine ferro.

POTISSIMUM si à spiritu flatulento concitatus dolor fuerit: nam, ut iam ante ex Galeno libro XI. therap. methodi retulimus, propriam quandam curationem sortitus est hic dolor, ex cucurbitula cum flamma copiosa, subinde admota: videturque tibi, ut inquit, presidium hoc in eiusmodi affectibus, incantamenti cuiusdam simile quid efficere, sine in intestinis, sine in quavis corporis parte exciteretur.

rectè neque cibus neque.

Id enim unice cavendum monet Pau-

lus, ut & satietas & cruditus vivatur.

### Confectio medicamenti.

GALENUS libro De compositione medicamentorum localium, duo pharmaca colica Casio ascripta parum cum hac Celsi confectione convenientia describit. Scribimus Largus capite CXX. colicen Casij quam ab eius seruo Atimeto se accepisse testatur, à secunda Galeni non omnino dissimilem describit: Recipit autem Apij seminis p. feli-  
bram, anesi p. quadranscm, spica nardi indica p. sextantem, opij p. quadrantem, croci p. sesquunciam, piperis longi p. sextantem, piperis nigri pondo sextantem, schani p. sesquunciam. hæc omnia confusa cribrata melle Attico decocta miscentur. Datur, inquit, ex hoc medicamento quantum nux anellana media patet ex aquæ calidæ cyathis tribus: Galenus nactis ponticæ magnitudine ex aqua calida totidem cyathis exhibet.

### CAPUT XV.

#### De Torminibus, id est, duoverreia.

PROXIMA his inter intestinorum mala, tormina esse consueverunt, *duoverreia* Græcè vocatur, intus intestina exulcerantur. Ex his cruor manat. Isque modò cum stercore aliquo semper liquido, modò cum quibusdam quasi mucosis excernitur, interdum simul quædam carnosæ descendunt. Frequens deiiciendi cupiditas, dolorque in ano est. Cum eodem dolore exiguum aliquid emittitur. Atque eo quoque tormentum intenditur. Idque post tempus aliquod leuatur, exiguaque requies est, somnus interpellatur, febriçula oritur, longoque tempore id malum cum inueterauerit, aut tollit hominem, aut etiam (si finitur) excruciat. Oportet in primis conquiescere. Siquidem omnis agitatio exulcerat, deinde ieiunum sorbere vini cyathum, cui cõtrita radix quinquefolij sit adiecta, imponere cataplasmata super ventrem, quæ reprimunt, quod in superioribus ventris morbis non expedit, quotiesque desidit, subluere aqua calida, in qua decoctæ ver-

GG

benæ



\* astringant. At  
e. q. v. mouent, si id  
conf.

\* illa

\* & p. f. in  
terdū pro-  
flu.

\* cancerē

\* Sin

\* indatur.

benæ sint, portulacam vel coctam, vel ex dura muria ediss.  
cibos, potionesque eas, quæ astringunt aluum. Si vetustior  
morbus est, inferioribus partibus tepidum infundere, vel pi-  
sanæ cremorem, vel lac, vel adipem liquatam, vel medullam  
ceruinam, vel oleum, vel cum rosa butyrum, vel cum eadem  
album crudum ex ouis, vel aquam, in qua lini semen deco-  
ctum sit: vel si somnus non accedit, vitellos cum aqua, in qua  
rosæ floris folia, cocta sint. Leuant enim dolorem hæc, &  
mitiora vlcera efficiunt, maximeque vtilia sunt, si cibi quo-  
que secutum fastidium est. Themison muria dura quam as-  
perrima sic vtendum memoriæ prodidit. Cibi verò esse de-  
bent, qui leniter ventrem \*distingant & ea quæ vrinam mo-  
ueant. Si ea consecuta sunt, in aliam partem humorem  
auertendo, profunt: si non sunt consecuta, noxam augent.  
Itaque nisi in quibus promptè id facere consueuerunt, non  
sunt adhibenda. Potui si febricula est, aqua pura calida, vel  
ea quæ ipsa quoque astringat, dari debet: si non est, vinum  
lene, austerum. Si pluribus diebus nihil remedia \* alia iuue-  
runt, vetusque iam vitium est, aquæ bene frigida potio as-  
sumpta vlcera astringit, & initium secundæ valetudinis facit.  
Sed, ubi venter suppressus est, protinus ad calidam potionem  
reuerrendum est. Solet autem interdum etiam putris sanies  
pessimi que odoris descendere, solet in purus sanguis profluere.  
Si superius vitium est, alius aqua mulla duci debet, hunc  
deinde eodem infundi, quæ supra comprehensa sunt. Valens-  
que est etiam aduersus vlcera intestinorum minijgleba, cum  
salis hemina contrita. \* Si minus, mista his aqua in aluum  
datur. Ac si sanguis profluit, cibi potionesque esse debent,  
quæ astringant.

#### ENARRATIO.

DYSENTERIA, aut, sicuti Celsus & Plinius Latine reddiderunt, tormina, nihil aliud est quam intestinorum exulceratio: Celsus Aurelianus intest. moru rheumatismam eius exulceratione esse dicit. Sæpius verò, Dysenteria, inquit, propriè ex-  
ulceratio est intestinorum serpendo der-  
passens.  
Isque modò.  
GALENVS De locis patientibus primo,  
ex secum varietate locum affectionis diuidit:  
cat:



eat: Siquidem infimarum partium ulcera, inquit, nullas omnino notas habent alni excrementis admixtas: earum verò partium quæ aliis collocata sunt ulcera, mixtas quidem cum stercore habent notas, sed id leniter quantaxat, quemadmodum si multo sint altiores, vehementior erit mixtura, præcipue in supremis intestinis, ulceris nota vehementer stercore videntur admixta. Aërius ab excrementis morbi magnitudinem diiudicat: nam quum superficies intestinorum fuerit denudata, exulceratioque superne corripitur, facilius ac cruentum, bilio-  
saque excernuntur: ubi autem aliis penetravit ulceratio, etiam sordes pelliculas admixtas habentes expelluntur: & si non celeriter cohibeatur, compendio vicinos locos depascitur, saniosa verò quadam excernuntur, qualia ab occisorum corporibus effluere consueverant.

longoque tempore.

HIPOCRATES libro De affectionibus. Est, inquit, hic morbus, & laboriosus, ac lethalis, & si quidem robusto adhuc corpore careatur, spes est fuga: si verò colliquatio iam, & ventre omnino exulcerato, nulla vita spes superest.

Oportet in primis.

ID rectè, si quid aliud, mea quidem sententia, præcipit Celsus, quantumvis Hippocrates libro tertio De dieta, curis pluribus & luctis, & deambulationibus orandum dicat, cum ab exercitiis, cum manè.

imponere cataplasmata.

SUNT qui id vituperent, quod obstrictis poris natura morum præpediatur, atque adeo quod si quid humoris in venis contentum sit, per reprimentia ventri applicata ad intestina regurgitet, atque per consequens morbum suumque augeat.

ex dura muria.

QUOMODO dura muria fiat, docet Columella De re rustica libro XII. cap. VI. dura autem obstricta videtur, non quod consistens dura sit, sed quod aqua in sale energiam aut vini suam amplius exorcere non possit, ac quod hæc pota dysenteris comminatur. Docet præter Celsus Paulus Aegineta, & Dioscorides sicuti & Themison quoque per inferna hisdem commodè insundi auctor est: Galenus tamen id suspectum habet libro XII. Methodici.

Id ea quæ urinam.

ADHIBENDA aliqua sunt, quæ modicè asringunt: ne si forte non succedat urinae excretio, recedat malum.

Soler autem interdum

GALENUS cruentam dysenteriam nominat, ac jejicoris, non intestinorum, accedens esse dicit libro II. & sexto De locis affectis.

minij gleba.

HERMOLAYUS Barbarus Lepidium si-  
gillum hoc loco intelligit, quem quidam bolum Armerum esse volunt, vide commentaria Matthioli in Dioscoridem.

## CAPUT XVI.

### De laxitate intestinorum.

EX torminibus interdum intestinorum laxitas oritur, quæ continere nihil possunt, & quicquid assumptum est, imperfectum protinus reddunt. Id interdum ægros trahit, interdum præcipitat. In hoc utique adhibere oportet comprimentia, quò facilius tenendi aliquid intestinis vis sit. Ergo

GG 2

& lu-



\* decocta  
in aq.  
desicat, sub-  
aucti æger: sic  
infra ca. prox.

& super pectus ponetur sinapi, exulcerataq. cute, malagma, quod humorem euacuet, & ex verbenis\* decoctis aqua desicat, & cibos, porionesque assumat, quæ aluum astringunt, & frigidis utetur perfusionibus. Oportet tamen prospicere, ne simul his omnibus admotis vitium contrarium per immodicas inflationes oriatur. Paulatim ergo firmari intestina debent, aliquibus quotidie adiectis. Et cum in omni fluore ventris, tum in hoc præcipue necessarium est, non quoties libet desiderare, sed quoties necesse est, ut hæc ipsa mora in consuetudinem ferendi oneris intestina deducat. Alterum quoque, quod æquè ad omnes similes affectus pertinet, in hoc maxime seruandum est, ut cum pleraque vtilia insuauia sint, qualis est plantago, & rubi, & quicquid malicorio mistum est, ea potissimum ex his dentur, quæ maxime æger volet. Deinde si omnia ista fastidiet, ad excitandam cibi cupiditatem interponatur aliquid minus vtile, sed magis gratum. Exercitationes, frictiones huic quoque morbo necessariae sunt, & cum his sol, ignis, balneum, vomitus (ut Hippocrati visum est) etiam albo veratro (sicætera parum proficient) euocatus.

## ENARRATIO.

INTESTINORVM lauitas, aliud nihil est, sicut Galeno placet, quam velox exitus eorum quæ comeduntur, & bibuntur, quæ talia deiciuntur, qualia fuerit denotata; quum neque secundum consistentiam, neque secundum colorem vel odorem in vllam omnino qualitatem in ventriculo facta fuerit ciborum permutatio. Hæc, ut auctor est Paulus, duplici continetur discrimine: siquidem modò ex summa intestinorum ulceratione contrahitur, cicatrice densa, & leui succedente, quæ deinde ob densitatem suam, ciborum per corpus digestione fieri, non permittit, quum venarum ora, quæ alimentum ex intestinis ad se anellunt, sint obstruata. Alterum discrimen est, quoties ex infirmitate & languore virium alimenta in ventriculo continentium, creantur; atque liente-

ria speciem hanc cum cæliaco morbo nonnunquam confundi idem auctor est.

## Ergo &amp; super pectus.

Id non ante faciendum putat Paulus, quam ubi iam immetatauerit mortuus: nam inchoante morbo, cataplasmata ex lini semine cum palmulis imponenda dicit.

## vomitus (ut Hippocrati, &amp;c.

Si quidem materia peccans in stomacho sit, vtilissimus erit vomitus; sin in intestinis eadem contineatur, nescio quàm erit ex usu: præsertim quando velleatione hellebori, plus offeceris, quam reuulsione in contrarium profeceris, quod & Hippocrates voluisse videtur, qui post veratri summptionem ventrem lacte cocto eluit. vide Hippocratem De affectibus, unde locum hunc mutuatus est Celsus.

## CAPVT



## CAPVT XVII.

*De Lumbricis aluum occupantibus.*

**N**ONNVNQVAM autem Lumbrici quoque occupant aluum, hiq̃ue modò ex inferioribus partibus, modò fœdus ore redduntur. Atque interdum latos eos, qui peiores sunt, interdum teretes videmus. Si lati sunt, aqua potui dari debet, in qua lupinum aut cortex mori decoctus sit, aut cui adiectum sit, contritum vel hyssopum, vel piperis acetabulum, vel scamoneæ paulum. Vel etiam pridie cum multum allium ederit, vomat. Posteroq̃ue die mali punici tenues radículas colligat, quantum manu comprehender, easq̃ue contusas in aquæ tribus sextariis decoquat, donec tertia pars supersit. Huc adiiciat nitri paulum, & ieiunus bibat. Interpositis deinde tribus horis, duas portionesumat, aut aquæ, vel muriæ duræ sic adiectæ, tum desidat subiecta calida aqua in pelui. Si verò teretes sunt, qui pueros maximè exercent, & eadem dari possunt, & quædam leuiora, vt contritum semen vrticæ, aut brassicæ, aut cumini cum aqua, vel mentha cum eadem, vel absinthium decoctum, vel hyssopum ex aqua mulsa, vel nasturtij semen cum aceto cõtritum. Edisse etiam & lupinũ, & allium prodest, vel malux oleum subter dedisse.

\* Huic

\* huic

\* in aluum

## ENARRATIO.

**Q**VVM res sint lumbricorum differentia, ascarides scilicet dicti, rotundi, & lati; Celsus duorum tantum, vti etiam Scribonius Largus, meminit: fortè quod indignum putauit, de ascaridibus quicquam scribere, quando iidem parui admodum sint, ac circa extremas intestinorum partes consistentes, nullumque noxium symptomata, præterquã in iisdem partibus pruritus inferentes. Hippocrates latos lumbricos infanibus in matris vtero nasci auctor est; neque verisimile esse, eosdem generari posse ab excrementorum putrefactione, posteaquam quotidie excernat, atque aluum expurget homo: ac proinde sicuti iudè in vtero materno consistente adhucdum infante parui

sunt, ita sensim eosdem auferere cum intestinis, adeò vt nonnunquam duorum cubitorum longitudine excernantur. Plinius xii. cubitorum longitudinis, latum lumbricum visum auctor est. Aetium latum lumbricum sic describit: Latum lumbricus est, si ita dicere libeat, permutatio pelliculæ intrinsecus remota intestina ambientis in corpus quoddam vinum, quod continuos stomachi morbus infert, & ad cibos incorrigibilem appetitum: Græci latos lumbricos *χελιδας* & *μενιδας* ad similitudinē fasciarum, & instigarum nominant; teretes autē *εγγυδους*.

& quædam leuiora.

IDEM testatur Galenus libro xiiii. Methodi.

GG 3

CAPVT.



## CAPVT XVIII.

## De τενεσμῶν intestinorum morbo.

EST autem aliud leuius omnibus proximis, de quibus supra dictum est, quod τενεσμῶν Græci vocant: id neque acutis, neque longis morbis annumerari debet, cum & facile toleratur, neque vnquam per se iugulet, in hoc æquè atque in torminibus frequens desidendi cupiditas est, æquè dolor vbi aliquid excernitur. Descendunt autem pituitæ, \* nuciſque similia, interdum etiam leuiter subcruenta: sed his interponuntur nonnunquam ex cibo quoque rectè \* coacta: desiderare oportet in aqua calida, sæpiusque \* ipsum manu nutrire, cui plura medicamenta idonea sunt, butyrum cum rosa, acacia ex aceto liquata, emplastrum id, quod τῆς ἀφάρμακον Græci vocant, rosa liquatum, alumen lana circumdatum, & \* ita appositum, eademque ex inferiore parte indita, quæ torminum auxilia sunt, \* eadem verbenæ decoctæ, vt inferiores partes foueantur, alternis verò diebus aqua, alternis \* leuè & austerum vinum bibendum est. Potio esse debet egelida & frigida: propior ratio victus talis, qualem in \* tormina supra præcepimus.

## ENARRATIO.

TENESMVM Plinius Tenasmm vocat: alij Tensionem dicere maluerunt: Græci priorem syllabam modò per τ, interim per ε scribunt. Est autem Tenesmus inferioris intestinorum partis, vt ait Alexander Trallianus, longanoniſque ipsius lenius malum; crebra videlicet, & inanis desidendi cupiditas, assiduus egerendi impetus. solet autem interdum dysenteria præcedere: nonnunquam verò & ipse solus paulatim generatus, desinit. Celsus interim dum omnibus antedictis lenius malum esse dicit, per tenesmum tantum inuelligisse videtur inuicem quendam ædematosum ante exulce-

rationem: nam quoties exulceratus est tenesmus, parui faciendus non est: solet enim interdum non minus molestia afferre, quam leuis dysenteria.

desidere oportet in aqua calida.

VIDENDVM tamen est num ad multitudinem stercoreum in cæco intestino retentionum causam suam referat desidendi cupiditas: nam tum quidem hisce medicamentis plus exacerbaueris quam iueris; quando ablato stercore statim compeſcatur morbus.

## CAPVT



## CAPVT XIX.

*De ventris fluxu & curatione.*

**L**EVIOR etiam dum recens deiectio est, vbi & liquida aluus, & sæpius quàm ex consuetudine fertur: atque interdum tolerabilis dolor est, interdum grauissimus, idque peius est: sed vno die fluere aluum sæpe pro valetudine est, atque etiam pluribus, dum febris absit, & intra septimum diem id conquiescat. Purgatur enim corpus, & quod intus læsurum erat vtiliter effunditur, verum spatium periculosum est. Interdum enim tormina, ac febriculas excitat, viresque consumit: primo die quiescere satis est, neque impetum ventris prohibere: si per se desit, balneo vti, paulum cibum capere: si mansit, abstinere non solum à cibo, sed etiam à potione. Postero die si nihilominus liquida aluus est, æquè conquiescere, paulum astringentis cibi sumere, tertio die in balneum ire, vehementer omnia præter ventrem perfricare, ad ignem lumbos, scapulasque admouere, cibis vti, sed ventrem contrahentibus, vino non \*multum meraco. Si postero quoque die fluat, plus edisse, sed vomere etiam ex toto, donec conquiescat. Contra sitim, fame, vomitu niti. Vix enim fieri potest, vt post hanc animaduersionem, aluus non contrahatur. Alia via est vbi velis suppressere, cœnare, deinde vomere, postero die in lecto conquiescere, vesperi vngi, sed leniter, deinde panis, circa selibram, ex vino amineo mero sumere, tum assum aliquid; maximeque auem, & postea vinum idem: bibere aqua pluuiali mistum, idque vsque ad quintum diem facere, iterumque vomere. Frigidam autem assidue potione esse debere, contra priores auctores Asclepiades affirmavit, & quidem quàm frigidissimam. Ego experimentis quenque in se credere debere existimo, calida potius an frigida vratur. Interdum autem euenit, vt id pluribus diebus neglectum; curari difficilius possit. A vomitu oportet incipere, deinde postero die vesperi, tepido \*loco vngi, cibum modicum assumere, vinum meracum quàm asperrium, imposi-  
tam;



Myrrhappia  
Plinius ab edo-  
re huius effe d-  
cit h. 15. ca. 15.

\*quando-  
cunque

\*pipere,  
quod ab h.  
c. est pulv.  
\*malico-  
rio

Potio quæ  
astringat.

tam super ventrem habere cum cerato rutam. In hoc autem affectu corporis, neque ambulatione, neque frictione opus est: vehiculo sedisse, vel magis etiam equo prodest. Neque enim vlla res magis intestina confirmat. Si verò etiam medicamentis utendum est, aptissimum est id quod ex pomis fit. Vindemiæ tempore in grande vas coniicienda sunt pira, atque mala siluestria: si ea non sunt, pira tarentina viridia, vel signina, mala scandiana vel amerina, myrrhappia, hisque adicienda sunt cotonea, & cum ipsis corticibus suis punica, sorba, & quibus magis utimur, etiam torminalia, sic ut hæc tertiam ollæ partem teneant, tum deinde ea musto implenda est, coquendumque id, donec omnia quæ indita sunt, liquata in unitatem quandam coëant. Id gustui non insuaue est, & quodocunque opus est, assumptum leuiter, sine vlla stomachi noxa ventrem tenet: duo aut tria cochlearia vno die sumpsisse, satis est. Alterum valentius genus est, myrti baccas legere, ex iis vinum exprimere, id decoquere, ut decima pars remaneat, eiusque cyathum sorbere. Tertium quod \*quandoque fieri potest, malum punicum excavare, exemptisque omnibus seminibus membranas, quæ inter ea fuerunt, iterum coniicere, tum infundere cruda ova, rudiculaque miscere, deinde malum ipsum super prunam imponere, quod dum humor intus est, non aduritur. Vbi siccum esse cœpit, remouere oportet, extractumque cochleari, quod intus est, edisse. Aliquibus adiectis maius momentum habet. Itaque etiam in piperatum coniicitur, misceturque cum sale, & \*pipere: est quid ex his edendum, est pulicula etiam cum qua paulum ex fauo vetere coctum sit, & lenticula cum \*malo corio cocta, rubique cacumina in aqua decocta, & ex oleo atque aceto assumpta, efficacia sunt, atque ea aqua, in qua vel palmula, vel malum cotoneum, vel arida sorba, vel rubi decocti sunt, potata. Quod genus significo, quoties potionem dandam esse dico, quæ astringat. Tritici quoque hemina in vino amineo austero decoquitur, idque triticum ieiuno, ac sitienti datur, superque id vinum id sorbetur, quod iure valentissimis medicamentis annumerari potest, atque etiam potui datur vinum



vinum ligninum, vel resinatum austerum, vel quodlibet austerum. Contunditurque cum corticibus, seminibusque suis punicum malum, vinoque tali miscetur, idque vel merum forbet aliquis, vel bibit mistum. Sed medicamenti uti, nisi in vehementibus malis, superuacuum est.

## ENARRATIO.

**FLUXIONEM** alui, ut auctor est Galenus Commento in secundum Epidemion, vocat Hippocrates, quoties sine tenesmo dysenteria, lienteria, deiciantur, & semper & assidue liquida excrementa; vel, ut ait auctor libri De definitionibus medicis, ventris fluxus nominatur, copiosior alui fluxus diuturna sine phlegmone & exulceratione.

sed vno die fluere.

**SIC** in Aphorismis Hippocrates, à pituita alba detenta, alui fluor superueniens agriitudinem tollit.

**Interdum enim tormina.**

**PUTA** si sincera biliosaque deiectione sit, bilis enim acrimonia facile afficiuntur roden- turque intestina: nam, ut septimo Aphorismorum Hippocrates, à cholero feces, aut deiectione sincera, dysenteria superueniens, malum.

ac febriculas.

**FEBRICITANT**, inquit Galenus VIII. Methodi medendi, nonnulli ex iis quos diarrhoea post cruditates male habet: quibus utique non minimè prouocatur febris ex de- fidendi frequentia: quod si etiam rosis & dolor, aut calor immodicus in ventre & in- testinis adsit, huic utique vel longè magis accessio febrilis increset.

**primo die quiescere.**

**NAM** qui stipticas portiones sumunt non perpurcato corpore, profluvium magis irritant: si quis tamen quietem qua motu priuatione fiat intelligere malit, id non absurdè fecerit: quando in omnibus fere fluxibus, quies, nisi fluxionem promouere velimus, conueniat: nam agitatione moueri corpora auctor est Hippocrates.

**balneo uti.**

**NON** quous, sed eo in quo qua poros aperiant decocta sunt, ut si quid humoris virulenti in corpore reliquum sit, his vaporatibus dissoluantur, atque ad exteriora trudentur: nam aliqui si astringens balneum sit, maximam noxam inferes, cutem coarsen- sando, & vapores materiamque ad interio- ra reuerendo.

**vino non multum meraco.**

**GALENUS** in virium tantum defectu vinum concedit, ac tum quidem austerum, ex aqua pluuiatili propinat: quanquam ubi ex intemperie frigida vitium obortum fue- rit, vino veteri facultatis calida exhibitio curare soleat: sicut frigida potu, in hoc Asclepiadem imitatus, si calida intemperies in- causa sit.

**vehiculo sedisse.**

**CAVENDUM** tamen est ne vehemen- ter fiat agitatio: nam siue ea vehiculo, siue epio fiat, ut consessorium quid habet, ita ventris fluore laborantibus inutilis erit: leuis contra, intestina ventremque roborabit.

**malo corio.**

Malicorio legitur.

**Contunditurque.**

**PLINIVS** Naturalis Historia xxiii. libro, ante furno torrendum dicit: Pun- cum, inquit, malum in olla noua operculo indito in furno tostum, & contritum, po- tumque in vino alium sistit. Dicit autem paulo ante, non quoduis, sed vinosum tan- tum accipiendum esse, quod alia fere stoma- cho nocua sint: nam dulcia, ait, inflationes pariunt, ac stomacho amica sunt.

HH

CAPVT



## CAP. V. XX.

*De vuluæ morbo, & curationibus.*

**E**x vulua quoque foeminis vehemens malum nascitur, proximeque ab stomacho vel afficitur hæc, vel corpus afficit. Interdum etiam sic exanimat, vt tanquam comitiali morbo prosternat. Distat tamen hic casus, eo quod neque oculi vertuntur, nec spumæ profluunt, nec nervi distenduntur: sopor tantum est, idque quibusdam foeminis crebro reuertens, perpetuum est. Vbi incidit, si satis virium est, sanguis missus adiuuat. Si parum est, cucurbitulæ tamen defigendæ sunt in inguinibus. Si diutius aut iacet, aut alioqui iacere consuevit, admouere oportet naribus extinctum ex lucerna linamentum, vel aliud ex iis quæ foedioris esse odoris retuli, quod mulierem excitet. Idemque aquæ frigida perfusio efficit, adiuuatque ruta contrita cum melle, vel ex cypriño ceratum, vel quodlibet calidum, & humidum cataplasma, naturalibus pubetenus impositum. Intra hæc etiam perficere coxas, & poplites oportet. Deinde vbi ad se redit, circuncidendum vinum est in totum annum, etiam si casus idem non reuertitur. Frictione quotidie vtendum totius quidem corporis, præcipue verò ventris & poplitum. Cibus ex mediâ materia dandus. Sinapi super imum ventrem, tertio quoque, aut quarto die imponendum, donec corpus rubeat. Si durities manet, mollire commodè videtur solanum in lac demissum, deinde contritum, & cera alba, atque medulla ceruina cum irino, aut seuum taurinum, vel caprinum cum rosa mistum. Dandum potui etiam vel castoreum est, vel git, vel anethum. Si parum pura est, purgatur iunco quadrato: si verò vulua exulcerata est, ceratum ex rosa fiet, & recens suilla adeps, & ex ouis album misceatur, idque apponatur, vel album ex ouo cum rosa mistum, adiecto, quo facilius consistat, contritæ rosæ puluere. Dolens verò ea sulphure suffumigari debet. At si purgatio nimia mulieri nocet, remedio sunt cucurbitulæ cute incisa, inguinibus, vel etiam

HH

HH

sub



sub mammis admotæ: si maligna purgatio est, subiicienda sunt \*coërcentia. Id faciunt etiam albæ oliuæ, & nigrum papauer cum melle assumptum, & gummicum trito semine apij liquatum, & cum cyatho passi datum. Præter hæc in omnibus \*vesicæ doloribus idoneæ potiones sunt, quæ ex odoribus fiunt, id est spica nardi, croco, cinnamomo, casia, similibusque. Idemque etiam decocta lentiscus præstat. Si tamen intolerabilis dolor est, & sanguis profluit, etiam sanguinis detractio apta est, aut certe coxis admotæ cucurbitulæ cute incisa. At cum vrina super potionum modum etiam sine dolore profluens, maciem, & periculum facit, si tenuis est, opus est exercitatione & frictione, maximeque in sole vel ad ignem. Balneum rarum esse debet, neque longa in eo mora, cibis comprimens. Vinum austerum meracum, per æstatem frigidum, per hyemem egelidum, sed tantum, quantum minimum sit. Infima aluus quoque vel ducenda, vel lacte purganda est. Si crassa vrina est, vehementior esse debet & exorcitatio, & frictio, longior in balneo mora: cibus opus est \*tenuibus. ris, vinum idem. In utroque morbo vitanda omnia sunt, quæ vrinam mouere consuerunt.

\*coërcentia.  
al. menses  
euocantia.

\*vulue

\*tenuibus.

## ENARRATIO.

**G**ALENVS De locis affectis sexto, multis dicit esse differentias suffocationis ad utero, vel pro causa efficiendi magnitudine, vel pro specierum quarundam variatione. Semper tamen inferne oritur vteri strangulatio: verum superna partes, & principales præsertim per consensum coëcuntur: nam ad cor per arterias, quas vocant carotidas, ad cerebrum, per spinæ membranas ac nervos, ad hepar, per venas affectio communicatur, viderique vterus velut ad supernas partes ascendisse.

vt. tamquam comitali.

MOYETVR enim morbus hic per circumcisions, sicut comitalis, idq; vulua repleta, aut seminali, aut alia mareva; aut si hæc intus computuerit. auctor est Aetius.

nec spumæ profluunt.

Id apud omnes in confesso est: quamquam apud Hippocratem libro De morbis mulieribus contrarium impletas: Nam ubi lenius habuerint, inquit, spumant.

Vbi incidit.

METHODVS medendi in hoc confit, vt reuellamus enaporationem à principibus partibus: quare si quando vires atque occasio permittant, vena circa malleolos secanda sunt. his tamen non inuiliores erunt scyæ seu cucurbitulæ femoribus affixæ, quod valide reuellant.

circumcidendum vi-

num est.

CVR in totum annum circumcidendum.

HH 2



dum vinum dicat, non video: nam quum attenuans & incidens victus ratio, modicumque exercitium, iisdem non inutile sit, nescio quomodo vinum quod pauciferum tenuiusque parium sit, non conueniat.

### Si duricies manet.

AETIVS emplastrum, aut episthema emolliens pectini applicandum dicit: caterrimū aut tale sit quod ex solano in lac demisso fieri docet Celsus. alij indicunt: ego certe nondum mollientem vim, aut dura resoluentem in solano comperire potui.

### At quum vrina.

HIPPOCRATES libro De morbis secundo, multitudine vrina rationem reddit: quam, etsi ad propositum nostrum parum faciat, non granabor ascribere. Multum vrinae emittitur, dicit, ubi caput nimium uocaluerit, quiescit enim in ipso pituita: liquefcens autē partim secedit ad naves, partim ad os, partim per venas quae ducunt ad pudendum. quum autem ad pudendum peruenit, mingit homo, & patitur quemadmodum ab stillicidio vrinae. Aetivus aliam causam addit, quae huic loco magis conue-

nit: nam posteaquam varias causas superfuitatis vrinae recensuisset, illud quoque addendum est, inquit, quod maxime fieri solet tam in colligatione totius corporis habitudinis, quam in mortificatione contentivae vivitū: quandoquidem ubi defatigata natura est, ob pessimam aliquam agilitudinis affectionem, virtus humorum contentiva, tanquam abiiceret illos dissolvit, ac modo per lotium, modo per sudorem, interdum etiam per ventrem excretionem facit. Quo fit, ut hic Pinzanum exemplar sequi malim, quod sine sudore profuens legit: neque enim posset natura viranque vacuationem ferre citra animi deliquij periculum: ita ut hic nihil alienius quam exercitium, ut quod sudorem provocaret, censendum sit.

### Infima alius quoque.

VARIANT hic exemplaria: alia siquidem infinita, alia infima legunt: verum vix legeris, obscurus admodum hic est; ita ut coniectandum omnino sit quid velit, atque opus quodammodo Oedipo aliquo sit, qui enigma solvat: nisi quis legendum dicat per infima alius: nam sic aliquo modo constabit sententia.

## CAPVT XXI.

### De nimia profusione seminis ex naturalibus.

EST etiam circa naturalia vitium, nimia profusio seminis, quod sine venere, sine nocturnis imaginibus sic fertur, ut interposito spatio tabe hominem consumat. In hoc affectu salutare sunt vehementes frictiones, perfusiones, natationesque quam frigidissima, neque cibi, nec potio, nisi frigida assumpta. Vitare autem oportet cruditates, omnia infantia, nihil ex his assumere, quae contrahere semen videntur, qualia sunt, siligo, simila, ova, alica, amyllum, omnis caro glutinosa, piper, cruce, bulbi, nucleipinci. Neque alienum est fovere inferiores partes, aqua decocta ex verbenis comprimentibus, ex iisdem aliqua cataplasmata imo ventri inguinibusque circumdare, praecipueque ex aceto, rutam vitare, etiam ne supinus obdormiat.

HH

ENAR-



## ENARRATIO.

QVAMVIS Aristoteles discrimen inter semen & genituram posuerit, ita ut genitura, maris semen dicatur; semen verò, mixtio geniturae & sanguinis menstrui; Celsus, sicut & Galenus, & alij, indifferenter seminis profusione dixit, quae Graecis *σποδοσία*: estq; multa, seu involuntaria, atque eadem assidua seminis excretio, cole haudquaquam extento; oriturque ex reitricis naturae facultatis imbecillitate, aut ex vasorum seminariorum tensione aut conuulsione.

praecipueque ex aceto  
rutam.

Id quàm sit verum, nescio: uales

enim ad comprimendum semen, non solum temperamento, sed tota ipsius substantia, licet calida sit ruta: eadem namque comesta semen coagulat & corrumpit, ut auctor est Aëlius. quod & confirmat libro VII. Simplicium Galenus: qui non solum semen, sed & Veneris appetentiam extinguere restatur. Verum ut Celsum nostrum aberrare vindicemus, immutatis distinctionibus locum hunc sic legemus: praecipueque ex aceto rutam, vitare & ne lupinus obdormiat. sic enim sententiam planam reddemus, quando supinus cubitus plurimum oblit, & ruta ex aceto perfusio plurimum prodest.

## CAPVT XXII.

*De coxarum morbis, & curationibus.*

SUPEREST ut ad extremas partes corporis veniam, quæ articulis inter se conferuntur. initium à coxis faciam. Harum ingens dolor esse consuevit. Isque hominem saepe debilitat, & quosdam non dimittit. Eoque id genus difficillimè curatur, quòd ferè post longos morbos vis pestifera huc se inclinat, quæ ut illas partes liberat, sic hanc ipsam quoque affectamprehendit. Fouendum primùm aqua calida est, deinde vtendum calidis cataplasmatibus. Maximè prodesse videtur aut cum hordeacea farina, aut cum ficu ex aqua decocta mistus capparis cortex concisus, vel lolij farina ex vino diluto cocta, & mista cum acida facie: quæ, quia refrigescunt, imponere coctum malagmata commodius est. Inulæ quoque radix contusa, & ex vino austero postea cocta, & latè super coxam imposita, inter valentissima auxilia est. Si ista non soluerunt, sale calido & humido vtendum est. Si ne sic quidem finitus dolor est, aut tumor ei accedit, incisa cute adinouendæ sunt cucurbitulæ, mouenda vrina. Aluus si compressa est, ducenda. Vltimum est, & in vereribus quoque morbis efficacissimum, tribus aut quatuor locis super coxam, cutem candentibus

\* alias

\* quæque  
refrigescunt,

HH 3

tibus



\*digeran-  
tur.

\*opitula-  
mur.

tibus ferramentis exulcerare. Sed frictione quoque utendum est, maximè in sole, & eodem die sæpius: quo facilius ea, quæ coadundo nocuerunt, \*dirigantur. Eaque, si nulla exulceratio est, etiam ipsis coxis, sicut & cæteris partibus adhibenda est. Cùm verò sæpe aliquid exulcerandum candenti ferramento sit, ut materia inutilis euocetur, illud perpetuum est, non ut primum fieri potest, huius generis vlcera sanare, sed ea trahere, donec id vitium, cui per hæc \*opitulantur, conquiescat.

### ENARRATIO.

CELSVS per Articulum, sicuti Græci per ἄρθρον, naturalem osium compositionem intelligit: quemadmodum & ipse Galeus libro De osibus facit. Si igitur crassus pituitosusque humor, in coxarum articulo concretus insideat, gravissimos excruciat dolores: atque qui ita affecti sunt, ischiadici, & coxendicium dolore vexati nominantur: Plinius enim articulum in quo ossis femoris caput cum osse coxendicis alligatur atque dearticulatur, coxendicem appellat.

quod ferè post longos.

SIC Hippocrates quarto Aphorismorum, longas febres per abscessus ad articulos interdum terminari auctor est.

incisa cute admovenda.

QUANQUAM omnes in hoc enim Celso conveniant; Hippocrates tamen libro De locis in homine, contrarium asserere videtur eo loco ubi dicit, Quam coxendicium morbus à fluxione fiat, cucurbitam medicam affigere oportet, & foras trahere, & non scarificando persuadere, & calefactoris medica-

mentis in potu exhibitis, intus calefacere, quo exitus fiat tum foras ad entem per cucurbitæ attractionem, tum intus ad ventrem per caliditatem.

Vltimum est.

HIPPOCRATES sexto Aphorismorum sub finem sectionis, Quibuscumque, inquit, à coxendicium dolore molestatis excidit coxa, & rursus incidit, iis mucosus supervenit: & quibuscumque coxendicium diuturno dolore molestatis excidit coxa, iis crux rutescit, & claudicant, si non urantur; vltione etenim humiditatis copia absumitur, atque exiccatur, & ligamenta solidiora efficiuntur. Et libro De affectionibus sic scribit: Si in unum aliquem locum incubuerit dolor, & constiterit, & medicamentis non fuerit exactus, vitio quocunque loco fuerit dolor, vitio autem crudo lino. Dioscorides stercore caprino servusfacto ad vltionem vititur, atque hac vltione summos coxendicium dolores, & qui quibusvis medicamentis rebelles sunt, persanandos post eum scribit Anylus.

### CAPVT XXIII.

De genuum doloribus, & cura.

COXIS proxima genua sunt, in quibus ipsis nonnunquam dolor esse consuevit. In eisdem autem cataplasmatibus, cucurbitulisque præsidium est, sicut etiam cùm in humeris



meris aliisve commissuris dolor aliquis exortus est. Equitare ei cui genua dolent, inimicissimum omnium est. Omnes autem eiusmodi dolores, ubi inueterauerunt, vix citra vstionem finiuntur.

## ENARRATIO.

**A**PARTIVS qua dolore vexantur, ferè omnium est remedium.

passiones he nomen sortita sunt: si qui-  
dem ἀπο τῆ ἰχθῖος, ἰχθῖας: ἀπὸ τῆς ἑλίας,  
ἑλῖας: ἢ διέκιναν; & si genia dolor in-  
festat, γένῃ γένῃ: si manus, χεῖρῃ γένῃ: & si  
maiores nervos tennerit dolor, πικρῶν γένῃ  
vocalur. Verum eisi pro loci affecti disci-  
mine varia sortiatur nomina affectio, idem

Equitare ei cui.

NON solum genu dolenti inimica est  
equitatio: sed & omnis articularibus mor-  
bis; quando certum sit ingem equitationem  
ischiadis, & podagræ causam frequenter  
fuisse.

## CAPVT XXIII.

*De articularum doloribus, in manibus, pedibusque.*

**I**N manibus pedibusque articularum vitia frequentiora, lon-  
gioraque sunt, quæ in podagris, chiragrisve esse consueue-  
runt. Ea rarò vel castratos, vel pueros ante fœminæ coitum,  
vel mulieres, nisi quibus menstrua suppressa sunt, tentant.  
Vbi sentiri cœperunt, sanguis mittendus est. Id enim inter  
initia statim factum, sæpe annuam, nonnunquam perpetuam  
valetudinem totam præstat. Quidam etiam cum asinino  
lotio, epoto se eluissent, in perpetuum hoc malum euase-  
runt. Quidam cum toto anno à vino, mulso, venere sibi tem-  
perassent, securitatem totius vitæ consecuti sunt. Idque uti-  
que post primum dolorem seruandum est, etiam si quieuit.  
Quod si iam consuetudo eius facta est, potest quidem aliquis  
esse securior his temporibus, quibus dolor se remisit. Maio-  
rem verò curam adhibere debent hi, quibus id reuertitur.  
Quod fere vere, autumnové fieri solet. Cum verò dolor non  
vrget, manu gestari debet, deinde ferri, inambulatione leui  
se dimouere: & si podagra est, interpositis temporibus exi-  
guis inuicem modò sedere, modò ingredi, tum antequam ci-  
bum capiat, sine balneo loco calido leuiter perfricari, sudare,  
perfundique aqua gelida, deinde cibum sumere ex mediâ mate-  
ria

\* bonam  
\* lacte



ria interpositis rebus urinam mouentibus, quotiesque plenior est, cuomere. Vbi dolor vehemens urget, interest sine tumore is sit, an tumor cum calore, an tumor iam etiam obcaluerit. Nam si tumor nullus est, calidis fomentis opus est. Aquam marinam, vel muriam duram ferue facere oportet, deinde in peluem conicere, & cum iam homo pati potest, pedes demittere, superque pallam dare, & vestimento tegere, paulatim deinde iuxta labrum ipsum ex eadem aqua leuiter infundere, ne calor intus destituat, ac deinde noctu cataplasmata calefacientia imponere, maximeque hibisci radicem ex vino coctam. Sin verò tumor calorque est, vttiliora sunt refrigerantia, recteque in aqua quam frigidissima articuli continentur: sed neque quotidie, neque diu fit, ne nerui \* lædantur. Imponendum verò est cataplasma quod refrigeret. Neque tamen \* in hoc ipso permanendum, sed ad ea transeundum, quæ sic reprimunt, vt emolliant. Si maior est dolor, papaueris cortices in vino coquendi, miscendi que cum cerato sunt, quod ex rosa factum sit. Vel ceræ & adipis suillæ tantundem vnà liquandum, deinde his vinum miscendum, atque vbi quod ex eo impositum est, incaluit, detrahendum, & subinde imponendum aliud est. Si verò tumores etiam obcaluerunt, & dolent, leuat spongia, quæ imposita subinde ex oleo, vel aceto, vel aqua frigida exprimitur, aut pari portione inter se mista, pix, cera, alumen. Sunt etiam plura idonea manibus, pedibusque malagmata. Quod si nihil superimponi patitur, id quod sine tumore est, fouere oportet spongia, quæ in aquam calidam demittatur, in qua vel papaueris cortex, vel cucumeris syluestris radix decocta sit, tum inducere articulis crocum cum succo papaueris, & ouillo lacte. At si tumor est, foueri quidem debet aqua \* calida, in qua lentiscus, verbena, aliæque ex reprimentibus decocta sint: induci verò medicamentum ex nucibus amaris cum aceto tritis, aut ex cerussa, cui contritæ herbæ muralis succus sit adiectus. Lapis etiam qui carnem exedit, quem *σαρκοφάγον* Græci vocant, excisus, sic vt pedes capiat, demissos eos cum dolent, tentosque ibi leuare consuevit. Ex quo in Asia lapidi Asio gratia

\* indure-  
scant.

\* in hoc  
quotidie  
perm.

\* gelida,



gratia est. Vbi dolor, & inflammatio se remiserunt, quod intra dies quadraginta fit, nisi vitium hominis accessit, modicis exercitationibus, abstinentia, vntionibus lenibus vtendum est: sic, vt etiam acopo vel liquido cerato cyprino articuli perfricentur. Equitare podagricis quoque alienum est. Quibus verò articulorum dolor certis temporibus reuertitur, hos antè & curioso victu cauere oportet, ne inutilis materia corpori supersit, & crebriore vomitu, & si quis ex corpore metus est, velalui ductione vti, vel lacte purgari. Quod Erasistratus in podagricis expulit, ne in inferiores partes factus cursus pedes replet; cum euident sit omni purgatione non superiora tantummodo, sed etiam inferiora exinaniri. Ex quocunque autem morbo quis inualefcit, si tardè confirmatur, <sup>\* conuale-</sup> vigilare prima læce debet, nihilominus in lecto conquiescere, <sup>fcit,</sup> circa tertiam horam leuiter vntis manibus corpus permulcere. Deinde delectationis causa (quantum iuuat) ambulare, circuncisa omni negotiosa cogitatione vel actione, tum gestari diu, multa friatione vti, loca, calum, cibos sæpe mutare. Vbi triduo, quātriduo ve vinum bibit, vno aut etiam altero die interponere aquam. Per hæc enim fiet, ne in vitia tabem inferentia incidat, & vt maturè vires suas recipiat. Cum ex toto verò conualuerit, periculose vitæ genus subito mutabit, & inordinatè aget. Paulatim ergo debet omittis his legibus, eò transire, vt arbitrio suo viuat.

## ENARRATIO.

HIPPOCRATES sectione sexta Aphorismorum Aphorismis XXVIII, XXXIX, & XL. Eunuchi neque podagra laborant, neque calui fiunt: & mulier podagra non afficitur, nisi menstrua deficiant; & puer podagra non laborat, antequā venere viatur.

Vbi sentiri cœperunt.

IDEM asserit Galenus libro De curatione per sanguinis missionem: cui suffragantur Paulus & Aëlius, & Trallianus; præsertim si sanguinis copia in causa sit: nam non solum a præsentī, sed & à iam instanti liberat morbo. At si acres & biliosi humores

in causa sint, phlebotomia alienius nihil esse potest, quum potius pharmaco leuiter ducente alium, vt auctor est Alexander, materia purganda sit; sic tamen, vt ante purgationē corpus humectantibus fluidum fiat, biliosiq; humoris acrimonia attemperetur. cum alimmo lacte.

ISCHIADICIS, id tunc exhiberi tradit Hippocrates libro De internis affectionibus.

Quidam cum toto anno.

COITVS, enim articulos, pedes, ac nervosas partes maxime laedit: sicut etiam vi-



nun, si immodicè sumatur; iis præsertim qui sanguine multo præditi sunt. auctor enim post Celsum nostrum Trallianus est, se multos nonisse, qui sola vini abstinentia, non amplius fuissent morbum experti.

### Quod ferè vere.

HIPPOCRATES sectione sexta, Aphorismo LV. Dolores podagrici vere & autumno maximè moventur; in vere quidem ex copia: nam vere mediocriter calido existente, materia per hyemem antea congesta fit effusio, & à validioribus partibus ad imbecillas, nempe pedes detruditur; ideoque minimè mirum, tum podagricos, & articulares morbos generari. Autumno verò reuertuntur, tum ex inæqualitate, tum ex qualitate humorum.

### maximeque hibisci radicem.

HIBISCVM, ut auctor est Plinius, libro xx. capite 1111. pasinaca simile est. quod & molochon agrian vocant, & aliqui pistolochiam. Vlcibus, cartilagini, ossibus fractis medetur. & in fine capitis locum hunc ex Celfo allegat: Celsus, inquit, podagricis qua sine tumore sunt, radicem eius in vino decoctam imponi inbet.

### recteque in aqua.

HIPPOCRATES sectionis quinta Aphorismo xxv. Tumores, inquit, articulorum sine ulcere, podagricos quoque dolores, & convulsiones: horum quidem plurima, aqua largè superfusa lenat, doloremque minuit ac soluit; stupor enim mediocris lenat.

### Quòd si nihil.

APPOSITE admodum dictum est, pro eo quòd si dolor adeò urgeat ut nihil superimponi patiat, ad ea quæ anodyna vocantur deveniendum est: hæc enim, nec temerè, nec quavis de causa in usum recipienda sunt; sed tum demum, quando dolor usque adeò vehemens est, ut laborans ferendo doleri amplius sufficere non possit.

### Lapis etiam qui carnem exedit.

Σαργόλιθος, & Asium dictum lapidem eundem esse puto; præsertim quando Galenus ab Asso oppido Asia, in quo potissimum invenitur, Asium lapidem per duplex s. nominatum dicat. atque id ut credam, facit auctoritas Plinij libro xx. capite xcvi qui ibidem sic scriptum reliquit: At circa Assum Troadis lapis nascitur, quo consumuntur omnia corpora; sarcophagus vocatur. & libro xxx. capite xvi11. Asius gustu salus, podagras lenit, pedibus in vasa ex eo canato inditus. Præterea omnia crurum vitia in iis lapidibus sanantur, quum in metallis omnibus crura vitientur. Ab hoc non discrepat Dioscorides, qui postquam ex Asio lapide cataplasma cum lomento fabarum podagricis utilissimum concinnari dixisset, statim subiungit, Podagrici iuvantur pedibus in folio ex eo lapide excavato inditis; sunt quoque ex eo loculi qui corpora erodunt.

### Vbi dolor & inflammatio.

HIPPOCRATES. libro De indicationibus, Quicumque podagrici morbi sunt, hi in xl. diebus ab inflammatione liberi sedantur. & sexto Aphorismorum, Quicumque podagrici morbi sunt, hi sedata inflammatione, in quadraginta diebus restituntur.

### Quibus verò articulorum dolor.

CVRIOSVM vitium appellat, non qui exquisitus, aut delicatus, verum qui fragilis ordinatusque, ut sic dicam, sit, & qui pro patientis habitu, summo studio atque cura præscriptus sit: nam sicui arthritici, carnosi, crassi, & pingues, extenuantem victus rationem requirunt; ita graciles gravissimè eadem offenduntur, quo fit ut diuretica in obesis, & pituitosa arthritide conveniant; in biliosa contra maximè aliena sint.

### AVRE-



A V R E L I I  
C O R N E L I I C E L S I  
D E  
R E M E D I C A  
L I B E R Q V I N T V S

A BALDVINO RONSSEO *Gandenſi, medico,*  
*Enarrationibus illustratus.*

P R O O E M I O N .



IXI de his malis corporis, quibus victus ratio maximè subuenit. Nunc tranſcūdum est ad eam medicinæ partem, quæ magis medicamentis \* purnat. His multum antiqui auctores tribuerunt, & Erasistratus, & hi qui se Empiricos nominauerunt, præcipuè tamen Herophilus, deductique ab illo viri, adeò vt nullum morbi genus, sine his curarent. Multaque etiam de facultatibus medicamentorum memoriæ prodiderunt, qualia sunt vel Zenonis, vel Andreæ, vel Apollonij, qui Mys cognominatus est. Horum autem vsum ex magna parte Asclepiades non sine causa sustulit: & cum omnia ferè medicamenta stomachum lædant, malique succi sint, ad ipsius victus rationem potiùs omnem curam suam tranſtulit. Verùm vt illud in plerisque morbis vtilius est, sic multa admodum corporibus nostris incidere consuerunt, quæ sine medicamentis ad sanitatem peruenire non possunt. Illud ante omnia scire conuenit, quòd omnes medicinæ partes ita \* innexæ sunt, vt ex toto separari non possint, sed ab eo nomen trahant, à quo plurimum petunt. Ergo vt illa quæ victu curat, aliquando medicamentum adhibet, & illa quæ præcipuè medicamentis \* purnat, adhibere etiam rationem victus



viſtus debet, quæ multum admodum in omnibus malis corporis proficit. Sed cùm omnia medicamenta proprias facultates habeant, ac ſæpe ſimplicia opitulentur, ſæpe miſta, non alienum videtur antè proponere & nomina, & vires, & miſturas eorum, quo minor ipſius curationis ex ſequentibus mora ſit.

## BALDVINI RONSSEI

## ENARRATIO.

Apollonij qui Mys.

**H**IC ab aliis Mix vocatur: conſcripſit libros De ſecta Herophili.

Herophilus.

HEROPHILVS hic inter maximos quondam habitus eſt medicos. tantum medicamentis tribuit, ut palam aſſereret medicamenta deorū eſſe munus: neque id abſque ratione, ut teſtatur Scribonius; nam proſus idem præſtant medicamenta, quod tactus diuinus efficere poteſt.

Horum autem vſum.

IDEM aſſerit Scribonius Largus in epi-

ſtola ad C. Iulium Calliſtum: Aſclepiades, inquit, febricitantibus, vitisſque præcipitibus correptis, quæ ὀζὺν & ἄλβη Graci dicunt, negavit medicamenta danda, quia cibo, vi-  
nōque apud dato interdum remediari intus eos exiſtimabat: ceterum libro qui παρασκευαστικὸν, id eſt Preparationum inſcribitur, contendit vltima ſortis eſſe medicum, qui non ad ſingula quæque vitia, binas ternasve compoſitiones, & expertas protinus paratas habeat. Idem de eodem teſtatur Plinius libro XXVI. capite III. ut libro ſecundo reuoluimus.

## CAPVT I.

De ſimplicibus facultatibus quaruncunque rerum, ex quibus medicamenta fiunt, & primò de his quæ ſanguinem ſupprimunt.

**S**ANGVINE M ſupprimunt, atramentum ſutorium, quod Græci χάλχαλον appellant, chalcitis, acacia, & ex aqua lycium, thus, aloë, gummi, plumbū combuſtum, porrū, herba ſanguinalis, creta vel cimolia vel \*figuralis, miſy, frigida aqua, vinum, acetum, alumen, melinum, ſquama & ferri, & æris, atque huius quoque duæ ſpecies ſunt, alia tantum æris, alia rubri æris.

ENAR-



## ENARRATIO.

**E**A quibus sanguis cohibetur, alia refrigerando, alia astringendo, alia glutinando, alia siccando, alia adurendo id efficiunt: Initium tamē à refrigerantibus, & astringentibus ducendū est; & ad extremum adhibenda adurentia sunt. Solet autem sanguis effluere, aut apertis, aut ruptis, aut exesivis vasis. apertis igitur astringentia; ruptis glutinantia; exesivis sarcotica & boni succi alimenta remedio sunt.

## CAPVT II.

*Quæ vulnus glutinent.*

**G**LV TINANT vulnus, myrrha, thus, gummi, præcipue: quæ acanthinum, psyllium, tragacantha, cardamomum, bulbi, lini semen, nasturtium, oui album, gluten, ichthycolla, vitis alba, contusæ cum testis suis cochleæ, mel coctum, sponsia vel ex aqua frigida, vel ex vino, vel ex aceto expressa, ex iisdem lana succida, si levis plaga est, etiam aranea: reprimunt alumen & scissile (quod *χυσδν* vocatur) & liquidum, melinum, auripigmentum, ærugo, chalcitis, atramentum, sutorium.

## ENARRATIO.

**G**LV TINANTIA Græci modò *καταληπτικὰ*, nunc *συνσπικτικὰ*, alias *στεγανωτικὰ* vocant: siccant omnia ad secundum ferè gradū, media ratione inter ea quæ cicatrice trahunt, & quæ carnem regenerant, non detergent, sed astringunt, prohibentq; ne quid humoris labris ulceris obueniat; nec in cruentis solummodò usurpant solent, sed & ad sinus, ad fistulas, maligna ulcera, verustaq; transferuntur: sunt autem huiusmodi, ut tertio Methodi medendi docet Galenus, ea quæ austera sunt atq; astringentia.

## CAPVT III.

*Quæ concoquant, & moveant pus.*

**C**ONCOQVUNT & mouent pus, nardum, myrrha, costus, balsamum, galbanum, propolis, styrax, thuris & fuligo & cortex, bitumen, pix, sulphur, resina, seuum, adeps, oleum.

## ENARRATIO.

**Q**UÆ pus mouent, quum similem temperiem habeant is temperaturis quæ naturales sunt, eorum substantiam inveri potius quàm immutare possunt; ergo in suppurationibus humiditas illa alteratur quidem, itēque si qua caro conuulsa est: at omnia



omnia quæ secundum naturam sunt, substantiam suam servant. tale igitur debet esse medicamentum quod ad pus movendum adhibetur, qualis est in naturis temperatis na-

tinus calor. quemadmodum enim alterationes, quæ secundum naturam ab innato calore sunt, à simili calore externo innantur; ita etiam in suppuracionibus usu venit.

## CAPVT IIII.

*Quæ aperiant vulnera.*

\* venarum  
ora  
\* quæ ἀνα-  
σταντικὰ  
Gr. dicun-  
tur,  
\* bdella,  
\* aminia

**V**\* **VLNERA** aperiunt tanquam ora in corporibus, \* quod ῥόμυς Græcè dicitur, cinnamomum, balsamum, panaces, iuncus quadratus, pulegium, flos albæ violæ, \* bdellium, galbanum, resina terebinthina, & pinea, propolis, oleum vetus, piper, pyrethrum, chamæpitys, vua \* taminia, sulphur, alumen, rutæ semen.

## ENARRATIO.

**Q**UÆ oscula venarum aperiunt, calida sunt non valdè, & crassarum partium; quæ etenim vehementer calefaciunt, urunt, & crustam inducunt: quare an piper, ut quod violenter calefaciat & siccet, & pyrethrum, aliæque id genus quæ adurentibus postea annumerat, rectè hic as-

scripserit, alij indicent: id tantum dicendum est, quod omnia exemplaria, meo quidem iudicio, perperam vulnera legant, quum potius vlcera legendum sit: quamvis auctor noster, Hippocratem imitatus, vulneris vocabulum cum ulcere confundat, ut ante annotavimus.

## CAPVT V.

*Quæ purgant.*

\* est san-  
daracha  
squama

\* hoc val.

\* vtique  
\* fel tauri-  
num, vit.

**P**URGANT, ærugo, auripigmentum, quod ἀρσενικὸν à Græcis nominatur. Huic autè & sandaracæ in omnia, eadem vis, sed validior \* est squama aris, pumex, iris, balsamum, styrax, thus, thuris cortex, resina & pinea, & terebinthina liquida, & nanthe, lacerti stercus, sanguis columbæ, & palumbi, & hirundinis, ammoniacum, bdellium, quod in omnia idem quod ammoniacum potest, sed \* valentius est, abrotanum, ficus arida, coccum gnidium, scobis eboris, omphacium, radícula, coagululum, sed maximè leporinum, cui eadem quæ cæteris coagululis facultas, sed \* vbique validior est, \* fel, vitellus crudus, cornu cæruinum, gluten taurinum, mel crudum, mity, chal-



fy, chalcitis, crocum, vua taminia, abrotanum, spuma ar-  
genti, galla, squama æris, lapis hæmatites, minium, costum,  
sulphur, pix, cruda, seuum, adeps, oleum, ruta, porrum, len-  
ticula, eruum.

## ENARRATIO.

**P**URGANTIA medicamenta Græci *ῥαγδα* vocant, debent au-  
tem eadem modicè detergere & siccare; de-  
tergenda enim sordes est, quæ corruptela  
corporis concrevit; exiccanda sanies humi-  
dumque recrementum, quod flatu natura  
lege ab alimento partis reliquum sit, aut  
alinde illabitur.

ammoniacum.

**B**ELLIVM valentius quidem est am-  
moniaco, verum an eadem purgent, alij vi-  
derint; ego ceridè molliendi discutiendique  
vi aded prædita esse comperi, ut scirrhus to-  
phusque discant.

coagulum.

**L**EPORINVM coagulum omnium est  
præstantissimum, ut quod comitiales liberes,  
sanguinem in ventre concretum dissipet ac  
dissoluat: in genere tamen omni coagulo vis  
est digerens acris ac deterforia.

seuum, adeps.

**A**N hæc purgantibus rectè annumerâ-  
rit, penes alios iudicium esto: ego, ut quod  
sentio libere proferam, à quodam assensu  
existimo.

## CAPVT VI.

*Quæ rodant.*

**R**ODVNT, alumen liquidum, sed magis rotundum, æru-  
go, chalcitis, misy, squama æris, sed magis rubri, æs com-  
bustum, sandaraca, minium Synopicum, galla, balsamum,  
myrrha, thuris cortex, galbanum, resina terebinthina humi-  
da, piper vtrunque, sed rotundum magis, cardamomum, au-  
ripigmentum, calx, nitrum, & spuma eius, apij semen, nar-  
cissi radix, omphacium, alcyonium, oleum ex amaris nuci-  
bus, allium, mel crudum, vinum, lentiscus, squama ferri,  
fel taurinum, scammonia, vua taminia, cinnamomum,  
styrax, cicuta semen, resina, narcissi semen, fel, nuces ama-  
ræ, oleumque earum, atramentum sutorium, chrysocola,  
veratrum, cinis.

## ENARRATIO.

**Q**UÆ rodunt, aut acris, aut amara,  
aut salsa, aut acerba sunt; aliæque  
aliàs id efficiunt: siquidem alia astringendo  
vellicant, alia salugine quadam rentiginem  
pronocant; sicuti alia acrimonia sua cutem  
penetrant, atque erosionis sensum faciunt.

*Cicuta*



## cicutæ semen.

NVLLO modo Cicutæ inter erodentia numerari potest. Nam quum frigidissima sit cicutæ, ut auctor est Galenus, nulla ratione semen inter rodentia collocari poterit; si tamen alicui pro cicutæ, cicutariam secundo ordine excalfacientem herbam substitinere placuerit, poterit vicinque con-

flare sententia: quanquam nemo myrrhidæ semen absolute rodens dixerit.

## oleumque carum.

NESCIO an sui per omnia bene memor Celsus breuissculo hoc capite recte oleum ex antæris pucillus bis bene inseruerit, quando id semel dixisse suffecisset.

## CAPVT VII.

*Quæ exedant corpus.*

EXEDVNT corpus, acaciæ succus, hebenus, ærugo, squama æris, chryfocolla, cinis Cyprius, nitrum, cadmia, spuma argenti, hypocistis, diphryges, sal, auripigmentum, sulphur, cicutæ, sandaraca, salamandra, alcyonium, æris flos, chalcitis, atramentum futorium, ochra, calx, acetum, galla, alumen, lac caprifisci, vel lactucæ marinæ, quæ tithymallos à Græcis nominatur, alcyonium, fel, thuris fuligo, spodium, lenticula, mel, oleæ folia, marrubium, lapis hæmatites, & Phrygius, & Asius, & scissilis, misy, vinum, acetum.

## ENARRATIO.

QVÆ corpus exedunt, *ἐκπνικὰ* vocant: hæc aliis paulo quam cathartica, quæ rodentia vocat Celsus, carnem subeunt; eandem tenellam adhuc tabesciunt, calore multo, nec ita crasso corpore.

cicutæ.

RVRVSM hic cicutam, nihil minus quam exedentem, ascriptis; sicuti etiam tu acetum, & alcyonium.

## CAPVT VIII.

*Quæ adurant.*

ADVRVNT, auripigmentum, atramentum futorium, chalcitis, misy, ærugo, calx, charta combusta, sal, squama æris, fex combusta, myrrha, stercus & lacerti, & columbæ, & palumbi, & hirundinis, piper, coccum Gnidium, allium, diphryges, lac vtrunque (quod proximo capite supra comprehensum



prehensum est) veratrum & album & nigrum, cantharides, corallium, pyrethrum, thus, salamandra, eruca, sandaraca, vua taminia, chrysocola, ochra, alumen scissile, ouillum stercus, œnanthe.

## ENARRATIO.

**S**VB adventibus cathartica & septica comprehendisse videtur; septa vocans quæ sine morbo exedunt.

myrrha, thus.

SECUNDI ordinis calefacientium, & primi tantum siccantium sunt, ut testatur Galenus: quo fit ut huic capiti non rectè accommodata dicamus.

corallium.

ET hoc quoque inter adventia malè

locant; quando, ut auctor est Dioscorides, astringat & refrigeret mediocriter: unde & excrecentia coercet, & cicatricem oculorum abstergit; atque ulcerum canitares atque cicatrices explet.

chrysocola.

GALENUS inter ea quæ carnem liquant, non tamen quæ vehementer mordicant, chrysocolam enumerat, quamquam sit facultate admodum digerente, exiccantique.

## CAPVT IX.

*Quæ crustas vlceribus inducant.*

**E**ADEM ferè crustas vlceribus tanquam igne adustis inducunt: sed præcipuè chalcitis, vti quæ si cocta est, flos æris, ærugo, auripigmentum, misy, & \* id, quod magis coctum. \* id quoq. m.

## ENARRATIO.

**Q**UÆ crustas inducunt, escharotica vocant: ea ex septorum genere ferè sunt: sed ut firmior contrahatur crusta,

aliquod ex acerbis metallicis admiscendum erit, quod sit crassa simul, & astringente potentia prædiatum.

## CAPVT X.

*Quæ crustas vlceribus resoluant.*

**C**RUSTAS verò has resoluit farina triticea cum ruta, vel porro, aut lenticula, cui mellis aliquid adiectum est.

KK

CAPVT



## CAPVT XI.

*Quæ discutiant ea, quæ in aliqua parte corporis coierunt.*

\* samp-  
sus Cy-  
pius.

**A**d discutienda verò ea, quæ in corporis parte aliqua coe-  
runt, maximè possunt, abrotanum, helenium, amara-  
cus, alba viola, mel, lilium, \* sampsus, cyperus, lac, fertula  
campana, serpyllum, cupressus, cedrus, iris, viola purpurea,  
narcissus, rosa, crocum, passum, iuncus quadratus, nardum,  
cinnamomum, casia, ammoniacum, cera, resina, vua tami-  
nia, spuma argenti, styrax, ficus arida, tragoriganus, lini &  
narcissi semen, bitumen, sordes ex gymnasio, pyrites lapis, aut  
molaris, crudus vitellus, amaræ nuces, sulphur.

## ENARRATIO.

Ad discutienda.

discussorium omnino ex aquosa substantia  
moderate calida, substituo.

**H**æc duorum generum sunt: alia  
enim leniora sunt, quæ æxiora  
dicuntur, suntq; media natura viciq; eo  
calore quem humiditas temperet; aliaque  
fortiora sunt quæ diapocnæ nominant;  
suntq; epispasticæ quodammodo vicina.

cedrus.

**C**EDRVS tertio ordine calefacit &  
exiccat; unde inter primi ordinis eroden-  
sium seu septicon rectius annumeramus.

cyperus.

ficus arida.

**C**YPERVS & iuncus quadratus  
idem sunt: quare quum paulo pōt iuncum  
quadratum repetat, pro cypero, cyprum,

ALIA glossos etiam sanquam discusso-  
rium medicamentum, caricis multo ineffica-  
ciores, ascribunt.

## CAPVT XII.

*Quæ euocent, & educant.*

**E**VOCAT & educit, ladanum, alumen rotundum, hebe-  
nus, lini semen, omphacium, fel, chalcitis, bdellium, re-  
sina terebinthina, & pinea, propolis, ficus arida decocta, ster-  
cus columbæ, pumex, farina lolij, croci in aqua cocti, elate-  
rium, lauri baccæ, nitrum, sal.

ENAR-



## ENARRATIO.

**Q**UÆ ENOCANT, calida ferè sunt & tenuis substantiæ; Græci ἰκταρίαν vocant. quare cur in hoc genere omphacium, facilitate planè contrarium (ut quod reprimat magis) posuerit; non possum satis mirari: nam quod de alumine subiungit, enim fortè sefellit Dioscori-

dis auctoritas, qui alumini etsi vim astrictionis attribuerit, idem tamen excoalsfacere dicit; unde suspicatus est mixte atque contraria simul esse facultatis, hoc est reprimentis, & enocantis, sicuti chalcitis: quæ etsi ita calefaciat ut & crassitas inducat, astrictionis tamen alicuius particeps est.

## CAPVT XIII.

*Quæ exasperata\* leuent.*

\* lanens.

**L**EVAT id quod exasperatum est, spodium, hebenus, gummi, oui album, lac tragacanthum. \* Læuat

## ENARRATIO.

NON omnino malè Pantinus rō leuant, in rō leuigant conuertendū censuit.

## CAPVT XIII.

*Quæ carnem nutriant, & vlcus impleant.*

**C**ARNEM alunt, & vlcus implent, resina pinea, \* ochra, actice, mel, asteriace, cera, butyrum.

\* ochra Attica, vel asterica, vel attice.

## ENARRATIO.

**M**EDICAMENTVM, ut auctor est Galenus tertio Methodi medendi, quod carni producenda sit aptum, primi ordinis tum siccantium, tum detergentium esse debet: nam quod super hunc fuerit, ita ut non modò humoris redundantiā consumat, sed etiam affluentem sanguinem populetur, id refici carnem ceu materiem eius absumens prohibebit: at quæ vlcera implent, sordes abstergunt, & humorem siccant; atque ita impedimenta tollunt, quæ carnem à natura creari non patiebantur.

ochra, actice, mel, asteriaca.

**S**UNT qui legendum putent ochra

attica, vel asterica: ego ochra Attica, circa distinctionem, legendum existimo, quod olim inter reliquas Attice ochra primus honos ascriberetur, si Dioscoridi & Plinio habenda fides est. Verum an rectè rō mel in distinctionem vel commutari nonnulli, nondum assequor; præsertim quando mel ad sordida vile sit vlcera, non solùm quod abstergat, sed & quod abscedentem carnem glutinet. si cui tamen distinctionem ponere libeat, ita ut per asteriacem, Lemnium sigillum intelligat (quod, licet non per omnia, saltem aliqua ex parte colore ochram exprimat) per me integrum est. Siquidem nisi pro asteriaca sphaeragida Lemnia intelligamus, ingenuè fateor me nondum legisse quid asteriacem

K K 2



asteriace sit : solebant enim varia in Lem-  
nio sigillis signa imprimere; nam modò ima-  
gine capre signabant, interim stella (unde  
olim *ἀστὴρ* appellabatur) aut alterius chins-

piam. Est autem Lemnium sigillum ad  
vulnera tam recentia, quam vetera &  
contumacia, & cicatrici inducenda utile;  
ut inter alios auctor est Galenus.

## CAPVT XV.

*Quæ molliant.*

\* erythria

\* Ribium

**M**OLLIVNT, æs combustum, terra \* cretria, nitrum, pa-  
paueris lacryma, ammoniacum, bdellium, cera, scuum,  
adeps, oleum, ficus arida, sesamum, sertula Campana, nar-  
cissi & radix & semen, rosa folia, coagulum, vitellus crudus,  
amaræ nuces, medulla omanis, \* stibi, pix, cochlea cocta, cicu-  
tæ semen, plumbi retrimmentum, *σικωρίαν μελύειν* Græci vo-  
cant, panaces, cardamomum, galbanum, resina, vua taminia,  
styrax, iris, balsamum, sordes ex gymnasio, sulphur, buty-  
rum, ruta.

## ENARRATIO.

**M**EDICAMENTA emollientia scir-  
rhus, ut auctor est Oribasius, multo  
calidiora esse debent quam temperata natura  
sit; non tamen tam vehementer calida; nam  
qua à lento crassoque humore indurato, aut  
congelato induruerunt, calefacientia siccant  
tâque medicamenta exposcunt; non tamen  
quæ valida violentâque sunt: sed satis est  
interim, ut secundi aut tertij sint ordinis  
excalefacientium, primi exiccantium. sa-  
cultas quoque emplastica in iis esse debet; sicuti  
& in eis quæ ad prius monendum adhibentur.  
Sed quo magis ad enacuandû pertinere de-  
bent, eò etiam minus meatui illi obstruere.

## papaueris lacryma.

**S**I, ut ex Oribasio retulimus, calida  
esse debent emollientia; mirum est, quare in  
eorundem catalogo, opium inseruerit Celsus;  
nisi quispiam, ut quod gustu amarum sit (si-  
cuti etiam inferre videtur doctissimus medi-  
cus Matthiolus Senerfis) temperie calidum  
esse dicas.

## rosæ folia.

**E**TSI mixta facultatis sit rosæ, astring-  
entis potius quam emollientis esse dixerò:  
nisi & hic quoque rosam pro rosaceo ac-  
cipias.

## CAPVT XVI.

*Quæ cutem purgent.*

**C**UTEM purgat mel, sed magis, si est cum galla, vel eruo,  
vel lenticula, vel marrubio, vel iride, vel ruta, vel nitro,  
vel ærugine.

## ENAR-



## ENARRATIO.

QUÆCUNQUE nitrosa sunt & amara, ea omnia meatum expurgato possunt; quæ verò tenuium partium sunt dulcia, extergent moderatè vicerum sordes, & totius cuticulæ.

si est cum galla.

GALLA nihil minùs quàm extergat acutem purgas, quum terij ordinis exiccantissimi, secundique frigescentissimi sit.

## CAPVT XVII.

De misturis simplicium rerum, & de ratione ponderum;  
& quid Malagma, & Emplastrum, &  
Pastillus inter se differant.

EXPOSITIS simplicibus facultatibus, dicendum est, quemadmodum misceantur, quæ ex iis fiant. Miscetur autem variè, neque huius ullus modus est, cum ex simplicibus alia demantur, alia adiciantur, iisdemque seruatis, ponderum ratio mutetur. Ita cum facultatum materia non ita multiplex sit, innumerabilia misturarum genera sunt, quæ comprehendi si possent, tamen esset superuacuum. Nam & iidem effectus intra paucas compositiones sunt, & mutare eas cuilibet (cognitis facultatibus) facile est. Itaque contentus iis ero, quas accepi velut nobilissimas. In hoc autem volumine eas explicabo, quæ vel desiderari in prioribus poterunt, vel ad eas curationes pertinent, quas protinus hic comprehendam, sic ut tamen quæ magis communia sunt, simul iungam. Si qua singulis, vel etiam paruis accommodata sunt, in ipsorum locum differam. Sed & antea sciri volo, in vncia pondus denariorum septem esse. Vnius deinde denarij pondus diuidi à me in sex partes, id est sex vncias, ut idem in vncia denarij habeam, quod Græci habent in eo, quem ὀβολὸν appellant. Id ad nostra pondera relatum paulo plus dimidio scrupulo facit. Malagmata verò, atque Emplastra, Pastilli que (quos ῥοχίσκους Græci vocant) cum plurima eadem habeant, differunt eò, quòd Malagmata maximè ex floribus, eorumque etiam surculis; Emplastra Pastilli que

\* quæque  
\* vnus  
\* similibus

\* Itaque

\* paucis

Vncia.  
Denarium.

KK 3

gis ex



gis ex quibusdam metallicis fiunt: deinde malaginata contusa abunde mollescunt: nam super integram cutem iniiciuntur. Laboriosè verò conteruntur ea, ex quibus emplastra pastilli que fiunt, ne lædant vulnera cum imposita sunt. Inter Emplastrum autem, & Pastillum hoc interest, quòd Emplastrum utique liquati aliquid accipit, in Pastillo tantum arida medicamenta aliquo humore iunguntur. Tum Emplastrum hoc modo fit, arida medicamenta per se teruntur, deinde mistis iis instillatur aut acetum, aut si quis alius non pinguis humor accessurus est, & ea rursus ex eo teruntur. Ea verò quæ liquari possunt, ad ignem simul liquantur, & si quid olei misceri debet, tum infunditur. Interdum etiam aridum aliquod ex oleo prius coquitur. Vbi facta sunt, quæ separatim fieri debuerunt, in vnum omnia miscentur. At pastilli hæc ratio est: Arida medicamenta contrita humore non pingui, aut vino, vel aceto coquuntur, & rursus cocta, inarescunt. Atque ubi utendum est, eiusdem generis humore diluuntur, tum Emplastrum imponitur, \* pastillus illinitur, aut alicui molliori, aut cerato miscetur.

## ENARRATIO.

Miscentur autem variè.

**M**ISCENDORVM medicamentorum rationem, copiosissimè tradiderunt veteres; eamque animadversionem obseruare consueuerunt, ut eis miscendis & componendis, euincens in laborantibus humores sequerentur, quo minus aliorum vico alios expellerent: cautione interim habita, ut si euacuatione opus esset, eosdem, quoad fieri posset, maxime iura molestiam euacuarant.

Vnius deinde denarij.

Locvs, hic, ut doctissime annotauit Ioannes Guinterius Andernacus, mendosè legitur, restituendusque in hunc modum est: Denarius à me diuiditur in sex partes, id est sextantes; ut idem in sextante habeam, quod Græci in eo quem ὀβολός appellant. Hic porro inter auctores magna controuersia est: siqui-

dem Plinius idem scribit esse Latinorum denarium, quod drachma apud Græcos est: idem faciunt Celsus & Scribonius, hi tamen auctores septem denarios in unciam mittere, ut videlicet LXXXIIII. duodecim uncias seu libram absoluant. Galenus autem aliquæ scriptores Græci, octo drachmas uncia attribunt, & xcvi libra. Iam verò Galenus quoties ex Scribonia medicamentum adducit, denarium semper drachma reddit; eisi hic Roma quoque, sicut & ille, professus fuerit. In eo conueniunt utrobique, & Latini & Græci, prout quod denarium, & drachmam continere sex oboles dicant. Hæc Guinterius.

Laboriosè verò.

QVASI dicat magno conari in tenuissimum polinem terenda; & summo labore quasi in uamos redigenda.

DE MA-



## DE MALAGMATIS.

## CAPVT XVIII.

*Malagma aduersus calidas podagras.*

**H**is cognitis, primū malagmata subiiciam, quæ ferè non sunt refrigerandi, sed calefaciendi causa reperta. Est tamen quod refrigerare \* possit, ad calidas podagras ap- \* potest, tum. Habet gallæ & immaturæ & alterius, coriandri seminis, cicutæ lacrymæ aridæ, gummi, singulorum plenum acetabulum, cerati cloti quod *πρωλευμένον* Græci vocant, felibram. Reliqua fere calefaciunt. Sed quædam digerunt materiam, quædam extrahunt, *ἐπιδιαιρέτικα* vocantur, pleraquæ certis magis partibus membrorum accommodata sunt.

## ENARRATIO.

**M**ALAGMATA vocant medici, ut auctor est Galenus, quæ partes supra induratas emolliunt; calido omnia temperamento mediocri prædita, non tamen exiccantia, quemadmodum nec manifestè humectantia: Nam quum exaltè malactica, medium quendam ordinem inter humectantia siccantiaque sortiantur, indurescentium substantia veluti fusionem quandam molliuntur. Sunt autem malagmata tres differentie: alia enim ex quibusdam succis, radicibus, inquam, herbis & seminibus fiunt; alia ex metallicis, aut iis quæ proportionè

metallis respondent; quanquam contrarium asserere videatur Celsus: nam quæ leni applicantur (ut auctor est Paulus ex Ægina medicus) constant calce vitæ, arripigmento, ærugine, cardamomo, ammoniaco, & aceto: alia ex succis, sebo, & lacrymis componuntur.

## Habet gallæ &amp; immaturæ.

**IMMATVRAM** gallam appellat eam, quam Dioscorides *omphacitæa* nominat.

*Malagma ad materiam extrahendam.*

**S**i materia extrahenda est, ut in hydropico, in lateris dolore, incipiente abscessu, in suppuratione quoque mediocri, aptum est id, quod habet resinæ aridæ, nitri, ammoniaci, galbani, singulorum pondo \*, ceræ pondo \*. Aut in quo hæc sunt, æruginis, rasæ, thuris, singulorum p. i. i. \*. aming-  
niaci



niaci salis p. vi. \*. squamæ æris, ceræ, singulorum p. viii. \*. resinæ aridæ p. \*. xii. \*. aceti cyathus. Idem præstat cumini farina cum struthio, & melle p. ii. \*.

## ENARRATIO.

Idem planè est quod ad Cleopphantem *que idcirco hoc quod auctor noster describit refert Galenus, nisi quodd loco ceræ, pro-* non ignavius.  
polii, & cyprinum acetumque accipiat; at-

*Malagma ad iecur dolens.*

Si iecur dolet, id in quo est balsami lacrymæ p. xii. \*. costi, cinnamomi, casia, corticis myrrhae, croci, iunci rotundi, balsami seminis, iridis illyricæ, cardamomi, amomi, nardi, singulorum p. xvi. \*. Quibus adiicitur nardinum virgulentum, donec cerati crassitudo sit, & huius quidem recentis usus est. Si verò servandum est, resinæ terebinthinæ p. xvi. \*. ceræ p. x. \* ex vino leni contunduntur, tum \* eo miscentur.

\* hac addititia.

## ENARRATIO.

MALAGMA hoc non solum ad iecur *aversantibus. Refertur autem ad Damocritum auctorem. Differt tamè nonnihil ab eo quod Galenus libro octavo Localium medicamentorum describit.*  
dolens utile est, verum etiam & ad omnes affectiones renum, coli, stomachi, & vulvae, sed neque incommodum est cachecticis, atrophis & hydropicis, cibumque

*Malagma ad lienem.*

At si lienis torquet, glandis (quam βαλενον Græci vocant) cortex & nitrum paribus portionibus contunduntur, respergunturque aceto quàm acerrimo. Vbi cerati crassitudinem habet, linteo antea in aqua frigida madefacto illinitur, & sic imponitur, supraque farina ordeacea iniicitur, sed *absumat.* manere ibi non amplius sex horis debet, ne lienem \* consumat. Satiusque est id bis, aut ter fieri. Commune autem & iocinori, & lieni, & abscessibus, & strumæ, parotidibus, articulis, calcibus quoque suppurantibus, aut aliter dolentibus, etiam concoctioni ventris, Lysias composuit ex hyssopi, panacis,



nacis, styracis, galbani, resinæ, singulorum p. ii. \*. ammoniaci, bdellij, ceræ, seui taurini, iridis aridæ p. \* i i i i. \*. cachryos \* i i. acetabulo, piperis granis quadraginta. Quæ contrita, irino vnguento temperantur.

## ENARRATIO.

VALENTIVS multo est quod ad lie-  
nos describit Scribonius Largus. reci-  
pit autem myrobalanorum \* p. l. Aphro-  
nitri \* p. xxx. capparis radice \* p. xx.  
cardamomi \* p. xxv. ammoniaci gutta  
\* p. xxx. ceræ p. sēlibram, olei irini p.  
sēlibram. Cera irino dissolvitur: quibus am-

moniacum aceto dilutum admiscetur, &  
postea quæ arida sunt miscentur.

Lysias composuit.

Si opopanaxum, sænugracum, anisum  
addideris, multo efficacius reddideris.

*Malagma ad laterum dolores.*

AD laterum autem dolores compositio est Apollophanis,  
in qua sunt resinæ terebinthinæ, thuris, fuliginis, singu-  
lorum p. i i i i. \*. bdellij, ammoniaci, iridis, seui vitulini, aut  
caprini à renibus \* sicci, singulorum p. i i i i. \*. Hæc autem  
eadem omnem dolorem leuant, dura emolliunt, mediocri-  
ter calefaciunt. Ad idem latus Andreæ quoque malagma  
est, quod etiam resoluit, educit humorem, pus maturat, vbi  
id maturum est, cutem rumpit, ad cicatricem perducit, pro-  
dest impositum minutis maioribusque abscessibus, item arti-  
culis, ideoque & coxis, & pedibus dolentibus: item si quid  
in corpore collisum est, reficit, præcordia quoque dura & in-  
flata emollit, ossa extrahit, ad omnia denique valet, quæ  
adiuuare calor potest. Id habet ceræ p. \* x i. \*. visci sycamini,  
quam aliàs sycomoron vocant, lacrymæ, singulorum p. \* i.  
\*. piperis & rotundi, & longi, \* ammoniaci, thymiamatis,  
bdellij, iridis illyricæ, cardamomi, amomi, xylobalsami, thu-  
ris masculi, myrrhæ, resinæ aridæ, singulorum p. x. \*. pyre-  
thri, cocci Gnidij, spumæ nitri, salis ammoniaci, aristolochiæ  
Creticæ, radice ex cucumere agresti, resinæ terebinthinæ li-  
quidæ, singulorum p. x x v. \*. Quibus adiicitur vnguenti iri-  
ni, quantum satis est ad ea mollienda, atque cogenda.

\*, visci,

\*, i.

\*, x i.

\*, ammo-  
niaci thy.

L L

ENAR-



## ENARRATIO.

Andreae quoque.

**D**ESCRIBIT isto operosius Andrea malagma, quod multis uile dicit Galenus libro De compositione medicamentorum extra per septimo: nam praeter simplicia quae hic enumerat Celsus, assypum, radicem hilibisi, gladioli radicem, capparis radicem, aloen, styracem, galbani adipemq; anserinum addit: praeterea ubi Celsus rotundum piper habet, ille album accipit:

adhac loco cucumeris agrestis, Galenus, meo quidem indicio, male sicut agrestes legere maluit. quare hic mouendus lector est, ut locum hunc Galeni corrigat, ac loco rotundus cucumeris restituat: parum enim lapsus fuit ubi rotundus, et assypum reddere. His accedit, quod male haecenus distincta fuerit Celsi lectio: siquidem post rotundus visci, comma apponendum; ut viscum quercinum, sicuti facit Galenus, intelligamus.

*Malagmata ad resoluenda quae adstricta sunt, & mollienda quae dura sunt, & digerenda quae coeunt.*

**P**RÆCIPVVM verò est ad resoluenda quae adstricta sunt, mollienda quae dura sunt, digerenda quae coeunt, id quod ad Polyarchum auctorem refertur. Habet iunci quadrati, cardamomi, thuris, fuliginis, amomi, ceræ, resinae liquidæ pares portiones.

*Aliud malagma ad eadem.*

**A**LIVD ad eadem Nilei, crocomagmatis (quod quasi recrementum eius est) p. i. i. i. \*. ammoniaci, thymiamatis, ceræ, singulorum p. x. x. \*. ex quibus duo priora ex aceto teruntur, cæra cum rosa liquatur, & tum omnia iunguntur.

## ENARRATIO.

*Aliud ad eadem.*

**G**ALENVS non solum ad prædicta, sed & ad præcordiorum dolores facere auctor est: Dissoluit, inquit, omnem duritiem, facit ad exarticulata, & luxata post

declinationem inflammationum positum: facit etiam splenicis & hepaticis. Variat tamen Galeni descriptio ab hac nostra: nam loco crocomagmatis, crocum habet; & in vicem rosacei, irinum substituit.

*Malagma Moschi ad molliendum.*

**P**ROPRIE etiam dura mollit id, quod Moschi esse dicitur. Habet galbani unciam, thuris fuliginis, P. \*. 3. ceræ, ammo-



ammoniacy, \* thymiamatis trientes, picis aridæ p. i i. \*. aceti \* dele di-  
heminas tres. *finæ.*

## ENARRATIO.

MOSCHIONIS legendum puto, cuius ne medicamentorum *extra jura mentio-*  
Galenus libro secundo De composi- *nem facit.*

*Malagma Medi ad digerenda quæ coëunt.*

FERTUR etiam ad digerenda quæ coëunt sub auctore  
Medo, quod habet ceræ p. 3. \*. panacis p. \*. semis, squa-  
mæ æris, aluminis rotundi, item scissilis, singulorum p. i.  
\*. plumbi combusti p. i. \*. & semis.

*Malagma Panthemi ad eadem.*

AD eadem Panthemus utebatur, calcis p. \*. semis, sina-  
pis contriti, item sceni Græci, aluminis, singulorum p. i.  
\*. seu bubuli p. i i. \*. & semis.

*Malagma ad strumas.*

AD strumam multa malagmata inuenio. Credo autem  
quo peius id malum est, minusque facile discutitur, co-  
plura esse tentata, quæ in personis variè responderunt. An-  
dreas auctor est, ut hæc misceantur, vrticæ seminis p. i. \*. pi-  
peris rotundi, bdellij, galbani, ammoniaci, thymiamatis, re-  
sinæ aridæ, singulorum p. i i i i. \*. resinæ liquidæ, ceræ, py-  
rethri, piperis longi, lactucæ marinæ, seminis sulphuris ig-  
nem non experti (quod *ἀπνεύ* vocatur) fecis \* aridæ, aceti, \* aridæ  
spumæ nitri, salis ammoniaci, sinapis, cardamomi, radicis cu-  
cumeris syluestris, resinæ, singulorum \* p. v i i i. \*. Quæ ex \* p. v.  
leni vino contunduntur.

*Aliud malagma ad idem valens.*

EXPEDITIVS ad idem fit, quod habet visci \* felini ster- \* aliar: semi-  
coris, resinæ, sulphuris ignem non experti pares portiones. nis, steico-  
Et in quo est sulphuris p. i. \*. lapidis, quem pyriten vocant ris. *Legen-*  
p. i i i i. \*. cumini acetabulum. Item in quo est lapidis eius- *dum fort. ssa*  
dem *vel caprim.*  
*et elixilli ex*  
*culeno de*  
*struma.*



dem pars vna, sulphuris duæ partes, resinæ terebinthinæ partes tres.

## ENARRATIO.

Expediuit ad idem.

POTES huc applicare Scribonij Largi <sup>enim, ut dicit, omnem futuram suppurationem dissipat, factam aperit: cuius de-</sup>  
malagma strumarum discussorium; id <sup>scriptionem habes apud eundem § CLXIII.</sup>

*Malagma ad strumam, & phymata.*

**A**RABIS autem cuiusdam est ad strumam, & orientia tubercula, quæ *φύματα* vocantur, quod hæc digerit. Habet myrrhæ, salis ammoniaci, thuris, resinæ & liquidæ & aridæ, crocomagmatis, ceræ, singulorum p. i. \*. lapidis eius, quem *πυρίτης* vocant, p. iiii. \*. quibus quidam adiiciunt sulphuris p. i. \*.

*Malagma ad strumam, & tubera, & carcinodas.*

**E**ST etiam proficiens in struma, & in his tuberibus, quæ difficulter concoquuntur, & in iis quæ carcinodæ vocantur, quod ex his constat: Sulphuris p. i. \*. nitri p. iiii. \*. myrrhæ p. v. \*. fuliginis thuris p. \*. semis, salis ammoniaci p. \*. iiii. ceræ p. i. \*.

*Malagma Protarchi ad parotidas, & fauim, & mala ulcera.*

**P**ROTARCHVS autem ad parotidas, eaque tubercula, quæ meliceriæ, id est, faui, vel phymata nominantur, item mala ulcera, pumicis, resinæ pineæ liquidæ, thuris fuliginis, spumæ nitri, iridis, singulorum p. vii. \*. cum ceræ p. ix. \*. miscebat, hisque olei cyathum & dimidium adiebat.

*Malagma, aduersus panum & phymata.*

**A**T aduersus panum, tum primùm orientem (quod *φύμα* Græci vocant) & omne tuberculum, quod phyma nominatur, miscetur ochra, quæ Attice nominatur, cum duabus partibus similæ, \* hisque contunditur, subinde mel instillatur, donec \* malagmatis crassitudo sit.

\* cum tunduntur,  
\* mellis

ENAR-



## ENARRATIO.

miscetur ochra.

**A**TTICAM ochram dicit, quod Attica, ut scribit Galenus, laudatissima sit: Attica autem ochra usus Virrunij tempore

in Italia planè exoleuerat. Habet autem vim astringendi, erodendi collectiones, & tubercula dissipandi: unde non inutiliter per se cum melle & similia ad orientem pannum applicari auctor noſter dicit.

*Malagma aduersus phymata.*

**D**ISCVTIT etiam omne tuberculum (quod phyma vocatur) id quod habet calcis, nitri spumæ, piperis rotundi, singulorum p. i. \*. galbani p. ii. \*. falis p. iiii. \*. quæ excipiuntur cerato ex rosâ facto.

*Malagma ad suppressum omne quod abscedit.*

**S**UPPRIMITQUE omne quod abscedit id, in quo est galbani, fabæ\* fræ, singulorum p. i. \*. myrrhæ, thuris, ex radice \* fixæ capparis corticis, singulorum p. iiii. \*. Satisque omnia abscedentia digerit, murex combustus, & bene contritus, aceto subinde adiecto.

## ENARRATIO.

*ad suppressum omne.*

**V**ENVSTE figuratèque dixit, ad suppressum; pro eo quod est, ad dissipandum, discutiendum, digerendumve; quod nimirum ea quæ dissi-

pantur, non secus atque ea quæ occultantur, ex oculis nostris enascuntur. atque quod sic intelligendum sit, tum simplicia ipsa testimonio sunt, tum ipsemet Celsus sub finem paragraphi satis demonstrat quum dicit, satisque omnia abscedentia digerit.

*Malagma ad sanguinem suppressum, & phymata.*

**A**T si \* satis sanguis subit, rectè imponitur quod aduersus \* plus phymata quoque potest. Constat ex his: bdellij, styra-<sup>fatis</sup> cis, ammoniaci, galbani, resinæ & aridæ & liquidæ pineæ. Item ex lentisci, thuris, iridis, singulorum p. ii. \*.

## ENARRATIO.

**V**ITIVM hoc apud Græcos ecchymoma, vel ecchymosis vocatur: id quidem circa initia, digerentibus nonnihil

ex astringentibus admisceri flagitat; si tamen perseverauerit malum, solis digerentibus opus habet.

LL 3

*Malagma*



*Malagma ad carcinodas, & phymata lenienda.*

**C**ARCINODÆ verò & phymata commodè his leniuntur: Galbani, visci, ammoniaci, resinæ terebinthinæ in singulis p. i. \*. seu taurini p. \*. semis, fecis combustæ quàm maxima portione, dum id siccius non faciat, quàm esse malagma oportet.

*Malagma ad liuorem faciei contusa.*

**Q**UOD si facie contusa liuor subcruentus est, hæc compositio nocte & die imposita tollit: Aristolochiæ, thapsiæ, singulorum p. ii. \*. bdellij, styracis, ammoniaci, thymiamatis, galbani, resinæ aridæ, & ex lentisco liquidæ, thuris masculi, iridis illyricæ, ceræ, singulorum p. iiii. \*. Item faba quoque imposita proficit.

*Malagmata \*stomachica ad aperiendum.*

\* ἀντιστο-  
μοτικά  
\* ἀντιστο-  
μικά

**S**VNT etiam quædam malagmata, quæ \* σωματικά Græci vocant, quoniam aperiendi vim habent. Quale est quod ex his constat, piperis longi, spumæ nitri, singulorum p. ii. \*. erisimi p. \*. iiii. quæ cum melle miscentur. Idoneaque etiam strumæ aperiendæ sunt eius generis. Vehementiusque ex his est id quod habet calcis p. iiii. \*. piperis grana sex, nitri, ceræ, singulorum p. x. \*. mellis p. \*. 3. olei heminam.

## ENARRATIO.

Sunt etiam.

**N**ESCIO qua ratione in hac significatione stomachica dicta malagmata usurpet: quando certum sit à parte affecta (nempe ore) cui accommodantur, stomachica

dicta, non solum malagmata, sed & reliqua medicamenta: siquidem, ut auctor est Galenus quinto Methodi, stomachica medicamenta dicta sunt, quod in assiduo oris usu sunt.

*Miconis malagma, ad resoluendum aperiendumque ac purgandum.*

**M**ICONIS quoque est quod resoluit, aperit, purgat. Habet alcyonium, sulphur, nitrum, puimicem, paribus portionibus, quibus tantum picis, & ceræ adicitur, ut fiat cerati crassitudo.

ENAR-



## ENARRATIO.

IOANNES Cesarini suis in Celsum annotationibus legendum existimat Myrtionis: cuius, ut scribit, in Plinio In-  
de frequens mentio est. facit tamen Plinius

Myconis cuiusdam medici, & alterius sta-  
tuarii mentionem. quo fit ut nihil hic im-  
mutandum censeam.

*Malagma ad ossa, & nervos.*

**A**D ossa autem Aristogenis, fit ex his: sulphuris p. i. \*. resinæ terebinthinæ, nitri spumæ, & ex scilla partis interioris, plumbi cloti, singulorum p. ii. \*. thuris, fuliginis p. viii. \*. ficus aridæ quàm pinguiissimæ, seu taurini, singulorum p. viii. \*. ceræ p. xi. \*. iridis Macedonicæ p. vi. \*. sesami fricti acetabulum, maximeque nervis, & articulis malagma conuenit.

*Malagma Euticlei ad articulos, & ad omnem dolorem.*

**I**GITUR Euticlei est, & ad articulos, & ad omnem dolorem, & ad vesicæ, & ad recenti cicatrice contractos articulos, quas ἀγκύλως Græci nominant, quod habet fuliginis thuris acetabulum, resinæ tantundem, galbani sine surculis scunciam, ammoniaci, bdellij, singulorum p. \*. 3. ceræ p. \*. semis. Aliud item fit, quod habet iridis, ammoniaci, galbani, nitri, singulorum p. xiiii. \*. resinæ liquidæ p. vi. \*. ceræ p. xvi. \*.

## ENARRATIO.

## Igitur Euticlei.

**I**STHOC parum differt ab eo quod cordiorum, thoracis & stomachi dolorem  
ad Amatbaonem refert Galenus ad præperusile.

*Malagma Sofagoræ ad dolores articulorum.*

**A**D dolores articulorum Sofagoræ: Plumbi combusti, papaueris lacrymæ, corticis hyoscyami, styracis, peucedani, seu resinæ, ceræ, pares portiones.

ENAR-



## ENARRATIO.

**I**STHOC, sicuti omnia etiam narco- ferendo impares videantur, in usum reci-  
tica, non nisi summa urgente necessita- piendum est.  
te, & ubi dolor ita excruciat, ut eidem suf-

*Chrysippi malagma, ad idem valens.*

**C**HYSIPPI, resinæ liquidæ, sandaracæ, piperis, singulo-  
rum p. x i i. \*. quibus ceræ paulum adiicitur.

\* Ctesiphon-  
tis

\* *Ctesiphontis malagma ad idem valens, & ad parotidas, &  
phymata, & strumam.*

**C**TESIPHONTIS, ceræ Creticæ, resinæ terebinthinæ,  
nitri quàm ruberrimi, singulorum p. \*. semis, olei cya-  
thi tres. Sed id nitrum antè per triduum instillata aqua teri-  
tur, & cum sextario eius incoquitur, donec omnis humor  
consumatur. Potest verò ea compositio etiam ad parotidas,  
phymata, strumam, omnemq. coitū humoris emolliendum.

## ENARRATIO.

Ctesiphontis, ceræ.

**V**IDE ne non Cleophrantæ legen- num mentio fit; & cuius Plinius libro Na-  
dum sit, cuius frequens apud Gale- turalis Historiæ xxvi. capite iiii. me-  
minit.

*Malagma ad articulos.*

**A**D articulos fici quoque aridi, partem nepetæ mistam,  
vel vuam taminiam sine seminibus cum pulegio rectè  
aliquis imponit.

## ENARRATIO.

**D**IOSCORIDES non cum nepeta, sed ex farina sœnigraci & aceto vires dicit.

*Malagma Aristoris, adversus podagras, & recentia  
phymata, & omnes dolores.*

\* chamæ-  
meli

**E**ADEM podagræ præsidio sunt. Sed ad eam fit Aristo-  
nis quoque, quod habet nardi, cinnamomi, casia, \* cha-  
mæleontis,



mæleontis, iunci rotundi, singulorum p. v i i i. \*. seu capri-  
ni ex irino liquati p. x x. \*. iridis p. i. \*. quæ in aceto quàm  
acerrimo iacere per x x. dies debet. Idem autem etiam re-  
centia phymata doloresque omnes discutit.

*\* Theofeni malagma, ad pedum dolores.*

*\* Theoni*

**A** T Theofenus ad pedum dolores, seu à renibus partem  
tertiam, salis partes duas miscebat, hisque membranu-  
lam illitam imponebat, tum superiniiciebat ammoniacum,  
thymiana in aceto liquatum.

*Numenij malagma, ad podagram, cæterosque  
articulos induratos.*

**A** T Numenius podagram, cæterosque articulos induratos  
hoc mollebat: abrotani, rosæ aridæ, papaveris lacrymæ,  
singulorum p. i i i. \*. resinæ terebinthinæ p. i i i i. \*. thuris,  
spumæ nitri, singulorum p. v i i i. \*. iridis, aristolochiæ, sin-  
gulorum p. x i i. \*. ceræ p. i i i. \*. quibus adicitur *\* cedricy-*  
thus vnus, olei laurini cyathi tres, olei acerbis sextarius. *\* cedrix*

*Dexij malagma, si quando callus in articulis increuit.*

**S** i quando autem in articulis callus increuit, Dexius do-  
cuit imponere, calcis p. i i i i. \*. cerusæ p. v i i i. \*. resinæ  
pinæ p. x x. \*. piperis grana p. x x. ceræ p. i i. \*. Quibus  
dum contunduntur, hemina vini lenis instillatur.

## DE E M P L A S T R I S.

### C A P V T XIX.

**E** x emplastris autem nulla maiorem vsum præstant, quàm  
quæ cruentis protinus vulneribus iniiciuntur, *Empy-  
ma* Græci vocant. Hæc enim reprimunt inflammationem (nisi  
magna viseam cogit) atque illius quoque impetum minuunt,  
tum glutinant vulnera, quæ id patiuntur, cicatricem iisdem  
inducunt. Constant autem ex medicamentis non pingui-  
bus, ideoque *\* alipenæ* nominantur. *\* aliparæ*

M M

E N A R.



## ENARRATIO.

## Ex emplastris.

**E**MPLASTRORVM nonnulla sunt vulneraria, quæ *ἰσχυρὰ*, quod cruentis iniiciantur; alia *ῥαψαῖα*, quod congelantur dicuntur; sicuti & *καταρυσματικὰ*, quod fracturis accommodantur, appellamus. Consilare autem ea oportet, ut auctor est *Ægineta*, ex siccentibus non summe, verum secundi ordinis absolute, & tertij incipien-

tiis: coqui autem debent quousque amplius manus non inquinant.

## ideoque alipenæ.

GVLIELMVS Pantinus rectè hic admonet legendum esse *ἀλινάριον*: sic enim apud Græcos vocari ea, quæ non habent oleum, pinguedinemque, aut eorundem parum admodum admixtum.

*Barbarum emplastrum nigrum, quod cruentis protinus vulneribus iniicitur.*

**O**PTIMUM ex iis est, quod Barbarum vocatur. Habet æruginis rasæ p. xii. \*. spumæ argenti p. xx. \*. aluminis, picis aridæ, resinæ pineæ aridæ, singulorum p. i. \*. quibus adiciuntur olei & aceti singulæ heminæ.

## ENARRATIO.

**H**OC emplastrum acceptum fert Scribonius Glycioni: quod idem paulo aliter describit. Galenus libro De medicamentis *ῥαψαῖα*, aliud *βλέφαρον*, ab hoc non

usque adeo discrepans, quod à plerisque nigrum vocari dicit, ad Heram Cappadocem refert: *Ægineta* ab his distinctum longè & operosius describit.

*Choacum emplastrum nigrum, ad idem valens.*

ῥαψαῖα

**A**LTERVM ad idem, quod *ῥόακον* vocant, habet spumæ argenti p. c. \*. resinæ aridæ tantundem. Sed spuma prius ex tribus olei heminis coquitur. His duobus emplastris color niger est, qui ferè talis fit ex pice atque resina. At ex bitumine nigerrimus: ex æruginis, aut æris squama viridis: ex minio ruber, ex cerussa albus.

## ENARRATIO.

**I**OANNES Casarius, Legendum, inquit, fortassis, choacum, aut chyacum, ut apud Georgium Vallam De cura oculi: nisi male, Coacum, quod inter Hippocratis

opera liber habeatur, qui de Pranotionibus Coacis inscribitur, unde & nomen deducum videri potest.

*Basilicon*



*Basilicon emplastrum nigrum ad idem.*

**P**AVCÆ admodum compositiones sunt, in quibus aliquid misturæ varietas nouat. Ergo id quoque nigrum est, quod Basilicon nominatur. Habet panacis p. i. \*. galbani p. ii. \*. picis & resinæ, singulorum p. x. \*. olei dimidium cyathum.

## ENARRATIO.

**Q**UOD ad Triphonem Basilicum refert Scribonius, parum ab hoc differt; nisi quod panacem omisit, cuius loco cypri-  
num oleum idem inserit.

*Smaragdinum emplastrum nigrum ad idem.*

**A**T quod peruiride est, smaragdinum appellatur, in quo sunt resinæ pineæ p. iii. \*. ceræ p. i. \*. æruginis p. \*. semis, thuris fuliginis p. ii. \*. olei tantundem, & aceti, quo fuligo & ærugo in vnum cogantur.

## ENARRATIO.

**S**MARAGDINUM hoc emplastrum differt tamen non nihil in ponderibus, ut cuius planum eris qui hoc nostrum smaragdinum, cum viridi Galli conferes.

*Emplastrum rufum ad idem.*

**E**ST etiam coloris fere rufi, quod celeriter ad cicatricem vulnera perducere videtur. Habet thuris p. i. \*. resinæ p. ii. \*. squamæ æris p. iii. \*. spumæ argenti p. xx. \*. ceræ p. c. \*. olei heminam.

## ENARRATIO.

**S**I galbanum adieceris, commodum & perusile emplastrum reddideris, ut autem in stirpe, & cetera vulnera mediocria.

*Παερακολλητικὸν emplastrum ad idem.*

**P**RÆTEREA est, quod παερακολλητικὸν à glutinando vocant. Constat ex his: Bituminis, aluminis scissilis p. iii. \*. spumæ argenti p. iii. \*. & olei veteris hemina.

MM 2

Cepha-



*Cephalicum emplastrum Philota capiti conveniens.*\* Ery-  
thrae\* ros. i. ro.  
sacei

PRÆTEREA sunt quædam generis eiusdem, quæ quia cap-  
pitibus fractis maximè conveniunt, Cephalica à Græcis  
nominantur. Philota compositio habet: Terræ \* cretræ,  
chalcitidis, singulorum p. iiii. \*. myrrhæ, æris combusti,  
singulorum p. x. \*. ichthyocollæ p. vi. \*. æruginis rasæ, alu-  
minis rotundi, misyos crudi, aristolochiæ, singulorū p. viii. \*.  
squamæ æris p. x x. \*. thuris masculi p. ii. \*. ceræ p. i. \*.  
\* rosæ, & olei acerbi, ternos cyathos, aceti quantum satis est,  
dum arida ex eo conteruntur.

## ENARRATIO.

Præterea sunt.

CAPITIS fracturatum quæ ad la-  
minam usque pervenerunt emplastra,  
cephalica dici consueverunt. Eorum virtus  
est, ut ossium squamas regenerent, nutri-  
menta in calvaria, & aliis corporis ossibus  
reducant: suntq; catagmaticis magna ex

parte acriora. Galenus ea magis probat quæ  
arida sunt: quale est id quod sexto Methodi  
Therapentica descripsit; ex iri llyrica, erui  
farina, manna, aristolochia rotunda, & pa-  
nacis radice. Vfus eorum est quoties ossa  
denudata fuerunt; denudatis enim ossibus  
pinguia malè conveniunt.

*Emplastrum viride ad idem valens.*

ALIVD ad idem viride, æris combusti, squamæ æris,  
myrrhæ, ichthyocollæ, singulorum p. vi. \*. misyos  
crudi, æruginis rasæ, aristolochiæ, aluminis rotundi, singulo-  
rum p. viii. \*. ceræ p. vii. \*. olei hemina, aceti quod satis sit.

## ENARRATIO.

GALENVS libro secundo De cōpositione medicamentorum *κεράειον*, ad Epigo-  
num ab hoc non prorsus dissimile, velatum  
emplastrum viride describit.

*Tetrapharmacum emplastrum, ad pus movendum.*

PURI autem movendo non aliud melius, quàm quod ex-  
peditissimum est, Tetrapharmacum à Græcis nominatur.  
Habet pares portiones ceræ, picis, resinæ, seu taurini, si id non  
est, vitulini.

ENAR-



## ENARRATIO.

**P**ER resuam hic colophoniam intelli-  
git: nam eam accipiendam docet Pan-  
lus in tetrapharmaco hoc emplastro, quod &  
basilicon vocari dicit. Scribonius resuam  
fructam esse vult, asseribitq; Aristo chirurgus.  
seui taurini.

TAVRINYM adipem dicit accipien-

dum, ut docet Galenus libro De simplicium  
medicamentorum facultatibus, quod media  
facultatis sit inter suillum & leoninum, ac  
proinde conveniat utrique medicamentorum  
generi; ei videlicet quod scirrhusis medetur,  
atque ei quod phlegmonas concoquat.

*Enneapharmacum emplastrum ad pus moriendum, & ad  
purgandum valens.*

**A**LTERVM ad idem Enneapharmacum nominatur, quod  
magis purgat. Constat ex nouem rebus, cera, melle, seuo,  
resina, myrrha, \*rosa, medulla vel ceruina, vel vitulina, vel bu-  
bula, \*hyssopo, butyro. Quorum ipsorum quoque pondera  
paria miscentur. Sunt autem quedam emplastra, quibus  
utriusque rei facultas est, \*quæ si singula habenda sunt, me-  
liora sunt. Sed in copia reiicienda sunt, his potius adhibitis,  
quæ propriè id, quod eo tempore opus est, consequuntur.  
Exempli causa duo proponam.

ros. i. ro-  
faceo  
\* æsypo

\* cui, si c.  
addenda  
sunt, dete-  
riora sunt,  
nec nisi  
cum vtra-  
que opus  
est, aut in  
singulis  
singulorū  
inopia,  
utendum  
venit. Sed

## ENARRATIO.

**N**ON dissimile huic enneapharmacum  
emplastrum describit Galenus libro De  
compositione medicamentorum secundum  
locos: constat autem ex mollis, cera alba,  
medulla ceruina, myrrha, butyri, adipis an-

serini, adipis vitulini, terebinthina, olei  
paribus portionibus. Ex quo constat hic pro  
resina, terebinthina esse accipiendam:  
pro hyssopo autem hic æsypum sub-  
stituere conuenit.

*Attalum emplastrum ad vulnera.*

**E**ST igitur ad vulnera Attalum, quod habet squamæ aris  
\* p. xvi. \*. fuliginis p. xv. \*. ammoniaci tantundem, re-  
sinæ terebinthinæ liquidæ p. xxv. \*. seui taurini tantundem,  
aceti heminas tres, olei sextarium.

\* p. vi.  
\* thuris  
ful.

*Iudei emplastrum, fracto capiti accommodatum.*

**A**T inter ea quæ fracto capiti accommodantur, habent  
quidam id quod ad auctorem Iudæum refertur. Con-  
stat ex iis, salis p. \*. iiii. squamæ aris rubri, aris combusti,

M M 3

singulo-



Curata  
• voca-  
mus, vel  
vocatur,

singulorum p. xii. \*. ammoniaci, thymiamatis, thuris fuliginis, resinæ aridæ, singulorum p. vi. \*. resinæ Colophoniacæ, ceræ, seu vitulini curati, singulorum p. xx. \*. aceti sesquicyathum, olei minus cyathum, *περὶ αὐτῶν* Græci appellant, quæ curata \* vocant, cum ex seuo, puta omnes membranulæ diligenter exemptæ sunt aut ex alio medicamento.

*Diadaphnidon emplastrum, ad extrahendum.*

Sunt etiam quædam emplastra nobilia ad extrahendum. Quæ ipsa quoque *ἐμαρυσινὰ* nominantur. Quale est, quod, quia lauri baccas habet, diadaphnidon appellatur. In eo est, resinæ terebinthinæ p. x. \*. nitri, ceræ, picis aridæ, baccarum lauri, singulorum p. xx. \*. olei paulum. Quoties aut baccam, aut nucem, aut simile aliquid posuero, scire oportebit, antequam expendatur, ei summam pelliculam esse demendam.

#### ENARRATIO.

Sunt etiam.

SIC Galenus malagmata διὰ δαφνιδίου, quod baccas lauri recipiant, libro De

compositione medicamentorum *κατὰ γὰρ* describit: quæ facultate ab hoc Celsi diadaphnidon emplastro parum discrepant.

*Aliud diadaphnidon ad extrahendum,  
& pus mouendum.*

ALIUD eo nomine, quod puri quoque mouendo est: Seui vitulini, ammoniaci, thymiamatis, picis, ceræ, nitri, baccarum lauri, resinæ aridæ, aristolochiæ, pyrethri pares portiones.

*Philocratis emplastrum ad extrahendum,  
& pus mouendum.*

PRÆTER has, est Philocratis, quod habet salis ammoniaci p. vii. \*. aristolochiæ p. viii. \*. ceræ, resinæ terebinthinæ, fuliginis thuris, singulorum p. xv. \*. spumæ argenti \* p. lii. \*. Quibus ut pus quoque moucant, iridis p. iiii. \*. & galbani p. vi. \*. adiciuntur.

*Rhypodes*



*Rhypodes emplastrum, ad extrahendum.*

**O**PTIMUM tamen ad extrahendum est id quod à similitudine sordium *ῥυπώδες* Græci appellant. Habet myrrhæ, croci, iridis, propolis, bdellii, capitulorum punici mali, aluminis & scissilis & rotundi, misyos, chalcitis, atramenti sutorij cocti, panacis, salis ammoniaci, visci, singulorum p. iiii. \*. aristolochiæ p. viii. \*. squamæ æris p. xvi. \*. resinæ terebinthinæ p. lxxv. \*. ceræ, & seui vel taurini, vel hircini p. c. \*.

## ENARRATIO.

Optimum tamen.

**N**ON omnino malè *εἴτῃνος* intelligi autem *εἴτῃνος*, ut ait Aetius, flores mali punici qui floribus anemones similes sunt. auctor est ex Galeno Pantinus. Sunt

*Emplastrum Hecatæi ad extrahendum.*

**H**ECATÆO quoque auctore emplastrum generis eiusdem sit ex iis, galbani p. ii. \*. fuliginis thuris p. iiii. \*. picis p. vi. \*. ceræ, & resinæ terebinthinæ, singulorū p. viii. \*. quibus paulum irini vnguenti miscetur.

*Alexandrinum emplastrum viride, ad extrahendum.*

**V**ALENSQVE ad idem emplastrum viride Alexandrinum est. Habet aluminis scissilis p. viii. salis ammoniaci p. \*. viii. 3. squamæ æris p. xvi. \*. myrrhæ, thuris sing. p. xviii. \*. ceræ p. cl. \*. resinæ Colophoniacæ, aut pineæ \* p. cxc. \*. olei heminam, aceti sextarium.

## ENARRATIO.

Valensque ad idem.

**E**x Andromacho ad Pasionem relatum *emplastrum viride* describit Galenus libro secundo De compos. medicis secundum genera: quod ab hoc non discrepat: nisi quod Celsus myrrham addiderit; Pasion autem arginens & as combustum loco eius posuerit; quod & Galenus non solum extrahere, sed & digerere auctor est.

De ens-



*De emplastris exedentibus.*

**Q**UÆDAM autem sunt emplastra exedentia, quæ *omnina* Græci vocant, quale est id quod habet resinæ terebinthinæ, \* fuliginis thuris, singulorum p. \*. 3. squamæ æris p. i. \*. ladani p. ii. \*. aluminis tantundem, spumæ argenti p. iii. \*.

\* hic & supra sape fuliginem pro pollicis posuit.

*Emplastrum quod exest corpus, & ossa resoluit, & supercrescentem carnem coercet.*

**E**XEST etiam vehementer corpus, atque ossa quoque resoluit, & supercrescentem carnem coercet, id quod habet spumæ argenti, squamæ æris, vncias singulas, nitri ignem non experti, lapidis Asij, aristolochiæ p. sextantes, ceræ, resinæ terebinthinæ, thuris, olei veteris, atramenti sutorij, salis ammoniaci p. semis, æruginis rasæ p. bessem, aceti \* stillitici heminam, vini aminei tantundem.

\* stilliticiij, al. scilicet.

*Emplastra aduersus morsus, & alia recentiora vulnera.*

**S**VNT etiam aduersus morsus quædam accommodata, quale est Diogenis nigrum, quod habet bituminis, ceræ, resinæ pineæ aridæ, singulorum p. xx. \*. spumæ argenti p. c. \*. olei sextarium. Aut in quo sunt squamæ æris p. iii. \*. cerussæ, & æruginis \* rasæ, singulorum p. viii. \*. ammoniaci p. xii. ceræ, resinæ pineæ, singulorum p. xxv. \*. spumæ argenti, p. c. \*. olei sextarium. Aut in quo sunt squamæ æris p. xiiii. \*. galbani p. vi. \*. cerussæ, & æruginis rasæ, singulorum p. viii. \*. ammoniaci p. xii. ceræ, resinæ pineæ, singulorum. \* p. lv. \*. ex quibus spuma argenti concoquitur.

\* passæ,

\* p. xlv. al. p. xxxv.

*Ephesium emplastrum rubrum, ad idem valens.*

\* Etheu

**R**UBRUM quoque emplastrum, quod Ephesium vocatur, huc aptum est. Habet resinæ terebinthinæ p. ii. \*. galbani p. \*. iii. minij sinopici p. vi. thuris fuliginis p. vi. \*. ceræ



cerae p. viii. \*. spumae argenti \* p. lvi. \*. olei veteris heminam. \*xlvi.  
al. xxxvi.

## ENARRATIO.

Rubrum quoque.

**V**ARIANT hic exemplaria: siquidem alia Ephesium, ab Epheso civitate legunt: ego Ethesiū dicere malim: de quo Hermolaus Barbarus in suis Corollaris ca-

pite lxxxvii. Galenus Halieno cuiusdam emplastri huius descriptionem assignare videtur: discrepat tamen ab hoc Celsi Ethesio, quod mannā prater alia ingredientia recipiat.

*Aliud emplastrum ad idem valens.*

**I**TEM id quod ex iis constat, squamæ aris, thuris fuliginis, singulorum p. iiii. \*. galbani p. vi. \*. salis ammoniaci p. \*. xii. 3. cerae p. xxv. \*. olei tribus heminis. Hæc autem aliis quoque recentioribus vulneribus rectè imponuntur.

*Alia emplastra non grauibz vulneribus accommodata, & maxime senilibz.*

**S**UNT enim alba lenia, ἄλκα Græci vocant, ferè non grauibz vulneribus accommodata, præcipueque senilibz. Quale est quod habet cerussæ \* p. lii. \*. seu vitulini curati, \*p. xxxii. & cerae, singulorum p. \* lviii. \*. olei heminas tres, ex quibz cerussa concoquitur. \*xlvi.

## ENARRATIO.

Sunt enim alba.

**H**oc non ignotum, nec omnino distimile, describit Scribonius, quod album vocat, ad contusa & perfriones utile: Recipit autem cerussæ p. lib. olei myrtini p. lib.

spuma argentea \* p. xxiiii. cere pontica p. lib. Cerussa, inquit, & spuma argentea decoquantur donec coeant; postea additur cera.

*Elephantinum emplastrum.*

**A**LIVD quod habet cerussæ p. xx. \*. cerae p. lv. \*. olei heminam, aquæ sextarium. Quæ quoties adiiciuntur cerussæ, vel spumæ argenti, scire licet illa ex his coquenda esse. Est autem ea percandida compositio, quæ supra posita est, ideoque elephantina nominatur. \*p. xxxv.

NN

ENAR-



## ENARRATIO.

**E**MPLASTRUM hoc tantum blandissimum est, & adhaerendo pertinax, refrigeratorium vim mediocrem obtinet; cuius auxilio exulceratis partibus ne quid influat impedit, & iam influxum denuo ad partes extimas retrudit.

*Lenia emplastra.*

**L**ENIA quoque quaedam emplastra sunt, quas λιπαράς ferè Græci nominant, ut id quod habet minij p. iiii. \*. spumæ argenti p. xxv. \*. ceræ, & adipis suillæ, singulorum p. xxvii. vitellos quatuor.

## ENARRATIO.

Λιπαράς Græca dictio est, idem significans quod pinguis, deducta à λίπος, quæ oleum, adipem, unguenque omne Græci significant; unde λιπαρά lenia dicuntur emplastra, quod cera, adips, oleum, resina, aut plura ex his simul misceantur.

*Emplastrum lenie.*

\* p. viii. **A**LIA compositio generis eiusdem, ceræ, resinæ terebinthinæ, singulorum p. vi. \*. cerussæ \* p. vi. \*. spumæ argenti, plumbi recrementi, scorian molybdi Græci vocant, singulorum p. xx. cicini olei, & myrti singulorum heminæ.

*Archagathi emplastrum lenie.*

**T**ERTIA, quæ ad auctorem Archagathum refertur, mysos cocti, æris combusti, singulorum p. iiii. \*. cerussæ coctæ p. viii. \*. resinæ terebinth. p. x. \*. spumæ argenti p. vi. \*.

## ENARRATIO.

Tertia quæ ad.

**Q**UAM hic ad Archagathum liparam refert, imperfecta quodammodo est, ut ex Scribonio Largo constat: siquidem is liparam ruffam describit, ad ani fissuras diuitinas quas εἰσόδους nominant, & ad eiusdem partis exulcerationes, & ad vitia diuitina non inutilem, quæ ab Archagathi emplastro hoc nihil differt, nisi quod aquam,

oleum myricum, & ceram auctor noster omiserit. sic autem habet Largi descriptio: Spuma argentea \* p° x x x v i. cerussa \* p° v i. mysos \* p° v i. chalcitidos vitæ \* p° v i. resina terebinthina \* p° x i i. cera \* p° v i. olei myrti sextarios S. i i. aque pon. sextans: cum aqua teruntur quæ primò posita sunt, & olei pondò dimidio, cum reliquo oleo, cera & terebinthina liquesacta mortario superfunduntur.

*Emplastra*



*Emplastra eiusdem generis ad leniendum apta.*

**E**TIAMNUM generis eiusdem, spumæ argenti, ceræ, adipis suillæ, singulorum p. xxvii. \*. vitelli cocti quatuor, \* rosæ hemina. Aut cerati ex oleo myrteo facti partes tres, \* ros. i. ro-  
adipis suillæ pars quarta, paulum ex plumbi recremento. Aut <sup>sacæ</sup> spumæ argenti selibra, ex olei hemina, & aquæ marinæ altera, cocta donec bullire desierit, cui paulum ceræ sit adiectum, aut pares portiones ceræ, seui, stibi, spumæ argenti, cerussæ.

## ENARRATIO.

**E**MPLASTRUM hoc ambustis mirificè. <sup>protinus enim impositum mitigat, postea sol-</sup> proderit, ut docet Scribonius: qui quum <sup>lit dolorem, statimque infinita celeritate per-</sup> multis usus fuerit, nullum magis probavit; sanat.

## CAPUT XX.

*De pastillis, & primò de his qui ad recentia vulnera glutinanda, sanandaque apti sunt.*

**P**ASTILLI quoque facultates diuersas habent. Sunt enim ad recentia vulnera glutinanda, sanandaque apti. Qualis est qui habet \* chalcitis, misyos, spumæ nitri, floris æris, gal-  
læ, aluminis scissilis modicè cocti, sing. p. i. \*. æris combusti, <sup>\* chalciteos,</sup> capitulorum mali punici, singulorum p. iiii. \*. Hunc oportet diluere aceto, \* sic ubi vulnus glutinandum est, illinere. \* ac ubi  
At si neruosus aut musculosus is locus est, commodius est cerato miscere, sic ut illius octo partes, nona huius sit.

## ENARRATIO.

**P**ASTILLORVM tria sunt genera: quorum unum potius datur, alteri in aluum iniicitur, tertiumque illitionibus seruit: Cel-  
<sup>his hoc loco tantum de his quæ illinuntur meminis.</sup>

*Alius pastillus ad glutinanda vulnera.*

**A**LIVS ad idem constat ex his, bituminis, aluminis scissilis, singul. p. i. \*. æris combusti p. iiii. \*. spumæ argenti p. xi. \*. olei sextario.

NN 2

De sphra-



\* Polydas

*De sphragide pastillo, quem Polybus confecit ad  
glutinandum vulnus.*

\* Polydas

**S**ED longè Polybi celeberrimus est, Sphragis autem nominatur, qui habet aluminis scissilis p. \*. i. 3. atramenti sutorij p. ii. \*. myrrhæ p. v. \*. aloës tantundem, capitulorum punici mali, fellis taurini, singulorum p. vi. \*. Quæ contrita vino austero excipiuntur.

## ENARRATIO.

Sed longè Polybi.

**I**OANNES CASARIUS hic veterem lecti-  
onem approbat; idg. auctoritate tum Ari-  
stotelis, tum Galeni, qui inter veteres me-  
dicos Polybium recensuerunt. Mihi tamen  
(sicut & ante nos Pantino quoque) Po-  
lydæ sphragis potius legendum videtur;  
idg. auctoritate Galeni, & Pauli Æginetæ:  
siquidem Polydæ sphragidem sic describit:

Aluminis scissi \* p° IIII. myrrha \* p° VIII.  
atramenti sutorij \* p° i. floris salviae pu-  
nicæ \* p° XII. fellis taurini \* p° VI. aliq.  
XVI. aloës uncia, vino excipiuntur austeros  
Galenus addit thuris \* p° IIII. duasque  
huius pastilli descriptiones habet: quarum  
priorem quæ hinc nostra magis consona est,  
vino dulci excipit; posteriorem austero, sicut  
& Celsus.

*Pastillus ad ulcera sordida, & nigritiem in auribus, naribus,  
& in obscenis partibus, inflammationesq. eorum.*

**A**D ulcera sordida, & nigritiem in auribus, naribus, ob-  
scenis partibus, inflammationesque eorum: Chryso-  
colla p. i. \*. atramenti sutorij, aluminis scissilis, sing. p. ii. \*.  
halicacabi corticis p. IIII. \*. minij p. vi. \*. spumæ argenti  
p. XII. \*. cerussæ p. XVI. \*. Quæ ex aceto & coguntur, &  
vbi utendum est, diluuntur.

## ENARRATIO.

**H**VIC omnino consonum pastillum scribit; nisi quod sarcocollam omittat.  
quem dihalicacaton vocat, Paulus de-

*Pastillus Andronis ad vnam inflammatam, ad naturalia  
sordida, etiam cancro laborantia.*

**A**NDRONIS verò est ad vnam inflammatam, ad natu-  
ralia sordida etiam cancro laborantia: Gallæ, atramenti  
sutorij,



futorij, myrrhæ, singulorum \* p. i. \*. aristolochiæ, aluminis \* p. ii. scissilis, singulorum p. ii. \*. capitulorum punici mali p. xxv. \*. ex passo coactorum, & (cùm vñse exigit) aceto vel vino dilutorum, prout valentius aut lenius vitium est, cui mendendum est.

## ENARRATIO.

**A**LIVS pastillus eidem auctori ascriptus excipiuntur. Paulus Ægineta ab hoc recipit cytharæ \* p. x. gallæ \* p. viii. etiam diversum habet. Scribonius Largus myrrhæ \* p. iiii. aristolochiæ \* p. iiii. loco capitulorum punici mali, gravati cortices accipit, atque alben & aris florem aramenti futorij \* p. i. diurnum, aluminis scissilis, misjos, singulorum tantundem; passo addit.

*Pastillus ad fissâ ani, vel ora venarum fundentia sanguinem vel cancrum.*

**P**ROPRIE autem ad ani fissâ, vel ora venarum fundentia sanguinem, vel cancrum: Aeruginis p. ii. \*. myrrhæ p. xii. \*. stibis, lacrymæ papaveris, acaciæ sing. p. xvi. \*. Quæ \* sibi, ex vino & teruntur, & in ipso vñse \* deliquantur. \* liquantur.

*Pastillus ad expellendum calculum cum urina.*

**E**XPELLERE autem ex vesica cum urina calculum videtur hæc compositio: Casiæ, croci, myrrhæ, costi, nardi, cinnamomi, dulcis radicis, balsami, hyperici pares portiones conteruntur, deinde vinum lene instillatur, & pastilli fiunt, qui singuli habeant p. \*. 3. hi quæ singuli quotidie manè ieiuno dantur.

## CAPUT XXI.

*De pessis.*

**H**ÆC tria compositionum genera, id est, quæ in malagmatis, pastillis, emplastris quæ sunt, maximum præcipue quæ varium vñsem præstant. Sed alia quoque vñsilia sunt, vt ea quæ foeminis subiciuntur (πείσες Græci vocant). Eorum hæc proprietas est: Medicamenta composita molli lana excipiuntur, ea quæ lana naturalibus conditur.

NN 3

ENAR-



## ENARRATIO.

## Hæc tria compositionum.

**P**ESSI utero soli adhibentur: sunt autem eorundem tres differentie; alij namque molliunt, alij astringunt, terij deinceps ordine aperiunt. Mollientibus ad uteri inflammationem, exulcerationes, perfrictiones, strangulationes, anesiones, & inflationes vitimur. Aperientes utiles sunt, quoties purgationem suppressam provocare volumus, aut continenter compressione vulvam emen-

date. Astringentium usus contrarius est aperientibus: nam fluorem muliebrem cohibent, & uterum suspensum contrahunt, & prolapsum reprimunt. Caterum convenit pessi crassitudinem instar strigmenti & paulo crassiores facere, deinde lanam linamento tortili similem duplicatam in medicamentum tinctam ori vulvae condere, sic ut stupam praelongam habeat alligatam; quo pessus facile eximi possit, quando visum fuerit. Auctor est Ægineta.

## Ad sanguinem euocandum.

\* cannis  
al. cuneis  
\* P. 11.

**A**D sanguinem autem euocandum, \* cauceis duabus adicitur nitri \* P. I. \*. aut alij semen conteritur, adicitur myrrha paululum, & unguento fusino miscetur, aut cucumeris sylvestris pars interior, ex lacte muliebri diluitur.

## ENARRATIO.

## cauceis duabus.

**F**ICI genus est à loco sic denominatum. Hoc Marco Crasso in Parthos naviganti quum nanem conspiceret, omen fecit; nam quum quidam canncas sic venales haberet,

Crasso visum est dicere, Cave ne eas. Porro quod eadem per se, etiamsi non additum sit nitrum, aut alij semen, naturam stimulent mensque euocent, clarum admodum est ei qui earundem temperiem probe exploratam habuerit.

## Ad vulvam molliendam.

\* ros. i. rosaceam, &  
sic innu-  
maris lo-  
cu.

**A**D vulvam molliendam, oui vitellus, & foenum Græcum, & \* rosa & crocum temperantur. Aut elaterij P. \*. 3. salis tantundem, vuar taminiae P. VI. \*. melle excipiuntur.

## ENARRATIO.

## Aut elaterij.

**P**ESSVS hic nihil minus quam vulvam emolliet, nisi ex retentis mensibus anti-

ries aut inflammatio collecta sit; nam ad menses ciendos, atque adeo partum moriuntur euocandum optime faciet.

Alia



*Alia pesti compositio ad idem valens.*

**A**UT Boëtho auctore, croci, resinæ terebinthinæ, sing.  
P. \*. IIII. myrrhæ P. \*. III. rosæ 8. I. \*. seui vitulini  
P. \*. 3. ceræ P. II. \*. miscentur.

*Ad inflammationes vulvæ Numenij pessus.*

**O**PTIMA autem aduersus inflammationes vulvæ, Nu-  
menij compositio est, quæ habet croci P. \*. 3. ceræ  
P. I. \*. butyri P. VIII. \*. adipis anserini P. XII. \*. vitellos co-  
ctos duos, rosæ minus cyatho.

## ENARRATIO.

Optima autem.

**C**OMMODVS, atque utilis admodum  
ad vulvæ inflammationes est iste pes-  
sus, atque citra omnem mali suspicionem  
exhiberi potest: nam qui ab Ægineia libro

tertio capite LXIII. sub finem describitur,  
quantumvis parum ab hoc differat, tamen  
propter papaveris lachrymam aut decoctum  
papaveris capitum, quod immiscendum di-  
cit, non ita tutum existimo.

*Ad eiiciendum è vulva infantem mortuum.*

**S**I verò infans intus decessit, quo facilius eiiciatur, mali-  
corium ex aqua terendum, eoque utendum est.

## ENARRATIO.

malicorium ex aqua.

**E**GO certe nusquam eo elogio decantatum  
malicorium legi: nam quum asstrictoria  
admodum facultatis sit, imminenti potius  
partum repeller, quam adinuat, nisi id ex

oculta quadam proprietate fieri dicamus.  
Quod de malicorio dico, idem de cochleis cum  
testis suis combustis pronuntiandum censo:  
nam quantumvis menses ciant, nusquam  
tamen legisse memini prodesse iis qua vitio  
locorum concidunt.

*Si mulier vitio locorum concidit, qua cura-  
tione utendum sit.*

**S**I concidere vitio locorum mulier solet, cochleæ cum te-  
stis suis comburendæ, conterendæque, deinde iis mel adii-  
ciendum est. Si non comprehendit, adeps leonina ex rosa  
mollienda est.

DE MEDI-



## DE MEDICAMENTIS QVIBVS

ARIDIS. VT IMVR.

CAPVT XXII.

*Ad carnem supercrescentem exedendam.*

**Q**UÆDAM autem misturæ medicamentorum sunt, quibus aridis neque coactis utimur, sic ut inspergamus, aut cum aliquo liquido mista illinamus, quale est ad carnem supercrescentem exedendam, quod habet squamæ, fuliginis thuris, singulorum p. i. \*. æruginis p. ii. \*. Hæc autem eadem cum melle purgant ulcera, cum cera implent. Misy quoque & galla, si paribus portionibus misceantur, corpus consumunt, eaque vel arida inspergere licet, vel excepta cadmia, illinire.

## ENARRATIO.

Quædam autem.

**G**ALENVS intra ulceris per arida medicamenta curationem, quotiescunque solueris, animaduertendum dicit, qualemnam in particula effectum ediderint; sciendumq; ac in memoria tenendum esse, nonnulla desiccare, non autem detergere: cuiusmodi sunt illa quæ astringendi qualitatem obtinent, eaq; quæ ulcus purum non efficiunt. At quæ præterquam quod siccant, adhuc etiam detergunt, ea non solum siccant, sed & purum quoque totam partem exulceratam ef-

ficiunt. Præterea notandum venit, pura ulcera ab iis medicamentis, unde prius quam essent sordida, nihil rosionis percipiebant, nunc erodi mordereque. quæ causa est, ut à valentioribus abstergentibus medicamentis, ad mitiora lenioraque digrediamur, ubi vltius ad amissum purum inueniamus: quemadmodum si sordidum sit, ad magis abstergentia transimus; nisi ex rosione sordida apparuerint. Celsus hoc capite, eorum quæ corpus consumunt atque exedunt, singulam quandam ponit.

*Ad putrem carnem continendam, ne ultra serpat, eamque leniter exedendam, plures compositiones.*

**P**UTREM verò carnem continet, neque ultra serpere patitur, & leniter exest, mel, vel cum lenticula, vel cum marubio, vel cum oleæ foliis, antè ex vino decoctis. Item scirtula campana in mulso cocta, deinde contrita, aut calx cum cerato, aut amaræ nuces cum allio, sic ut huius pars tertia sit, paulumque iis croci adiiciatur. Aut quod habet spinnae genti



genti p.vi. \*. cornu bubuli combusti p.xii. \*. olei myrtei, & vini cyathos ternos. Aut quod ex his constat: Floris punici mali, atramenti sutorij, aloës, singulorum p.ii. \*. aluminis scissilis, thuris, singul. p.iiii. \*. gallæ p.viii. \*. aristolochiæ p.x. \*. Vehementius idem facit etiam adurendo auripigmentum cum chalcitide, & aut nitro, aut calce, aut charta combusti. Item sal cum aceto. Vel ea compositio quæ habet chalcitidis, capitulorum punici mali, aloës, singulorum p.ii. \*. aluminis scissilis, thuris, singulorum p.iiii. \*. gallæ p.viii. \*. aristolochiæ p.x. \*. mellis quantum satis sit ad ea cogenda. Vel cantharides p.i. \*. p. sulphuris. i. \*. kolij p.iii. \*. Quibus adiicitur picis liquidæ quantum satis est: adiungendum mel, chalcitis quoque cum resina & ruta mista, aut cum eadem resina diphryges, aut vua taminia, cum picis liquida. Idem verò possunt feces vini combusti, & calcis, & nitri pares portiones, vel aluminis scissilis p. \*. 33. thuris, sandaracæ, nitri, singulorum p. \*. i. gallæ p.viii. \*. aristolochiæ p.x. \*. mellis quantum satis est. \* & 3.

*Hieræ compositio.*

**E**st etiam Hieræ compositio quæ habet myrrhæ, chalcitidis, singulorum p.ii. \*. aloës, thuris, aluminis scissilis, singulorum p.iiii. \*. aristolochiæ, gallæ immaturæ, singul. p.viii. \*. malicorij contriti \* p.xx. \*. \* p. x.

## ENARRATIO

Est etiam Hieræ.

IOANNES Cæsarius, Legendum fortasse est, inquit, Hyrrhæ; ut sit medici non medicine nomen; cuius & Galenus alicubi meminit. Ego tamen Heræ legere malim, cuius frequens apud Galenū libris De compositione medicamentorum, & alibi, sit

mentio; quanquam si quis legere scribere malit, per me stat: quando Galenus libro v. De compositione medicamentorum paræ parū emplastri cuiusdam meminerit, quod isgæ ex Vulcani templo ad Memphim vocatum dicit.

*Iudæi compositio.*

**E**st & Iudæi, in qua sunt calcis partes duæ, nitri quàm ruberrimi pars tertia, quæ vrina impuberis pueri coguntur, donec strigmenti crassitudo sit. Sed subinde is locus, cui id illinitur, madefaciendus est.

OO

Iolla



*Iolle compositio.*

**A**r tollas chartæ combustæ, sandaracæ, singulorum  
p. i. \*. calcis p. ii. \*. auripigmenti tantundem miscebat.

## E N A R R A T I O.

**Q**UOD *diaceteru* Apellis inscribitur, que easdem incipientes prohibens,  
paulo operosius est, nomas fistens, at-

*Ad sanguinis profluvia vel ex membrana cerebri, vel aliis  
locis, & ad cancerum, & ad inducendam cicatri-  
cem, & ad coërcendam carnem crescentem.*

**S**i verò ex membrana, quæ super cerebrum est, profluit  
sanguis, vitellus combustus & contritus inspergi debet, si  
alio loco sanguinis profluvium est, auripigmenti, squamæ  
\* *æris*, singulorum p. i. \*. sandaracæ p. ii. \*. marmoris \* *cocti*  
p. iii. \*. inspergi debet. Eadem cancro quoque obfistunt.  
Ad inducendam cicatricem, squamæ æris, thuris fuliginis,  
singul. p. ii. \*. calcis p. iii. \*. Eadem incrementem quoque  
carnem coërcent.

*Timei compositio ad ignem sacrum vel cancerum.*

**T**IMÆVS autem ad ignem sacrum, vel ad cancerum, his  
utabatur, myrrhæ p. ii. \*. thuris, atramenti sutorij, sin-  
gulorum p. iii. \*. sandaracæ, auripigmenti, squamæ æris,  
singul. p. iii. \*. gallæ p. vi. \*. cerussæ combustæ p. viii. \*.  
Eadem vel arida insperfa, vel melle excepta idem præstant.

*Ad sternutamenta excitanda.*

**S**TERNUTAMENTA verò vel albo veratro, vel struthio  
coniecto in nares excitantur, vel his inistis, piperis, vera-  
tri albi, singulorum p. \*. 3. castorei pondo i. \*. spumæ nitri  
p. ii. \*. struthij p. iii. \*.

E N A R -



## ENARRATIO.

## Sternutamenta verò.

**S**TERNUTAMENTA excitantibus mo-  
nentur, ut secundo libro diximus; vel  
ut eos qui nimia propensione in somnum de-

inentur, excitare festinemus; vel ut fetum  
vel secundas expellamus, ut aculeos qui in  
pectore latent, in aspectum adducamus; vel  
ut vertiginem sedemus; vel ut aliquid ex-  
pellamus.

## Gargarizationes quibus fieri debeant.

**G**ARGARIZATIONES autem aut \* leuandi causa fiunt, aut  
reprimendi, aut euocandi. \* Leuant lac, cremor, vel ptif-  
sanæ, vel furfurum. Reprimit aqua, in qua vel lenticula, vel  
rosæ, vel rubus, vel cotoneum malum, vel palmulæ decoctæ  
sunt. Euocant, sinapi, piper.

\* lauandi

\* Lauant

## CAPVT XXIII.

## De antidotis, &amp; quibus malis opitulentur.

**A**NTIDOTA rarò, sed præcipuè interdum necessaria  
sunt, quia grauissimis casibus opitulantur. Ea rectè qui-  
dem dantur collisis corporibus vel per ictus, vel ubi ex alto  
deciderunt, vel in viscerum, laterum, faucium, interiorum-  
que partium doloribus. Maximè autem desideranda sunt  
aduersus venena, vel per morsus, vel per cibos, aut potiones  
nostris corporibus inserta.

## ENARRATIO.

## Antidota rarò.

**A**NTIDOTA dicuntur (ut auctor est  
Galenus) medicina, quæ non extrin-  
secus corpori inposita, sed intra ipsum as-  
sumptæ affectibus medentur. Tres autem  
ipsorum in uniuersum differentia habentur:

nonnulla enim herbalium medicamentorum  
gratia assumuntur; quædam ad virulentas  
feras proficiunt; quædam affectibus ex prano  
victu oborientibus opitulantur. sunt etiam  
quæ triplicem promittunt usum; quemad-  
modum iberiæ nuncupata, quæ ab Andro-  
macho medico composita est.

## Compositio antidoti.

**V**NUM est quod habet lacrymæ papaueris p. \*. 3. acori  
malobatri p. v. \*. iridis illyricæ, gummi, singul. p. ii. \*.

OO 2

anisi



\* feseleos,  
\* papaue-  
ris  
\* syriaci,

anisi p. iii. \*. nardi gallici, foliorum rosæ aridorum, carda-  
momi, singul. p. iiii. \*. petroselin p. \*. iiii. 3. trifolij p. v. \*.  
casia nigra, \* filis, bdellij, balsami, seminis \* piperis albi, sin-  
gulorum p. \*. 3. styracis p. \*. v. 3. myrrhæ, opopanacis, nardi  
\* syri, thuris masculi, hypocistidis succi, singul. p. vi. \*. casto-  
rei p. vi. \*. costi, piperis albi, galbani, resinæ terebinthinæ,  
croci, floris iunci rotundi, singulorum p. \*. vi. 3. dulcis radice  
p. viii. \*. 3. Quæ vel melle vel passo excipiuntur.

## ENARRATIO.

filis.

HOC est feseleos: atque sic quidem pas-

sim in antidotis accipiendum est.

*Aliud antidotum Ambrosia nominatum, quod Zopyrus  
Ptolemæo regi composuit.*

\* hic ubique,  
et pa. preced.  
et inf. usque  
ad pag. 484.  
in vet. cod. de-  
letu \* poss  
et legitur p.

**A**LTERVM quod Zopyrus regi Ptolemæo dicitur com-  
posuisse, atque Ambrosiam nominasse, ex his constat:  
Costi, thuris masculi, singulorum p. v. \*. piperis albi p. \*. 3.  
floris iunci rotundi p. ii. \*. cinnamomi p. iii. \*. casia nigra  
p. iiii. \*. croci Cilicij p. \*. iiii. 3. myrrhæ, quam staeten no-  
minat, p. v. \*. nardi indici p. \*. v. 3. Quæ singula contrita  
melle cocto excipiuntur. Deinde ubi utendum est, id quod  
Ægyptiæ fabæ magnitudinē impleat in potione vini diluitur.

## ENARRATIO.

**S**IMILEM planè descriptionem ha- men antidoti Zopyri multum ab hac dif-  
feret. bet Paulus libro septimo. Scribonij ta-

*Antidotum Mithridatis.*

**N**OBILISSIMVM autem est Mithridatis, quod quotidie  
sumendo rex ille dicitur aduersus venenorum pericula  
tutum corpus suum reddidisse. In quo hæc sunt: costi p. \*.  
s. 3. acori p. v. \*. hyperici, cumini, sagapeni, acaciæ succi,  
iridis Illyricæ, cardamomi, singulorum p. ii. \*. anisi p. iii. \*.  
nardi gallici, gentianæ, radice, aridorum rosæ foliorum, sin-  
gulorum



gulorum p. iiii. \*. papaueris lacrynae, petroselini, singulo-  
rum p. \*. iiii. 3. calix, filis, lolij, piperis longi, singulorum \*. polij.  
p. vi. \*. styracis p. \*. v. 3. castorei, thuris, hypocistidis succi,  
myrrhae, opopanax, singulorum p. vi. \*. malobathri folij  
p. vi. \*. floris iunci rotundi, resinae terebinthinae, galbani,  
dauci cretici seminis, singulorum p. \*. v. 3. nardi, opobal-  
sami, singulorum p. \*. vi. 3. thlaspi p. \*. v. 33. radice pon-  
ticae p. vii. \*. croci, zingiberis, cinnamomi, singul. p. \*. vii. 3.  
Haec contrita melle excipiuntur, & aduersus venenum, quod  
magnitudinem nucis Graecae impleat, ex vino datur. In cae-  
teris autem affectibus corporis pro modo eorum, vel quod  
Aegyptiae fabae, vel quod erui magnitudinem impleat, satis est.

## ENARRATIO.

**M**VLTVM differt haec Methridatij anti-  
dotum, ab ea quam descripsit Galenus  
libro De antidotis: cuius descriptionem si-  
quis desideret, aut Galenum iam citato loco,  
aut Scribonium Largum §. centesimo se-  
ptuagesimo consulat.

lolij, piperis longi.

**P**OLII restituendum est ex Scribo-  
nio Largo, atque pro longo pipere, scri-  
bendum est album.

## DE ACOPIS.

## CAPVT XXIII.

*Acopum neruis utile.*

**A**COPA quoque vtilia neruis sunt. Quale est quod ha-  
bet floris iunci rotundi p. \*. ii. 33. costi, iunci quadrati,  
lauri baccarum, ammoniaci, cardamomi, singul. p. \*. iiii. 3.  
myrrhae, aeris combusti, singulorum p. \*. vii. iridis illyricae,  
cerae, singulorum p. iiii. \*. alexandrini calami, iunci rotun-  
di, aspalathi, xylobalsami, singulorum p. xviii. \*. seui p. i. \*.  
vnguenti irini cyathum.

## ENARRATIO.

**A**COPA dicta sunt, quod praecipue ad  
lassitudinem, quae Graecis *αόρος* dicitur,  
puta tensine, ulcerosa, & eius quae ossa de-  
fatigat, sensum, conueniant, quanquam &

aliis compluribus morbis sunt utilia. Eorum  
porro usus commodus est, in his qui perma-  
nente, & indigente impinguatione opus ha-  
bent, ut docet Orribastus, quoniam in adfectio-  
nes pro-

OO 3



nes propter eorum defluxum, nihil magnopere possint: vel in iis quibus, propterea quod morbi inhesterant, madefactiones minimè sunt idoneæ. in quo genere sic post madefactiones acopa adhibent; sicuti etiam malagmasa post cerata. Sunt autem tres

acoporum differentia: calefacti enim, molliunt, cunctique scarificant. Calefactis in acutis morbis utimur, ubi nervi laesi iri suspicia est: mollientibus vero in morbis diutinis: scarificantium usus in diuturnis morbis est, qui difficulter amouentur.

*Acopum Enodes nervis utile.*

*viduatis*

**ALTERVM** quod \* *ἑνὸς δὲ* vocant, hoc modo fit. ceræ p. \*. 3. olei tantundem, resinæ terebinthinæ ad nucis iuglandis magnitudinem simul incoquantur, deinde infusa in mortario teruntur, instillaturque subinde quàm optimi mellis acetabulum, tum irini vnguenti, & rosæ terni cyathi.

**ENARRATIO.**

**S**i in vicem olei, glaucinum, & cyprianum recipias, *ἑνὸς δὲ τῷ μελίτι* commodum est ad nervorum contractiones: benefacit ad lassitudinum molestias. Galeni, quod *πρὸς τὸν ἐνὸς* dicitur, effeceris,

*Enchrifa ad ulcera purganda & implenda.*

*\* cilini*

**ΕΓΧΡΙΣΤΑ** autem Græci vocant liquida quæ illinuntur. Quale est quod fit, ad ulcera purganda, & implenda maximè inter nervos, paribus portionibus inter se mistis, butyri, mellis vitulinæ, seu vitulini, adipis anserinæ, ceræ, mellis, resinæ terebinthinæ, rosæ, olei \* cicini. Quæ separatim omnia liquantur, deinde liquida miscentur, & tum simul teruntur. Et hoc quidem magis purgat: magis verò emollit, si pro rosâ cyprus infunditur.

**ENARRATIO.**

olei cicini.

**IOANNES** Cæsius, Cicini, inquit, legendum fortassis: sed & Cilicini potest, vel Cilicij: propterea quod Galenus

in quodam operum suorum mentionem facit olei quod ab ipso Caprolæum vocatur: quod quidem in Cilicia fit: unde & dictum videtur: potest à Celsopoleum Cilicinum, quæ ab

*Ad sacrum ignem.*

**AD** sacrum ignem spumæ argenti p. vi. \*. cornu bubuli combusti p. ii. \*. conteruntur, adiciturque invicem vinum, & id quod specialiter sil vocatur, & myrteum, donec utriusque terni cyathi conficiantur.

**DE CA**



## DE CATAPOTIIS.

## CAPVT XXV.

*Catapodium ad somnum accersendum, & lenationem  
doloris, & simul ad concoquendum.*

**C**ATAPOTIA quoque multa sunt, variisque de causis  
fiunt. Anodyna vocant, quæ somno dolorem leuant.  
Quibus uti, nisi nimia necessitas urget, alienum est. Sunt  
enim ex vehementibus medicamentis, & stomacho alienis.  
Potest tamen etiam ad concoquendum, quod habet papau-  
eris lactymæ, galbani, singulorum p. i. \*. myrrhæ, castorei, pi-  
peris, sing. p. ii. \*. Ex quibus quod erui magnitudinem ha-  
bet, satis est deuorasse.

## ENARRATIO.

Catapodia quoque.

**C**ATAPOTIVM id est medicamen-  
tum quod non diluitur, sed ita ut est  
deuoratur. auctor est scribimus. In hoc

verò Catapodium circa noxam exhiberi pos-  
sit, si lachryma papaueris pondus nonnihil  
imminuamus; quum reliqua ingredientia,  
ad refrenandam eius vim satis esse queant.

*Catapodium valentius ad somnum.*

**A**LTERVM stomacho peius, ad somnum valentius ex his  
fit, mandragoræ p. \*. 3. apij seminis, item hyoscyami se-  
minis, singulorum p. iiii. \*. Quæ ex vino teruntur. Vnum  
autem eiusdem magnitudinis, quæ supra posita est, abunde  
est sumpsisse.

## ENARRATIO.

Hoc, ut reuerentius & omnino narcoticum non concessere. Sed hoc

*Catapodium ad plurimos dolores per somnum leniendos.*

**S**IVE autem capitis dolores, siue vlcera, siue lippitudo, siue  
dentes, siue spiritus difficultas, siue intestinorum tormen-  
ta, siue inflammatio vuluæ est, siue coxa, siue iocur, aut lienis,  
aut



aut latus torquet, siue vitio locorum aliqua prolabitur, & obmutescit, occurrit dolori per quietem eiusmodi catapotium: Silis, acori, rutæ syluestris seminis, singulorum p. i. \*. castorei, cinnamomi, singulorum p. ii. \*. papaueris lacrymæ, panacis, radicis mandragoræ, malorum aridorum, iunci rotundi floris, singulorum p. ii. \*. piperis grana lvi. Hæc per se contrita, rursus instillato subinde passo, simul omnia teruntur, donec crassitudo sordium fiat. Ex eo paulum aut deuoratur, aut aqua diluitur, & potui datur.

## ENARRATIO.

**H**oc certe, si quod aliud, merè benedictum censendum est: ut quod nec nimis profundum somnum conciliet, nec nervis inimicum sit, sed quod & sensus simul excitet, & sopiat.

panacis, radicis mandragoræ, malorum arid.

Legendum panacis radicis, mandragoræ malorum aridorum.

*Catapotium aliud ad multa valens.*

**Q**VINETIAM syluestris papaueris cum iam ad excipendam lacrymam maturum est, manipulus, qui manu comprehendi potest, in vas demittitur, & superinfunditur aqua, quæ id contegat, atque ita coquitur. Vbi iam bene manipulus is coctus est, ibidem expressus proicitur, & cum eo humore, passi pari mensura miscetur, inferuetque donec crassitudinem sordium habeat. Cum infixit, catapotia ex eo fiunt, ad nostræ fabæ magnitudinem, habentque vsum multiplicem. Nam & somnum faciunt, vel per se assumpta, vel ex aqua data, & aurum dolores leuant, adiectis exiguo modo rutæ succo, ac passi. Et tormina supprimunt ex vino liquata, & inflammationem vuluæ coërcent, mista cerato ex rosa facto, cum paulum his croci quoque accessit, & ex aqua fronti inducta, pituitam in oculos decurrentem tenent.

refixit,

## ENARRATIO.

**C**ATAPOTII huius descriptio non eadem loca, nisi quod hoc formam elementum differt à Diacodio Galeni, libro De medicamentorum compositione seorsum recipiat: into igitur & extra omnem

*Catapotium*



*Catapodium ad inducendum somnum, quod vulua  
dolens prohibuit.*

**I**TEM si vulua dolens somnum prohibuit, croci p.ii.\*. anisi, myrrhæ, singul. p. i. \*. papaueris lacrymæ p.iiii.\*. cicutæ feminis p. viii. \*. miscentur, excipiunturque vino veteri, & quod lupini magnitudinem habet in tribus cyathis aquæ diluitur. Id tamen in febre periculosè datur.

*Ad iecur sanandum.*

**A**D sanandum iecur nitri p. \*. 3. croci, myrrhæ, nardi Gallici, singulorum p. i. \*. melle excipiuntur, daturque quod Aegyptiæ fabæ magnitudinem habeat.

**E N A R R A T I O.**

*Ad sanandum.*

**I**D sanè quomodo iecur sanare possit, non video: nam quantumvis nardus Celica, imbecilliori iecinori prodest, non ta-

men sequitur statim eandem iecur persanaturam: & neque etiam si frigidis iecinoris morbis convenire dicamus, omnibus ob id ex aquo utilis erit. Idem si quis de duobus proximis paragraphis dicat, non aberraverit.

*Ad finiendos dolores lateris.*

**A**D lateris dolores finiendos, piperis, aristolochiæ, nardi, myrrhæ pares portiones.

*Ad thoracis dolores finiendos.*

**A**D thoracis, nardi p. i. \*. thuris, castiæ, singulorum p. iii. \*. myrrhæ, cinnamomi, singulorum p. vi. \*. croci p. viii. \*. resinæ terebinthinæ quadrans, mellis hemina tres.

*Catapodium Athenionis ad tussim.*

**A**D tussim Athenionis, myrrhæ, piperis, singulorum p. i. \*. castorei, papaueris lacrymæ, singulorum p. i. \*. Quæ separatim contusa, postea iunguntur, & ad magnitudinem fabæ nostræ, bina catapodia manè, bina noctu dormituro dantur.

PP

ENAR-



## ENARRATIO.

Ad tussim.

**S**i galbanum & styracem, sicut facit Scribonius, admiscueris, longe excellen-

tius feceris, ut quod & ad siccas seu aridas tusses profuturum sit. neque hoc ignavius est quod proximo paragrapho ad Heraclidem refert.

*Catapotium Heraclidis Tarentini, ad tussim, & somnum.*

**S**i tussis somnum prohibet, ad utrumque Heraclidis Tarentini, croci p. i. \*. cinnamomi, castorei, papaveris lacrymæ, singulorum p. i. \*. myrrhæ, piperis longi, costi, galbani, singulorum p. \*. 3.

*Catapotium ad purganda ulcera in faucibus tussientibus.*

**Q**UOD si purganda sunt ulcera in faucibus tussientibus, panacis, myrrhæ, resinæ terebinthinæ, singulorum p. v. \*. galbani p. \*. 3. hyssopi p. \*. 3. conterenda sunt, hisq. hemina mellis adiicienda, & quod digito excipi potest, deuorandum est.

*Colicæ Cassij medici.*

**C**OLICÆ verò Cassij ex his constat, croci, anisi, castorei, singulorum p. iii. \*. petrosclini p. iii. \*. piperis & longi, & rotundi, singulorum p. v. \*. papaveris lacrymæ, iunci rotundi, myrrhæ, nardi, singulorum p. vi. \*. Quæ melle excipiuntur. Id autem & deuorari potest, & ex aqua calida sumi.

## ENARRATIO.

Colicæ verò.

**H**ANC Cassij medici colicem describit Scribonius Largus paragrapho cxx.

adiicit tamen semen apij: Datur, inquit, quantum nux abellana media patet, & in ipsis etiam doloribus statim prodest. De hac libro precedente susius dictum est.

*Ad infantem mortuum aut secundas impellendas.*

**I**NFANTEM verò mortuum, aut secundas expellit aquæ potio, cui salis ammoniaci p. i. \*. aut cui dictami Cre- tici p. i. \*. adiectum est.

ENAR-



## ENARRATIO.

**S**i pro sale ammoniac, subijueris des, ammoniacum partu extrahit: quod guttam ammoniacam, constabit sali ammoniac a nullo attributum comminino sententia; quando, ut ait Dioscori- perio.

*Laborantibus ex partu quid dari debeat.*

**E**x partu laborantibus erisimum, ex vino tepido \*iciunæ \*iciunis dari debet.

## ENARRATIO.

**A**PVD nullum hac facultate pradi- excalfacere dicat, contraque venena in de- tum lego erisimum: nam etiamsi Ga- linctu cum melle dari; non tamen sequitur lenus plantis que acrimonia pradi- ob id ex partu laborantibus cum vino datum comparatis, & Dioscorides extennare atque profuturum.

*Ad adiuuandum vocem.*

**V**OCEM adiuuat thuris p. i. \*. in duobus cyathis vini datum.

*Aduersus difficultatem urine.*

**A**DVERSVS urinæ difficultatem, piperis longi, castorei, myrrhæ, galbani, papaueris lacrymæ, croci, costi vnciæ singulæ, styracis, resinæ terebinthinæ pondo sextantes, mel, absinthij cyathus. Ex quibus ad magnitudinem fabæ Ægyptiæ, & manè, & \*cœnato dari debet. \*incarnato

## ENARRATIO.

*Aduersus urinæ.*

**E**TSI opium recipiat confectio, calida admodum est, neque cinis difficultati urinæ conueniens; verum ei tantum, que frigiditatem originis sue causam habuerit. cienda, sed & indurato pleni, atque hepatis conueniens erit: nam que ingrediuntur, sufficientia sunt, & ad viscositatem humorum induratis partibus infarctorum extergendam, & ad secandam crassitudinem, & ad discutiendos extennatos humores. atque hac quidem ratione, non solum urina

*Arteriaces compositio quomodo fiat.*

**A**RTERIACE verò hoc modo fit, casia, iridis, cinnamomi, nardi, myrrhæ, thuris, singulorum p. i. \*. croci p. i. \*. piperis grana xxx. ex passi tribus sextariis decoquuntur, donec

PP 2

nec



nec mellis crassitudo his fiat. Aut croci, myrrhæ, thuris, singulorum p. i. \*. coniiciuntur in passi eundem modum, eodemque modo decoquuntur. Aut eiusdem passi hemina tres usque eò coquuntur, donec extracta inde gutta indurescat, & adiicitur trita cassiæ p. i. \*.

\* & ci  
adiic.

## CAPVT XXVI.

*De quinque generibus noxarum corporis, & primò de vulneribus, quæ maximè per tela inferuntur.*

Cum facultates medicamentorum proposuerim, genera in quibus noxa corpori est, proponam. Ea quinque sunt. Cum quid extrinsecus læsit, ut in vulneribus. Cum quid intra seipsum corruptum est, ut in cancro. Cum quid innatum est, ut in vesica calculus. Cum quid increuit, ut vena, quæ intumescens, in varicem conuertitur. Cum quid deest, ut cum curta pars aliqua est. Ex his alia sunt, in quibus plus medicamenta, alia in quibus plus manus proficit. Ergo dilatis his, quæ præcipuè scalpellum & manum postulant, nunc de his dicam, quæ maximè medicamentis egent. Diuidam autem hanc quoque curandi partem sicut priorem. Et antè dicam de his, quæ in quamlibet partem corporis incidunt. Tum de his, quæ certas partes infestant. Incipiam à vulneribus. In his autem antè omnia scire medicus debet quæ insanabilia sint, quæ difficilem curationem habeant, quæ promptiorem. Est enim prudentis hominis, primùm cum qui seruari non potest, non attingere, nec subire speciem eius, ut occisi, quem fors ipsius \* peremit. Deinde ubi grauis metus, sine certa tamen desperatione est, indicare necessariis periclitantis in difficili \* rem esse, ne si victa ars malo fuerit, vel ignorasse, vel fefellisse videatur. Sed ut hæc prudenti viro conueniunt, sic rursus histrionis est, paruum rem attollere, quò plus præstitisse videatur. Obligarique æquum est, confessione promptæ rei, quò curiosius etiam circumspiciat, ne quod per se exiguum est malum, maius curantis negligentia fiat.

\* spem  
al. fa spi-  
cionem  
\* intere-  
mit.  
\* spem

ENAR-



## ENARRATIO.

Cum facultates.

**H**IPPOCRATES libro secundo Prædictionum docet, quæ vulnera prognosticis relinquenda sint: siquidem, Quacunque, inquit, vulnera tempus nascuntur, aut ita gliscerent sanguinem, aut corpus

doloris impatiens adeo, ut præ dolore & febricit & deliraret homo; aut si magnitudine tanta fuerint, ut homo ad curationem adduci ab eius contemptu non possit, ab his quidem discedere oportet, qualiacunque tantum fuerint; diuersi animi deliquit exceptis.

*Quæ vulnera insanabilia sint.*

**S**ERVARI nõ potest, cui basis cerebri, cui cor, cui stomachus, cui iocinoris portæ, cui in spina medulla percussa est, cuique aut pulmo medius, aut iciumum, aut tenuius intestinum, aut ventriculus, aut renes vulnerati sunt, cuiue circa fauces\* glandes venæ, vel arteriæ præcisæ sunt.

\* glandes,  
vena vel  
arteria,  
&c.

## ENARRATIO.

**H**IPPOCRATES sexto Aphorismorum, Vesica, inquit, discissa, aut cerebro, aut corde, aut septo, aut aliquo ex interioribus intestinis, aut ventriculo, aut iecore, lethale est. Et libro Prædictionum: Vulnera magis lethalia sunt quæ in venas crassas in collo ac inguinibus infliguntur; deinde quæ in cerebrum, & hepar; postea quæ in intestinum & vesicam. Sunt tamen hæc omnia perniciofa valde; non tamen ita, ut nemo ex his enadat, velut putatur. siquidem Galenus cerebrum vulneratum sæpius curatum vidit. Sunt tamen ex capitis vulneribus lethalissima quæ ad cerebrum pertingunt, graviora sunt & huiusmodi omnia, si os nudum, magnum os infractum diffractumque: quin

etiam si osculum ulceris paruum fuerit, fissura vero ossis aliquamdiu permanferit, periculosum est: sunt autem hæc eo graviora, quo sunt propinquiora. Vesica porro collium vulneratum, ut in lithiasis frequenter usu venit, discissum, indies curari videmus: ipsa tamen vesica concanitas, quam propriè vesicam aut vésiv appellamus, discissa, quum nervosa sit, incurabilis omnino est, tum quod vesica ipsa tenuis, exanguis & nervosa sit; tum quod profundum sit; tum quod in interiora progreditur vulnus, atque ob id coalescere non possit. Eadem planè ratio de intestinis est. At ventriculo vulnerato multos restitutos ait Galenus, nisi omnino magnum vulnus fuerit.

*Quæ vulnera difficilem curationem habeant.*

**V**ix autem ad sanitatem perueniunt, quibus vlla parte pulmo, aut iocinoris crassum, aut membrana quæ continet cerebrum, aut lienis, aut vulua, aut vesica, aut vllum intestinum, aut septum transuersum vulneratum est. Hi quoque in præcipiti sunt, in quibus usque ad grandes, intusque conditas ve-

PP 3

nas,



\* descendit. nas, in alis vel poplitibus mucro \* defedit. Periculosa etiam vulnera sunt, ubicunque venæ maiores sunt, quoniam exhaurire hominem, profusione sanguinis possunt. Idque evenit non in alistantum, atque poplitibus, sed etiam in his venis, quæ ad anum, testiculosque perveniunt. Præter hæc malum vulnus est, quodcunque in alis, vel feminibus, vel inanibus locis, vel in atticulis, vel inter digitos est. Item quodcunque musculum, aut neruum, aut arteriam, aut membranam, aut os, aut cartilaginem læsit.

## ENARRATIO.

aut iocinoris crassum.

ITA tamen ut venas notat dignas non vulneret: nam aliqui propter sanguinis profusionem lethale omnino vulnus esset, sicuti ante de iecinoris porta sauciata pronunciatum reliquit. Huc referri possunt quæ de venis subiungit.

aut vulva aut vesica aut  
vllum intestinum.

IVM propter substantiam nerveam,

rum propter situm: necessum est enim iis vulnerari profunda esse vulnera.

Præter hæc.

SUMPTVS est hic locus ex secundo Prædictionum Hippocratis: ubi sic scribit. Caterum ex locis subalares difficiliore curati sunt, & laterum mollitudines (inanēs locos reddidit Celsus) & femora. nam & mora in ipsis sunt, & recidant. Ex articulis maxime obnoxij sunt magni digiti, & præsertim pedum.

*Quæ vulnera tutiorem curationem habeant.*

TVTISSIMUM omnium, quod in carne est, & hæc quidem loco, vel peiora, vel meliora sunt. Modò verò periculum facit, quodcunque magnum est.

## ENARRATIO.

quodcunque magnum est.

HIPPOCRATES triplex genus magni vulneris ponit: primum quidem, quod

in corporis parte præstantiore accidit; alterum, quod malignum; ac tertium, quod amplum est: in quo significato magnum vulnus usurpasse videtur Celsus.

*Observationes quedam, & ætatis, & corporis &  
vite, & temporis in vulneribus.*

ALIQUID etiam in vulneris genere, figuraque est. Nam peius est, quod etiam collisum, quàm quod tantum discissum est, aded ut acuto quoque quàm retuso telo vulnerari



vulnerari commodius sit. Peius etiam vulnus est, ex quo aliquid<sup>\*abscissum</sup> excisum est, ex quo ve caro alia parte abscissa, alia dependet. Pessima quæque plaga in orbem est: tutissima, quæ lineæ modo recta est. Quo deinde propius huic, illi ve figuræ vulnus est, eo vel deterius, vel tolerabilius est. Quin etiam confert aliquid & ætas, & corpus, & vitæ propositum, & anni tempus: quia facilius sanescit puer, vel adolescens, quàm senior; valens, quàm infirmus: neque nimis tenuis, neque nimis plenus, quàm si alterum ex his est: integri habitus, quàm corrupti: exercitatus, quàm iners: sobrius, & temperans, quàm vino, venerique deditus. Opportunissimumque curationi tempus vernum est, aut certè neque feruens, neque frigidum. Siquidem vulnera & nimius calor, & nimium frigus infestant: maximè tamen horum varietas, idcoque perniciosissimus autumnus est. Sed pleraque ex vulneribus oculis subiecta sunt, quorundam ipsæ sedes indices sunt, quas alio loco demonstraui, cum positus interiorum partium ostendimus. Veruntamen quia quædam vicina sunt, interest quoque vulnus in summa parte sit, an<sup>\*penitus</sup> penitus penetrauerit: necessarium est notas subiicere, per quas quid intus actum sit, scire possimus, & ex quibus vel spes, vel desperatio oritur.

## ENARRATIO.

**Q**UOD simplicia vulnera composita, hoc est iis quæ simul confusa & distrupta sunt, faciliora sunt; clarum est quàm ut dici debeat: at quod rotundum vulnus aut vlcus difficillimè curetur, ex Herophiliorum sententia, Problematum libro rationem hanc reddidit Cassius: *φασι γὰρ ὅτι τὰ σχήματα κυκλικὰ τῶν ἰληῶν μικρὰ μὲν φαίνεται τῇ περὶ ἑξῆς, ὅν ποιεῖται δ' ἐστὶν, ἀλλὰ ἔχον τὴν δύσμεν, μείζονα τὰ ἰμβραδὸν περὶ φαίνεται, τὸ μείζον δὲ πλείονος ἡρότου δόται πρὸς τὴν ἰπύλωσιν.*

## Quin etiam confert.

**SYMPTVS** est locus hic ex secundo Prædictionum Hippocratis: Multum etiam differt, inquit, corporis ipsius hominis stru-

ctura. aliquando enim non febricitat, neque inflammatur sauciatus; aliquando etiam citra causam febricitat, & aliqua corporis parte omnino inflammatur.

## Siquidem vulnera.

**HIPPOCRATES**: Frigidum ulceribus mordax est, cutem obdurat, dolorem insupprimibilem facit. Nam quod de frigide perfusione dicit Hippocrates, id etiam de tempestive calida accipi potest. Calidum tempus vires dissolvit, atque profluvia sanguinis excitat; unde & vulneratis inimicum est: Annui vero inequalitas, sicuti omnibus morbis aliena est, ita vulneribus adversissima existit.

Signa



*Signa percussæ cordis.*

**I**GITUR corde percusso, sanguis multus effertur, venæ languescunt, color pallidissimus, sudores frigidi, malique odoris, tanquam\* in rotato corpore oriuntur, extremisque partibus frigidis, matura mors sequitur.

\* in ægroto  
al. irritato  
al. irrorato

## ENARRATIO.

**Æ**GINETA subnigrum sanguinem posse docet variis exemplis Nicolaus Massa, & Matthias Cornax. Alex. Pedemontanus scribit in eiusdem capsula etiam vermes reperi-  
tos esse, ipsum cor innadentes, qui lunaticam passionem generant, atque pueros interficiant.

*Signa pulmonis icti.*

**P**ULMONE verò icto, spirandi difficultas est, sanguis ex ore spumans, ex plaga rubens, simulque etiam spiritus cum sono fertur: in vulnus inclinari iuvat, quidam sine ratione consurgunt. Multi si in ipsum vulnus inclinati sunt, loquuntur: si in aliam partem, obmutescunt.

## ENARRATIO.

sanguis ex ore. ex ore magis per vomitum redditur, lingua alium colorem assumit, multum spiritus attrahunt ægri frigidi apperentes.

**Æ**GINETA, Sanguis, inquit, ex plaga spumans enacnatur, quum non

*Signa iocinoris vulnerati.*

**I**OCINORIS autem vulnerati notæ sunt, multus sub dextra parte præcordiorum profusus sanguis, ad spinam redacta præcordia, in ventrem cubandi dulcedo, punctiones, doloresque usque ad iugulum, iunctumque ei latus scapularum, os intentum. Quibus nonnunquam etiam biliosus vomitus accedit.

*Signa percussorum renum.*

**R**ENIBUS verò percussis, dolor ad inguina, testiculosque descendit, difficulter urina redditur, eaque aut est cruentâ, aut cruor fertur.

ENAR-



## ENARRATIO.

eaque aut est cruenta.

**Q**UICUNQUE, inquit Hippocrates, sanguinem mingunt, his in renibusruptionem vena significat: nam quantumvis varia sint ac multa mictionis sanguinis

causa, non tamen purus sanguis conseritur & celeriter efferitur per urinam, nisi ubi vena renum propter sanguinis multitudine rupta sunt, aut renes ipsi aliqui vulnerati.

*Signa vulnerati lienis.*

**A**T lienis icto, sanguis niger à sinistra parte prorumpit, præcordia cum ventriculo ab eadem parte indurefcunt, fitis ingens oritur, dolor ad iugulum, sicut iocinore vulnerato, venit.

*Signa percussa vulue.*

**A**T cum vulua percussa est, dolor inguinibus, & coxis, & femoribus est. Sanguinis pars per vulnus, pars per naturale descendit, vomitus bilis insequitur. Quædam obtumescunt, quædam mente labuntur, quædam sui compotes, neruorum, oculorumque dolore vrgeri se consitentur, morientesque tandem, eadem quæ corde vulnerato patiuntur.

\* femi-  
bus  
obmure-  
fcunt,

## ENARRATIO.

**S**YMP TOMATA hæc subsequuntur, tum sensum quem cum cerebro, ventriculo, & propter colligantiam, tum propter con- superioribus partibus habes.

*Signa percussi cerebri, vel membrana eius.*

**S**\* I N cerebrum, membranave eius vulnus accepit, sanguis per nares, quibusdam etiam per aures exit, fereque bilis vomitus insequitur. Quorundam sensus obrunduntur, appellati que ignorant. Quorundam trux vultus est, quorundam oculi quasi resoluti, huc atque illuc mouentur. Fereque tertio vel quinto die delirium accedit. Multorum etiam nerui distenduntur. Ante mortem autem plerique fascias, quibus caput deligatum est, lacerant, ac nudum vulnus frigori obiciunt.

\* Enimo-  
vero si

\* huc illuc  
comouen-  
tur.

QQ

ENAR-



## ENARRATIO.

PAVLVS distinguit ita, ut si cerebri membrana vulnus acceperit, dolor capitis validus subsequatur, oculi ferueant, rubeantque, lingua agitesur, mens desipiat. Et si cerebrum percussum est, inquit, agri concidunt, vox nihil sonat, facies peruertitur, bilis vomitus sequitur, sanguis per na-

res erumpit, per aures humor albus pulicula similis emanat, sanies per vulnus exit. Hippocrates sectione sexta Aphorismorum, Quibus cerebrum vulneratur, ait, ita febris & bilis vomitus superuenire necesse est. Celsus febris non meminit, forte quod illam sub delirio comprehenderit.

*Signa percussi stomachi.*

VB I stomachus autem percussus est, singultus, & bilis vomitus insequitur. Si quid cibi vel potionis assumptum est, id redditur cito. Venarum motus elanguescent, sudores tenues oriuntur, per quos extremæ partes frigescent.

## ENARRATIO.

HVC referre potes quæ de abdomine vulnerato scribit Paulus, quod nimis-

rum succus aut chylus ex ventriculo emanatur, ex intestinis sterces.

*Signa ieiunii intestini, & ventriculi vulnerati, & aliorum intestinorum.*

COMMVNES verò ieiunii intestini, & ventriculi vulnerati notæ sunt. Nam cibus, & potio per vulnus exeunt, præcordia \* intumescunt, nonnunquam bilis per os redditur. Intestino tantum sedes inferior est. Cætera intestina icta vel sterces, vel odorem eius exhibent.

## ENARRATIO.

nonnunquam bilis  
per os.

intestinum hoc bilem sinceram universam ex chologogis poris recipiat, & quod offi felis maxime vicinum sit. Cæterum ex hoc § satis constat pro gula in præcedente § stomachi nomen usurpatum.

PRÆSERTIM si ieiunium vocatum intestinum affectum sit: quod videlicet

*Signa percusse medulle, quæ in spina est.*

\* percussa, al. discissa,

MEDVLLA verò quæ in spina est, \* discussa, nervi resolvuntur, aut distenduntur, sensus intercedit: interposito tempore



tempore aliquo sine voluntate inferiores partes vel semen, vel  
vrinam, vel etiam sterco excernunt.

## ENARRATIO.

SI quis originem convulsiois nervorum, principium, per quos velut internuncios cor-  
distentionisve probe exploratam habeat, pus uniuersum transmittit motum & sen-  
qua hic de medulla spina discissa dicuntur, sum, consequens est dorsali medulla percus-  
facile assequetur: nam quum spinalis me- sa, sensum & motum si non prorsus inter-  
dulla cerebri quodammodo germen sit, & cipi, saltem vitari; atque ea qua ordine  
explantatio, & durorum corporis nervorum subiungit Celsus, subsequi.

*Signa septi transuersi percussæ.*

AT si septum transuersum percussum est, præcordia  
sursum contrahuntur, spina dolet, spiritus rarus est, san-  
guis spumans fertur.

## ENARRATIO.

SEPTE transuerso vulnerato, inquit gemitu & dolore per totam humeri partium  
Paulus, inspiratio magna oritur, cum compagem.

*Signa vesicae vulneratae.*

VESICA verò vulnerata, dolent inguina. Quod super pu-  
bem est, intenditur, pro vrina sanguis, aut ex ipso vulnere  
vrina descendit, stomachus afficitur. Itaque aut bilem vo-  
munt, aut singultiunt, frigus, & ex eo mors sequitur.

## ENARRATIO.

pro vrina sanguis.

EXVLCERATA vesica, aquè ac reni-  
bus, mingitur sanguis: non respondet  
tamen proportionem ei qui ex renibus fertur,  
quando in his vena & ampliores & plu-  
res sint. Sed quòd vesica affecta sanguis

per urinariam fistulam effluit, docet Hippo-  
crates sectione quarta Aphorismorum, di-  
cens: Si sanguinem mingant aut grumos,  
vel stillidinum vrina habeant, & dolor in  
inum ventrem incidat, & pellicinem, &  
semen, circa vesicam labor est.

*De sanguine, & sanie, & pure, & eorum speciebus,  
quando meliora, deterioraue sint.*

HIS cognitis, etiam nunc quædam alia noscenda sunt, ad  
omnia vulnera vlceraque, de quibus dicturi sumus, per-  
tinentia. Ex his autem exit sanguis, sanies, pus. Sanguis om-  
nibus.

QQ 2



\* varia, nibus notus est. Sanies est tenuior hoc, \* variè crassa, & glu-  
 \* albidissi. tinosa, & colorata. Pus crassissimum, \* albidissimumque, glu-  
 tinosius & sanguine & sanie. Exit autem sanguis ex vulnere  
 recenti, aut iam sanescente. Sanies est inter vtrunque tem-  
 pus: Pus ex vulnere iam ad sanitatem spectante. Rursus &  
 sanies, & pus quasdam species Græcis nominibus distinctas  
 \* μελικερία habent. Est enim quædam sanies, quæ vel *ιχωρ*, vel \* melice-  
 ria nominatur. Est pus, quod *ελαωδες* appellatur. *ιχωρ* tenuis,  
 subalbidus ex malo ulcere exit, maximeque ubi nervo læso  
 \* glutino- inflammatio secuta est. Meliceria crassior, & \* glutinosior,  
 \* fa & c. subalbida, melli que albo sub similis fertur. Hæc quoque ex  
 malis ulceribus, ubi nervi circa articulos læsi sunt, & inter  
 hæc loca, maxime ex genibus. *Ελαωδες* tenuæ, subalbidæ, qua-  
 \* vngui- si vinctum colore atque pinguitudine, oleo albo non dissimi-  
 \* nosum le, adparet in magnis ulceribus sanescentibus. Malus autem  
 est sanguis nimium aut tenuis, aut crassus, colore vel liui-  
 \* ruber, dus, vel niger, aut pituita mistus, aut varius. Optimus cali-  
 dus, \* rubens, modicè crassus, non glutinosus. Itaque protin-  
 us eius vulneris expedita magis curatio est, ex quo sanguis  
 bonus fluxit. Itemque postea spes in his maior est, ex quibus  
 \* quoque melioris generis quæque proveniunt. Sanies \* igitur mala est,  
 multa, nimis tenuis, liuida, aut pallida, aut nigra, aut glutino-  
 sa, aut mali odoris, aut quæ & ipsum vlcus, & iunctam ei  
 cutem erodit. Melior non multa, modicè crassa, subrubicun-  
 da, aut subalbida. *Ιχωρ* autem peior est multus, crassus, sub-  
 liuidus, aut subpallidus, glutinosus, ater, calidus, mali odo-  
 ris. Tolerabilior est subalbidus, qui cætera omnia contraria  
 prioribus habet. Meliceria autem mala est multa, & per-  
 crassa, melior quæ & tenuior, & minus copiosa est. Pus inter  
 hæc optimum est. Sed id quoque peius est multum, tenue,  
 dilutum, magisque si ab initio tale est. Itemque si colore se-  
 ro simile, si pallidum, si liuidum, si seculentum est. Præter  
 hæc, si malè olet, nisi tamen locus hunc odorem excitat.  
 Melius est, quo minus est, quo crassius, quo albidius. Item-  
 que si leve est, si nihil olet, si æquale est, modò tamen con-  
 venire, & magnitudini vulneris & tempori debet. Nam  
 plus



plus ex maiore, plus nondum solutis inflammationibus naturaliter fertur. Elæodes quoque peius est multum, & parum pingue, quo minus \* etiam, quoque id ipsum pinguius, eo + eius melius est.

## ENARRATIO.

INTER eos qui hodie extant, nullum exactius parvis & saniei differentiam descripsit, quam noster Cornelius hoc paratographo. Pius igitur, ut docet Hippocrates libro De ulceribus, fit ex sanguine putri, & a natura plurimum abhorrente, iχθὺς san sanias; Gnidoni ac recentioribus virulentia appellatur: estq; supersunitas subtilis, ex

abundantia humorum aquosorum generata, unde ulcera humida redduntur. Sordem Galenus crassio rem quandam saniei vocat; quæ si multa sit, ulcera sordida reddat, quam eandem cum Celsi meliceria esse existimo. Damocrates iχθὺς πύρρην λέπειον appellat.

*Curatio aduersus profusionem sanguinis in ulceribus.*

QUIBUS exploratis, ubi aliquis ictus est, qui seruari potest, protinus prospicienda duo sunt, ne sanguinis sit profusio, néve inflammatio interimat. Si profusionem timeamus, quod ex sede vulneris, & magnitudine eius, & ex impetu ruentis sanguinis intelligi potest, siccis linamentis vulnus implendum est, supraque imponenda spongia, ex aqua frigida expressa, ac manu super comprimenda. Si parum sic sanguis conquiescit, sæpius linamenta mutanda sunt. Et si sicca parum valent, aceto madefacienda sunt. Id vehemens ad sanguinem supprimendum est. Ideoque quidam id vulneri infundunt. Sed alius rursus metus subest, ne nimis valenter ibi retenta materia magnam inflammationem postea moueat. Quæ res efficit, ut neque rodentibus medicamentis, neque adurentibus, & ob id ipsum inducentibus crustam, sit utendum, quamuis pleraque ex his sanguinem supprimunt. Sed si semel ad ea decurritur, \* potius quæ mitius \* his pot. idem efficiunt. Quod si illa quoque profluvio vincuntur, venæ quæ sanguinem fundunt apprehendendæ, \* circaque id \* intraque quod ictum est, duobus locis deligandæ, intercidendæque sunt, \* ut & in se ipsæ coeant, & nihilominus ora præclusa habeant. Vbi ne id quidem res patitur, possunt ferro candenti aduri. Sed etiam satis multo sanguine effuso ex eo loco, quo

QQ;

neque



\*ab aduer-  
sa, vel  
aucta,

neque nervus, neque musculus est, utputa in fronte, vel superiore capitis parte, commodissimum tamen est cucurbitulam admoveere \* a diuersa parte, ut illuc sanguinis cursus reuocetur.

### ENARRATIO.

& ex impetu ruentis  
sanguinis.

**I**D ad dignotionem loci affecti dictum est: nam qui cum impetu ferrur sanguis, magna ex parte, aut arteria, vulnerata, aut eadem praecisa, accidere solet. Linamenta autem aceto madefacienda dicis, quod repellentis admodum astrictioraque sit facultatis, alij emplastica admoveere malunt, quemadmodum & Paulus ipse faciendum suadet.

decidunt, nudam magis partem, quam naturaliter esse debet, relinquunt, multisq; iam ex iis quibus crusta decedit, sanguinis profusum quod egre sibi queat, superuenit: quanquam & his utendum est, quoties magna urget necessitas. Auctor est Aegineta.

ferro candenti aduri.

OPORTET tamen ignita ferramenta antea ex aceto, vel vino restringere.

Sed etiam fatis.

Quæ res efficit.

DE remissione per cucurbitulam secundum libro abunde dictum est.

NAM quæ crustas generant, quoties

*Curationes aduersus vulnerum inflammationem.*

\*eaque

**E**T aduersus profusionem quidem in his auxilium est. Aduersus inflammationem autem in ipso sanguinis cursu, ea timeri possunt, ubi læsum est, vel os, vel nervus, vel cartilago, vel musculus: aut ubi parum sanguinis pro modo vulneris fluxit. Ergo quoties quid tale erit, sanguinem maturè suppressere non oportebit, sed pati fluere, dum tutum erit, adeo ut si parum fluxisse videbitur, mitti quoque ex brachio debeat, utique si corpus iuvenile, & robustum, & exercitatum est: multoque magis, si id vulnus ebrietas præcessit. Quod si musculus læsus videbitur, præcidendus erit. Nam percussus mortiferus est: præcisus sanitatem recipit.

### ENARRATIO.

Quod si musculus.

**L**ÆSUM musculum præcidendum dicis Auctor noster: quod etsi quàm maximè eo præciso actionem aliquam vitari certum sit; ab inflammatione tamen & conuulsione

vindicet, quam proximo capite ex Hippocrate lethalem esse dicit. atque hæc quidem musculos vulneratos magna ex parte subsequi solet; præsertim si in capitibus aut finibus musculorum vulnera infigantur: nam in capitibus musculorum, musculi nervi adnascuntur;



nascentur; ex finibus autem chordæ oriun-  
tur. Si tamen in longum, aut in rectum  
vulnerari contingat musculus, nihil minus  
quàm præcidendus erit; quando si probè cu-

retur, non minus quàm præcisus curationem  
recipiat, idq; citra vitium alicuius actionis,  
quàm in præciso musculo necessariò vitari  
diximus.

*De glutinatione vulnerum.*

SANGVINE autem vel suppresso, si nimius erumpit: vel ex-  
hausto, si per se parum fluxit, longè optimum est vulnus  
glutinari. Potest autem id vel quod in cute vel etiam in carne  
est, si nihil ei præterea mali accedit. Potest caro alia parte  
dependens, alia inhærens, si tamen etiamnum integra est, &  
coniunctione corporis fouetur. In his verò quæ glutinantur,  
duplex curatio est. Nam si plaga in molli parte, sui debet,  
maximèque si discissa auris ima est, vel imus nasus, vel frons,  
vel bucca, vel palpebra, vel labrum, vel circa guttur cutis vel  
venter. Si verò in carne vulnus est, hiatque, neque in vnum  
oræ faciliè attrahuntur, futura quidem aliena est. Imponendæ  
verò fibulæ sunt (*ἀγκυρῆς* Græci nominant) quæ oras pau-  
lum tamen contrahunt, quo minus lata postea cicatrix sit.  
Ex his autem colligi potest, id quoque quod alia parte depen-  
dens, alia inhærebit, si alienatum adhuc non est, futuram, an  
fibulam postulet. Ex quibus neutra antè debet imponi, quàm  
intus vulnus purgatum est, ne quid ibi concreti sanguinis  
relinquatur. Id enim & in pus vertitur, & inflammationem  
mouet, & glutinari vulnus prohibet. Ne linamentum qui-  
dem, quod suppressendi sanguinis causa inditum est, inibi  
relinquendum est. Nam id quoque inflamat. Compre-  
hendi verò futura vel fibula non cutem tantum, sed aliquid  
etiam ex carne, vbi suberit hæc, oportebit, quò valentius  
hæreat, neque cutem abrumpat. Vtraque optima est ex acia  
molli non nimis torta, quò mitius corpori incidat. Vtraque  
neque nimis rara, neque nimis crebra iniicienda est. Si nimis  
rara est, non continet. Si nimis crebra est, vehementer affi-  
cit, quia quò sæpius acus corpus transiit, quoque plura loca  
iniectum vinculum mordet, eo maiores inflammationes  
oriuntur, magisque æstare. Neutra etiam vim illam desi-  
derat: sed eatenus utilis est, quæ cutis ducentem, quasi sua  
sponte

\* venæ se-  
ctione,

\* inhæret,

\* acu

\* transiit,

\* vim

\* quatenus



sponte subsequitur. Ferè tamen fibulæ latius vulnus esse patiuntur. Sutura orasiungit, quæ ne ipsæ quidem inter se contingere ex toto debent, vt si quid intus humoris \*concreuerit, sit quæ emanet. Si quod vulnus neutrum horum recipit, id tamen purgari debet, deinde omni vulnere primò imponenda est spongia ex aceto expressa: si sustinere aliquis aceti vim non potest, vino vtendum est. Leuis plaga iuuatur etiam, si ex aqua frigida expressa spongia imponitur. Sed ea quocumque modo imposita est, dum \*manet, prodest. Itaque vt inarescat, non est committendum. Licetque sine peregrinis, & conquisitis, & compositis medicamentis vulnus curare. Sed si quis huic parum confidit, imponere medicamentum debet, quod sine seuo compositum sit ex his, quæ cruentis vulneribus apta esse proposui. Maximeque si caro est, barbarum: si nervi, vel cartilago, vel aliquid ex eminentibus, quales aures, vel labra sunt, Polybi sphragidem. Alexandrinum quoque viride neruis idoneum est, eminentibusque partibus ea, quam Græci *πάρρυστα* vocant. Soler etiam colliso corpore exigua parte findi cutis. Quod vbi incidit, non alienum est scalpello latius aperire, nisi muscoli, nervique iuxta sint, quos incidi non expedit. Vbi satis diductum est, medicamentum imponendum est. At si id, quod collisum est, quamuis parum diductum est, latius tamen aperiri propter nervos, aut musculos non licet, adhibenda sunt ea, quæ humorem leniter extrahant, præcipueque ex his, id quod rhyodes vocari proposui. Non alienum est, etiam vbicunque vulnus graue est, \*impositum, quo id iuuetur, insuper circumdare lanam succidam ex aceto, & oleo. Vel cataplasma, si mollis is locus est, quod leniter reprimat; si nervosus aut musculosus, quod emolliat.

## ENARRATIO.

Nam si plaga.

**T**RIPlicem suturem in vulneribus differentiâ consuevit chirurgi: vnam siquidem agglutinatoriã seu incarnatiuam;

alteram suppressoriam sanguinis; & tertiam labiorum in vnum adductorum ad tempus conservatricem appellantes: ac congelutatoria sutura quinq. diuersos modos statunt, quos breuitatis causa omisso. Hæc omnes Theophrastus



Theophrastus Paracelsus in maximis etiam vulneribus tanquam superfluas reiecit, & veluti inflammationum genitrices suspectas habet. Dicit enim singulis particulis insitum humidum quoddam radicale quod balsamum vocat, quod solutam continuitatem per se vivere & consolidare possit: ac proinde quum natura per se vulnera sigillare potius sit, in hoc tantum chirurgo incumbendum, ut natura subministret, atque ea arceat quæ symptoma aliquod loco affecto afferre possent; in quo albo, ut diximus, suturam censet, quod eidem magna ex parte communes esse soleant dolor, congeries excrementorum, & inflammatio. Quæ quidem etsi ita se habeant, est tamen quandoque ubi citra noxam usus suturarum esse possit, adhibitis cautelis quas hic auctor noster recenset.

#### Vtraque optima est ex acia.

BENE monuit Pantinus hic subesse mendum, legendumque ex acu. quamquam id non animadvertens Taganlius, antiquam lectionem in suum De institutionibus chirurgicis librum transtulit. Caterum acus ipsa longa esto, ut idem scribit, ac lenis, cuspide triangulari, canda excavata, ut in ea filum recondatur, & transitum acus non remoretur.

#### Neutra etiam vim illam.

QUAMVIS verus lectio aliquo modo constare possit, ego tamen cum Pantino vim vllam legere malim.

#### Spongia ex aceto.

SI nervosus locus sit affectus, aut aliqui

tendines, acetum, ut libro Methodi docet Galenus, etiamsi quam maxime inflammationes arceat, suspectum est. vinum certe, aurorum imprimis, (hoc enim Celsus intelligere verisimile est) admodum utile censetur: nam præterquam quod inflammationes arceat, ut docet Hippocrates, etiam glutinandi vi præditum est, quam usque ad penitiores vulneris partes transmittit.

#### Levis plaga.

SI natura corporis totius atque adeo partis affecta calida sit, ipsaque anni tempestas frigida vi permittat, frigida conveniet, ut quæ repellendi vi prædita est, & calore naturali aucto sanitatem restituet. si tamen profundum vulnus sit, & nec temperstas, nec corporis constitutio frigida usum admittant, nihil æquè aduersum vulneribus existit, atque frigida, ut quæ extincto calido innato, curationem prohibeat, si nervosus locus affectus est, aquæ frigiditas nervos sensiles admodum, & natura frigidos afficiet, & principi partium primati, ut testatur Galenus, affectionem suam impertiet.

#### Polybi sphragidem.

Polyidæ legendum esse iam antè dictum est.

#### lanam succidam ex aceto.

SVCCIDAM lanam ὀσπρηγὶς vocant: leniendi, digerendi, & repellendi vim habet: acetum siccatur, astringit mediocriter, ac repellit; oleum autem dolorem levandi & discutiendi facultate præditum est.

#### Quomodo vulnus ligari conveniat.

**F**ASCIA verò ad vulnus deligandum, lintea aptissima est, \*linca  
eaque lata esse debet, ut semel iniecta non vulnus tantum, sed paulum utrinque etiam oras eius comprehendat. Si ab altera parte caro magis recessit, ab ea melius attrahitur. Si æquè ab utraque, transversè comprehendere oras debet: aut si id vulneris ratio non patitur, media primùm iniicienda  
RR est, ut



\*inferior  
\*vltms  
\*Porro  
\*ab iis, de  
q.

est, ut tum in vtranque partem ducatur. Sic autem deliganda est, ut & contineat, neque adstringat. Quod non continetur, elabitur: Quod nimis adstrictum est, cancro periclitatur. Hyeme sæpius fascia circuire debet, æstate quoties necesse est, tum extrema pars eius \* inferioribus acu assuenda est. Nam nodus \* vulnus lædit, nisi tamen longè est. \* Illo neminem decipi decet, ut propriam viscerum curationem requirat, \* de quibus suprà posui. Nam plaga ipsa curanda extrinsecus, vel futura, vel alio medicinæ genere est. In visceribus nihil mouendum est, nisi aut si quid ex iocinore, aut liene, aut pulmone duntaxat extremo dependeat, præcidatur. Alioquin vulnus interius, ea victus ratio, eaque medicamenta sanabunt, quæ cuique visceri conuenire superiore libro proposui.

## ENARRATIO.

ad vulnus deligandum,  
lindea aptissima.

EXPURGENDA distinctio est, legendumque linea. Hippocrates libro De offi-

cina medici, Quod ad longitudinem, inquit, ac latitudinem pertinet, implant trium, quatuor, quinque aut sex digitorum quidam latitudinem, celsiorum vero longitudinem.

*De ratione victus, & notis vulnorum, curationibusque eorum.*

**H**is ita primo die ordinatis, homo in lecto collocandus est, isque, si graue vulnus est, abstinere, quantum vires patiuntur, ante inflammationem à cibo debet: bibere, donec sitim finiat, aquam calidam: vel si æstas est, neque febris neque dolor est, etiam frigidam. Ad eò tamen nihil perpetuum est. Sed semper pro viribus corporis æstimandum, ut imbecillitas etiam cibum protinus facere necessarium possit, tenuem scilicet & exiguum, qui tantum sustineat. Multi que etiam ex profluvio sanguinis inter morientes, ante ullam curationem in vino reficiendi sunt, quod alioqui inimicissimum vulnere est. Nimis verò intumescere vulnus, periculosum: nihil intumescere, periculosissimum est. Illud indicium est magnæ inflammationis, hoc emortui corporis. Protinusque si mens homini consistit, si nulla febris accessit, scire licet, maturè.



turè vulnus sanum fore. Ac ne febris quidem terrere debet, si in magno vulnere, dum \*inflatio est, permanet. Illa pernicio-  
 ciosa est, quæ vel leui vulneri superuenit, vel ultra tempus in-  
 inflammationis durat, vel delirium mouet, vel si neruorum \*ri-  
 gor, aut distentio, quæ ex vulnere orta est, eam non finit. Vo-  
 mitus quoque biliosus non voluntarius, vel protinus vt per-  
 cussus est aliquis, vel dum inflammatio manet, malum si-  
 gnum est in his duntaxat, quorum vel nerui, vel etiam ner-  
 uosi loci vulnerati sunt. Sponte tamen vomere non alienum  
 est, præcipuè his, quibus in consuetudine fuit: sed neque  
 protinus post cibum, neque iam inflammatione orta, neque  
 cum in superioribus partibus plaga est. Biduo sic vulnere ha-  
 bito, tertio die id aperiendum, detergendaque sanies ex aqua  
 frigida est, eademque rursus iniicienda sunt. Quinto \*iam  
 die quanta inflammatio futura est, se ostendit. Quo die rur-  
 sus detecto vulnere considerandus color est. Quod si liui-  
 dus, aut pallidus, aut varius, aut niger est, scire licet malum  
 vulnus esse: idque quodcumque animaduersum est, terrere  
 nos potest. Album, aut rubicundum esse vlcus, commodis-  
 simum est. Item cutis dura, crassa, dolens, periculum osten-  
 dit. Bona signa sunt, vbi hæc sine dolore tenuis, & mollis  
 est. Sed si glutinatur vulnus, aut leuiter intumuit, eadem  
 sunt imponenda, quæ primò fuerunt. Si grauis inflammatio  
 est, neque glutinandi spes est, eaque pus moueat, aquæ quo-  
 que calidæ necessarius vsus est, vt & materiam digerat, & du-  
 ritiam emolliat, & pus citet. Ea sic temperanda est, vt &  
 manu contingenti iocunda sit, vsque eò adhibenda donec  
 aliquid ex tumore minuisse, \*coloremque vlceri magis na-  
 turalem reddidisse videatur: maximeque si grande vulnus  
 est, tetrapharmacum: si in articulis, digitis, locis cartilagino-  
 sis, rhyodes. Post id fomentum, si \*lata plaga non pater,  
 imponi protinus emplastrum debet, \* & si latius hiat, illud  
 emplastrum liquari ex irino vnguento oportet: eoque illita  
 linamenta disponi per plagam, deinde emplastrum suprà dari,  
 & super id succidam lanam, minusque etiam, quàm primo,  
 fasciæ astringendæ sunt.

RR 2

ENAR-

\* inflam-  
matio\* rigorem,  
aut disten-  
sionem q.  
e. v. o. est,  
ca. a.

\* tamen

\* calorem

\* latè

\* maxime-

que si grã-

de vulnus

est, tetra-

pharmacu-

si in articu-

lis, digitis,

locis carti-

laginosi,

rhyodes:

et si latius



## ENARRATIO.

abstinere.

**H**IPPOCRATES libro De affectionibus, & de ulceribus, Vulneratos, inquit, fame affligito, & ex alio qua insunt subducito, aut chylere, aut pharmaco infra purgante exhibitio, & in potu dato aquam vel acetum; inflammata cataplasmati frigefacito. Celsus hic pro virium ac temporis ratione limitationem quandam addit.

nihil intumescere.

**H**IPPOCRATES. sectione v. Aphorismo LXVI. In vulneribus fortibus & prauis, si tumor non appareat, ingens malum est: certum etenim est materiam ad interiora, atque adeo nobiliores partes rapi, atque inibi maiori noxa originem dare. Celsus signum emortui corporis esse dicit.

vel si neruorum rigor.

**H**IPPOCRATES segmento v. Aphorismo 11. Convulsio ex vulnere lethalis est, inquit: atque id quidem duabus de causis; partim videlicet quod ex inanitione fiat. atque sic idem eodem libro dicit, ubi sanguis plurimus fluxit, singultus, aut convulsio superueniens, malum; partim quod necessum sit magnum esse vulnus idque in nervoso genere, quod lege consortij cerebrum quoque afficiat. hinc & vomitum non spontaneum

tanquam convulsorum suspectum etiam habet.

Quinto iam die.

**T**ERTIO etenim & quarto die se se revolvunt vulnera, ut docet Hippocrates: unde si qua in metu sit inflammatio, quinto die sese exeret.

Si gravis inflammatio.

**Q**UOTQVOT haecenus videre contigit exemplaria, locum hunc depravate legunt: siquidem Pinzanum, quod securus est Ioannes Oporinus, si gravis inflammatio est, neque glutinandi spes est, ea que pus moveant: Ioannes Casarius, si gravis inflammatio est, neque glutinandi spes est, neque moveretur, legere maluit: ego (nisi quid me fallat opinio) legendum existimo: ea que pus moueant. & quod sic legendum sit, me monuit ipse Celsus, qui aquam calidam idem utilem esse dixit, quod pus citet. Porro quod ad calidae usum attinet, sic scriptum reliquit Hippocrates: Quod ad aquae calorem pertinet & copiam, calor vehementior non sit, quam ut infusa ferri possit a manu. copiam, ubi relaxandum tenuandique est, esse conveniens: maximam; ubi caro producenda est aut molliendum, modicam.

Curationes propriae articulorum.

\* dicenda

\* &amp; ea

\* Magisq.  
quo maiore,  
& quo  
in mai.

**P**ROPRIE quaedam in articulis \* visenda sunt, in quibus si praecisi nervi sunt, qui continebant, debilitas eius partis sequitur. Si id dubium est, & ex acuto telo plaga est, \* ea transversa commodior est. Si retuso & graui est, nullum in figura discrimen est. At visendum est pus supra articulum, an infra nascatur. Si sub eo nascitur, albumque & crassum diu fertur, nervum praecisum esse credibile est. \* Magis quoque, maiores dolores inflammationesque quo maturius excitatae sunt. Quamvis autem non abscissus nervus est, tamen si circa



circa tumor durus diu permanet, necesse est & diuturnum vlcus esse, & sano quoque eo tumorem permanere, futurumque est, vt tardè membrum id extendatur vel contrahatur. Maior tamen in extendendo mora est, vbi recuruato articulo curatio adhibita est, quàm in recuruando eo, quod rectum continuerimus. Collocari quoque membrum quod ictum est ratione certa debet. Si glutinandum est, vt superius sit, si in \* inflammatione est, vt in neutram partem inclinatum sit. Si iam pus profluit, vt deuexum sit. Optimum etiam medicamentum quies est: moueri & ambulare, nisi sanis, alienum est. Minus tamen his est periculosum, qui in capite vel in brachiis, quàm qui in inferioribus partibus vulnerati sunt. Minimeque ambulatio conuenit, femine, aut crure, aut pede laborante. Locus in quo cubabit tepidus esse debet. Balneum quoque dum parum vulnus purum est, inter res infestissimas est. Nam id & humidum, & sordidum reddit, ex quibus ad cancrum transitus esse consuevit. Levis frictio rectè adhibetur, sed his partibus, quæ longius absunt à vulnere.

\* eo inflatio est.

## ENARRATIO.

ARTICVLORVM vulnera omnia Galenus Cacoëthe vocat Methodi medendi libro, tum quòd nervorum distentionem inferre soleant, tum quòd ex dolore vigiliarum & delirij periculum instet.

ea transuersa.

GALENVS tamen libro Methodi sexto nervum per transuersum vulneratum conuulsiōi opportuniorem dicit, quàm per directum.

*Vulnus quomodo purgandum est.*

INFLAMMATIONE finita, vulnus purgandum est. Id optimè faciunt tincta in melle linamenta, supraque id, emplastrum, \* vel enneapharmacum dandum est. Tum demum verò purum vlcus est, cum rubet, ac nimium neque siccum, neque humidum est. Ac quodcunque sensu caret, quod non naturaliter sentit, quod nimium aut aridum, aut humidum est: quod aut pallidum, aut albidum, aut liuidum, aut nigrum est, id purum non est.

\* tetrapharmacum, vel:



## ENARRATIO.

**D**ETERGET mel, & humores euocat: dida ulcera finisq; commodissime insun-  
qua ratione, inquit Dioscorides, infor-  
dicur.

*Quomodo vulnus implendum est.*

• etiam  
pleniora.

• At si

• carnis  
pl.

**P**VRGATO, sequitur vt impleatur, iam q; calida aqua cate-  
nus necessaria est, vt sanies remoueatur. Lanæ succidæ  
superuacuu vsus est. Lota melius circumdatur. Ad imple-  
dum autem vulnus proficiunt quidem etiam medicamenta  
aliqua. Itaque ea adhiberi non alienum est, vt butyrum cum  
rosa, exigua mellis parte, aut cum eadem parte, aut cum ea-  
dem rosa tetrapharmacum, aut ex rosa linamenta. Plus ta-  
men proficit balneum rarum. Cibi boni succi, vitatis omni-  
bus acribus, sed \* iam plenioribus. Nam & auis, & venatio,  
& suilla elixa dari potest. Vinum omnibus dum febris, dum  
inflammatio est, alienum est. Item q; vsque ad cicatricem,  
si nerui, musculiue vulnerati sunt, etiam si altè caro\*, aut si  
plaga in summa cute generis tutioris est, potest non periculus,  
modicè tamen datum, ad implendum quoque proficere. Si  
quid mollendum est, quod in neruosis locis, musculosisq;  
necessarium est, cerato quoque super vulnus vtendum est.  
At si caro supercreuit, modicè reprimat siccum linamentum,  
vehementius squama aris. Si \* plus est, quod tolli opus est,  
adhibenda sunt etiam nuna vehementiora, quæ corpus ex-  
dant. Cicatricem post omnia hæc commodè inducit, lycium  
ex passo, aut lacte dilutum, vel etiam per se impositum sic-  
cum linamentum.

## ENARRATIO.

vt butyrum cum rosa.

modicè reprimat siccum.

**P**vs magis moueris, sordidumque vlcus  
reddideris quam vulnus impleris, aut  
carnem produxeris.

**V**ALENTIVS effeceris, si prius ex acri-  
minia imbutum resiccaris.

*De vlceri-*



*De ulceribus, quæ extrinsecus per vulnera incidunt,  
curationibûsque eorum.*

**H**ic ordo felicitis curationis est. Sed quædam tamen periculosa incidere consuerunt. Interdum enim vetustas vlcus occupat, induciturque ei callus, & circum oræ crassæ liuent, post quæ quicquid medicamentorum ingeritur, parum proficit, quod fere negligenter curato vlceri superuenit. Interdum vel ex nimia inflammatione, vel ob æstus immodicos, vel ob nimia frigora, vel quia nimis vulnus adstrictum est, vel quia corpus aut senile, aut mali habitus est, cancer occupat. Id genus à Græcis diductum in species est, nostris vocabulis non est. Omnis autem cancer non solum id corrumpit, quod occupauit, sed etiam serpit, deinde aliis aliisque signis discernitur. Nam modò super inflammationem rubor vlcus ambit, isque cum dolore procedit, *ερυσίπelas* Græci nominant. Modò vlcus nigrum est, quia caro eius corrupta est. Idque vehementius etiam putrescendo <sup>\*discernitur.</sup> intenditur. Vbi vulnus humidum est, & ex nigro vlcere humor pallidus fertur, mali que odoris est, carunculæ corruptæ. Interdum etiam nerui ac membranæ resoluuntur, specillumque demissum descendit aut in latus, aut deorsum, eoque vitio nonnunquam os quoque afficitur. Modò oritur ea, quam Græci *γὰρ ἡγεῖται* appellant. Priores in qualibet parte corporis fiunt. Hæc in prominentibus membris, id est inter ungues, & alas, vel inguina, fereque in senibus, vel his quorum corpus mali habitus est. Caro in vlcere vel nigra, vel liuida est, sed sicca & arida, proximaque cutis plerumque subnigris <sup>\*extenditur.</sup> pustulis impletur, deinde ei proxima vel pallida, vel liuida, fereque rugosa sine sensu est: Vltior in inflammatione est, omniaque ea simul serpunt: Vlcus in locum pustulosum: Pustulæ, in eum qui pallet aut fiuet: Pallor aut liuor, in id quod inflammatum est: Inflammatio, in id quod integrum est, transit. Inter hæc deinde febris acuta oritur, ingensque sitis, quibusdam etiam delirium accedit, alij quamuis mentis suæ compotes sunt, balbutiendo tamen vix sensus suos ore explicant. Incipit affici



pit affici stomachus. Fit foedi spiritus ipse odoris. Atque initium eius quidem mali recipit curationem. Vbi verò penitus insedit, insanabile est, plurimique sub frigido sudore moriuntur.

## ENARRATIO.

QUANQVAM indifferenter vulnus & vulcus apud probatores auctores, praesertimque Hippocratem, pro eodem accipi contendant nonnulli: videmus tamen hic à Celso alterum ab altero esse distinctum.

Omnis autem cancer.

QUANDOQVIDEM Gulielmus Paracelsus breuissimè caput hoc enarravit, non pigebit hic eiusdem verba ascribere, ne (quod semper mihi religio fuit) alios suo

defraudem honore: Tres, inquit, canceri species facit Celsus, erysipelam, gangranam, & vulcus nigrum. Vultum autem istud cancer dici caput est, vel quia vena qua in eius ambitu circumiacent, sic tument & implentur, ut cancerorum pedes sua forma imitari atque exprimere videantur; vel quòd renacissimè hoc malum, ubi semel apprehenderit, inhaeret: quo modo & cancri dissimillimè ab eo quod suis chelis amplectuntur, auelli possunt.

## Curatio ulceris.

\* concidendum  
al. excid.  
\* carnicula  
\* has, vel  
hoc

\* nolit,

Ac pericula quidem vulnerum hæc sunt. Vetus autem vlcus scalpello \* incidendum est, excidendæque eius ora, & quicquid super eas liuet, æquè incidendum. Si \* varicula intus est, quæ \* his sanari prohibet, ea quoque excidenda. Deinde, ubi sanguis emissus, nouatumque vulnus est, eadem curatio adhibenda, quæ in recentibus vulneribus exposita est. Si scalpello aliquis uti \* non vult, potest sanare id emplastrum, quod ex ladano fit, & cum vlcus sub eo exesum est, id quo cicatrix inducitur.

## ENARRATIO.

emplastrum quod ex ladano.

QVONIAM ea quæ præcedunt clariora sunt quàm ut ampliore enarratione egeant, volentes præterimus. Ceterum quando hic emplastri quod Ἀλγ' λανδανον vocari dicit, mentionem facit; duximus non omnino inutile fore, quæ ingre-

diuntur simplicia enumerare, posteaquam id à Celso nostro omissum est. Recipit igitur argenti spuma \* p<sup>o</sup> XL. ladani \* p<sup>o</sup> XXXII. chalcanti \* p<sup>o</sup> VIIII. aluminis scissilis \* p<sup>o</sup> XII. cera \* p<sup>o</sup> C. squamma \* p<sup>o</sup> VIII. bituminis \* p<sup>o</sup> XXXII. myrti quartam hemina partem, vinum Falernum succi adicitur.

## Curatio Erysipelatum.

Id autem quod Erysipelas vocari dixi, non solum vulneri superuenire, sed sine hoc quoque oriri consuevit, atque interdum



terdum periculum maius affert, utique si circa <sup>\*cervicem</sup> ceruices aut <sup>\*cervicem</sup> caput constitit. Oportet, si vires patiuntur, sanguinem mittere, deinde imponere simul reprimentia & refrigerantia, maximeq. cerussam solani succo, aut cimoliam cretam aqua <sup>\*pluviali</sup> pluiali exceptam, aut ex eadem aqua subactam farinam <sup>\*lenticula.</sup> cupresso adiecta, aut si tenerius corpus est, <sup>\*lenticula.</sup> lenticulam. Quicquid impositum est, betæ folio contegendum est, & super linteolum frigida aqua madens imponendum. Si per se refrigerantia parum proderunt, miscenda erunt hoc modo, sulphuris p. i. <sup>\*p. xii.</sup> cerussæ & croci, singulorum <sup>\*al. xxi.</sup> p. xx. <sup>\*al. xxxi.</sup> æque cum vino conterenda sunt, & id his illinendum: aut si durior locus est, solani folia contrita, suillæ adipi miscenda sunt, & illita linteolo superiniicienda. At si nigrities est, neque dum serpit, imponenda sunt, quæ carnem putrem lenius exedant, repurgatumque vlcus sic ut cætera nutriendum est. Si magis putre est, iamque procedit ac serpit, opus est vehementius erodentibus. Si ne hæc quidem euincunt, aduri locus debet, donec ex eo nullus humor feratur: nam quod sanum est, siccum est cum aduritur, post vitionem putris vlcis superponenda sunt quæ crassas à vino resoluant, eas <sup>\*resina vsta.</sup> ῥαλέας Græci vocant. Vbi exciderunt, purgandum vlcus maxime melle & <sup>\*coque</sup> resina est, sed aliis quoque purgari potest, quibus purulenta curantur, eodemque modo ad sanitatem perducendum est.

## ENARRATIO.

QVOD si ulceratus locus incalascet aut doleat, aut colorem ex sano rutilicundum, aut aliam notam quamcumque exiguan præ se ferat, verendum est ne erysipelas subsequatur. quam suspicionem augebit, natura patientis biliosa, tempus anni calidum, & regio, reliquaque eius generis. Porro Galenus tumorem ex seriente & tenui sanguine constat, primatim quidem & propriè erysipelas vocavit: quum verò nec planè biliosa, nec sanguineæ fluxio existat, sed ex ambabus mixta, utique ab eo quod in vixtura superat, nomen vitio indidit; ac

modò erysipelas phlegmonodes, nunc inflammationem erysipelatodem nominavit. Cæterum quæ cervicem aut caput excipit erysipela, merito periculosa dicitur Celsò; ut quæ, nisi subito succurratur, suffocet ac strangulet.

## Oportet, si vires patiuntur.

HIPPOCRATES libro De ulceribus, rationem materia peccantis habens, Cuiusque, inquit, ulcersi supervenerit erysipela, purgare corpus convenit seu deiectione, seu vomitu, prout ulcersi præstabit. Celsus maiorem.

S S.



iozem respectum habens ad inflammationem, quæ eidem comes magna ex parte esse solet, sanguinem mittendum esse dicit: quanquam præstiterit ex Hippocratis præscripto, nisi quid obftet, medicamento purgante aluum sollicitare, atque bilem ducere.

### Sulphuris.

SI spumam argenti & opium addideris, Oribasij pastillum ad erysipelam reddideris.

### Si magis putre est.

MALVM id esse dicit Hippocrates se-

ctione septima Aphorismorum: quod videlicet partes in superficie existentes, non solum exulceret, sed & interiores & profundiores depascat.

### cas ἐχάρας Græci.

IOANNES CASALIUS ex Suida: ἐχάρας, φησὶ, καλεῖται τοιοῦτον καὶ ἀμύνει τὴν μὴ ἔχουσαν ὕψος, ἀλλ' ἐπὶ γῆς ἰδρυμένην, ἢ κτίλιν, παρ' ὃ καὶ τοὺς ἰατροὺς τὰ αὐτῶν σωματῶν κοίλα ἐλκεῖ ἐχάρας καλεῖται.

### Curatio Gangræne.

**G**ANGRÆENAM verò, si nondum planè tenet, sed adhuc incipit, curare non difficillimum est, utique in corpore iuuenili, & magis etiam si muscoli integri sunt, si nerui vel læsi non sunt, vel leuiter affecti sunt, neque vllus magnus articulus nudatus est, aut carnis in eo loco paulum est, ideoque non multum, quod putresceret, fuit, consistitque coloco vitium: quod maximè fieri in digito potest. In eiusmodi casu primum est, si vires patiuntur, sanguinem mittere. Deinde quicquid aridum est, & intentione quadam proximum quoque locum malè habet, \* vsque ad sanum corpus \* concidere. Medicamenta verò dum malum serpit, adhibenda nulla sunt, quæ pus mouere consuerunt, ideoque ne aqua quidem calida. Grauius quoque, quamuis reprimantia, aliena sunt. Sed his quàm leuissimis opus est, superque ea quæ inflammata sunt, vtendum est refrigerantibus. Si nihilo magis malum constitit, vri id, quod est inter integrum ac vitiatum locum, debet. Præcipueque in hoc casu petendum, non à medicamentis solum, sed etiam à victus ratione præsidium est. Neque enim id malum nisi corrupti vitiosi que corporis est. Ergo, primò, nisi imbecillitas prohibet, abstinentia vtendum. Deinde danda quæ per cibum potionemque aluum, ideoque etiam corpus, adstringant, sed ea leuia. Postea, si vitium constitit, imponi super vulnus eadem debent, quæ in putri vlcere præscripta sunt. At tum quoque pleniori-

\* extensio-  
ne  
\* vsque co  
sa.  
\* excidere



plenioribus cibis vti licebit ex media materia, \* sic tamen non \* sed  
 nisi aluum, corpusque siccantibus: aqua verò pluuiali frigida  
 balneum (nisi iam certa fiducia redditæ sanitatis est) alie-  
 num est, siquidem emollitum in eo \* vulnus, cito rursus eo \* vlcus,  
 dem malo afficitur. Solent verò nonnunquam nihil omnia  
 auxilia proficere, ac nihilominus serpere \* his cancer. Inter \* is  
 quæ miserum, sed vnicum, auxilium est, vt cætera pars cor-  
 poris tuta sit, membrum, quod paulatim emoritur, absin-  
 dere. Hæ grauissimorum \* vulnerum curationes sunt. Sed \* vlcus  
 ne illa quidem negligenda, vbi integra cute interior pars col-  
 lisa est, aut vbi derafum, attritumve aliquid est, aut vbi sur-  
 culus corporis infixus est, aut vbi tenue, sed altum vulnus in-  
 fedit. In primo casu commodissimum est malicorium ex  
 vino coquere, interioremque eius partem conterere, & cera-  
 to miscere ex rosa factò, idque \* supponere: deinde vbi cutis \* superpo-  
 ipsa exasperata est, inducere lene medicamentum, quale λι- nere:  
 παρ' est. Derafo verò detricto que imponendum est empla-  
 strum tetrapharmacum, minuendusque cibus, & vinum sub-  
 trahendum. Neque id quia non habebit altiores ictus, con-  
 temnendum erit. Siquidem ex eiusmodi casibus sæpe canceri  
 fiunt. Quod si leuius id erit, & in parte exigua, contenti esse  
 poterimus eodem leni medicamento. Surculum verò (si fieri  
 potest) oportet vel manu, vel etiam ferramento eiicere. Si  
 vel præfractus est, vel altius descendit, quàm vt ita \* fieri pos- \* velli  
 sit, medicamento euocandus est. Optimè autem educit, su-  
 perimposita arundinis radix, si tenera est protinus contrita:  
 si iam durior, antè in mulso decocta. Cui semper mel adii-  
 ciendum est, aut aristolochia cum eodem melle. Pessima ex  
 surculis arundo est, quia aspera est. Eademque offensa, etiam  
 in \* filice est. Sed vsu cognitum est, vtranque aduersus alte-  
 ram medicamentum esse, si contrita superimposita est. Facit  
 autem idem in omnibus surculis, quodcunque medicamen-  
 tum extrahendi vim habet. Idem altis tenuibusque vulne-  
 ribus aptissimum est. Priori rei Philocratis, huic Hecatæi  
 emplastrum maximè conuenit.



## ENARRATIO.

**G**ANGRÆNAS appellant quoties membrum aliquod eb inflammationis qua confidatur magnum tument, emoritur: neque iam confirmatas tantum. sic dicunt, sed etiamnum que sunt: haec si ita intendantur, ut ipsa particula corrumpatur, in sphacelum degenerant. Porro Hippocrates id malum nasci auctor est tum libro De fracturis, tum libro De vulneribus capitis, quoties ulcus male curatur, quod si quoties egrotus improba vitæ ratione utitur, aut quoties medicamenta non satis congrua applicantur.

superque ea quæ inflammata sunt.

**G**ALENVS ante omnia priusquam affectus in sphacelum degeneret, atque prius quam pars mortificetur, sanguinem in loco affecto impactum, quantum eius fieri potest, euacuat: ex vena quidem si vena amplior in ipso membro appareat, vel aliqui cute ipsa altis plagis diuisa; sanguine siquidem ablato facile est malo mederi, si tamen membra ita vitiosa sint, ut in totum sensu sint destituta, praevidenda aut aduenda sunt, ne vicinis partibus malum communicent.

*Quomodo cicatrix vulnere inducenda, purgandaque sit.*

**V**BI verò in quolibet vulnere ventum ad inducendum cicatricem est, quod perpurgatis iam repletis vlceribus necessarium est: primum ex aqua frigida linamentum, dum caro alitur: deinde cum iam continenda est, siccum imponendum est, donec cicatrix inducatur. Tum deligari super album plumbum oportet, quo & reprimitur cicatrix, & colorem maximè sano corpori similem accipit. Idem radix sylvestris cucumeris præstat. Idem compositio, quæ habet claterij p. i. \*. spumæ argenti p. ii. \*. vnguenti pondo iiii. \*. Quæ excipiuntur resina terebinthina, donec emplastri crassitudo ex omnibus fiat. Ac nigras quoque cicatrices leniter purgant paribus portionibus mista, ærugo, plumbi clotum, eademque rosa cocta, siue vngitur cicatrix, quod in facie fieri potest: siue id ut emplastrum imponitur, quod in aliis partibus commodius est. At si vel excreuit cicatrix, vel concaua est, stultum est decoris causa rursus, & dolorem & medicinam sustinere. Alioqui res utrique succurri patitur. Si quidem utraque cicatrix exulcerari scalpello potest. Si medicamentum aliquis mauult, idem efficiunt compositiones hæc, quæ corpus exedunt. Cute exulcerata, super eminentem carnem exedentia medicamenta coniicienda sunt: super concauam



cauam impleantia, donec vtrumque vlcus sanæ cuti æquetur,  
& tum cicatrix inducatur.

## ENARRATIO.

QVOD cicatrix à cute aliud sit, docet  
Galenus libris tercio, & XIII.  
Methodi therap. Inducunt autem cicatri-  
cem quæcunque astringunt & siccant: nam,  
sicuti Paulus ait, summa vlcis caro cui  
similis efficiuntur, induciturque ei cicatrix si  
illam desicemus astringamusque, adeò ut  
non solum id quod præter naturam redundat

discutiat, verum etiam id quod secundum  
naturam est attingamus.

Ac nigras quoque  
cicatrices.

LENE admodum hoc est quod prescri-  
bit Celsus, efficaciusque effeceris si loco olei  
vini accipias, aut nitri paucillum addideris.

## CAPVT XXVII.

*De vulneribus quæ per morsus inferuntur,  
eorumque curationibus.*

DIXIT de his vulneribus, quæ maximè per tela inferun-  
tur. Sequitur, ut de his dicam, quæ morfu fiunt, inter-  
dum hominis, interdum simiæ, sæpe canis, nonnunquam  
ferorum animalium aut serpentium. Omnis autem feræ  
morsus habet quoddam virus. Itaque si vehemens vulnus  
est, cucurbitula admoenda est. Si leuius, protinus empla-  
strum iniiciendum, præcipueque \*Diogesi. Si id non est, \*Diogenis  
quodlibet ex his, quæ aduersus morsus proposui. Si ea non  
sunt, viride Alexandrinum. Si ne id quidem est, quodlibet  
non pingue ex his quæ recentibus vulneribus accommodan-  
tur. Sal quoque his, præcipueque ei, quod canis fecit, medi-  
camentum est, si manus vulnere imponitur, superque id duo-  
bus digitis verberatur: Exsaniat enim: ac salsamentum quo-  
que rectè super id vulnus deligatur.

## ENARRATIO.

Omnis autem feræ  
morsus.

PLINIVS Naturalis historia libro  
XXVIII. capite IIII. inter asperri-

mos vel hominis morsum numerari conten-  
dit, idque salina morsu vulnere illata causa:  
nam hæc, ut idem testatur, non modò homi-  
ni noxia est, sed & contra serpentes veneni  
vim obtinet. Anticennas, quod & paulo  
post



post etiam infert Celsus, ieiuni sine hominis  
sive bestia morsum nocentiorum esse dicit.

cucurbitula admoenda.

VIRVS siquidem una cum sanguine,  
& spiritu extrahitur, visq; veneni enervatur,  
ac dissoluitur.

præcipueque Diogeni.

NON omnino malè legendum hic arbitramur Ioannes Casarius, Diogenis : cuius supra à Celsò facta mentio est in emplastris, aduersus morsum, & alia recentiora vulnera.

Curatio aduersus rabiosi canis morsum.

Timor aquæ.  
ὕδρφοβία.

præuisam

**V**TIQUE autem si rabiosus canis fuit, cucurbitula virus eius extrahendum est. Deinde si locus neque nervosus neque musculosus est, vulnus id adurendum est. Si vri non potest, sanguinem homini mitti non alienum est. Tum vsto quidem vulnere superimponenda, quæ cæteris vstis, sunt. Ei verò quod expertum ignem non est, ea medicamenta, quæ vehementer exedunt. Postque nullo nouo magisterio, sed iam supraposito vlcus erit implendum, & ad sanitatem perducendum. Quidam post rabiosi canis morsum protinus in balneum mittunt, ibique patiuntur desudare, dum vires corporis sinunt, vlcere adaperto, quo magis ex eo quoque virus destillet, deinde multo, meracoque vino excipiunt quod omnibus venenis contrarium est. Idque cum ita per triduum factum est, tutus esse homo à periculo videtur. Solet autem ex eo vulnere, vbi parum occursum est, aqua timor nasci, ὕδρφοβία Græci appellant. Miserrimum genus morbi, in quo simul ager & siti, & aquæ metu cruciatur. Quo oppressis in angusto spes est. Sed vnicum tamen remedium est, nec opinantem in piscinam non antè ei præuisam proiicere. Et si natandi scientiam non habet, modò mersum bibere pati, modò attollere. Si habet, interdum deprimere, vt inuitus quoque aqua satietur. Sic enim simul & sitis & aquæ metus tollitur. Sed aliud periculum excipit, ne infirmum corpus in aqua frigida vexatum, nervorum distentio absumat. Id ne incidat, à piscina protinus in oleum calidum demittendus est. Antidotum autem, præcipue id, quod primo loco posui: vbi id non est, aliud, si nondum ager aquam horret, potui ex aqua dandum est, & si amaritudine offenditur, mel adii-



adiiciendum est. \* Et si iam is morbus occupauit, per catapota sumi potest. \* At si

## ENARRATIO.

Deinde si locus.

PRIMUM & ante omnia vulnus maius facere conuenit, osculo ipsius per scalpellum diuiso, & dilatato: Deinde etiam fissuris circumcirca locum vellicare eo studio, ut effluxum sanguinis multum per locum eliciamus, vlcus verò cauteriis ignitis amplioribus inuendendum. Auctor est Aëtius.

protinus in balneum mittunt.

SI QUIDEM una cum sudore exudat virus: quocirca ante, & post cibum mouendi sunt sudores.

aquæ timor.

AETIVS hoc malo potissimum affici testatur, qui vitiosis humoribus repleti sunt: at alij ex immodica siccitate merum aqua fieri dixerunt, quasi humida ipsorum substantia in contrarium penitus habitum mutata. Russus autem insaniam ex atra bile speciem esse dixit, veneno humorem illum imitatio: nam sicuti alij atra bile insaniunt,

alia timent, ita hydrophobi imaginem canis qui momorderit, in aqua se videre suspicantur. sic philosophus quidam, ut memoria prodidit Aëtius, à rabioso cane morus, & generoso animo affectioni resistens, & in consequens ratus canem in balneo apparere (apparerebat enim illi sicuti alijs omnibus hoc modo affectis) ratiocinatus secum atque locutus, Quid cani & balneo commune est? superauit affectionem, & sanatus est ab affectione, ubi citra timorem bibisset. Ceterum vitium hoc handquaquam prescriptum statutiūque diem habet quo inuadit, ut auctor est Actuarius: siquidem vix plurimum quidem, post quadagesimum diem negligentiores adoriri solet: attamen interdum & post sex menses, & anno elapso enadere contingit. sunt qui narrent aqua pauorem post septimum demum annum corripuisse.

Antidotum autem.

NON solum in potu theriaca danda est, sed & cum rosaceo dissoluta vulnere imposita admodum prodest.

*Curationes communes, aduersus omnes morsus serpentium.*

SERPENTIVM quoque morsus non nimium distantem curationem desiderant, quamuis in ea multum antiqui variarunt, ut in singula genera anguium singula medendi genera præciperent, atque alijs alia. Sed in omnibus eadem maximè proficiunt. Igitur in primis \* super vulnus id membrum deligandum est, non tamen nimium vehementer, ne torpeat. Dein venenum extrahendum est. Id cucurbitula optimè facit. Neque alienum est, antè scalpello circa vulnus incidere, quo plus vitiatum sanguinis extrahatur. Si cucurbitula non est, quod tamen vix incidere potest, tum quodlibet simile vas, quod idem possit. Si ne id quidem est, homo adhiben-



adhibendus est, qui vulnusexugat. Neque hercules scientiam  
*psylli.* præcipuam habent hi qui Psylli nominantur, sed audaciam  
 vsu ipso confirmatam. Nam venenum serpentis, vt quædam  
 etiam venatoria venena, quibus Galli præcipuè vtuntur, non  
 gustu, sed in vulnere nocent. Ideoque colubra ipsa tutò estur,  
 ictus eius occidit, & si stupente ea (quod per quædam medi-  
 camenta circulatores faciunt) in os digitum quis indidit, ne-  
 que percussus est, nulla in ea salua noxa est. Ergo quisquis  
*ille* exemplum Psylli secutus, id vulnus exuxerit, & ipse tutus erit,  
 & tutum hominem præstabit. \* Illud, ne intereat, antè de-  
 bebic attendere, ne quod in gingiuis, palatove, aliave parte  
 oris vlcus habeat. Post hæc is homo loco calido collocandus  
 est, sic vt id, quod percussus erit, in inferiorem partem incli-  
 netur. Si neq. qui exugat, neq. cucurbitula est, sorbere oportet  
 ius anserinum, vel ouillum, vel vitulinum & vomere. Viuum  
 autem gallinaceum pullum per medium diuidere, & protin-  
 us calidum super vulnus imponere, sic vt pars interior corpo-  
 ri iungatur. Facit id etiam hædus, agnúsve discissus, & cali-  
 da eius caro statim super vulnus imposita. Emplastra quoque,  
 quæ supra comprehensa sunt. Aptissimumque est, vel Ephe-  
 sium, vel id quod ei subiectum est. Præfensque in aliquo an-  
 tidoto præsidium est. Sin id non est, necessarium est exsor-  
 bere potionem meri vini cum pipere, vel quidlibet aliud,  
 quo calor mouendus est, ne humorem intus coire patiatur.  
 Nam maxima pars venenorum frigore interimit. Omnia  
 etiam vrinam mouentia, quia materiam extenuant, vtilia  
 sunt.

## E N A R R A T I O.

hi qui Psylli nominantur.

**P**SYLLORVM meminit Plinius Natu-  
 ralis historia libro XXI. capite xv. &  
 libro VII. capite 11. in hunc modum: Cra-  
 tes Pergamenus in Helleffonto circa Parum  
 genus hominum fuisse tradit, quos Ophio-  
 genes vocant, serpentum ictus contactu le-  
 nare solitos, & manus imposita venenum ex-  
 trahere corpori. Varro etiam nunc paucos

esse iki, quorum salua contra ictus serpen-  
 tum medeantur. Similis & in Aprica  
 gens Psyllorum fuit, vt Agatarchides scri-  
 bit, à Psyllo rege dicta, cuius sepulchrum in  
 parte Syrii maiorum est. Horum corpori  
 ingentum fuit virus exiiale serpentilus, vt  
 cuius odore sepirent eas. Mos verò liberos  
 genitos, protinus obiciendi sanissimis earum,  
 eorū genere pudicitia coniugum experiendi,  
 non proficiantibus adulterino sanguine na-  
 tos ser-



eos serpentibus. Hæc gens ipsa quidem præ  
pè internecione sublatæ est à Nasamonitæ,  
qui nunc tenent hæc sedes. Genus tamen ho-  
minum ex his qui profugerant, aut quum  
pugnatum fuerat, absuerant, hodièque re-  
manet in paucis. Simile & in Italia de  
Marforum gente durat, quos à Ciræ filio  
ortos ferunt, & idè inesse iis vim natura-  
lem cam. Hæc Plinius.

### Ergo quisquis exem- plum Psylli.

QUISQUIS ad exungendum vulnus  
se accingere vult, cibum autè sumpsisse  
debet, ac vino os colluisse, oleique momen-  
tum dum fugit in ore continere.

### Vium autem gallinaceum.

LONGE tamen præsentius erit reme-

dum, si unctionem adhibeamus: nam quum  
ignis facultas, inquit Attianus, quavis  
alia sit validior, simul veneno potitur, im-  
peditque quo minus penitus serpat, adde  
quòd eius demissa portio locum dei curatio-  
ni, quum videlicet, durante exulceratione,  
facilis sit venenieductio.

### Sin id non est neces- sarium.

NIHIL enim æquè calorem innatum  
auget, & cõseruat, ac meri porio, præterquàm  
quòd humores nocuos à partibus nobilioribus  
ad ignobiliores & extimas propellat: quo præ-  
sentius nihil in moribus venenatis est: nam  
& ob hoc summe commendantur balnea, ut  
materia foras euocetur.

### Speciales curationes aduersus ictus serpentium, & primò aduersus ictum aspidis.

HÆC aduersus omnes ictus communia sunt. Vfus ta-  
men ipse docuit, eum quem aspis percussit, acetum po-  
tius bibere debere. Quod demonstrasse dicitur casus cuius-  
dam pueri, qui cum ab hac ictus esset, & partim ob ipsum  
vulnus, partim ob immodicos æstus siti premeretur, ac locis  
siccis alium humorem non reperiret, acetum quod forte se-  
cum habebat, ebibit, & liberatus est. Credo quoniam id  
quamuis refrigerandi vim habet, tamen habet etiam diffi-  
pandi. Quo fit, ut terra respersa eo, spumet. Eadem ergo vi  
verisimile est, spissescentem quoque intus humorem homi-  
nis ab eo discuti, & sic dari sanitatem.

Aceti vis &  
natura.

### ENARRATIO.

TRIA aspidis genera prodit Galenus,  
cherseam, chelidonium, & pyadam,  
quam propriè sub aspidis nomine Celsus,  
Serenus, Dioscorides, atque alij auctores in-  
tellexerunt: hæc enim omnium perniciosissi-  
mum virus eiectur, erecto in priorem  
partem collo, ex intervallo quod satis esse  
coniciat, venenum in hominem fundit.

Huius generis fuisse traditur quam Cleo-  
patra demissa ab Augusto vberibus affixit.  
Morsus autem aspidis acus punctura similis  
est, atque omnino exiguus sine tumore ap-  
paret; sanguis non copiosus, sed exiguus &  
niger distillat: subita oculorum hebetudo  
innadit, dolor corporis multiplex admodum,  
sed mitis, nec sine voluptate comitatur; aded.

TI

ut sine:



ut sine dolore quodammodo pereant; color mutatur, & virefcit, stomachi erosio exigua inest, frons continuo contrahitur, palpebra sine sensu velut in somno commouentur, atque inter hac morsprehendit, ne tertia quidem diei parte prolata. Hinc Plinius libro XXIX. capite IIII. Aspidem, inquit, percussos torpere & somno necant, omnium serpentum minimè sensibiles.

Vfus tamen ipse docuit.

Id quo acrim, eò melius & conuenien-

tius erit. dandum autem est, quousque aciei qualitatem circa dextram præcordiorum partem percipiant: hepatis etenim morbis ab aspidem primum priuari sensu aiunt. Cæterum ad prænotionem victurus sit, nec ne percussus, centauræam cum vino vitæ præbe bibendam: siquidem si enormis pharmacum, morietur; sin minus, viuet. Auctor est Aetius.

*Aduersus ictum scorpionis.*

*Heliotropium herba solaris.*

IN quibusdam etiam aliis serpentibus, certa quædam auxilia satis nota sunt. Nam scorpio sibi ipse pulcherrimum medicamentum est. Quidam contritum cum vino bibunt, quidam eodem modo contritum super vulnus imponunt, quidam super prunam eo imposito, vulnus suffumigant, vndique veste circumdata, ne is fumus dilabatur, tum carbonem eius super vulnus deligant. Bibere autem oportet herbe solaris, quam ἡλιοτρόπιον Græci vocant, semen, vel certè folia ex vino. Super vulnus verò etiam furfures ex aceto, vel ruta syluatica rectè imponitur, vel cum melle sal tostus. Cognoui tamen medicos, qui ab scorpione ictis, nihil aliud quàm ex brachio sanguinem miserunt.

ENARRATIO.

ASCORPIONE ictis locus quamprimum inflammatur, ac durefcit, & plaga vehementissimus dolor consequitur, frigiditasque & stupor, circaque plagam & totum corpus frigidus sudor, & his qui iuxta infernas partes percussi sunt, inguina excitantur atque intumescent: qui verò circa supernas, locus sub alis, & hac quidem leniter percussus adsunt. Validius autem ictis ardor circa plagam adest, quemadmodum in anibustis, & rubore suffunduntur, & verrucarum instar formicarum eruptio, circa labra & totum corpus, ut grandine se impetenti, facies disflorquetur, sordèsq; circa oculos adsint glutinose, & lachrymæ vis-

cosæ. Plinius, Scorpium, inquit, vermiculus est venenosus, eò importunior cæteris, quòd grauiore supplicio lenta per triduum morte conficit. Virginitus lethale semper ictu, & seminis ferè in totum; viris autem in matris, exenues canis, priusquam aliquo sortuito ictu ieiunium egerant venenum.

Nam scorpio.

SCORPIVS, ut auctor noster dicit, in puluerem redactus locoque vulnerato impositus, tanquam vulneris sui medicus optulatur, ita iubente rerum nature disidio quam æritas dicitur nominant, quod testatur Plinius libro



libro x i. item Aegineta ac Aetius, & præter eos Serenus hoc carmine :

At cui vulnus atrox incussit scorpius  
ardens,  
Continuò capitur: tunc digna cædere  
rufus  
Vulncribusque actus fertur reuocare  
dolorem.

ruta fyluatica.

EFFICACIOR erit si eidem Galbanum  
spleny niore extansum locoque inductum, &

in vino dissolutum addatur, aut cum ipsius  
ruta decocto, aut cum ruta.

Cognoui tamen  
medicos.

SANGVINIS mistio, etsi omnibus à  
virulento animali morsu consueat, atque  
eis præsertim qui plethorici sunt, si venenum  
per corpus fuerit dispersum; nescio tamen an  
à scorpione ictos persanare possit.

*Aduersus aranei, & scorpionis ictum.*

ET ad scorpionis autem, & ad aranei ictum, allium cum  
ruta rectè miscetur, ex oleo que contritum superimponitur.

#### ENARRATIO.

PLINIVS inter araneas solum phalan-  
gium noxium esse existimat: Aegineta  
etiam aliud aranearum genus esse dicit, quod  
percuttis validos dolores circa media præ-  
cordia excitat, & ruborem, & urina diffi-  
cultatem; nonnunquam etiam & strangula-  
tum. Id murem cæcum, vel murem ara-

neum vocat Scribonius: Græci *μυρμάρη* ap-  
pellant. huius meminit in Theriacis suis  
Nicander.

allium cum ruta.

NON modò impositum allium remedio  
est, sed & si sumatur, vinumque meracius  
superbibatur, iuuabit.

*Aduersus cerastis, & dipsadis, & hæmorrhoidis ictum.*

AT si cerastes, aut dipsas, aut hæmorrhoids, percussit,  
asphodeli, quod Aegyptiæ fabæ magnitudinem æquet, arefactum, in duas \* potiones diuidendum est, sic ut ei rutæ paulum adiiciatur. Trifolium quoque, & menthastrum, & cum aceto panaces æquè proficiunt. Costumque & casia, & cinnamomum rectè per potionem assumuntur.

\* carapo-  
tium  
• portio-  
nes

#### ENARRATIO.

A Ceraste percussis elenatio & tumor  
plage insurgit, capitis clavi similitu-  
dine, ac totum corpus variculis modo astol-  
litur: emanat autem ex vulnere sanies,  
modò nigra, modò sippallida, & porraceo  
colore: genitale attingitur, mente alienatur,

oculi obscurascunt; postremo, convulsione  
rigentium instar perenni. At qui à dipsade  
morsi sunt (est autem dipsas vipera species,  
à nonnullis præter, & caulos appellata)  
siti intolerabili urgentur; ita ut etiam si  
quanti maxime bibant, lenamen sitis nullum  
perferant.

TT 2



perjensissit: manus omnes ita obstruantur, ut nec vomant, sudant, meliant, aut alius excrementis exonerentur; quo fit ut si ad lenandam sitim multam bibant, distendatur venter, adeo ut inferre circa inguina, vel circa immum ventrem distumpantur. Ab hamorrhoe vel hamorrhoeide percussos consequitur color isti loci cruentus, mali coloris & nigricans; gravibus atque in dem ex acris excruciantur doloribus: in principio quidem ex plaga nihil effluit, praeter paucum quippiam aquosum: ac macilentia, atque strigosa prorsus ob cruciatum constrictam red-duntur corpora; pregressi vero temporis, non solum e plaga promanat sanguis sed & reliqua si quae ante in corpore fuerint vulnera, iam diu cicatrice obducta, disruptis cicatricibus sanguinem fundunt. Quin & idem ex naribus fluit; idque potissimum si masculus fuerit qui momordit. alii quoque excrementa sanguinea sunt, cruor quoque is qui

amamat, ferè in grumos conrescit. Quod si foemina fuerit, ex toto corpore sanguinem effervi continget. ita ut ex venarum radicibus, angulis oculorum, dentium gingivis sanguis effervat atque distillet. In genere omnes dolore stomachi, & spirandi difficultate deimuntur.

### asphodeli.

TANTVM antiquitas asphodelo tribuebat, ut ante portas villarum satum, remedio esse crederent contra veneficorum morsum. Pynxanum exemplar loco asphodeli, perperam spoli legit. Trifolium autem praesentissimum adversus omnium serpentium ictus remedium esse dicebant; adeo ut xxv. grana eius adversus omnia venena sufficere pro antidoto dicerent, neque aliter eo viendum quam contra venena censuerunt: efficacius autem reliquis bituminosum est.

### Aversus chersydri ictum, & cerasitis.

ADVERSUS chersydri verò ictum, panaces, aut laser, quod sit scrupulorum \* p. 11. \* vel porri succus cum hemina vini sumendus est, & edenda multa satureia. Imponendum autem super vulnus stercus caprinum ex aceto coctum, aut ex eodem ordeacea farina, aut ruta, vel nepeta, cum sale contrita melle adiecto. Quod in eo quoque vulnere, quod cerasites fecit, aequè valet.

### ENARRATIO.

SERPENS hic, ut auctor est Aëlius, chersydri appellationem inde habet, quod in principio quidem in aquosis degit locis, & hydrys, id est natix (sic enim vocat Plinius) ab ipsis aquis appellatur: postea verò siccos incolit locos, & ex compositione locorum, chersydri, hoc est natix terrestis nomen innent. In terra autem degens chersydros appellatur; & tunc sarè seipso senior redditur, quod in humidis locis humido vitu exsatiatur, nec purum venenum habeat:

siquidem, quemadmodum auctor est Aristoteles libro De natura animalium, serpentes non parum inter se differunt, pro loci, & regionis in qua sunt diversitate. Nam loca montosa, aspera & calida venenata magis producent animalia; omitto quod morum etiam diversitatem concitent; montosa siquidem aspera & inaccessa loca, animalia omnis generis efferaiora aspectu, & robustiora producent, locis planis declinibus, & mollibus. Quare non debeat alicui mirum videri,



videri, si chersydri morsus, natricis periculoso-  
siores dixerimus. Natricis porro morsu  
vltima factum, dilatur, & linefcens ange-  
tur, faniesque ex eo nigra, & copiosa, &  
fædi odoris, qualis ex depafcente ulcere ex-  
cernitur. Morsos confequitur vertigo ocu-  
lorum, exolutio, vomitus biliofi, fæidi, ac  
molus quidam corporis totius inordinatus, ita

ut per ventrem quædam inordinata feran-  
tur.

### Imponendum autem.

CAPRINVM ftercus Græci propriè  
καπρίδιον nominant; id ex aceto ad vipe-  
rarum morsum non inutile eſſe docet Gale-  
nus, adeò ut complures eo ſervatos dicat.

### Aduerſus phalangii icſum.

**V**BI verò phalangium nocuit, præter eam curationem  
quæ manu \* redditur, sæpe homo demittendus in fo-  
hum eſt, dandusque ei myrrhæ, & vixæ taminix par modus  
ex paſſi hemina, vel radiculæ ſemen, aut lolij radix ex vino, &  
ſuper vulnus furfures ex aceto coctæ, imperandumque ut is  
conqueſcat.

### ENARRATIO.

**PHALANGIUM** Italia ignotum eſt,  
teſte Plinio, & eſt plurimum generum:  
Aëtiũ ſex ut plurimum numero eſſe dicit; ac  
primum quidem rhagium, id eſt acineum,  
vocati, figura rotundum, colore nigrum  
acino vixæ ſimile, & os quidem iuxta me-  
dium ventrem habet, pedibus breviſſimis  
tamquam imperfectis, dolor à morſu eius,  
qualis à ſcorpione: lotium ſimile araneis  
textis. Alterum lupus appellatur, corpus la-  
tius ac volubile habens, partes verò circa  
collum ipſius incifa ſunt, amplius autem &  
os eius eminentias tres habet. Tertium myr-  
mecium, hoc eſt fornicarium dictum eſt,  
formica maximè aſſimilatur capite; aluo vi-  
gra guttis albis velut aſtris quibuſdam di-  
ſtinguentibus, veſperum dolore torquet.  
Quartum cravocolaptes, ſublongum eſt &  
viride ſtimulũque iuxta collum habet, at-  
que ſi in quem irruat, locos circa caput pe-  
tit. Quintum ſclerocephalum dictum, caput  
habet ſaxæum & obduratum, linamenta  
verò per omne corpus ſimilia animalibus il-  
lis quæ noctu lucernas circumvolitant.  
Sextum deinceps ſcolecium ſive vermica-  
rium appellatum, ſublongum eſt & macu-

loſum, maximè circa caput. Et hæc qui le-  
de phalangiorum generibus ex Aëtio. Cæ-  
terum à morſu phalangiorum locus rubet,  
& veluti aculeo punctus apparet, non tamen  
tumor, neque incaleſcit, ſed leniter rubidus  
frigore, & pruritu vexatur. Morsos autem  
moleſtat dolor aſſiduus, tremor, pallor, vi-  
gilix; quosdam etiam pudendi intentio, con-  
tinua urinx excernenda excitatio, nonnul-  
lis urinx difficultas: intumeſcit autem uni-  
verſum corpus, facièsque, & maximè circa  
linguam partes, ut impediri habeat ſer-  
monem. Sunt nonnulli, præſertim qui ab  
aculeo morſi ſunt, qui ſi mingant, aquoſa  
omnino reddant, in quibus quædam aranea-  
rum telis ſimilia continentur; ſed & iſdem  
vomitus ſimilis excernitur; nonnullis etiam  
talìa excrementa reiiciuntur; magna tamen  
ex parte difficulter eadem ſubſequentur.

### sæpe homo.

**NIHIL** æquè prodeſt morſis à phalan-  
gio, quàm aſſidua balnea, aut ſomenta ſpon-  
giarum in calido aceto tinctarum, & sæpe  
ad plagam adhibitarum: nam niſi continuus  
uſus ſit, aut sæpe balneum reiteretur. parum  
admodum



admodum profuerit : quando cerum sit  
morfos quidem si quando in aquam calidam  
demittantur, dolore liberari, atque rursus  
posteaquam exempti fuerint, validius in-  
dolefcere.

& super vulnus furfures.

IDEM feceris ficulneum cinis cum sale  
ex vino subactum : proderit etiam ulcera  
aqua marina fomentasse.

*Aduersus ictus Italorum anguium, qui minus ter-  
ribiles peregrinis sunt.*

\*bryonia  
\*argem.  
\*personi-  
ta,

**V**ERVM hæc genera serpentium & peregrina, & aliquanto  
magis pestifera sunt, maximeque æstuosis locis gignun-  
tur. Italia, frigidioresque regiones hac quoque parte salubrita-  
tem habent, quod minus terribiles angues edunt. Aduersus  
quos satis proficit herba \*betonica, vel cantabrica, vel centau-  
rion, vel \*agrimonia, vel trixago, vel \*personina, vel marinæ  
pastinacæ, singulæ binæve tritæ, & cum vino potui datæ, &  
super vulnus impositæ. Illud ignorari non oportet, omnis  
serpentis ictum & ieiuni, & ieiuno magis nocere. Ideoque  
perniciosissimi sunt cum incubant. Vtilissimumque est, ubi  
ex anguibus metus est, non antè progredi, quam quis aliquid  
assumpsit.

#### ENARRATIO.

**A**NGVIS, ut auctor est Plinius, vene-  
natus non est, nisi per mensem infliga-  
tus luna.

Illud ignorari non oportet.

CIBATIONE enim virulentia quodam-  
modo mitigatur, & ieiunio venenositas per  
corpus facilius distribuitur.

*Remedium generale aduersus omnia venena, vel in  
cibo, vel in potione assumpta.*

**N**ON tam facile his opitulari est, qui venenum, vel in  
cibo, vel in potione sumpserunt. Primum, quia non  
protinus sentiunt, ut ab angue icti, ita ne succurrere quidem  
statim sibi possunt. Deinde, quia noxa non à cute, sed ab  
interioribus partibus incipit. Commodissimum est tamen,  
ubi primum sensit aliquis, protinus oleo multo epoto vomere.  
Deinde ubi præcordia exhausta, bibere antidotum. Si id  
non est, vel merum vinum.

ENAR-



## ENARRATIO.

## Primum quia.

**S**I quis tamen in cibo aut potu suspectum habeat venenum, certis notis quale id sit deprehendet: ex odore enim & amantitudine cili, & potus, ut auctor est Aëtius, optimi agnoscitur; ex colore, cerussa, calx, gypsum; ex his vero quæ in cibo & potu innatant, lac coagulatum, & recens mactati tauri sanguis; ex fetore autem & qualitate ac odore, rana vulbera, lepus marinus; & reliqua omnia certis aliquibus signis discernuntur. Nam & præter hæc, post sum-

ptum venenum statim ac de repente à sumpto cibo varia accessiones irruunt: de quibus sigillatim hic enarrabimus.

## Commodissimum est.

**V**BI videlicet datum venenum adhuc dum in venire est, inibi que per se nauseam facit: nam alioqui, si ad intestina usque penetrarit, & tormina circa umbilicum induxerit, magis fuerit necessarius clyster; quemadmodum etiam si ad vesicam devenerit, in secessu in aqua & oleo laudantur.

*Specialia remedia aduersus quedam venena, & primò aduersus cantharidas.*

**S**VNT tamen quædam remedia propria aduersus quædam venena, maximeque leuiora. Nam si cantharidas aliquis ebibit, panaces cum lacte contusa, vel galbano, vino adiecto dari, vel lac per se debet.

## ENARRATIO.

**M**ALEFICORVM, inquit sexto Epidemion Hippocrates, lac, allium, vinum feruidum, acerrum & sal remedia existunt; per malefica, venenata animalia intelligens: nam quod potissimum aduersentur, lac, vinum, allium, auctor est Dioscorides xxxix. capite libri sexti.

## Nam si cantharidas.

**CANTHARIDES** gustum & odorem similem pici e cedro facta habent: potæ sto-

machi dolorem morsusque excitant, præcipueque vesica: quamobrem qui biberunt eas, difficulter urinam, & cum sanguine reddunt, exulcerata scilicet vesica: præterea animo sæpè deficiunt, dextræque præcordiorum parte inflammationem patiuntur: per alium ipsis excernuntur qualia in torminibus intestinorum egeri solent, & in tenebriosis, inquit Aëtianus, vertigines incidunt; denique mente alienantur.

*Aduersus cicutam.*

**S**I cicutam, vinum merum calidum cum ruta quamplurimum ingerendum est, deinde is vomere cogendus. Posteaque laser ex vino dandum. Isque si febre vacat, in calidum balneum mittendus. Si non vacat, vngendus ex calefacientibus est. Post quæ quies ei necessaria est.

ENAR-



## ENARRATIO.

**C**ICUTAM potam caligo vertiginēque, ut nec minimum ē longinquo videre liceat, itēque mentis alienatio, & arthrum gelatio consequitur; ultimoque convulsi praefocantur qui eam sumpserunt, nihilque sentiunt.

est: studendum tamen est ut ante vini sumpcionem vomitu eandem, quoad fieri potest, educamus, quantumcunque alium ab hoc diversum ordinem describat auctor noster; & si quid eius ad intestina prolapsum sit, purgante medicamento euacuemus.

vinum merum.

Id non semel sed subinde faciendum

*Aduersus hyoscyamum.*

**S**i hyoscyamum, feruens mulsum bibendum est, aut quodlibet lac, maximè tamen asininum.

## ENARRATIO.

**H**YOSCYAMON qui biberint, caput graue venisque distentiū habent: mente abalienantur ebrii, modò cum quadam verborum altercatione; unde & nomen alterci trahit herba: postea sopiuntur, & omni

sensu carent, linescentibus membris eorum. Auctor est Scribonius.

aut quodlibet lac.

PRIVS tamen aqua mulsa saepius pota cogendi sunt per pinnam reicere.

*Aduersus cerussam.*

<sup>juglandis</sup> **S**i cerussam, ius maluae, vel \* ius glandis ex vino contrita, maximè profunt.

## ENARRATIO.

**C**ERVSSAM qui biberunt, facildē deprehenduntur; linguam enim albam habent, commissurisque dentium albicantes: praeterea nausaeant; reiciunt potu medicamento, caligant magis magisque, vertigine quadam

urguntur; postea spiritus via intercluditur, cum extremorum perfrictione, & mentis alienatione ac pigro corporis motu, ac praefocantur.

*Aduersus sanguisugam si epota est, & lac quod intus coit.*

**S**i sanguisuga epota est, acetum cum sale bibendum est. Si lac intus coit, aut passum, aut coagulum, aut cum aceto laser.

ENAR-



## ENARRATIO.

**S**ANGVIS GAM potam quinis per se facile deprehenderit : nam præterquam quod in faucibus molestiam titillationemque sentiat, sanguis purus etiam nonnunquam reiiicitur; quibus accedit, quod ventriculi os vellicatur.

aut coagulum.

POTISSIMUM agninum, leporinum aut porcinum, victoriati pondere bis terve datum.

*Aduersus fungos inutiles.*

**S**I fungos inutiles quis assumpserit, radícula aut \*epota, \*potanda aut cum sale & aceto edenda est. Ipsi verò hi, & specie quidem discerni possunt ab vtilibus, & cocturæ genere idonei \*sunt. Nam siue ex oleo inferbuerunt, siue piri furculus \*fieri cum his inferbuit, omni noxa vacant.

## ENARRATIO.

**F**UNGORVM alij genere, alij copia offendunt: ac propterea auctor noster viiles ab inutilibus quodammodo distinxisse videtur. integri sumpti strangulatis laqueis similes inducunt. Venenatos autem, aut inutiles fungos quoties qui denorauerit, primum nauseat, nec quicquam magno opere reicit; postea stomachi, ventrisque & præcordiorum infinitos habet dolores: manant

sudores frigidi per artus, qui & ipsi gelantur celerrimè, nisi citò succurratur.

radícula aut epota.

PER radiculam raphanum intelligit; hæc enim his qui fungis strangulantur, iam cibo, quam potu salutaris est: sensum enim aciem, ut ait Dioscorides, excitat, ac vomitionem conciliat, qua præsentis nullum est remedium.

*De adustis corporis locis, & quomodo curari debeant.*

**A**DUSTIS quoque locis extrinsecus vis infertur, itaque sequi videtur, ut de his dicam. Hæc autem optimè curantur foliis, aut lilij, aut linguæ caninæ, aut betæ in vetere vino oleoque decoctis. Quorum quilibet protinus impostum, ad sanitatem perducit. Sed diuidi quoque curatio potest in ea, quæ mediocriter exedentia reprimentiaque primò & pustulas prohibeant, & summam pelliculam exasperent. Deinde ea quæ lenia ad sanitatem perducant. Ex prioribus est lenticula cum melle, farina, vel \*myrrha, vel vino, creta ei-  
molia cum thuriscortice contrita, & aqua coacta, atque ubi

\*myrrhæ  
cum vino,

Y V

vsus



vsus necessitas incidit, aceto diluta. Ex insequentibus quælibet lipara. Sed idonea maximè est, quæ vel plumbi recrementum, vel vitellos habet. Est etiam illa adustorum curatio, dum inflammatio est, impositam habere cum melle lenticulam. Vbi ea declinauit, farina cum ruta, vel porro, vel marrubio, donec crusta cadant. Tum cruum cum melle, aut irim, aut resinam terebinthinam, donec vlcus purum sit. Nouissimè siccum linamentum.

\* ordeï fa.

### ENARRATIO.

**A**DUSTOS appellat eos quos Græci *ἐκθύσους*: quo vocabulo Galenus eos quoque notari auctor est, qui aqua calida vruntur; ita ut quacunque de causa, & quantis re quis aduratur, adustus vel *μεθύσους* dicatur. Quando igitur in his qui vruntur, solutio continui fiat, ac crusta quedam superinducatur, statim in initio opus est calorem restringere, & ne pustula, aut inflammatio superueniat, repellentibus præcanere: quo facto, ad ea qua siccant ac de-

tergent veniendum est, abstinendumque omnino ab his est quæ morsum aliquem inferunt. Nam Hippocrates ulcerata & fracta leuibus medicamentis nutrienda sunt, inquit, non secus atque adusta. quare an rectè, ac propriè exasperandam hic dixerit cutim summam, indicent alij: nam neque creta cimolia quantumcunque aceto diluta sit, cutem exasperabit; verum mitigabit potius inflammationem, compefcique ac repellet.

*De interioribus ulceribus, quæ aliqua corporum parte corrupta nascuntur.*

### CAPVT XXVIII.

*De carbunculo, & eius curatione.*

**A**B his quæ extrinsecus incidunt, ad ea veniendum est quæ interius corrupta aliqua corporum parte, nascuntur. Ex quibus non aliud carbunculo peius. Eius hæ notæ sunt: Rubor est, superque cum non nimium pustulæ eminent, maximè nigra, interdum subliuidæ, aut pallidæ. In his sanies esse videtur, infra color niger est. Ipsum corpus aridum, & durius quàm naturaliter oportet. Circa quem quasi crusta est, eaque inflammatione cingitur, neque in eo loco leuari cutis potest, sed inferiori carni quasi affixa est. Somnus vrget, nonnunquam horror, aut febris oritur, aut utrumque.

Idque



Idque vitium subteractis quasi quibusdam radicibus serpit, interdum celerius, interdum tardius, supra quoque procedens inalbescit, dein lividum fit, circumque exiguae pustulae oriuntur. Et si circa stomachum faucesve incidit, subito spiritum saepe elidit. Nihil melius est, quam protinus adurere. Neque id graue est. Nam non sentit, quoniam ea caro mortua est. Finisque adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris est. Tum deinde \*vulnus, sicut caetera adusta, curandum est. Sequitur enim sub medicamentis erodentibus crusta vndique à viua carne diducta, quae trahit secum quicquid corruptum erat, purusque iam sinus curari potest implentibus. At si in summa cute vitium est, possunt succurrere quaedam vel exedentia tantum, vel etiam adurentia. Vis pro magnitudine adhibenda est. Quodcumque verò medicamentum positum est, si satis proficiet, protinus à viua corruptam partem \*resoluit. Certa quoque esse fiducia potest, ferè ut vndique vitiosa caro \*excedat, quae huiusce medicamen exest. Si id non fit, medicamentumque malo vincitur, utique ad vitionem properandum est. Sed in eiusmodi casu abstinendum à cibo, à \*vino est. Aquam liberaliter bibere expedit. Magisque ea seruanda sunt, si febricula quoque accessit.

\*vulnus,

\*resoluet.

\*excidat,

\*vinoque

## ENARRATIO.

CARBUNCULUS, qui & ἄρσενος Græce dicitur, ut XI. II. Methodi medendi Galenus, est vitium quod ex humore crasso feruentique nascitur, plerumque à pustulis incipiens; aliquando verò & sine his. Inter initia autem quibus vitium hoc inflat, scabunt particulae: mox oritur pustula quadam; qua rupta vulcus cum crusta gignitur. Sæpe verò non una oritur scabentis pustula; sed multae exiles velut milij semina, crebra in particula residentes: quibus perruptis similiter crustosum vulcus superuenit. Febricitant omnes qui à carbunculo apprehenduntur, non minus quam qui erysipelate laborant: quare & iis tum loco citato, tum libro De arte curatiua ad Glanronem statim ad animi deliquium mitteren-

dum sanguinem docet, quod videlicet sanguinis misto totum corporis habitum resstigeret, & febrem extinguat.

## Et si circa stomachum.

ID mirum non est, præsertim quando carbunculus ipse ex causis popularium grafsanitus oriri soleat, & materia ipsa ad interiora, atque adeo partem aliquam principem regurgitare, quo fit ut putido hoc & venefico spiritu homo supprimatur, atque suffocetur.

## Nihil melius est, quam.

SATIVS tamen est, nisi rebeatis omnino fuerit materia, alia ratione propellere, neque (nisi ubi ad extrema iam fore ventum est)

vitionem



ustionem aggredi: Galenus enim, scarificandura locum docet; alij sanguisugas adhibendas existimant, quod nonnullis suspectum est, quod pro ratione attractæ materiae non evascent, purioresque tantum sanguinem exugant, crassiore relicto. Cataplasmata quæ quum reprimant modicè, etiam digerant, & dissipent, adhibent: quale est quod ex plastrago conficitur, aut quod ex bis cocta leute

constat. Verùm si consue malum progressum sit, ut omnibus fere remediis rebelles sit, tum aut arsenicum, quod hinc malo peculiariter aduersatur, aut simile quid quod ignis vim habeat, apponendum erit: & quum extremis exquisitis morbis, extrema ad summum remedia optima sine, carbunculum ipsum protinus adurentius, & candente ferro extirpabimus.

*De Carcinomate, & eius curatione.*

**N**ON idem periculum καρκίνωμα affert, nisi imprudentia curantis agitata tum est. Id vitium fit maximè in superioribus partibus, circa faciem, nares, aures, labra, mammas foeminarum. Et in iecore autem, aut splene hoc nascitur. Circa locum aliqua quasi puncta sentiuntur, isque immobilis, inæqualis tumet, interdum etiam torpet. Circa eum inflatae venæ quasi recurvantur, hæque pallent, aut liuent, nonnunquam etiam in quibusdam delitescunt. Tactusque is locus, aliis dolorem affert, in aliis cum non habet. Et nonnunquam sine ulcere durior aut mollior est, quàm esse naturaliter debet; nonnunquam iisdem omnibus vlcus accedit. Interdumque nullam habet proprietatem, interdum simile his est, quæ vocant Græci κοιδώματα, aspredine quadam & magnitudine sua. Colorque eius ruber est, aut lenticulae similis, neque tunc fertur. Nam protinus aut resolutio nervorum aut distentio insequitur. Sæpe homo ictus obmutescit, atque eius anima deficit. Quibusdam etiam si id ipsum pressum est, quæ circa sunt, intenduntur, & intumescit. Namque pessimum id genus est, fereque primum id fit, quod καρκίνος à Græcis nominatur. Deinde ex eo id καρκίνωμα, quod sine ulcere est. Deinde vlcus, ex eo thymium. Tolli nihil nisi καρκίνος potest, reliqua curationibus irritantur. Et quo maior vis adhibita est, eo magis quidam vti sunt medicamentis adurentibus. Quidam ferro adusserunt. Quidam scalpello exciderunt. Neque ulli vnquam medicina proficit. Sed adusta protinus concitata sunt, & increuerunt, donec occiderent. Excisa etiam post inductam cicatricem, tamen reuerterunt, & caus-

\* exagitatum, i. irritatum  
\* è iec.

\* æqualis

Tactusque

\* aufertur.

\* profecit.  
al. profuit



& causam mortis attulerunt. Cum interim plerique nullam vim adhibendo, qua tollere id malum tentent, sed imponendo tantum lenia medicamenta, quæ quasi blandiantur, quominus ad ultimam senectutem perueniant, non prohibentur. Discernere autem <sup>\*cacoëthes</sup> cacoëthes, quod curationem recipit, à <sup>\*carcinoma</sup> carcinoma, quod non recipit, nemo scire potest, nisi tempore & experimento. Ergo ubi primum id vitium notatum est, imponi debent medicamenta adurentia. Si leuatur malum, minuunturque eius indicia, procedere curatio potest, & ad scalpellum, & ad vitionem. Si protinus irritatum est, scire licet iam <sup>\*cacoëthes</sup> carcinoma esse, remouendaque sunt omnia acria, omnia vehementia. Sed si sine vlcere is locus durus est, imponi ficum quam pinguiissimam, aut rhypodes emplastrum satis est. Si vlcus æquale est, ceratum ex rosâ iniiciendum est, adiiciendusque ei puluis ex contrita testa, <sup>\*in qua</sup> ex qua faber ferrarius tingere candens ferrum solitus est. Sed si id nimium supercreuit, tentanda squama æris est, quæ lenissima ex adurentibus est, eatenus ne quid eminere patriatur, sed ita, si nihil exacerbauit. Si minus, eodem cerato contenti esse <sup>\*debemus</sup> debemus.

## ENARRATIO.

**R**ECTE monet Ioannes Taganlium libro primo Institutionum Chirurgicarum, Celsum nostrum contra Græcos carcinoma à cancro distinguere. Ita ut cancerum oriri & serpere dicat ab his quæ extrinsecus incidunt; carcinoma autem corrupta interioris partis aliqua innasci.

## Id vitium fit.

FREQUENTIVS tamen in feminarum mamma, quam vlla alia corporis parte nascitur; quæ quod natura fungosa sint & inanes, crassissimam atræ bilis (unde hoc vitium nascitur) materiam possunt concipere.

## Circa locum aliqua.

CANCROSVS tumor duritiem habet, & inequalitatem quæ tactu facile depre-

benditur. colorem præ se fert lividum, quæ videlicet inter rubrum & nigrum medius sit: circa locum affectum aliqua quasi puncta sentiuntur.

## Et nonnumquam.

UBI mitior fuerit humor melancholicus, latentem seu occultum, ut vocat Hippocrates, cancerum sine ulcere progignit; sin acrior maligniorque contingat, cutim erodit, & cancerum facit ulceratum.

## Interdumque nullam.

SIC Galenus, Alias, inquit, confusa exiguæque, & quæ vulgum fortassis latere possint, affert symptomata; alias ita vehementia & magna, & cunctis evidentiâ, ut ne puerum quidem clam sint.



Nam protinus aut  
resolutio.

ISTHVC neque experientia comperisse  
contigit, neque apud quenquam probatum,  
quod sciam, auctorem legisse memini.

Namque pessimum  
id genus.

OBSCURVS admodum hic Celsus est,  
neque satis assequor quid velit: nam quod  
modò pessimum dicit, paulo post idem cura-  
tionem tantum recipere asserit; reliqua verò  
medicamentis irritari, atque quodammodo  
efferrari: κακόν τις autem à Græcis vocari,

auctor est veterum more; ut qui cancre-  
tum vlcus malignum ac ferum appellabant.

Neque vlli vquam.

ALLVDIT ad XXXVIII. Aphorif-  
mum sectionis sextæ: Cancros occultos me-  
lius est non curare: qui enim curantur, ci-  
tius pereunt; qui verò non curantur, longiore  
tempore durant.

Excisa etiam.

GALENVS excisa vlcera vix recipere  
cicatricem contendit, unde contingat ho-  
mines macie & doloribus consumptos, oculis  
quàm si curationem non admississent, ani-  
mam agere.

De Theriomate, & eius curatione.

EST etiam vlcus, quod θηριόμα Græci vocant. Id & per  
se nascitur, & interdum vlceri ex alia causa facto super-  
uenit. Color est vel liuidus, vel niger, odor foedus, multus,  
& mucco similis humor. Idipsum vlcus neque tactum, neque  
medicamentum sentit, prurigine tantum mouetur. At circà  
dolor est, & inflammatio. Interdum etià febris oritur. Non-  
nunquam ex vlcere sanguis erumpit. Ad id quoque malum  
serpit. Quæ omnia sæpe intenduntur. Fitque ex his vlcus,  
quod ἐπιπρωτα ἐσθίον οὖν Græci vocant, quia celeriter serpendo,  
penetrandoque vsque ossa corpus vorat. Id vlcus inæquale  
est, cæno simile, inestque multus humor glutinosus, odor  
intolerabilis, maiorque quàm pro modo vlceris inflammatio.  
Vtrumque sicut omnis cancer, fit maximè in senibus, vel his,  
quorum corpora mali habitus sunt. Curatio vtriusque eadem  
est, sed in maiore malo magis necessaria: ac primùm à victus  
ratione ordinandus est, ut quiescat in lectulo, ut primis diebus  
à cibo abstineat, aquam quamplurimam assumat. Aluus quo-  
que ei ducatur. Dein post inflammationem cibum boni  
succi capiat, vitatis omnibus acribus, potionis quantum volet,  
sic ut interdiu quidem aqua contentus sit. In cæna etiam  
vini austeri aliquid bibat. Non æquè tamen fame in his quos  
herpes vrgebit, atque in his qui therioma adhuc habebunt,  
vtendum

\* At

\* cauo  
al. ouo

\* ordinan-  
dum

\* sedatam  
infl.

\* verò



utendum erit. Et victus quidem talis necessarius est. Super  
 vlcus verò inspergenda est arida aloë, cœnanthe, & si parum  
 proficiet, chalcitis. Ac si quis nervus exesa carne nudatus est,  
 contegendus antè linteolo est, ne sub eo medicamento adu-  
 ratur. Si validioribus etiam remediis opus est, ad eas compo-  
 sitiones veniendum est, quæ vehementius adurunt. Quic-  
 quid autem inspergitur, auerso specillo infundi debet. Super-  
 danda cum melle sunt vel linamenta, vel olea folia ex vino  
 decocta, vel marrubium, eaque linteolo contegenda in aqua  
 frigida madefacto, dein bene expresso. Circaque quæ tumor  
 ex inflammatione est, imponenda, quæ reprimant, cataplas-  
 mata. Si sub his nihil proficitur, ferro locus aduri debet, di-  
 ligenter nervis, si qui apparent, antè contactis. Adustum vel  
 medicamentis, vel ferro corpus, primum purgandum, deinde  
 implendum esse, apparere cuilibet ex prioribus potest.

## ENARRATIO.

**NOMEN** ipsum per se malignum  
 admodum ac ferum vlcus indicat. cæ-  
 terum ad quem affectum referendum sit,  
 admodum dubito; præsertim quando nihil  
 commune habere video cum serino Hippo-  
 cratis ulcere, libro De locis in homine.  
 Quando tamen eiusdem signa penitus paulo  
 mecum perpendo, idem ferè esse videtur,  
 quod Auicenna libro IIII. fen III. ca-  
 pite IX, ignis Persicus. atque ita quidem  
 eiusdem prunam, carbunculum, ignem au-  
 tem Persicum therioma esse dicemus; quan-  
 quam certi nihil hic ausim pronunciarè.

quod ἐρπητας.

**SI** flava bilis acris sit ac compage cras-  
 sa, omnem cutem ad subiectam carnem  
 usque exulcerat, atque herpetem exeden-  
 tem aut æsthiomen dictum generat.

fit maximè in senibus.

**HIPPOCRATES** in viris fieri dixit  
 ante LX. annos transiisere.

Aluus quoque ei.

**NONVNQVAM** etiam suffecerit diu-  
 reticis materiâ peccantem expurgasse: quan-  
 quam si leniter ducente aluum ac bilem tra-  
 hente medicamento purgetur aluus, admo-  
 dum proderit.

Super vlcus verò in-  
 spergenda.

**IDEM** præscribit Galenus libro De arte  
 curatina ad Glanconem: Exedentes, inquit,  
 refrigerari volunt; quemadmodum & alij  
 herpes, & erysipelata: non tamen medi-  
 camenta ferunt, quæ præterquam quodd re-  
 frigerent, etiam humectare idonea sunt, sed  
 solum refrigerantia admittunt; præsertim  
 quæ exiccare possunt. Quare an per se uti-  
 lis sit chalcitis, alij viderint: mihi certè  
 nondum placere potuit; uti neque ea quæ  
 vehementius adurunt; nam quæ cum frigi-  
 ditate quadam reprimunt, commendari cer-  
 tum est.

De sacro



*De sacro igne, & eius curatione.*

**S**ACER quoque ignis, malis vlceribus annumerari debet. Eius duæ species sunt: Alterum est subrubicundum, aut mistum rubore atque pallore, exasperatumque per pustulas continuas, quarum nulla altera maior est, sed plurimæ perexiguæ. In his semper ferè pus, & sæpe rubor cum calore est, serpitque id nonnunquam sanesciente eo, quod primum vitiatum est, nonnunquam etiam exulcerato, vbi ruptis pustulis vlcus continuatur, humorque exit, qui esse inter saniam, & pus videri potest. Fit maximè in pectore, aut lateribus, aut eminentibus partibus, præcipueque in plantis. Alterum autem est in summæ cutis exulceratione, sed sine altitudine, latum, subliuidum, inæqualiter tamen, mediumque sanescit, extremis procedentibus, ac sæpe id, quod iam sanum videbitur, iterum exulceratur. At circà proxima cutis quæ vitium receptura est, tumidior & durior est, coloremque habet ex rubro subnigrum. Atque hoc quoque malo ferè corpora seniores tentantur, aut quæ mali habitus sunt, sed in cruribus maximè. Omnis autem sacer ignis, vt minimum periculum habet ex his quæ serpunt, sic propè difficillimè tollitur. Medicamentum eius \* fortissimum est, vno die febris, quæ humorem noxium absumat. Cuius \* quo crassius & albidius est, eo periculi minus est. Prodest etiam infra os vlcerum \* lædi, quo plus puris exeat, & id quod ibi corruptum corpus est, extrahat: sed tamen si febricula accessit, abstinencia, lectula, alui ductione opus est. In omni verò sacro igni neque lenibus, & glutinosis cibis, neque salsis & acribus vtendum est, sed his quæ inter vtrunque sunt, qualis est panis sine fermento, piscis, hœdus, aues, exceptoque apro omnis ferè venatio. Si non est febricula, & gestatio utilis est, & ambulatio, & vinum austerum, & balneum. Atque in hoc quoque genere potio magis liberalis esse, quàm cibus debet. Ipsa autem vlcera si mediocriter serpunt, aqua calida: si vehementius, vino calido fouenda sunt. Deinde acu pustulæ quæcunque sunt aperiendæ. Tum imponenda ea, quæ putrem carnem exedant.

\* fortissimum

\* pus, quo

\* lædi,



dant. Vbi inflammatio sublata, vlcusque purgatum est, imponi lene medicamentum debet. In altero autem genere possunt proficere mala cotonca in vino cocta, atque contrita. Potest emplastrum vel Hieræ, vel tetrapharmacû, cui quinta pars thuris adiecta sit. Potest nigra hedera ex vino austero cocta. Ac si celeriter malum serpit, non aliud magis proficit. Purgato vlcere, quod in summa cutē esse proposui, satis ad sanitatem eadem lenia medicamenta proficiunt.

## ENARRATIO.

**N**ESCIO me hercules, qua ratione ducti, hodie quotquot serē sunt interpretes, Græcorum cryspellam, Sacrum ignem reddiderint: quando certum sit priscos illos Latinos medicos herpetem pro sacro igne usurpasse, quod vel ex hoc Celsi capite cuius manifestum euadit, qui singula quæ igni sacro ascribitur, cū herpete conseret. Huic adde quod Plinius libro Naturalis Historia xxvi. capite xi. plura ignis sacri genera esse dicit, inter quæ medium hominem ambiens appellatur zoster, & homineæ eucat si cinxerit. Cui subscribere videtur Scribonius Largus, qui quum antè ignis sacri meminisset, statim zonæ, quam zosteria Plinius vocari dixit, remedia describit, atque hanc quidem simpliciter herpetem vocari auctor est.

## Eius duæ species.

**G**ALENUS libro De tumoribus præter naturam, tres eius species enumerat; vti post eum annotauit Aetius: Nam si flava bilis, inquit, citra alterius humoris mixturam secreta iuxta partem aliquam consisterit, herpes appellatur affectio. Si quidè igitur crassa fuerit compage, & magis acris, omnem cutem ad subiectam carnem exulcerat: atque hæc species generis appellationem tulit, simpliciterque, ac citra appositionem herpes vocatur. Est etiam adhuc tertia herpetis species quæ miliaris appellatur, eod quod pustulas paruas, & multas in superficie cutis excitat milio similes. Oritur autem etiam ipse à bile, vtrum minùs acris & calida quam

priores. Celsus, quod præcedente De theriomate paragrapho herpetis excedentis mentionem fecerit, sufficit hic dixisse, duas tantum eius species esse. Dicitur est autem ignis, eod quod videatur ἱερῆς, hoc est serpere per cistem summam, modò hanc eius partem, modò proximam occupans, ut auctor est Aëtianus; quod semper priore laborante persanata, propinqua eius vitium excipiat, non secus quàm ignis qui proxima quæq; depascitur, ubi ea quæ prius accensa erant, deficientibus idonea materia, prius quoque extinguuntur.

## Omnis autem sacer ignis.

**H**IPPOCRATES secundo Prædictionum, Herpetos, inquit, minime omnium vlcernum, quæ depascendo prosperant, periculosi sunt: verum maxime difficulter submoueri possunt; quemadmodum cancri oculi.

## vno die febris.

**Q**UOD si ex sincera bile ortus sit herpes, nescio quàm conueniat febris: at si eadem permixta sit pituita, non omnino inuulsi erit, ut quæ calore febrili dissipari possit.

## Si non est febricula.

**Q**UAM conueniant hæc quæ enumerat Celsus, alij indicent: Hippocrates abstinentiam & aquam, tum in diutinis vlceribus, tum maxime recentibus conuenire dicit; atque à vino abstinendum: quia quanto liberalius corpus nutritur, & quo meracius vi-



num bibitur, eo plus sanguinis & aliorum succorum ad ulceratū locum fertur. Præterea idem in ulceribus omnibus quietem & otium plurimum convenire dicit. Si quis tamen id eo balneum, & ambulationem admittere velit, ut humores euocentur; per me integrum est: malim tamen ex Hippocratis præscripto quietem & abstinentiam.

### *Ipsa autem ulcera.*

IN herpete Galenus nihil alienius quam humiditatem dixit, ac proinde frustra localia dicta medicamenta applicari, ante totius corporis purgationem: nam quantumcunque localibus exulceratam particulam curaveris, serpet tamen semper ulterius malum, ac cum exulcerabit, nisi purgata sit bilis.

### *De Chironio ulcere, & eius curatione.*

\* duras,  
\* tenuis, o.  
malus.  
Neque i.  
v. n. i. e. t.  
vlla est in-  
flāmatio.  
Dolor  
\* humore

**C**HIRONIUM autem vlcus appellatur, quod & magnum est, & habet oras \* duas, callosas, tumentes. Exit sanies non multa, sed \* tenuis. Odor malus neque in ulcere, neque in eius \* tumore est. Nulla inflammatio, dolor modicus est, nihil serpit, ideoque nullum periculum adfert, sed non facile sanescit. Interdum tenuis cicatrix inducitur, deinde iterum rumpitur, vlcusque renouatur. Fit maximè in pedibus & cruribus. Super id imponi debet, quod & lene aliquid, & vehemens, & reprimens habeat. Quale eius rei causa fit ex his, Squamæ æris, plumbi eloti combusti, singulorum p. iiii. \*. cadmiæ, ceræ, singulorum p. viii. \*. rosæ quantum satis est ad ceram simul cum eis molliendam.

### *ENARRATIO.*

**I**NVETERATA, & quæ vix cicatricem recipiunt, alij chironia appellarunt, ut ait Paulus, seu Chirone medico peritissimo indigentia: alij Telephia, quod in tali ulcere Telephus consenuerit. Galenus libro 1111. De compositione medicamento-

rum secundum genera, Chironia ulcera vocata dicit, non mediocriter, sed maximè maligna contumaciæque. Nos, quemadmodum Commentariolo nostro De magnis lenibus ostendimus, sceleratiora dicta ulcera esse putamus.

### *De ulceribus quæ ex frigore in pedibus, & manibus oriuntur, & eorum curationibus.*

Χίριον  
hoc genus vl-  
ceru dicitur à  
Græcis, à La-  
tinis Pernio.

**F**IUNT etiam ex frigore hyberno ulcera, maximè in pueris, & præcipuè pedibus, digitisque eorum, nonnunquam etiam in manibus. Rubor cum inflammatione mediocri est. Interdum pustulæ oriuntur, deinde exulceratio. Dolor autem modicus. Prurigo maior est, nonnunquam humor exit, sed



sed nō multus, qui referre vel pus, vel sanie videtur. In primis multa calida aqua fouendum est, in qua rapa decocta, aut si ea non sunt, aliquæ verbenæ ex reprimentibus. Si nondum adaperitum vlcus, æs, quàm maximè calidum quis pati potest, admouendum est. Si iam exulceratio est, imponi debet alumen, æqua portione cum thure \* contritū, cum vino adiecto, \* contritum, vino aut malicorium in aqua coctum, deinde contritum. Si summa detracta pellicula est, hīc quoque meliūs lenia medicamenta proficiunt.

## ENARRATIO.

VLCERA hæc Latinis Perniones, Græcis χιμετλα dicuntur. Hefychius χιμετλον, inquit, τὸ ἐν χειμῶνι γινόμενον ἰλκός ἐπὶ ψύχρους.

In primis multa calida.

HIPPOCRATES: Perniones, inquit, perimdere & calefacere oportet; ita ut quàm maximè calefacias igne & aqua. Paulus marinam aquam præfert.

## De struma, &amp; eius curatione.

STRUMA quoque est tumor, in quo subter concreta quædam ex pure & sanguine, quasi glandulæ oriuntur. Quæ vel præcipuè fatigare medicos solent, quoniam & febres mouent, nec vnquam faciliè maturescunt, & siue ferro, siue medicamentis curantur. Plerumque iterum iuxta cicatrices ipsas resurgunt, multoque pōst medicamento est opus. Quibus id quoque accedit, quod longo spatio detinent. Nascuntur maximè in ceruice, sed etiam in alis & inguinibus, & in lateribus. In mammis quoque fœminarum se reperisse, Chirurgicus Meges auctor est. Propter hæc & album veratrum rectè datur, atque etiam sæpius, donec \* ea digerantur. Et medicamenta imponuntur, quæ humorem vel educant, vel dissipent, quorum suprà mentio facta est. Adurentibus quoque, quidam vtuntur, quæ exedunt, crustaque eum locum astringunt: tunc verò vt vlcus \* conterant. Quæcunque autem ratio curandi est, corpus puro vlcere exercendum, atque alendum est, donec ad cicatricem perueniat. Quæ cūm medici doceant, quorundam rusticorum experimento cognitum: quem struma malè habet, eum, si anguem \* edit, liberari. \* edat,



## ENARRATIO.

**H**IPPOCRATES libro Prædictionum secundo, strumosa tubercula pueros plurimum infestare auctor est, & facillimè ex ipsis liberari. Senioribus verò pueris, inquit, & adolescentibus minus quidem oriuntur; verum difficilius ab ipsis liberantur. Viris autem talia quidem tubercula non valdè sunt. Vocant autem strumas, quas Græci χοιροειδές, à porcis in quorum gutture adnatos quidam tiores reperiuntur strumæ similes: vel quod prolifica videantur, ut auctor est Aëtius: ab unico etenim tumore, alij etiam quandoque enascuntur. Solent autem eas ita distinguere, sicuti docet Aëtius, ut inter se differant magnitudine, natura, loco, ortu, multitudine, vasorum complicatione: Magnitudine, quia alia parva, alia magne, alie media, aliæq; ingentes: Multitudine, quia plures, aut una

tantum generantur: Natura, quia aliqua maligna sunt, ut que altatim indolent, & medicamentis appositis deteriores redduntur, quas etiam, ut auctor est Ægineta, carcinodes aliqui dixerunt; notumque est omnibus, curationi que manu fit, ipsas non cedere: aliæ contra morigera sunt cum tantum medicamentorum usus. In genere, quales quales sunt, per chirurgiam optimè curantur: ea observatione adhibita, ut si in collo struma sit, recta aut obliqua sectio fiat; sin circa alas, aut inguina, transversa, ob cursu reduplicationem.

## Plerumque iterum.

Id de malignis tantum, & que nondum extirpata planè sunt, intelligendum est; mites & parva facillè ex toto curantur.

## De Furunculo, &amp; eius curatione.

\* inflammatio,  
ne,

**F**URUNCULVS verò est tuberculum acutum cum \* inflammatione, & dolore, maximeque ubi iam in pus vertitur. Qui ubi ad apertus est, & exit, super apparet pars carnis in pus versa, pars corrupta subalbida, subrubra, quem ventriculum quidam furunculi nominant. In eo nullum periculum est, etiam si nulla curatio adhibeatur. Maturescit enim per se, atque erumpit. Sed dolor efficit, ut potior medicina sit, quæ maturius liberet. Proprium eius medicamentum galbanum est. Sed alia quoque supra comprehensa sunt. Si cetera defunt, imponi debet primum nō pingue emplastrum, ut id reprimat: deinde si non repressit, quodlibet puri mouendo accommodatum. Si ne id quidem est, vel resina, vel fermentum. Expresso pure, nulla ultra curatio necessaria est.

## ENARRATIO.

**G**RÆCORVM Dothienes furunculos appellat, atque omnino periculi exortes dicit: Paulus tamen duplicem furunculi speciem facit, mirem, quoties sub sola cute solet; & perniciosam seu malignam, ubi

subteractis radicibus in superficiem erumpit. Dignosces id, ut auctor est Aëtius, tum visu tum tactu, locum circumquaque furunculi contrectans.

De phy-



*De phymate, & eius curatione.*

**P**HYMA verò nominatur tuberculum furunculo simile, sed rotundius & planius, sæpe etiam maius. Nam furunculus oui dimidij magnitudinem raro explet, nunquam excedit: phyma etiam latius patere consuevit, sed inflammatio dolorque sub eo minores sunt. Vbi \*euulsum est pus, eodem modo apparet ventriculus, quod in furunculo non inuenitur. Verum omnis corrupta caro in pus vertitur. Id autem in pueris & sæpius nascitur, & facilius tollitur: in iuuenibus rarius oritur, & difficilius curatur. Vbi ætas indurauit, ne nascitur quidem. Quibus verò medicamentis discuteretur, supra propositum est.

\* diuisum  
al. diuul.  
est, pus  
cod. m. ap-  
paret: vêt.  
qui i. fu-  
runculo,  
n. i.

## ENARRATIO.

**H**IPPOCRATES generatim omnia tubercula *φύματα* appellare solet: sic in Aphorismo, Vbi sancti egrotant, inquit, tubercula aut phymata in corpore nascuntur; aphorismo XV. sectionis secunda. & sectione quarta, aphorismo penultimo: Quibus phymata urinarum meatum exercent, hi abscessu in vomica erumpente liberantur. Specialim tamen phymata dicimus glandularum inflammationem, quæ & celeriter augetur, & ad suppurationem festinet.

Galenus Commento primo sectionis XIII. libri sexti Hippocratis De morbis vulgaribus: Ab iis, inquit, quæ ex terra progerminant, Græci homines *φύματα* (hoc est tubercula) vocauerunt, eos præter naturam tumores, qui prorsus sine causa extrinseca proueniunt, sed potissimum eos hoc nomine vocant, quæ extra corporis superficiem extuberant: verum ob nominis alterius inopiam interdum & latus, pauloque naturaliter partibus aliores, hoc eodem nomine appellans.

*De Phygethlo, & eius curatione.*

**P**HYGETHLON autem est tumor, non altus, sed latus, in quo quiddam pustulæ simile est. Dolor distentioque vehemens est, & maior quàm pro magnitudine tumoris: interdum etiam febricula, idque tardè maturefcit, neque magnopere in pus conuertitur. Fit maximè aut in vertice, aut in alis, aut in inguinibus, \* Panem, ad similitudinem figuræ nostri vocant. Atque id ipsum quo medicamento tolleretur, supra demonstravi. Sed cum omnes nihil nisi minuti abscessus sint, generale nomen trahit latius vitium ad suppurationem spectans. Idque ferè fit aut post febres, aut post dolores partis

Panum,  
Panis.

XX 3

alicuius,



\* nocenter  
adol.  
\* impri-  
mit.

\* quod-  
quamuis  
sub.

\* aqua co-  
cta, cui &  
olerum a-  
liiquid re-  
ctè  
\* tantum  
modo  
\* maior  
\* durities,  
&  
\* quas  
\* istæ  
\* iamq. is  
locus pru-  
rit,

ma

alicius, maximeque eos, qui ventrem infestarunt. Sæpiusque oculis expositum est, siquidem latius aliquid intumescit ad similitudinem eius, quod phyma vocari proposui, rubetque cum calore, & paulo post etiam cum duritia, magisque innocenter indolescit, & sitim vigiliamque exprimit. Interdum tamen nihil horum in cute deprehendi potest, maximeque, ubi altius pus mouetur. Sed cum siti vigiliaque sentiuntur intus aliquæ punctiones, & quod de subito durius non est, melius est: & quamuis non rubet, coloris tamen aliter mutati est. Quæ signa iam pure oriente nascuntur. Tumor ruborque multo antè incipiunt. Sed si locus mollis est, auertendus is materiæ aditus est per cataplasmata, quæ simul & reprimunt, & refrigerant, qualia & aliàs & paulò antè in Erysipelate proposui. Si iam durior est, ad ea veniendum est, quæ digerant, & resoluant: qualis est ficus arida, contusa: aut fex mista cum cerato: quod ex adipe suilla coactum sit, aut cucumeris radix, cui ex farina duæ partes adiectæ sint, antè ex mulso decocta. Licet etiam miscere aquis portionibus ammoniacum, galbanum, propolim, viscum, pondusque adiacere myrrhæ dimidio minus, quam in prioribus singulis erit. Atque emplastra quoque & malagmata idem efficiunt, quæ suprà explicui. Quod per hæc discussum non est, necesse est maturescat. Idque quo celerius fiat, imponenda est farina ordeacea, ex qua cocta rectè miscetur. Eadem autem hæc in minoribus quoque abscessibus, quorum nomina proprietatesque suprà reddidi, rectè fiunt. Eadèque omnium curatio, tantummodo distat. Crudum est autem in quo magis quasi venarum motus est & grauitas, & ardor, & distentio, & dolor, & rubor, & durities. Et si maior abscessus est, horror aut etiam febricula permanet, penitusque condita suppuratio. Si pro his quæ alibi cutis ostendit, punctiones sunt, ubi ista se remiserunt, iamque cutis prurit, & aut subliuidus, aut subalbidus est, matura suppuratio est, eaque ubi vel per ipsa medicamenta, vel etiam ferro aperta est, pus debet emitte. Tum si quæ in alis, vel inguinibus sunt, sine linamento nutrienda sunt. In cæteris quoque partibus, si vna plaga exigua est, si medio-



mediocris suppuratio fuit, si non altè penetrauit, si febris non est, si valet corpus, æquè linamenta superuacua sunt. In reliquis, parcè tamen, nec nisi \*plaga est, imponi debent. <sup>\* magna</sup> Commodè verò \*vel super linamenta, vel sine his imponitur <sup>pl.</sup> lenticula ex melle, aut malicorium ex vino coctum. Quæ & <sup>\* mel</sup> per se, & mista idonea sunt. Siqua circa duriora sunt, ad ea mollienda, vel malua contrita, vel fœni græci, linivæ semen expulso coctum superdandum est. Quicquid deinde impositum est, non abstringit, sed modicè deligari debet. Illo neminem decipi decet, ut in hoc genere cerato utatur. Cætera quæ pertinent ad purgandum vlcus, ad implendum, ad cicatricem inducendam, \*conveniuntque in vulneribus, exposita sunt. <sup>\* cõu. val.</sup>

## ENARRATIO.

**P**HYGETHLON Latinis Pannus dicitur, estque inflammatio erysipelatodes, aut erysipelas cum inflammatione: ac proinde quoniam mixtus affectus est, alterutrinus, inflammationis dico aut erysipelatis, remedia aut augenda, aut minuenda erunt pro sperantis in mixtura ratione.

aut cucumeris radix.

SYLVATICI videlicet, quem & anguinum vocat Plinius.

Tum si qua in alis.

GALENVS bubones vocare solet, sunt tamen, ut libro De tumoribus ait, qui in alis & inguinibus phygethla tantum oriri dicant, vtpote glandularum inflammationes.

*De Fistulis, & earum generibus, & curationibus.*

**N**ON NVNQVAM autem ex eiusmodi abcessibus, & ex aliis vlcera generibus Fistulæ oriuntur. Id nomen est vlceri alto, angusto, calloso. Fit in omni fere parte corporis, habetque quædam in singulis locis propria. prius de communibus dicam. Genera igitur fistularum plura sunt. Siquidem aliæ breues sunt, aliæ altius penetrant, aliæ \*rectè intus feruntur, <sup>\* recta</sup> aliæ multoque plures transversæ, aliæ simplices sunt, aliæ duplices, triplicesve ab vno \*ore intus orisæ, quæ tres sunt, aut <sup>\* ore orisæ, quæ intus</sup> etiam in plures sinus diuiduntur, aliæ rectæ, aliæ flexæ, & tortuosæ sunt. Aliæ intra carnem desinunt. Aliæ ad ossa, aut cartilaginem penetrant, aut vbi neutrum horum subest, ad interiora



\* simplici,  
recta, int.

\* thoracēq.  
pen. malū.  
Ad

\* Si iā in  
osse vitium  
est, necne,  
id quoque  
d. p. & si  
iā cōfist. p.  
\* ultimo  
\* labitur  
sede qua  
inn.  
\* subsit,  
\* sciri po-  
test.

\* laue,  
\* osse

\* alterum  
inc. al. ite-  
rum

teriora perueniunt. Aliæ deinde facili, aliæ cum difficultate curantur. Atque etiam quædam insanabiles reperiuntur. Expedita curatio est in fistula \* simplici recenti intra carnem, adiuuatque ipsum corpus, si iuvenile, si firmum est. Inimica contraria his sunt. Itemque si fistula os, vel cartilaginem, vel neruum, vel musculos læsit, si articulum occupauit, si vel ad vesicam, vel ad pulmonem, vel ad vuluam, vel ad grandes venas arteriasve, vel ad inania, ut guttur, stomachum, \* thoracem penetrauit. Ad intestina quoque eam tendere semper periculosum, sæpe pestiferum est. Quibus multum mali accedit, si corpus vel ægrum, vel senile, vel mali habitus est. Ante omnia autem demitti specillum in fistulam conuenit, ut quò tendat, & quàm altè perueniat, scire possimus. Simul etiam protinus humida, an siccior sit: quod extracto specillo pater. \* Si verò os in vicino est, id quod disci potest, si iam necne, cò fistula penetrauit, quatenus nocuerit. Nam si molle est, quod \* ultimo specillo contingitur, intra carnem adhuc vitium est. Si magis id renititur, ad os ventum est. Ibi deinde si elabitur specillum, nondum caries est: si non \* labitur, sed æquali innititur, caries quidem, verum adhuc leuis est. Si inæquale quoque & asperum subest, vehementius os exesum est. At cartilago vbi \* subhæsit, ipsa sedes docet, peruentumque esse ad eam ex renixu \* pater. Sed ex his quidem colliguntur fistularum sedes, spatia, noxæ. Simples verò hæ sint, an in plures partes diducantur, cognosci potest ex modo puris, cuius si plus fertur, quàm quod simplici spatio conuenit, plures sinus esse manifestum est. Cumque ferè iuxta sint caro, & neruus, & aliqua neruosa, quales ferè tunicae, membranaeque sunt: genus quoque puris docebit, num plures sinus intus diuersa corporis genera perfererint. Si quidem ex carne pus \* leue, album copiosius fertur. At ex neruoso loco coloris quidem eiusdem, sed tenuius & minus. Ex \* neruo pingue, & oleo non dissimile. Denique etiam corporis inclinatio docet, num in plures partes fistulae penetrarint, quia sæpe cum quis aliter decubuit, aliterque membrum collocauit, pus ferri, quod iam desierat, \* incipit, testaturque non solum alium

sinum



sinum esse ex quo descendat, sed etiam in aliam corporis partem cum tendere. Sed si & in carne, & \* recens, & simplex \* recta, est, ac neque rugosa, neque caua sede, neque in articulo, sed in eo membro, quod per se immobile, non nisi cum toto corpore mouetur, satis proficiet emplastrum, quod recentibus vulneribus imponitur, dum habeat vel salem, vel alumen, vel squamam aris, vel æruginem, \* ex metallicis aliquid. Ex \* vel ex quæ eo collyrium fieri debet altera parte tenuius, altera paulo plenius. Id quæ ea parte qua tenuius est, \* altera antecedente \* alteram demitti oportet in fistulam, donec sanguis purus ostendat. Quæ in omnibus fistularum collyriis perpetua sunt. Idem deinde emplastrum in linteolo super imponendum, supraque iniicienda spongia, in acetum ante demissa, soluique quinto die satis est. Genusque victus adhibendum est, quo carnem ali docui. Ac si longius à præcordiis fistula est, ex interuallo ieiunum radículas edisse, deinde vomere, necessarium est. Verustate callosa fit fistula. Callus autem neminem fallit, *Callus.* quia durus est, & aut albus, aut pallidus. Sed tum validioribus medicamentis opus est. Quale est, quod habet papaueris lacrymæ p. i. \*. gummi p. iii. \*. cadmiæ p. iiii. \*. atramenti sutorij p. viii. \*. Ex quibus aqua coactis collyrium fit. Aut in quo sunt gallæ \* p. \*. æruginis sandaracæ, aluminis \* p. i. Ægyptij, singulorum p. i. \*. atramenti sutorij combusti p. ii. \*. Aut quod constat ex chalcitide, & saxo calcis, quibus auripigmenti dimidio minus, quàm in singulis prioribus est, adiicitur, eaque melle cocto excipiuntur. Expeditissimum autem est ex præcepto Megetis, æruginis rasæ p. ii. \*. conterere, deinde ammoniaci, thymiamatis p. ii. \*. aceto liquare, \* eo quæ \* ex eo quæ infuso æruginem infuso ex æruginē colligere. Id quæ ex primis medicamentis est. Sed ut hæc maximi effectus sunt, si cui ista non adsunt, facile tamen est callum quibuslibet adurentibus medicamentis \* prodere, aut quibus \* hæc maximè in effectu sunt erodere. Satiusque est, vel papyrus intortum, vel aliquid ex penicillo in modum collyrij astrictum \* eò illinere. Scilla quoque cocta & mista cum calce, callum exest. Si quando verò longior & transversa fistula est, demisso specillo contra

YY

princi-



\*vtrunque  
al vtrique

\*foramen  
\*tot med.

principium huius incidi, commodissimum est, & collyrium  
vtrunque demitti. At si duplicem esse fistulam, aut multi-  
plicem existimamus (sic tamen ut brevis, intraq. carnem sit)  
collyrio vti non debemus, quod vnam partem curret, reliquas  
omittat: sed eadem medicamenta arida in calamum scripto-  
rium coniicienda sunt, isque ori fistulae aptandus, inspiran-  
dumque, ut ea medicamenta intus compellantur. Aut eadem  
ex vino liquanda: vel si sordidior fistula est, ex mulso: si cal-  
losior, ex aceto sunt, atque intus infundendum quicquid in-  
ditum est. Superponenda sunt quae refrigerent & reprimant.  
Nam ferè quae circa fistulam sunt, habent aliquid inflamma-  
tionis. Neque alienum est vbi quis resoluerit, antequàm rur-  
sus alia medicamenta coniiciat, per auricularium clysterem  
fistulam eluere. Si plus puris fertur, vino: si callus durior est,  
aceto: si iam purgatur, mulso, vel aqua, in qua cruum coctum  
sit, sic ut huic quoque mellis paulum adiciatur. Ferè verò  
fit, ut ea tunica quae inter \*ferramentum & integram carnem  
est, victa \*medicamentis tota exeat, infraque vlcus purum  
sit. Quod vbi contingit, imponenda glutinamenta sunt, præci-  
pueque spongia melle cocto illita. Neque ignoro multis pla-  
cuisse, linamentum in modum collyrij compositum, tinctum  
melle demitti. Sed celerius id glutinatur, quam impletur.  
Neque verendum est, ne purum corpus puro corpori iunctum,  
non coeat, adiectis quoque medicamentis ad id efficacibus,  
cum saepe exulceratio digitorum, nisi magna cura prospexi-  
mus, sanescendo in vnum os iungat.

#### ENARRATIO.

**FISTULA.** sinu est callo obductus, ali-  
quatenus indolens, in pluribus nascens  
periculis: magna verò ex parte ex absces-  
sibus oritur parum dextrè curatis. est autem  
translatum nomen, ut ait Galenus, à fistu-  
la quibus mnsici vniuntur.

cumque auria sunt, aut disturniora, os  
abscedere necessarium est, & cicatrices car-  
nas fieri.

Aliae deinde faciliè.

Nonnunquam autem.

Sic Hippocrates sectione sexta Apho-  
rismorum, aphor. XLV, Vlcera, inquit, qua-

HIPPOCRATES in Causis Pranotio-  
nibus, Fistulae, inquit, difficillima sunt, quae  
in cartilaginosis, & excarnibus locis sunt,  
& canae sunt, ac procedunt, ac sanie ma-  
denti semper, & caruncula in ostio ipsius in-  
est. Cu-



est. Curati autem faciliores sunt, quæ in molibus & carnosiss, & non nervosis existunt.

nendus dicit, atque ablucendas fordes, ac deinde aruginem immittendam, atque ad septem usque dies faciendum.

### Ex nervo pingue.

NON solum ex puris qualitate fistulam ad nervum usque pervenisse indicabimus; verum etiam ex doloris sensu: punctio enim sensum, aut stuporis exhibebit. adhuc morus ille qui à nervo hoc proficisci solebat, seipso deterior apparebit, sed & in specilli tactu molestus sensus perceptus indicationem faciet. Humor autem inde latus tenuior est, similis ei qui ab ossibus defluit, non quidem oleosus aut pinguis (sicuti hic infert Celsus) sed glutinosus ac saniosus, ut ait Aëlius.

solutique quinto die satis est.

HIPPOCRATES tamen quotidie sol-

### Expediitissimum autem.

IOANNES Tagaulius ex Ægina loco hunc in hunc modum restituendum arbitrat: æruginis rasæ \* p<sup>o</sup> xii. conterere, deinde ammoniaci thymiamatis \* p<sup>o</sup> ii. &c.

Ferè verò fit.

VARIANT hic exemplaria: alia etenim ferramentum, habent: Ioannes Casarius, Pinzanam lectionem reprobandi, quæ ferrumen habet, foramen legere maluit: mihi certè Pinzana magis aridet.

Neque ignoro.

IDEM quoque suadet Aëlius.

### De Meliceria.

EST etiam vlceris genus, quod & à faui similitudine *μελικηρίς* à Græcis nominatur; idque duas species habet. Alterum subalbidum furunculo simile, sed maius, & cum dolore maiore. Quod ubi maturefcit, habet foramina per quæ fertur humor glutinosus, & purulentus, nec tamen ad iustam maturitatem pervenit. Si diuisum est, multo plus intus corrupti quàm in furunculo apparet, altiusque descendit. Rarè fit, nisi in \* scapulis. Alterum est minus \* super corpus \* capillis. \* super caput \* subalbidum, eminens, durum, latum, subviride, \* subpallidum, magis exulceratum. Siquidem ad singulorum pilorum radices foramina sunt, per quæ fertur humor glutinosus subpallidus, crassitudinem mellis aut visci referens, interdum olei. Si inciditur, viridis intrà caro apparet. Dolor autem, & inflammatio ingens est, adeò ut acutam quoque febrem mouere confuerit. Super id quod minus crebris foraminibus exasperatum est, rectè imponitur & ficus arida, & lini semen \* in multo coctum, & emplastra ac malagmata materiam educentia, aut quæ propriè huc pertinentia, suprà posui. Super alterum, \* quod in vido coctum

YY 2

&c



& ea medicamenta, & farina\* ex mulso cocta, sic ut ei dimidium resinæ terebinthinæ misceatur, & ficus in mulso decocta, cui paulum hyssopi contriti sit adiectum, & vix taminiæ pars quarta fico adiecta. Quod si parum in utrolibet genere medicamenta proficiunt, totum vlcus vsque ad sanam carnem excidi oportet, & vlcere ablato, super plagam medicamenta danda sunt, primum quæ pus citent, deinde quæ purgent, tum quæ impleant.

## ENARRATIO.

**I**ANVS Cornarius, ut annotauit Pannius, pro meliceria, melicerin legendum contendit: est autem affectio quam alij Cerion, Latini Fannus nominant; que quia foramina habeat maiora humorem similem mellis continentia, meliceris, hoc est fannus mellis nominatur. Celsus duas species meliceris ponit; per priorem quidem, quam maiorem esse dicit, proprie dictam melicerim intelligens; per posteriorem verò, affectionem que achor appellatur: est etenim hæc vlcusculum in capitis cute consistens; vel, ut ait Aetius, tenuia foramina habens, per quæ tenuis sanies effluit, mediocriter viscosa. Galenus unicam tantum melicerim definiuit: quemadmodum Aëtii quoque & Ægi-

nera: neque fannum hunc cum meliceride confundunt, sed inter se distinguunt, ac diuersis capitibus de singulis tractant. de achoribus tamen, & fannus tanquam congeneribus morbis, eodem capite remedia causantque ac signa describunt.

Rarò fit, nisi in scapulis.

Ex Aëtio restitendum monet Pannius capillis, quando in capite atque locis capillis obductis frequentius oritur malum. Quanquam si de proprie dicta meliceride, & non de cerio seu fanno intelligamus, rectè auctor noster inuenerit scapulis maximè molestas esse melicerides.

*De Acrochordone, & Thymio, & Myrmecis, & Clauo, curationibusque eorum.*

**S**VNT quædam verò verrucis similia, quorum diuersa nomina, ut vitia sunt. Acrochordona Græci vocant, ubi sub cute coit aliquid durius, & interdum paulo asperius, coloris eiusdem, infra tenue, ad cutem latius, idque modicum est, quia rarò fabæ magnitudinem excedit. Vix vnum tantum eodem tempore nascitur, sed ferè plura maximeque in pueris, eaque nonnunquam subito desinunt, nonnunquam mediocrem inflammationem excitant. Sunt quæ etiam in pus conuertuntur. Ac \*Thymion nominatur, quod super corpus quasi verrucula eminet, ad cutem tenue, supra latius, subdu-

\* acrothymion



rum, & in summo perasperum. Idque summum colorem  
 floris thymi repræsentat, unde ei nomen est, ibique facile fin-  
 ditur, & cruentatur, nonnunquam aliquantū sanguinis fun-  
 dit, fereque \*circa magnitudinem fabæ Ægyptiæ est, raro \*citra  
 maius, interdum perexiguum, modò vnum, modò autem  
 plura nascuntur, vel in talis, vel palmis, vel inferioribus pedum  
 partibus. Pessima tamen in obscœnis sunt, maximeque ibi  
 sanguinem fundunt. Myrmecia autem vocantur, humiliora  
 thymio, durioraque, quæ radices altiùs \*exigunt, maiorem. \*adigunt,  
 que dolorem mouent, infrà lata, super autem tenuia, minus  
 sanguinis mittunt, magnitudine vix vnquam lupini modum  
 excedunt. Nascuntur ea quoque aut in palmis, aut in infe-  
 rioribus partibus pedum. Clauus autem nonnunquam qui-  
 dem etiam alibi, sed in pedibus tamen maximè nascitur, præ-  
 cipuè tamen ex contuso, quamuis interdum aliter, dolorem-  
 que etiam, si non aliàs, tamen ingredienti mouet. Ex his  
 Acrochordon, \*siue Thymium sæpe etiam per se finiuntur: \*sic &  
 & quo \*minora sunt, eò magis. Myrmecia & clauus sine cu- \*maiora  
 ratione vix vnquam desinunt. Acrochordon si excisa est, ἀκροχόρδον  
 nullam radiculam relinquit, ideoque ne renascitur quidem. ὁ δὲ  
 Thymio clauoque excisis subter rotunda radícula nascitur, ὁ μύρμηκας  
 quæ penitus descendit ad carnem, eaque relicta idem rursus  
 \*exigit. Myrmecia latissimis radicibus inhærent, ideoque ne \*exit.  
 excidi quidem sine exulceratione magna possunt. Clauum μύρμηκας  
 subinde deradere commodissimum est. Nam sine vlla vi sic  
 emollescit, ac si sanguinis quoque aliquid emissum est, sæpe  
 emoritur. Tollitur etiam, si quis eum circumpurgat, deinde  
 imponit resinam, cui miscuit pulueris paulum, quem ex la-  
 pide molari contrito fecit. Cætera verò genera medicamen-  
 tis adurenda sunt. Aliisque id quod ex fece vini: myrmeciis  
 id, quod ex alumine & sandaraca fit, aptissimum. Sed ea,  
 quæ circà sunt, foliis contegi debent, ne ipsa quoque exulce-  
 rentur. Deinde postea lenticula imponi solet. Tollit thy-  
 mium etiam ficus in aqua cocta.



## ENARRATIO.

IOANNES Celsus annotavit hic à Celsi myrmecium in neutro genere usurpatum, contra aliorum tam Græcorum quam Latinorum auctorum consuetudinem, ut à quibus feminino genere myrmecia feruntur. Paulus tamen Ægineta (sicuti Celsus libro IIII. capite XV.) neutro genere usurpat.

## Acrochordona Græci.

VERRUCA, inquit Ægineta, quæ acrochordon dicitur, exigua cutis eminentia est, doloris expers, callosa, rotunda, plurima parte habet basim angustam, & suspensa esse videtur: myrmecia autem, seu formicaria verruca sic dicta est, quod ad contrahendum dolorem eiusmodi exhibeat qualis à morsu formicæ animalis contingit. Ad frigora, inquit, Ægineta formicarum moribus similem sensum excitat. hæc non solum in palmis, aut inferioribus partibus pedum,

ut arbitratur Celsus, sed & in universo corpore nascitur, frequentius tamen in iam dictis locis.

## Ac Thymion.

ABUNDANT certe hæc potissimum circa sedem, pedenda, ac media femora; rarius tamen in aliis partibus, atque ibidem (ut etiam infert noster auctor) pessima sunt. Solent autem ea ita distinguere, ut alia mansueti, alia maligna appellant: atque hæc quidem incurabilia dicunt; illa vero curata facilia.

## Clausus autem nonnumquam.

CLAVVS, inquit Ægineta, circumscriptus in orbem callus coloris candidi, clauorum capitibus similis, toto corpore, sed pedum solo digitisque præcipue, enascitur; dolor sequitur, & incessus impedimentum.

## De pustularum generibus, &amp; earum curationibus.

**A**T pustulæ maximè vernis temporibus oriuntur. Earum plura genera sunt. nam modò circa totum corpus par-  
 \* aspritudo tèmeve \* aspredo quædam fit, similis his pustulis, quæ ex vrtica, vel ex sudore nascuntur, ἐξαρθήματα Græci vocant, eaque  
 \* excedūt. modò rubent, modò colore cutis non \* exedunt. Nonnunquam plures similes varis oriuntur, nonnunquā maiores pustulæ luidæ, aut pallidæ, aut nigrae, aut aliter naturali colore mutato, subestq. his humor. Vbi hæ ruptæ sunt, infra quasi  
 \* φλύκται- exulcerata caro apparet, \* ἐλκῶδες Græcè \* nominatur. Fiunt  
 \* nominā- vel ex frigore, vel ex igni, vel ex medicamentis. \* Pfydracion  
 tur. autem paulo durior pustula est, subalbida, acuta, ex qua ipsa  
 \* φλυζάκιον quod exprimitur humidum est. Ex pustulis verò nonnunquam etiam vlcuscula sunt, aut aridiora, aut humidiora: & modò tantum cum prurigine, modò etiam cum inflammatione aut dolore. Exitque aut pus, aut sanies, aut utrunque. Maximeque id evenit in ætate puerili, rarò in medio corpore,



pore, sæpe in eminentibus partibus. Pessima pustula est, quæ ἰπποκρίτης vocatur. Ea colore vel subliuida, vel subnigra, vel alba esse consuevit. Circa hanc autem vehemens inflammatio est, & cum ad aperta est, reperitur intus exulceratio mucosa. Color est humori suo similis. Dolor ex ea supra magnitudinem eius est, neque enim ea faba maior est. Atque hæc quoque oritur in eminentibus partibus, & ferè noctu. Vnde nomen quoque à Græcis ei Epinyctis impositum est. In omni verò pustularum curatione primum est, multum ambulare, atque exerceri. Si quid ista prohibet, gestari. Secundum est, cibum minuere, abstinere ab omnibus acerbis & extenuantibus, eademq. nutrices facere oportet, si lactens puer ita affectus est. Præter hæc is qui iam robustus est, si pustulæ minutæ sunt, desudare in balneo debet, simulque super eas nitrum inspergere, oleoque vinum miscere, & sic vngi. Tum descendere in solum. Si nihil sic proficitur, aut si maius pustularum genus occupavit, imponenda lenticula est, detractaque summa pellicula ad medicamenta lenia transeundum. Epinyctis post lenticulam rectè herba quoque sanguinali, vel vindi coriandro curatur. Ulcera ex pustulis facta tollit spuma argenti cum semine fœnigræci mista, sic, ut his inuicem rosa, atq. intubi succus adiiciatur, donec mellis crassitudo fiat. Propriè ad eas pustulas, quæ infantes malè habent, lapidis, quem pyriten vocant p. viii. \*. cum quinquaginta amaris nucibus miscetur, adiiciunturq. olei cyathitres. Sed prius vngi ex cerussa pustulæ debent, tum hoc illini.

\* malum :  
maius.

## ENARRATIO.

**E**XANTHEMATA cutis sunt exulcerationes subrubicunda, & aspera; Hippocrates libro tertio Epidemion ἐκθύματα, quoddam spontè è cute erumpant, in easq. florescant, vocat. Plinius papulas, atque interdum pituita eruptiones appellat. At quæ prinatim ἐκθύματα nominantur, inquit Aëtianus, à crassis humoribus cuti impositis, ut plurimum ubi densa est summa cuticula, consistunt.

ἐλκώδες.

**VARIANT** hic exemplaria: siquidem nonnulla φλύκταιναι legunt: Paninus helicydia rectius legendum arbitratur, quæ Galenus ulcerosas pustulas nominare solet.

Psfyracion.

**PYNZANVM** exemplar physacium: non omnino malè habet: malim tamen Psfyrachiam scribere, sicuti Ioannes Martius:



nardus omnino legendam suspicatur: est autem psdrachium pustula dolorem inferens citra saniei collectionem, eamq; ab ebulliente fervore, ut auctor est Aelius, Græci ἐκζυμα vulgò appellant. Alexander Trallianus exigua capitis tubercula esse dicit, pustulæ similia, quæ summam cutem excedunt.

### Pessima pustula est.

EPINYCTIDES, ut auctor est Galenus, nomen sortita sunt, quod nocte nascantur: sunt autem ulcuscula sua sponte erumpentia pustularum specie, & subrubra; quibus apertis cruenta sanies defluit. Per diem non magnopere excruciant; per noctem autem gravis & magis quam pro ratione ulceris dolor torquet. Vide Pauli lib. II. cap. IX.

### De Scabie, & eius curatione.

\* aliàs,  
humor cutis rubicundus,  
al. humor durior e,  
r. al. durities cutis.

SCABIES verò est, \* durior cutis rubicundior, ex qua pustulæ oriuntur, quædam humidiores, quædam sicciore. Exit in quibusdam sanies, fitque ex his continuata exulceratio pruriens, serpitque in quibusdam citò. Atque in aliis quidem ex toto desinit, in aliis verò certo tempore anni reuertitur. Quo asperior est, quoque prurit magis, eò difficilius tollitur. Itaque eam, quæ talis est, ἀγέτω (id est feram) Græci appellant. In hanc quoque victus ratio eadem quæ suprà necessaria est. Medicamentum autem ad incipientem hanc idoneum est, quod fit ex spodij, croci, æruginis, singulorum p. i. \*. piperis albi, omphacj, singulorum p. i. \*. cadmiæ p. viii. \*. Aut ubi iam exulceratio est, id quod fit ex sulphuris p. i. \*. ceræ p. iiii. \*. picis liquidæ hemina, olei sextariis duobus. Quæ simul incoquantur, dum crassitudo mellis fiat. Est etiam quod ad Protarchum auctorem refertur. Habet hoc farinæ lupinorum sextarium, nitri cyathos quatuor, picis liquidæ heminam, resinæ humidæ scilibræ, aceti cyathos tres. Crocum quoque, lycium, ærugo, myrrha, cinis, æquis portionibus rectè miscentur, & ex passo coquantur. Idque omnem pituitam ubique \* sustinet. At si nihil aliud est, amirca ad tertiam partem decocta, vel sulphur pice liquida mistum, sicut in pecoribus proposui, hominibus quoque scabie laborantibus opitulantur.

### ENARRATIO.

SCABIES à Græcis ἰσχα vocatur: affinis admodum affectio cum Græcorum lepra, ut rectè annotavit Manardus: Differunt tamen, quòd lepra cum manifestis squamis cutem profundius per circulos depascatur; scabies autem, sem psora, superficiem



ficiem tantum variis figuris ladit, & furfuracea quadam corpora remittit. Leporam melancholicus succus committit, ut auctor est Aetnarius: scabiē varij humores, eorumq; varia misce, constituunt. communis viri- que est cutis asperitas & pruritus: si vero tenues acresque & serose humiditates succu permiscantur, impetiginis suboritur, quæ facillimè in scabiem ac lepram degenerant.

*ayelav.*

PER *ayelav*, scabiem intelligere videtur eam, quæ crassiorem succum, puta melancholicum, originis suæ causam habuerit: hæc enim non raro (sicuti secundo ab hæc scriptum reliquit Celsus) in lepram Græcorum degenerat.

*De Impetiginis speciebus, & curationibus.*

IMPETIGINIS verò species sunt quatuor. Minimè mala est, quæ similitudine scabiem repræsentat. Nam & rubet, & durior est, & exulcerata est, & roditur. Distat autem ab ea, quia magis exulcerata est, & varis similes pustulas habet, videnturque esse in ea quasi bullulæ quædam, ex quibus interposito tempore squamulæ resoluuntur, certioribusque hoc temporibus reuertitur. Alterum genus peius est, simile papulæ ferè, sed asperius rubicundiusque, figuras varias habens: squamulæ ex summa cute \* descendunt, rosio maior est, celerius & latius procedit, certioribusque etiam nonnunquam \* prior temporibus & fit, & desinit, Rubrica cognominatur. Tertia etiamnum deterior est: nam & crassior est, & durior, & magis tumet, in summa cute finditur, & vehementius rodit. Ipsa quoque squamosa, sed nigra procedit, & latè, & tardè \* eminus serpit. In temporibus aut oritur, aut desinit, neque ex toto tollitur, Nigra cognomen est. Quartum genus est, quod curationem omnino non recipit, distans colore: Nam subalbidum est, & recenti cicatrici simile, squamulæque habet pallidas, quasdam subalbidas, quasdam lenticulæ similes, quibus demptis, nonnunquā profluit sanguis. Alioqui verò humor eius albidus est, cutis dura atque fissa est, proceditque latius. Hæc verò omnia maximè genera oriuntur in pedibus & manibus, atque ungues quoque infestant. Medicamentum non aliud valentius est, quàm quod ad scabiem quoque pertinere sub auctore Protarcho retuli. Serapion autem nitri p. ii. \*. sulphuris p. iiii. \*. excipiebat resina copiosa, eoque utebatur.

\* erodit.

\* discedunt,

\* nigra

\* & minus serpit, neque in certis temp.

ZZ

ENAR



## ENARRATIO.

QUANQVAM Scribonius Largus, & Celsus Aurelius lichena Græcis dictam, Latinorum impetiginem esse contendunt; Celsus tamen hic per impetiginem, Græcorum leprā intellexisse videtur, quemadmodum annotarunt Ioannes Mainardus & Euchsus. Aliis tamen opinio hæc non satis placuit, quod videlicet apud Græcos nusquam quatuor lepræ species, ut hic à Celso impetiginis, describantur. Ego certè rem quodammodo in dubium vocarim; nisi potior eorum opinio videretur, qui per impetiginem, lepram Græcorum intellexerunt: nam, ut sequente paragrafo dicemus, papularum nomine lichenes seu impetiginem vulgo dictam à Celso intelligi certum est, quam interdum in impetiginem transire dicit: quod & de lichene Græci scribunt, quam in lepram non raro degenerare contendunt. Tertium porrò atque quartum impetiginis genus Mainardus libro epistolarum medicinalium ad Ionthosin refert; cuius

Plinius meminit, principiumque elephantiasis esse dicit: Galenus tumorem parvum & durum in faciei cute esse ait, & qui à succo crasso congregetur; Latini Varum nominant. Verum, ut cum bona venia tanti viri quod sentio eloquar, nihil minùs quam Ionthosin comprehendisse videtur; præsertim quando sequente libro capite V. speciatim de variis scribat. Nam quantumvis tertium genus quod nigrum vocari dicit, in temporibus aut oriri, aut desinere dicit; subiungit tamen paulo post: hæc omnia genera maxime oriuntur in pedibus, & manibus, atque ungues quoque infestant, & c: vari autem faciei cutim tantum debonestant. Quo fit, ut quum obscurus admodum hic locus sit, ingenne nostram ignorantiam sateri potius duxerimus, quam aliis erroris fenestram patefacere. Secundum verò genus, quod rubricam vocari dicit, ad quem affectum referam, nondum legisse memini.

## De Papulis, &amp; earum curatione.

PAPULARVM verò duo genera sunt. Altera est in qua per minimas pustulas cutis exasperatur, & rubet, leuiterque roditur: medium habet\* paulillo leuius, tardè serpit: idque vitium maximè rotundum incipit, eademque ratione in orbem procedit. Altera autem est, quam *αγλας*, id est, feram Græci appellant. In qua similiter quidem, sed magis cutis exasperatur, exulceraturque, ac vehementius & roditur, & rubet, interdum etiam pilos remittit. Quæ minus rotunda est, difficilius sanescit: nisi sublata est, in impetiginem vertitur: sed levis papula, etiam si ieiuna saliuā quotidie defricatur, sanescit. Maior commodissimè murali herba tollitur, si sub ea detrita est. Ut verò ad composita medicamenta veniamus, idem illud Protarchi tanto valentius in his est, quanto minus in his\* vitij est: alterum ad idem Myronis, nitrī\* rubri, thuris, singulorum P. I. \*. cantharidum purgatarum P. II. \*. sulphuris

\* paulo laxius,

\* vitium  
\* ruffi,



fulphuris ignem non experti tantundem, resinæ terebinthinæ liquidæ p. xx. \*. farina \* lolij semis, gith cyathos tres, picis crudæ \* vnum.

\* lolij  
sext. iiii.  
\* sext.

## ENARRATIO.

QUANQVAM doctissimus, ac mihi quondam summa necessitudine innotuit, Hadrianus Iunius in suo Nomenclatore dicat papulas, quæ & Boæ Plinio dicuntur, esse puerilem morbum qui rubore corporis obsidet, nimirum exiles maculas, rubras aut purpureas, interdum etiam nigricantes, ἐξανθήματα Græcis dicta, quæ Galenus 6. Epidemion ἐξανθήματα πρὸς ἄνδρ. à milij similitudine vocat: & Leonartus Fuchsius eadem etiam duplicia esse contendat, sublimia videlicet & lata seu humilia, atque illa ab iis qui barbaram sequuntur medicinam morbillos vocari, lata verò variolas: Mihi tamen, saluo illorum iudicio, auctor noster papulis suis idem ascripsisse videtur, quod Græci lichenibus: siquidem, ut habet auctor Introductorij (sive is Galenus sive alius fuerit) lichen cutis affectus est; cuiusque species duæ existunt, una tolerabilis mitiorque est, altera fera (ἀγρία à Græcis vocari dicit Celsus) difficiliorque: squamula in his ex summa cute descendunt; sub quibus locus rubicundior serèque exulcera-

tus apparet. Hanc Ægineta non raro in lepram degenerare auctor est: Galenus De compositione medicamentorum localium, ex lichene psoram & lepram ordiri contendit. Quæ si cum Celsi nostri papulis quis conferat, non poterit non fateri, easdem cum lichenibus esse papulas: nam & papularum duo depingit genera, & ex his id quod ferum vocari dicit, in impetiginem interdum transire dicit. Huc si remedia conseras, atque eadem expendas, videbis papulis eadem adscribi remedia quæ & lichenibus, & vulgò dicta impetigini utilia esse censentur. Siquidem, ut vnum multorum loco in medium afferamus, Scribonius Largus, Galenus, Ægineta, ieiuni hominis salina mitiores lichenem sanari contendunt: & Serenus Sammonicus capite xi. inquit: Si verò vitium est quod ducit ab impete nomen, Hoc matutina poteris cohibere salina. Celsus noster, Sed levis papula, inquit, etiam si ieiuni salina quotidie defricatur, sanescit.

*De Vitiliginis speciebus, id est, de Albo, & Melane, & Leuce, & earum curatione.*

VITILIGO quoque, quamuis per se nullum periculum adfert, tamen foeda est, & ex malo corporis habitu fit. Eius tres species sunt. Ἀλφός vocatur, vbi color albus est, serè subasper, & non continuus, ut quædam quasi guttæ dispersæ esse videantur. Interdum etiam latius, & cum quibusdam intermissionibus serpit. Μέλαις colore ab hoc differt, quia niger est, & umbræ similis. Cætera eadem sunt. Λευκή habet quiddam simile albo, sed magis albida est: altius descendit, in eaque albi pili sunt, & lanugini similes. Omnia hæc serpunt, sed in aliis celerius, in aliis tardius. Alfos & Melas in

ZZ 2

quibus



quibusdam variis temporibus & oriuntur, & desinunt. Leuce quem occupavit, non facile dimittit. Priora curationem non difficilissimam recipiunt, ultimum vix unquam sanescit: ac si quid ei vitio demptum est, tamen non ex toto sanus color redditur. Vtrum autem aliquod horum sanabile sit, an non sit, experimento facili colligitur. Incidi enim cutis debet, aut acu pungi. Si sanguis exit, quod ferè sit in duobus prioribus, remedio locus est: si humor albidus, sanari non potest: itaque ab hoc quidem abstinendum est. Super id verò, quod curationem recipit, imponenda lenticula mista cum sulphure & thure, sic ut ea contrita ex aceto sit. Aliud ad idem, quod ad Hirenaum auctorem refertur, Alcyonium, nitrum, cuminum, fici folia arida paribus portionibus contunduntur, adiecto aceto. His in sole vitiligo perungitur, deinde non ita multo post, ne nimis erodatur, eluitur. Propriè quidem Myrone auctore eos, quos Alphos vocari dixi, hoc medicamento perungunt, sulphuris \* p. ii. \*. nitri p. iii. \*. myrrhæ aridæ contritæ acetabulum miscent, deinde in balneo super vitiliginem inspergunt farinam ex faba, tum hæc inducunt. Hi vetò quos Melanas vocari dixi, curantur, cum simul \* contrita sunt alcyonium, thus, hordeum, faba sine oleo, in balneo ante sudorem insperguntur, \* tum genus id vitiliginis defricatur.

\* quidam

\* p. 3. a-  
luminis scif-  
ilis p. \*. 3.  
nitri p. \*.  
iiii. myr-  
ri radice co-  
erita acetab.

\* contrita  
alcyoniū.

\* actum

## ENARRATIO.

VITILIGINVM, inquit Aëlius, qua Alphi Græcis dicuntur, generatio eiusdem est speciei cum leuce & lepra; non tamen omnino in profundo caro in eis affecta est, sed summa tantum cutis, & velut squamule quædam vitiliginis ipsæ affixæ inhaerent; albæ quidem ex pituita, nigra verò ex atra bilis humore oloris. Ioannes Moynardus albam & morpheam Aniceane sub vitiliginis nomine comprehendit vult. & quoniam plurima quæ ad loci huius & aliorum intelligentiam de minoribus tumoribus & pustulis facere possunt, idem libro septimo

capite secundo in medium adducit, lectorem eò relegatum volumus.

## Leuce quem occupavit.

ÆGINETA tamen non omnem leucem incurabilem dicit: esse enim nonnunquam quando incisa summa cute sanguis effluat; & interdum rubicundiorum cutem evadere, si panniculo læneo asperiore perficata fuerit: quod quories contigerit, spem sanitatis adhuc esse; si lactea humiditas aut humor albus exeat, desperatam esse, quod nimirum caro, quam iam occupat, aliam formam induerit.

AVRE-



A V R E L I I  
C O R N E L I I C E L S I  
D E  
R E M E D I C A  
L I B E R S E X T V S ,

A BALDVINO RONSSEO *Gandensi, medico,*  
*Enarrationibus illustratus.*

C A P V T I .

*De vitiis singularum corporis partium.*

*De capillis fluentibus.*



DE his vitiis, quæ per totum corpus orientia, medicamentorum auxilia desiderant. Nunc ad ea veniam, quæ non nisi in singulis partibus incidere consuerunt, orsus à capite. In hoc igitur capillis fluentibus maximè quidem sæpe radendo succurritur. Adicit enim vim quandam ad <sup>\* etiam</sup> continendum ladanum cum oleo mistum. Nunc de his capillis loquor, qui post morbum ferè fluunt. Nam quo minus caput quibusdam ætate nudetur, succurri nullo modo potest.

E N A R R A T I O .

CALVITIUM fit quoties ex defectu humorum, non ex malignitate eorumdem capilli desunt; Græcis *παδάρεσις* dicitur. Videmus interim interdum ætate aliquibus pilis nudari caput: nonnullis etiam non ætatis vitio, sed ex morbo capilli deficiunt; quod ex raritate cutis & penuria

essentia generantis pilos fit: atque ob id auctor noster ea quæ vim quandam ad continendum habent, prodesse dicit; hoc est, ea quæ moderatè cutem densant, sic tamen ut ne refrigerent: quapropter moderatè astringentia admiscere oportet humectantibus pharmacis, quale inter alia est ladanum.

ZZ 3

C A P V T



## CAPVT II.

*De Porrigine, & eius curatione.*

**P**ORRIGO autem est, vbi inter pilos quædam quasi squamulæ surgunt, ex quæ \* acutæ resoluuntur, & interdum madent, multo sæpius siccæ sunt. Id quæ euenit modò sine vlcere, modò exulcerato loco: huic quoq. modò malo odore, modò nullo accidente, fere quæ id in capillo fit, rariùs in barba, aliquando etiam in supercilio. Ac neque sine aliquo corporis vitio nascitur, neque ex toto inutile est. Nam bene integro capite, non exit. Vbi aliquod in eo vitium est, non incommodum est, summam cutem potius subinde corrumpi, quàm id, quod nocet, in aliam partem magis necessariam verti. Commodius est ergo subinde pectendo repurgare, quàm id ex toto prohibere. Si tamen ea res nimium offendit, quod humore sequente fieri potest, magis quæ si \* id etiam mali odoris est, caput sæpe radendum est, dein \* id super \* ad iuuandum aliquibus ex leuiter reprimentibus, quale est nitrum cum aceto, vel ladanum cum myrteo vino, vel myrobalanum cum vino. Si parum per hæc proficitur, vehementioribus vti licet, cum eo, vt sciamus, vtique in recenti vitio id inutile esse.

## ENARRATIO.

**P**ORRIGINEM Auicenna furfures vocat, Græci πυρρῆσι nominant: contingit autem hæc affectio à serosis humoribus; decidunt tennes & furfuraceæ squamulæ ex capitis cute citra exulcerationem, vt docet Paulus Ægineta: Celsus modò madere tanquam consortia exulcerationis (quæ

ies videlicet humor acrior cutim exulceret) sapientis tamen sicca esse dicit, quæ à cute resoluuntur: atque ea quidem quæ vlcerato loco contingunt, mali esse odoris, neque omnino inutilia; quando capitis, hoc est, cerebri vitia ita commodissimè expurgentur.

## CAPVT III.

*De Sycofi, & eius curatione.*

**E**ST etiam vlcus, quod à fici similitudine συκοῖσι à Græcis nominatur. Caro excrescit, & id quidem generale est.



est. Sub eo verò duæ species sunt. Alterum vlcus durum, & rotundum est, alterum humidum, & inæquale. Ex duro exiguum quiddam, & glutinosum exit: ex humido plus: & mali odoris. Fit verò vtrunque in his partibus, quæ pilis continguntur. Sed id quidem quod callosum, & rotundum est, maximè in barba. Id verò quod humidum, præcipuè est in capillo. Super vtrunque oportet imponere elaterium, aut lini semen contritum, & aqua\* coactum, aut ficum in aqua decoctam, aut emplastrum terrapharmacum ex aceto subactum, terra quoque eretria ex aceto liquata rectè illinitur.

## ENARRATIO.

**A**ETIVS Amidonius quando thymos excrecentes in ficos aut σύκων degenerate dicit, aliam ab hac fycosi intellexisse videtur; siquidem is circa pudenda femoræque frequentissimè, raroque in facie viri dicit: Oribasius plerumque in capite nasci auctor est: Celsus in barba & capillo molestam esse contendit; est tamen quando in reliquo corpore, quauquam rarius, contingat. Appellat autem ficos, ut auctor est Oribasius, germina quedam ad modum vlcerni rotunda, subdura, rubentia, quæ dolor etiam concomitatur.

## CAPVT IIII.

*De Areis, & earum curationibus.*

**A**REARVM quoque duo genera sunt. Commune vtrique est, quòd emortua summa pellicula pili primum extenuantur, deinde excidunt: ac si ictus is locus est, sanguis exit liquidus, & mali odoris, increscitque vtrunque in aliis celeriter, in aliis tardè. Peius est, quod densam cutem, & subpinguem, & ex toto glabram fecit: sed ea quæ ἀλωπεκία nominatur, sub qualibet figura dilatur, fit & in capillo, & in barba. Id verò quod à serpentis similitudine ὀφίας appellatur, incipit ab occipitio, duorum digitorum latitudinem non excedit, ad aures duobus capitibus serpit, quibusdam etiam ad frontem, donec se duo capita in priorem partem committant. Illud vitium in qualibet ætate est, hoc fere infantibus. Illud vix vnquam sine curatione, hoc per se sæpe finitur. Quidam hæc genera arearum scalpello exasperant. Quidam illinunt



illinunt adurentia ex oleo, maximeque chartam combustam. Quidam resinam terebinthinam cum thapsia inducunt. Sed nihil melius est, quam nouacula quotidie radere, qua cum paulatim summa pellicula excisa est, adaperiuntur pilorum radicular. Neque antè oportet desistere quam frequentem pilum nasci apparuerit. Id autem, quod subinde raditur, illini atramento scriptorio satis est.

## ENARRATIO.

**A**REARVM causam Galenus esse dicit humorum vitiorum redundantiā: atque ij quales quales tandem sint, ex colore cutis capitis cognoscere licet; quando color, ut idem testatur, similis efflorescat humerulus. Aliquibus enim mutata cutis albidior apparet, piuita redundantis testis; aliquibus nigrior, melancholici humoris indicium; aliis etiam pallidior, biliosi humoris exuberantis certissimum testimonium. Curare autem singulos affectus pro humoris varietate oportet, ac prapurgato corpore discussoriis medicamentis vitendum est, quando nihil alienius sit quā repellentia adhibere. Alopecias autem dictas volunt, quod vulpitus peculiare sit vitium.

## CAPVT V.

*De Varis, & Lenticulis, & Ephelide, & eorum curationibus.*

**P**ENE ineptiæ sunt, curare Varos, & Lenticulas, & Ephelidas. Sed eripi tamen fœminis cura cultus sui non potest. Ex his autem quas suprà posui, Vari, Lenticulæque vulgo notæ sunt, quamvis rarior ea species est, quam Græci vocant, cum sit ea Lenticula rubicundior, & inæqualior. Equale verò à plerisque ignoratur; quæ nihil est, nisi asperitas quadam, & durities mali coloris. Cætera non nisi in facie, Lenticulæ etiam in alia parte nonnunquam nasci solent. De qua per se scribere alio loco, visum operæ pretium non est. Sed Vari commodissime tolluntur impoſita resina, cui non minus quàm ipsa est, aluminis scissilis, & paulum mellis adiectum est. Lenticulam tollunt galbanum & nitrum, cum pares portiones habent, contritaque ex aceto sunt, donec ad mellis crassitudinem venerint. His corpus illinendum, & interpositis pluitibus horis manè eluendum est, oleoque leuiter vngendum.



dum. Ephelidem tollit resina, cui tertia pars salis fossilis, & paulum mellis adiectum est. Ad omnia verò ista, atque etiam ad colorandas cicatrices potest ea compositio, quæ ad Tryphonem patrem auctorem refertur. In ea pares portiones sunt myrobalani\* magmatis, cretæ cimoliæ subcærulæ, nucum amararum, farinæ ordeï, atque erui, struthij albi, sertulæ campanæ seminis. Quæ omnia contrita, melle quàm amarissimo coquuntur, illitumque à vespere vsque manè eluitur.

\* croco-  
magma-  
tis,

## ENARRATIO.

VARI, ut diximus, exigui & duri in facie tumores sunt, qui ubi suppurrati fuerint, evanescent; iōdus Greci nominant. ut plurimum verò eos infestant, qui barbam unguere assolent, & quibus sanguis è naribus profluere solet. Ephelis est tuberculum & affredo cutis in facie, ex inflammatione aut ardore solis prognata. Ἐλινος, vel ἔλινος, seu φακός, ut alia habent exemplaria, pustula aut tumor quidam est,

sugillatis non omnino dissimilis, deducto vocabuli etymo ἀπὸ τῆς ἑλινος, quod percutere significat.

## myrobalani magmatis.

MAGMA myrobalani vocat retinimenta ab expressâ myrobalano reliqua: ea enim lenticulis, psoris, varis commodissime adhiberi auctor est Dioscorides.

## CAPUT VI.

*De oculorum morbis, curationibusque eorum, & primò de his morbis, qui lenibus medicamentis curantur.*

SED hæc quidem mediocria sunt. Ingentibus verò, & variis casibus oculi nostri patent. Qui cum magnam partem ad vitæ simul & usum, & dulcedinem conferant, summa cura tuendi sunt. Protinus autem orta lippitudine quædam notæ sunt, ex quibus quid euenturum sit, colligere possimus. Nam si simul ac lacryma, & tumor, & crassa pituita cœperint, si ea pituita lacrymæ mista est, & ea lacryma calida est, pituita verò alba, & mollis, tumor non durus, longæ valetudinis metus non est. At si lacryma multa, & calida, pituita paulum, tumor modicus, idque in vno oculo est, longum id, sed sine periculo futurum est. Idque lippitudinis genus minimè cum dolore est, sed vix ante vigesimum diem tollitur, nonnunquam per duos menses durat, sed quandoque finitur. Si pi-

\* si simul

aa

tuita



pituita alba & mollis esse incipit, lacrymaeque miscentur, aut si  
 ea simul haec utrumque oculum invaserunt, potest esse breuior,  
 sed periculum vicerum est. Pituita autem sicca & arida do-  
 lorem quidem mouet, sed maturius desinit, nisi quid exulce-  
 ravit. Tumor magnus si sine dolore est & siccus, sine vlllo  
 periculo est. Si siccus quidem, sed cum dolore est, ferè ex-  
 ulcerat, & nonnunquã ex eo casu fit, vt palpebra cum oculo  
 glutinetur. Eiusdem exulcerationis timor in palpebris pu-  
 pillisve est, vbi super magnum dolorem lacrymae salsae, cali-  
 daeque cunt, aut etiam si tumore \* finito diu lacryma cum  
 \* candida, pituita profluit. Perius etiamnum est, vbi pituita \* calida, aut  
 liuida est lacryma calida aut multa profluit, caput calet, à tem-  
 poribus ad oculos dolor peruenit, nocturna vigilia vrget. Si-  
 quidem sub his oculis plerunque rumpitur, votumque est,  
 vt tantũ exulceretur. Intus ruptum oculum febricula iuuat.

\* ex Si foras iam ruptus procedit, sine auxilio est. Si \* de nigro  
 aliquid albidum factum est, diu manet. At si asperum cras-  
 sum est, etiam post curationem vestigium aliquod relin-  
 quit. Curari verò oculos sanguinis detractione, medica-  
 mento, balneo, vino, vetustissimus auctor Hippocrates  
 memoriae prodidit. Sed eorum tempora, & causas pa-  
 rum explicuit, in quibus Medicinae summa est. Neque mi-  
 nus in abstinentia, & alui ductione saepe auxilij est. Hos  
 igitur interdum inflammatio occupat, vbi cum tumore in  
 his dolor est, sequiturque pituitae cursus nonnunquam co-  
 piosior vel acrior, nonnunquam vtraque parte modera-  
 tor. In eiusmodi casu prima omnium sunt, quies & ab-  
 stinentia. Ergo primo die loco obscuro cubare debet, sic  
 vt à sermone quoque abstineat. Nullum cibum assume-  
 re, si fieri potest, ne aquam quidem: sin minus, certè quàm  
 minimum eius. Quòd si graues dolores sunt, commo-  
 dius secundo die; si tamen res vrget, etiam primo sanguis  
 mittendus est, vtique si in fronte venae tument, si firmo cor-  
 pori materia superest. Si verò minor impetus, minus acrem  
 curationem requirit, aluum, sed non nisi secundo, tertiove  
 die, duci oportet. At modica inflammatio neutrum ex his  
 auxilium



auxilium desiderat. Satisque est uti quiete, & abstinentia. Neque tamen in lippientibus longum ieiunium necessarium est, ne pituita tenuior atque acrior fiat. Sed secundo die dari debet id, quod leuissimum videri potest ex his, quæ pituitam faciunt crassiores, qualia sunt oua forbilia. Si minor vis urget, pulicula quoque, aut panis ex lacte. Insequentibus diebus, quantum inflammationi detrahatur, tantum adici cibi poterit. Sed generis eiusdem, utique ut nihil falsum, nihil acre, nihil ex his quæ extenuant, sumatur, nihil potui præter aquam. Et victus quidem ratio talis maximè necessaria est. Protinus autem primo die croci p. i. \*. & farina candidæ quàm tenuissimæ p. ii. \*. excipere oportet oui albo, donec mellis crassitudinem habeat, idque in linteolum illinere, & fronti agglutinare, ut compressis venis pituitæ impetum cohibeat. Si crocum non est, thus idem facit. Linteolo an lana excipiat, nihil interest. Super inungi verò oculi debent, sic ut croci quantum tribus digitis comprehendere potest, sumatur: myrrhæ ad fabæ, papaveris lacrymæ ad lenticulæ magnitudinem, eaque cum passo conterantur, & specillo super oculum inducantur. Aliud ad idem: Myrrhæ p. i. \*. mandragoræ succi p. ii. \*. papaveris lacrymæ p. ii. \*. foliorum rosæ, cicutæ seminis, singulorum p. iiii. \*. acaciæ p. iiii. \*. gummi p. viii. \*. Et hæc quidem interdium. Noctu verò, quò commodior quies veniat, non alienum est superimponere candidi panis interiorem partem ex vino subactam. Nam & pituitam reprimat, & si quid lacrymæ processit, absorbet, & oculum glutinari non patitur. Si graue id, & durum propter magnum oculorum dolorem videtur, oui & album, & vitellus in vas defundendum est, adiciendumque eo paululum, idque digito permiscendum. Vbi facta vnitas est, demitti debet lana mollis bene carpta, quæ id excipiat, superque oculos imponi. Ea res & levis est, & refrigerando pituitam coercet, & non exarescit, & glutinari oculum non patitur. Farina quoque ordeacea cocta, & cum malo cotoneo cocto mista, commodè imponitur. Neque ab ratione abhorret etiam penicillo potissimum uti expresso: si leuior impetus



est, ex aqua: si maior, ex posca. Priora fascia deliganda sunt, ne per somnum cadant, & hoc superimponi satis est, quia & reponi ab \* ipso commodè potest: & cum inaruit, iterum madefaciendum est. Si tantum mali est, ut somnum diu prohibeat, eorum aliquid dandum est, quæ \* ἀνόδουα Græci vocant. Satisque est puero, quod crui, viro quod fabæ magnitudinem impleat. In ipsum verò oculum primo die, nisi \* immodica inflammatio est, nihil rectè coniicitur. Sæpe enim potius concitatur eo pituita, quàm minuitur. A secundo die graui quoque lippitudini per indita medicamenta rectè succurritur, vbi vel iam sanguis missus, vel aluus ducta est, aut vbi neutrum necessarium esse, manifestum est.

## ENARRATIO.

**M**ORBI oculos infestantes, ut varij atque multiplices sunt; sic variis sedibus vagantur: alij siquidem oculi propria agnitiones sunt, ut sunt ophthalmia, cymoses, pterygia, œdemata; alij communes sunt oculis atque ciliis; in quo albo comprehenduntur xerophthalmia & sclerophthalmia: alij verò circa cutem ciliarum sunt, ut sunt steatomata & melicerides: alij intus circa cilia consistunt; cuius generis sunt sycofis, & grando: rheades canthorum seu hircorum morbus est, caligo ceratoecidis tunica. Circa rhagoiden tunicam oriuntur staphylomata, mydriases, phthisis, hypophthalmi pupille: suffusio in ipso rhagoidis foramine consistit: glaucosis vitium est crystallini humoris.

## Qui cum magnam partem.

SIC Anicetas, Cruciatas, inquit, lumen omnium maximè exeruciant, est enim oculus acerrimi sensus.

## Protinus autem orta.

LIPPITUDO seu ophthalmia est oculorum phlegmone; ex accidenti tamen oculorum morbus esse videtur, quando, ut passim testatur Galenus, aliud nihil sit quàm in-

flammati tunica os capitis & calvariam ambientis.

## Nam simul ac lachryma &amp; tumor, &amp;c.

TOTA hac periculis ex Hippocratis secundo de Prædictionibus desumpta est: ac proinde quoniam locis aliquot hic restituendus est Celsus, Hippocratis verba subiungemus. Dicit autem sic: Oculi porro lippientes optimè permittantur, si & lachryma & sordes, & tumor simul inceperint: si verò lachryma sordi fuerit permixta, & non valdè calida, sordes autem alba fuerint & molles, & tumor levis, solutus; si ita hæc se habuerint, oculus conglutinabitur ad noctes, ut doloris exorsus sit: atque hoc modo res minimè periculosa fuerit, ac minimè diuturna; si verò lachryma procedit multa, & calida cum paucissima sorde, ac paruo tumore, atque hoc ex altero oculo tantum, tunc diuturnum valdè sit malum, verum non periculosum; & doloris exorsus est hic modus: & indicationem in his maximè expectare oportet, primam quidem ad vigesimam diem; si verò hoc tempus transmittat, ad quadagesimum expectanda est; si verò neque in his diebus sedetur, in sexaginta indicatur. Per totum autem tempus hoc sordem considerare oportet,



oportet, an in digito misceatur, & alba ac mollis fiat, maximè sub indicationis tempore; si enim desinet, hac faciet. At si utrique oculi hac perperantur, in maiori periculo sunt ne ulcerentur: verum indicatio brevioris temporis erit. Sordes autem sicca valde dolorosa sunt, sed citò indicantur, si non vulnus acceperit oculus. Si verò tumor magnus fuerit, dolorisque exorsus & factus, periculo vacat; si verò cum dolore fuerit, malus est si siccus sit, & periculum est ne ulceretur oculus & concreseat. Sed & gravis est tumor si lachrymam continuam habeat, itemque dolorem: si enim lachryma procedit calida ac salsa, periculum est, & pupillam exulcerari & palpebras. Si verò tumor confederit, sed lachryma multa multo tempore effundatur, & sordes fuerint, viris quidem palpebrarum eversionem predicere oportet, mulieribus autem ac pueris exulcerationem ac subversionem palpebrarum. At si sordes pallida ac limba fuerint & lachryma multa ac calida, & in capite ardor fuerit, & de tempore dolores in oculum incubuerint, & vigilia his accesserint, necesse est ulcus in oculo factum esse, & timor est quoque ut talis rumpatur. Prodest autem succedens febris, aut dolor ad lumbos innixus. Hactenus Hippocrates. Celsus passim pituitam crassam pro sordibus reddidit.

Nam simul ac

LEGITO ex iam citato loco, Nam si simul.

sed quandoque finitur.

LEGE quandoque antè finitur, ut quadragesimum diem intelligamus, quo nonnunquam solus morbum dixit Hippocrates.

in palpebris pupillisve.

LEGE pupillisque.

Pcius etiamnum est.

OMNIA ferè exemplaria sic habent, idq; mendose admodum; solum Oportini reliquis rectis, atque adeò Hippocratis Celsiq; mentem exprimens, etiamnum legitur

Curari verò oculos.

HIPPOCRATES sectionis sexta Aphorismo XXXI. Dolores, inquit, oculorum meri potio, aut balneum, aut vena sectio, aut medicamentum epotum soluit. Meri quidem potio eos oculorum dolores sanat, qui ex copia sanguinis crassioris in venulis oculorum circa plenitudinem totius corporis contenti, procreantur: potest enim, ut auctor est Ægineta, vinum calefacere, vacuare & obstructions tollere; ac tale quidem potissimum est, ut auctor est Aëtius, fulvum tenue, antiquum. Balneum autem, ut docet Galenus, eis prodest qui ab acerbis humoribus ad oculos fluentibus circa corporis plenitudinem oriuntur. Per balneum autem intelligit, balneum aqua dulcis, ut docet Paulus; hoc etenim dolores mitigat, acres humores enocat atque contemperat. Fomentum autem, auctore Galeno, confert, ubi nihil in oculos confluit; dissolvit enim eam qua in ipsis est superfluitatem. Sanguinis verò missione si universum corpus plenitudine laboraverit, nihil utilius est; ut qua sola à gravissimis ophthalmiis liberare possit, quemadmodum docet libro De sanguinis missione Galenus. At purgatio, si malis humoribus redundet homo, non minus quam phlebotomia ex usu est: quod confirmat Hippocrates libro De visu, Ad lippitudinem annuam, dicens, ac populareum conductis capitis purgatio & ventris inferni.

Neque minus.

IDEM suadet Hippocrates libro De visu.

Neque tamen in lippientibus.

QVOD hic oculis lippientibus panem ex lacte exhibet Celsus, contra Hippocratis mentem, atque adeò ipsam rationem esse videtur: nam Hippocrates lac dare caput dolentibus & febricitantibus malum esse auctor est, quod lac suis vaporibus caput perat atque afficitur: Verum quoniam variæ sunt lippitudinis causæ, aliæque alia siccior sit, non tuius prodesse dicemus panem lacti infusum,



sum, sed et tantum quæ siccior sit, & quæ ab acerbis succis originem trahit; obinde enim lac, hebetatque humorum acrimoniam, ut paragrapho de oculorum carbunculis annotauimus.

Myrrhæ p. i. \*. man-  
dragoræ..

ISTHVC tanquam narcoticum non nisi maxima urgente necessitate admiserit Galenus.

& cum malo cotoneo.

SEMINA cotonei, quam malum ipsum, prætulerim; ut quæ venenositati inflammationum strenuissimè resistant: quanquam & ipsum cotoneum summè commendetur. nisi immodica inflammatio est. Pynzanum exemplar malè habet nisi modica inflammatio est: legendumque est nisi immodica, sicut reliqua omnia habent.

*De diuersis oculorum collyriis.*

**M**VLTA autem multorumque auctorum collyria ad id apta sunt, nouisque etiam nunc misturis temperari possunt, cum lenia medicamenta & modicè reprimentia, faciliè & variè misceantur. \* Ergo nobilissima exequar.

\* Ego nobilium ex-  
scilicet au-  
storum.

ENARRATIO.

**V**ARIA admodum medicamentorum ocularium materies existit; alia enim acrimoniam leniunt, alia contrariam his temperiem obtinent, recludendis vacuandisque iis quæ diu impacta fuerunt, accommodata: nonnulla sordices abstergunt; alia

his vicina sunt, smectica dicta ab exterendis sordibus; alia concoquunt, ac discutiunt; nonnulla etiam astringunt. At ex compositis oculorum remediis alia delinuntur, simpliciterque denominationem habent, alia ærocollyria, alia hygrocollyria vocantur.

*Philonis collyrium.*

**E**st igitur Philonis, quod habet cerussæ elotæ, spodij, gummi, singulorum p. i. \*. papaueris lacrymæ combustæ p. i. \*. Illud scire oportet, hic quoque omnia medicamenta, singula primùm per se teri, deinde mista, iterum adiecta paulatim vel aqua vel alio humore: gummi cum quasdam alias facultates habeat, hoc maximè præstare, ut ubi collyria facta inaruerunt, glutinata sint, neque frientur.

Gummi

\* præstat,

*Dionysij collyrium.*

**D**IONYSII verò collyrium est, papaueris lacrymæ combustæ, donec tenerescat, p. i. \*. thuris combusti, gummi singulorum p. ii. \*. spodij p. ii. ii. \*.

\* inarescat,

*Cleonis*



*Cleonis collyrium.*

**C**LEONIS nobile admodum, papaveris lacrymæ frictæ  
 P. I. \*. croci P. I. \*. gummi P. I. \*. quibus cum terun-  
 tur, adicitur rosæ succus. Aliud eiusdem valentius: Squammæ  
 \* aris quod *σύνωμα* appellant, P. I. \*. croci P. II. \*. spodij  
 P. III. \*. plumbi & eloti, & combusti P. VI. \*. gummi tan-  
 tundem. Eius aliud quoque ad idem est, maximè ubi multa  
 pituita profluit. Castorei P. \*. 3. aloës P. L. \*. croci \* P. L. \*. \* P. XI.  
 myrrhæ P. II. \*. lycij P. III. \*. cadmiæ curatæ P. VIII. \*. stibis  
 tantundem, acaciæ succi P. XII. \*. quod cum gummi miscuit,  
 liquidum in \* pyxidula servatur. Theodotus verò huic  
 compositioni adiecit papaveris lacrymæ combustæ P. I. \*. aris  
 combusti & eloti P. II. \*. \* nucleorum palmarum combusto-  
 rum P. X. \*. gummi P. XII. \*.

\* ferri aut  
chalybis

\* pyxidula

\* aliàs: nu-  
cleos pal-  
marum co-  
bustos nu-  
mero x.

## ENARRATIO.

## Cleonis nobile.

**E**ST & aliud Cleonis collyrium, quod  
 Galenus & Aegineta describunt: re-  
 cipit autem, pompholygos, plumbi, singulo-  
 rum uncias v. croci  $\mathfrak{z}$  i s. squammæ aris  
 quod stomoma dicitur  $\mathfrak{z}$  i. gummi  $\mathfrak{z}$  i i i.  
 adicitur aqua pluvialis. Atque hic Ianus  
 Cornarius commentariis suis in librum pri-  
 mum De compositione medicamentorum lo-  
 calium squammæ ferri legendum existi-  
 mat; quamquam Celsus noster, atque eundem  
 sequitur Plinius pro stomomate aris squam-  
 mam reddiderint: Est enim stomoma, in-  
 quit, ferri perpurgamentum, & ad acies  
 confirmatum. Ponitur tamen à Dioscoride  
 inter medicamenta: verum ab aris squamma  
 distinguit, ut patet legenti Dioscoridem capi-  
 tibus XLIX. & L. libri quinti. Andreas  
 Matthiolus nec aris, nec ferri squammam  
 esse contendit, commentariis suis in Diosco-  
 ridem, sed chalybis tantum purissimi, &

ad acies confirmati; auctoritate Galeni du-  
 ctus, qui scribat aris squammam principem  
 locum in desiccando inter ceteras obtinere,  
 ferri verò maiore astringendi vi, quam hæc  
 pollere, & hac etiam maiore stomomati:  
 ad hæc quod Galenus dicat, aliq̃ esse squam-  
 mam aris, aliam ferri, aliam stomomati.  
 Docet porro stomomati conficiendi rationem  
 Aristoteles libro quarto Meteororum in hunc  
 modum: *Τὴν περὶ δὲ καὶ ὁ θερμαίνοντος  
 σιδῆρος, ὅς ἐστι ὑγρὸς γίνεσθαι, καὶ πάλιν  
 πύρρον εἶναι. καὶ τὰ στομάματα ποιοῦσι οὕ-  
 τως ὑφίσταται καὶ, καὶ ἀποκαθαίρεται κατὰ  
 τὴν φύσιν. ὅταν δὲ ποικίλῃς πᾶν, καὶ κα-  
 ταρρῇ γίνεσθαι, τοῦτο στομάμα γίνεσθαι.*  
 quod sic Latine reddas: Sed & ferrum ela-  
 boratum liquefit, ita vi fluxum reddatur,  
 & rursum concrestat: atque in hunc mo-  
 dum faciunt stomomata; siquidem scoria in  
 fundum subsidet, & defecatur ferrum: quum  
 verò id sæpè factum est & purum evasit,  
 stomoma efficitur.

Theodoti



*Theodoti collyrium, Acharistum appellatum.*

**A**T ipsius Theodoti, quod à quibusdam ἀχάριστον nominatur, eiusmodi est. Castorei, nardi indici, singulorum p. i. \*. lycij \* p. \*. papaueris lacrymæ tantundem, myrrhæ p. ii. \*. croci, cerussæ elotæ, aloës, singulorum p. iii. \*. cadmiæ botryodiselotæ, æris combusti, singulorum p. viii. \*. gummi \* p. viii. \*. acaciæ succi p. xx. \*. \* stibis tantundem, quibus aqua pluuialis adiicitur.

\* p. ii.

\* p. viii.

\* stibis

## ENARRATIO.

**A**ETIUS libro quarto sermone primo capite cix. ἀχάριστον dictum putat, quod digna illi gratia referri nequeat: ipsum tamen vocabuli etymon ingratitudinē quamdam pra se ferre videtur. Ceterum descri-

buntur à Galeno diuersa collyria acharista: quæ etsi cum hac Theodoti descriptione parum conveniant, tamen quod ad facultatem attinet, hoc non multo inferiora censenda sunt.

*Cythion vel Tephron collyrium.*

**P**RÆTER hæc ex frequentissimis collyriis est id, quod quidam Cythion, quidam à cinereo colore Tephron appellant, amyli, tragacanthæ, acaciæ succi, gummi, singulorum p. i. \*. papaueris lacrymæ p. ii. \*. cerussæ elotæ \* p. iii. \*. spumæ elotæ p. viii. Quæ æquē ex aqua pluuiali continentur.

\* p. viii.

spumæ elo

tæ p. iii.

*Euelpidis collyrium, Trygodes nominatum.*

**E**VELPIDES autem, qui ætate nostra maximus fuit ocellarius medicus, utebatur eo, quod ipse composuerat, Trygodes nominabat: Castorei p. ii. \*. lycij, nardi, papaueris lacrymæ, singulorum p. i. \*. croci, myrrhæ, aloës, singulorum p. iii. \*. æris combusti \* p. viii. \*. cadmiæ, & stibis, singulorum p. xii. \*. acaciæ succi p. xxvi. \*. gummi tantundem. Quo grauior verò quæque inflammatio est, eo magis leniri \* medicamentum debet, adiecto vel albo oui, vel muliebri lacte. At si neque medicus, neque medicamentum præsto est, sæpius vtrumlibet horum in oculis penicillo ad ipsum

\* p. viii.

\* medica-

mento



ipsum facto infusum, id malum lenis. Vbi verò aliquis releuatus est, iamque cursus pituitæ constitit, reliquias fortasse leniores futuras discutiunt balneum & vinum. Igitur lauari debet leuiter, antè ex oleo perficatus, diutiusque in cruribus & feminibus, multaue calida aqua fouere oculos, deinde per caput prius calida, tum egelida perfundi, à balneo cauere, ne quò frigore afflatuue lædatur: posthæc cibo paulo pleniore, quàm ex eorum dierum consuetudine, vtr: vitatis tamen omnibus pituitam extenuantibus. Vinum bibere lenè, subausterum, modicè vetus, neque effusè neque timidè, vt neque cruditas ex eo, & tamen somnus fiat, lenianturque intus latentia acria. Sed si quis in balneo sensit maiorem oculorum perturbationem quàm attulerat, quod incidere his solet, qui manente adhuc pituitæ cursu festinarunt, quamprimum discedere debet, nihil eo die vini assumere, cibi minus etiam quàm pridie. Deinde cum primum satis pituita substitit, iterum ad vsum balnei redire. Solet tamen euenire nonnunquam, siue tempestatum vicio, siue corporis, vt pluribus diebus neque dolor, neque inflammatio, & minimè pituitæ cursus finiatur. Quod vbi incidit, iamque ipsa vetustate res matura est, ab his eisdem auxilium petendum est, id est balneo ac vino. Hæc enim vt in recentibus malis aliena sunt, quia concitare ea possunt, & accendere, sic in veteribus, quæ nullis alijs auxilijs cesserunt, admodum efficacia esse consuerunt: videlicet hic quoque vt alibi, cum secunda vana fuerint, contrariis adiuuantibus. Sed antè tondèri ad cutem conuenit. Deinde in balneo aqua calida quamplurima caput atque oculos fouere, tum vtrumque penicillo detergere, & vngere caput irino vnguento: continereque in lectulo se, donec omnis calor qui conceptus est, finiatur, delinatque sudor, qui <sup>\*necessarius</sup> farid in capite collectus est. Tum ad idem cibi viniue genus veniendum est sic, vtr: poriones meracæ sint, obregendumque caput, & quiescendum. Sæpe enim post hæc trauis somnus, sæpe sudor, sæpealui deiectio pituitæ cursum finit. Si leuius malum est, quod aliquando sæpius fit, per plures dies idem fieri oportet, donec ex toto sanitas rekituatur. Si diebus eis-

bb

dem



dem alius nihil reddit, ducenda est, quo magis superiores partes leuentur. Nonnunquam autem ingens inflammatio tanto impetu erumpit, ut oculos sua sede propellat. *πρόωται* id, quoniam oculi prociidunt, Graeci appellant. His utique, si vires patiuntur, sanguinem mittere: si id fieri non potest, aliquid duci, longioremque in diem indici necessarium est. Opus autem lenissimis medicamentis est. Ideoque Cleonis collyrio, quidam, quod ex duobus antequam positum est, utuntur. Sed optimum est Nilei. Neque de ullo magis inter omnes auctores convenit.

## ENARRATIO.

Euelpides autem

iamque cursus pituitae.

**S**i prodera nonnihil iuniores, collyrium Scribonii, quod a colore *φαιός*, hoc est, fuscum seu subnigrum vocari dicit, effecerit: quod idem, et post eum Galenus, ac Aegineta ad epiphoras cum perseverantia tumoris recte applicari dicit. Trigonos autem vocari dicit, hoc est, faculentum, ab acacia, quae ingreditur: solum enim ea primum faculentum, aut *αγορά* nominare, qua multam in se acaciam recipiunt.

Eius videlicet, ut ex Scribonio loco iam citato liquet, quae ipso calore oculorum glutinosior visa fuerit, quod saepe sexto septimoque die accidere solet.

multaque calida aqua.

Etsi per se calida conveniat, viliorem tamen reddideris si fenugracum, aut meliorum eidem iocoveris.

Nilei collyrium omnium optimum.

**I**tem habet nardi Indici, papaveris lacrymae, singulorum p. i. \* gummi p. i. \*. croci p. ii. \*. foliorum rosae recentium p. iiii. \*. Quae vel aqua pluviatili, vel vino leni sabaustrero coguntur. Neque alienum est malicorium, vel scutellariam campanam ex vino coquere, deinde conterere, aut myrrham nigram cum rosae foliis miscere, aut hyoscyami folia, cum oui coram vitello, aut farinam cum acaciae succo, vel passo, aut mulso. Quibus si folia quoque papaveris adiciuntur, aliquanto valentiora sunt. Horum aliquo preparato, penicillo fouere oculos oportet, ex aqua calida expresso: in qua antequam mel myrti vel rosae folia decocta sint. Deinde ex illis aliquid imponi. Praeter haec ab occipitio incisa cute, cucurbitula admoveenda est. Quod si per haec restitutus oculus in sedem suam



suam non est, eodemque modo prolapsus permanet, scire oportet, lumen esse amissum. Deinde futurum, ut <sup>indure-</sup> inarescat <sup>icat</sup> is, aut in pus vertatur. Si suppuratio se ostendit, ab eo angulo qui propior tempore est, incidere oculus debet: ut, effuso pure, & inflammatio, ac dolor finiatur, & intus tunica residant, quo minus sœda postea facies sit. Utendum deinde vel iisdem collyriis est ex lacte, aut ovo, vel croco, cui album oui miscatur. Ac si induruit & sic emortuus est, ne in pus verteretur, quatenus sœdè prominebit, excidendum erit, sic ut hamo summa tunica apprehendatur: infra id deinde scalpellus incidat <sup>• tandem</sup> tantundem: medicamenta erunt coniicienda, donec <sup>• fissus</sup> omnis dolor finiatur. Iisdem medicamentis in eo quoque oculo utendum est, qui primum procidit, deinde per plura loca <sup>• fissus</sup> fissus est.

## ENARRATIO.

**G**ALENVS, & Aegineta non Nilum, sed Nilum vocant. utile esse dicunt ad doloris angustiam, fluxum vberum, ac tennem, pustulas, ac prolapsus; deser-

buntq; præter hoc, & aliud Nili collyrium quo usus est Galio ophthalmicus; parum tamen ab hac descriptione discrepat.

*De carbunculis oculorum, & eorum curatione.*

**S**OLENT etiam carbunculi ex inflammatione nasci, nonnunquam in ipsis oculis, nonnunquam in palpebris; & in ipsis oculis modò ab interiore, modò ab exteriori. In hoc casu alius ducenda est, cibus minuendus, lac potui dandum, ut acria quæ læserunt, leniantur. Quod ad cataplasmata & medicamenta pertinet, his utendum, quæ aduersus inflammationes proposita sunt. Atque hic quoque Nilei collyrium optimum est: si tamen carbunculus in exteriori palpebræ parte est, ad cataplasmata aptissimum est lini semen ex mulso coctum: aut, si id non est, tritici farina eodem modo cocta.

## ENARRATIO.

**C**ARBUNCULI, ut auctor est Aëtius, oculorum ruborem ab initio habent, <sup>•</sup> verò aut eminentiam non statim inducunt: nam ob immodicam caliditatem velut ru-

adde ut oculum sibi perire putent, immo etiam

proutem quandam carbunculus sustinet, &

bb 2

quod



quod effluit ab ipso quum sit acre ac mordax, superficiem quidem carbunculi ressecat, & crustam inducit, vicinis vero locis morbum infert; & qui in palpebris carbunculi oriuntur, facilius certe quam qui in oculis consistunt, curantur; siquidem hos curationem vix admittere auctor est Ægineta; & Aëtius perfecte sanari posse negat.

In hoc casu aluus.

Si corpus plethoricum sit, etiam vena tundenda est.

lac porui dandum.

Si C. Paulus, Dolor, inquit, leniri debet lactis potione, item cibis frumentaceis,

& alioqui boni succi, & omni acrimonia vacuis: cauendum tamen est ne aut febricit egrotus, aut imbecillo ventriculo præditus sit: nam hic nihil alienius esset quam lactis usus, ut quod biliscentis facillime aut acefcens morbo novam materiam suppeditaret: nam hac de causa Hippocrates, lac dare capne dolenti & febricitanti venit.

Quod ad cataplasmata.

CAVENDUM est ne frigefacientia cataplasmata applicemus, quod hac carbunculis admota, in oculum propellunt quod a carbunculo defluit; unde non raro non minus periculi immineret quam ab ipso carbunculo.

*De pustulis oculorum & curatione earum.*

**P**USTULÆ quoque ex inflammationibus interdum oriuntur. Quod si inter initia protinus incidit, magis etiam seruanda sunt, quæ de sanguine, & quiete supra posui. Sin serius, quam ut sanguis mitti possit, aluus tamen ducenda est. Si id quoque aliqua res inhibet, utique victus ratio seruanda est. Medicamentis autem hic quoque lenibus opus est, quale Nilei, quale Cleonis est.

#### ENARRATIO.

**P**USTULÆ, ut inquit Paulus, excrecentie, quedam sunt corniformis membrana, orta ex humore quopiam subexcoriante ipsius compagem; Græci φλύκταινες, Arabes vesicas nominant; Aëtius & in albo & in palpebris, & plarunq; circa corniformem membranam fieri dicit, atque ex superficie tantum aliquando occupare, quæ curari faciles sunt; nonnunquam etiam in profundo quodammodo delitescere, quæ ut

difficilius curantur, ita non raro (ut paulo post etiam infert Celsus) exulcerantur, & inducta tandem cicatrice visum si non plane abolent, certe admodum debilitant.

alius tamen ducenda.

VEHEMENTES tamen purgationes, atque et potissimum quæ stomachum subvertunt, evitanda sunt: quare commodissimum erit aut picta, aut aliquo simili docere aluum.

\* *Philetis collyrium, ad pustulas oculorum.*

\* φιλαι-  
θός  
\* Phila-  
lethos

**I**D quoque, quod \* Philetis vocatur, huic aptum est, Myrrha, papaveris lacrymæ, singulorum p. i. \* plumbi eloti, terræ samia, quæ ασηρ vocatur, tragacanthæ, singulorum

P. IIII.



P. IIII. \* sſibis cocti, amyli, ſingulorum P. XVI. \*. ſpodij eloti, \* ſſibij ceruſſæ elotæ, ſingulorum P. VIII. \*. Quæ aqua pluuiali excipiuntur. Vſus collyrij, vel ex ovo, vel ex lacte eſt.

## ENARRATIO.

terræ ſamiz.

SCRIBONIVS Largus etiam ſamiam dicere maluit.

*De vlceribus oculorum, & eorum curatione,  
& de δια\* βαλάνη collyrio.*

\* δια βαλάνη

EX puſtulis vlcera interdum ſunt, eaque recentia æquè lenibus medicamentis nutrienda ſunt, & iſdem fere quæ ſuprà in puſtulis poſui. Fit quoque propriè ad hæc quod δια\* βαλάνη vocatur. Habet æris combuſti & eloti, papaueris lacrymæ frictæ, ſingulorum P. I. \*. ſpodij eloti, turis, \* ſſibis combuſti, & eloti, myrrhæ, gummi, ſingulorum P. II.

\* ſſibij

## ENARRATIO.

eaque recentia.

Id quidem verum eſt, ſi in ſuperficie oculi exulceratio conſiſtat: verum ſi in profundum dehiſcat, non ita facilè, etiam in ipſo principio, curari poteſt; periculum enim eſt, ne acrimonia ſua humores, atque adeo oculum ipſum corrodat atque exulceret.

*Curatio oculorum aliquo caſu imminutorum.*

VENIT etiam, vt oculi vel ambo, vel ſinguli, minores fiant, quàm eſſe naturaliter debeant. Id quæ & acer pituitæ curſus in lippitudine efficit, & continuati fletus, & ictus parum bene curati. In his quoque iſdem lenibus medicamentis ex muliebri lacte vtendum eſt: Cibi verò his qui maxime corpus alere, & implere conſueverunt. Vitandaque omni modo cauſa, quæ lacrymas excitet, curaque domeſticorum, quorum etiam, ſi quid tale incidit, eius notiæ ſubtrahendum: atque acria quoque medicamenta, & acres cibi non, alio magis nomine his nocent, quàm quòd lacrymas mouent.

bb. 3

ENARR-



## ENARRATIO.

**P**HTHISIS, & atrophian oculi sic distinguunt Græci, ut phibisis oculi affectus sit, quo pupilla angustior, obscurior, rugosiorque reddatur, res visui obiectæ maiores appareant: Imminutus autem, aut macer oculus (Græci ἀτρεφίας, Atricennas profunditatem oculi nominat) vel omnino alimentum sentire non dicitur, quum ex vehementi capitis dolore aut in febribus acutis paulatim humiliatur, vel canatur, aut in

etiam minor sit, & aliquando obscurior, & visum impedit: differt tamen à tæbe vel phthisi, quod tæbes solam pupillam, atrophia totum oculum occupet.

Idque & acer pituitæ cursus.

SOLET etiam cephalalgias, & reliquas capitis infirmitates subsequi, ut iam dictum est.

## De pediculis palpebrarum.

\* quo  
al. cum

**G**ENVS quoque vitij est, \* qui inter pilos palpebrarum pediculi nascuntur. Id φθειράς Græci nominant. Quod cum ex malo corporis habitu fiat, raro non ultra procedit. Sed fere tempore interposito, pituitæ cursus acerrimus sequitur, exulceratisque vehementer oculis, aciem quoque ipsam corrumpit. His alius ducenda, caput ad cutem tendendum, diuque quotidie ieiunis perfricandum. His, ambulationibus, aliisque exercitationibus diligenter utendum, gargarizandumque ex mulso, in quo nepeta & pinguis ficus decocta sit: sæpe in balneo multa calida aqua fouendum caput. Vitandi acres cibi, lacte vinoque pingui utendum, bibendumque liberalius quam edendum est. Medicamenta verò intrus quidem lenia danda sunt, \* ne acriorem pituitam concitent. Super ipsos verò pediculos alia, quæ necare eos & prohibere ne similes nascantur, possint. Ad id ipsum spumæ nitri p. i. \*. sandaracæ p. i. \*. vuae taminia p. \*. i. simul teruntur, adiiciturque vetus oleum pari portione, atque acetum, donec ei mellis crassitudo sit.

\* alias  
ne acio-  
res pitui-  
tæ concit-  
entur.  
al. ne quid  
acrioris pi-  
tuitæ cōc.

\* diu rige-  
re.

\* curantur

De oculorum grauioribus morbis, qui ex inflammationibus oriuntur, & validioribus medicamentis curantur, & de Andree collyrio, & de \* diacerato.

**H**ACTENVS oculorum morbi lenibus medicamentis nutriuntur. Genera deinde alia sunt, quæ diuersam curatio-



curacionem desiderant, foreque ex inflammationibus nata sunt, sed finitis quoque his manentia. Atque in primis in quibusdam perseverat tenuis pituitæ cursus, quibus alius ab inferiore parte euocanda est, demendum aliquid ex cibo. Neque alienum est illi frontem compositione Andrea, quæ habet gummi p. i. \*. cerussæ, stibis, singulorum p. ii. \*. spumæ argenti & coctæ, & elotæ p. iiii. \*. Sed & ea spuma ex aqua pluuiali coquitur, & arida hæc medicamenta ex succo myrti conteruntur. His illita fronte cataplasma quoque super iniiciendum ex farina, quæ frigida aqua coacta sit, cuique aut acaciæ succus, aut eupressus adiecta sit. Cucurbitula quoque, inciso vertice, rectè accommodatur, aut ex temporibus sanguis emittitur. Inungi verò eo debet quod habet squamæ aris, papaueris lacrymæ, singulorum p. \*. ceruini cornu combusti & eloti, plumbi eloti, gummi, singulorum p. iiii. \*. thuris p. xii. \*. Hoc collyrium quia cornu habet, *ὀξέγατο*, nominatur. Quotiescunque non adiicio quod genus humoris adiciendum sit, aquam intelligi volo.

## ENARRATIO.

## Atque imprimis.

**E**PIPHORAM intelligit, quamquam latius quodammodo epiphora nomen patere videatur, ut quod omnem humiditatem delationem ad oculos, siue per angulos siue per totum oculum fiat, denotet. Est autem epiphoris non raro comites inflammatio, interdum etiam citra eandem oriuntur, & desinunt: est & quando longas oculorum inflammationes subsequantur: de quibus hic mentionem facere videtur Celsus.

## Cucurbitula quoque.

UT videlicet imperiū stitoris reuellamus.

## Hoc collyrium.

**ALIVD** ab hoc diaceros collyrium describit Galenus quod recipit plumbi combusti, cornu ceruini cremati, singulorum  $\frac{3}{4}$  i. cerussæ, squamæ aris, amyli, thuris, sepiæ, resæ combustæ, aruginis, myrrhæ, gummi, singulorum uncia; aqua pluuiatili excipiuntur. Aërius (sicut etiam Galenus) varia ex cornu ceruino collyria describit.

*Memigmenon, Euclidis collyrium.*

**A**D idem Euclidis, quod *μεμυγμένον* nominabat. In eo papaueris lacrymæ, & albi piperis, singulæ vnciæ sunt, gummi libra, aris combusti p. i. \*. Inter has autem curaciones, post intermissione aliquam prosunt balneum & vinum. Cumque:



Cumque omnibus lippientibus vitandi cibi sunt, qui extenuant, tum præcipue quibus tenuis humor diu fertur. Quod si iam fastidium est eorum, quæ pituitam crassiorem reddunt, sicut in hoc genere materiæ maximè promptum est, confugiendum est ad ea, quæ quia ventrem, corpus quoque astringunt.

*De oculorum ulceribus supercrescentibus, sordidis, cauis, veteribus, & curationibus singulorum.*

**A**T vlcera si cum inflammatione finita non sunt, aut supercrescentia, aut sordida, aut caua, aut certè vetera esse confuerunt. Ex his supercrescentia collyrio, quod Memigmenon vocatur, optimè reprimuntur. Sordida purgantur & eodem, & eo quod Smilion nominatur.

#### ENARRATIO.

At vlcera si cum.

**I**N vlceribus quæ cicatrice indigent, cauendum est ne supercrescentia aliqua sit, aut caro ipsa abundet, quod videlicet superuenientes cicatrices visum impediunt, & dum ex palpebris punguntur, flexionem afferant. Porro interdum afficiuntur typica agnata, interim corniformis, aut angulorum

aliquis seu palpebra ea affectione laborat. Nosse autem oportet quod vlcus vel vulnus corniformis tunica periculosum sit, quam reliquarum partium oculi, & si ea pars ipsius quæ pupilla obiecta est, fuerit ulcerata, si vulnus ad interiora descendit, magna ex parte calidius affecti obiacantur, teste Galeno.

*Smilion collyrium.*

**H**ABET aruginis p. iiii. \*. gummi tantundem, ammoniaci, minij tinopici, singulorum p. xvi. \*. Quæ quidam ex aqua, quidam, quo vehementiora sunt, ex aceto terunt.

*Phynon collyrium Euelpidis.*

\* Alias  
Pyrrhon,  
vel Pyrrhona.

\* fingendū

**I**D quoque Euelpidis, quod \* Phynona appellabat, huic vtile est: Croci p. i. \*. papaueris lacrymæ, gummi, singulorum p. ii. \*. aris combusti & eloti, myrrhæ, singulorum p. iiii. \*. piperis albi p. vi. \*. Sed antelinitum hoc \* vngendum est.

*Spherion*



*Sphæriorum collyrium Euelpidis.*

**I**D quoque eiusdem, quod Sphæriorum nominabat, \* eodem \* in cod. valet. Lapidis hamatilis cloti p.ii. \*. piperis grana sex, cadmiæ clotæ, myrrhæ, papaveris lacrymæ, singulorum p.iii. \*. croci p.iiii. \* gummi p.viii. \*. Quæ cum vino aminco conteruntur.

## ENARRATIO.

**G**ALENVS alind orbiculare, sphæriorum dictum, ad Triphonem relatum. *collyrium describit, ab hoc nonnihil diversum.*

*Liquidum Euelpidis collyrium.*

**L**IQUIDVM quoque medicamentum ad idem componebat, in quo erant hæc, æruginis p. \*. \* minij combusti, \* misy atramenti futorij, cinnamomi, singulorum p.iii. \*. croci, nardi, papaveris lacrymæ, singulorum p.i. \*. myrrhæ p.ii. \*. æris combusti p.iii. \*. cinetis ex \* odoribus p.iiii. \*. piperis \* oleribus, grana \* xv. Hæc ex vino austero teruntur: deinde cum passibus tribus heminis decoquuntur, donec corpus vnum sit. Idque \* v. medicamentum vetustate efficacius fit.

## ENARRATIO.

minij combusti.

**M**INIVM intelligi potest de cinnabari, quæ catachresticis atque abusivè, minium etiam appellatur: potest nihilominus sinopicum minium intelligi, cuius in Smilio collyrio superius facta est mentio.

Nam minium Hispanicum hic nequaquam opportunum est; quippe venenum, ut sunt Plinius & Dioscorides abundè testes idonei: quauquam Strabo Hispanicum sinopicam terram non esse deterius existimat. Hæc Pantinus. Quid verò per cineres ex odoribus intelligat, nunc ignorare ingenuè confiteor.

*De causis oculorum ulceribus, & curationibus.*

**C**AUVA verò ulcera commodissimè implent ex his quæ supra posita sunt, Sphæriorum, & id quod \* Philetis vocatur. \* aliàs, Philalethis, φιλᾶθῆς. Idem Sphæriorum vetustis ulceribus, & vix ad cicatricem venientibus optimè succurrit.

CC

Hermo-



*Hermonis collyrium.*

**E**st etiam collyrium, quod cum ad plura valeat, plurimum tamen proficere in his vlceribus videtur. Refertur ad Hermonem auctorem: habet piperis longi p. 13. \*. albi p. \*. cinnamomi, costi, singulorum p. 1. \*. atramenti sutorij, nardi, casia, castorei, singulorum p. 11. \*. gallae p. v. \*. myrrhae, croci, thuris, lycij, ceruillae, singulorum p. viii. \*. papaueris lacrymae p. xii. \*. aloes, æris combusti, cadmia, singulorum p. xvi. \*. acaciae, stibis, gummi, sing. p. xxv. \*.

## ENARRATIO.

Est etiam collyrium.

**C**OLLYRIUM hoc ad multa utile est, & vnum multorum loco esse potest; siquidem caua vlcera explanat, cicatrices quodammodo inconspicuas reddit, pustulas sanat, oculum perturbatum conseruat, &

ut uno verbo omnia dicam, ad omnes desperatas affectiones conueniens est. Describitur tamen aliud ab Aetio ad Hadrianum Imperatorem relatum collyrium, huic non omnino dissimile: verum hoc nonnihil oporoscus est, & non minoris efficacia censendum est.

*De cicatricibus oculorum, quae ex vlceribus factae sunt, & quomodo curari debeant, & de Asclepias, & Canopite & Pyxino, collyriis.*

**F**ACTAE verò ex vlceribus cicatrices, duobus vitiis periclitantur, ne aut cauae, aut crassae sint. Si cauae sunt, potest eas implere, id quod spharion vocari dixi, vel id quod Asclepias nominatur. Habet papaueris lacrymae p. 11. \*. sagapeni, opopanax, singulorum p. 111. \*. aruginis p. 1111. \*. cumini p. viii. \*. piperis p. xii. \*. cadmia elotae, cerussae, singulorum p. xvi. \*. At si crassae cicatrices sunt, extenuat vel Smilion, vel Canopite collyrium, quod habet cinnamomi, acaciae, singulorum p. 1. \*. cadmia elotae, croci, myrrhae, papaueris lacrymae, gummi, singulorum p. 11. \*. piperis albi, thuris, singulorum p. 111. \*. æris combusti p. ix. \*. cum aqua pluuiatili. Vel Euelpidis Pyximum, quod ex his constat: Salis fossilis p. 1111. \*. ammoniaci, thymianatis p. viii. \*. papaueris lacrymae p. xii. \*. cerussae p. xv. \*. piperis albi, croci ficuli,



ficuli, \*singulorum P.LII.\*. gummi P.XIII.\*. cadmiæ clotæ \*alijs  
P.IX.\*. Maximè tollere cicatricem videtur, id quod habet <sup>singulorū</sup>  
gummi P.III.\*. æruginis P.I.\*. crocomagmatis P.III.\*. <sup>xxx1.</sup>

## ENARRATIO.

**C**AVÆ ex ulceribus cicatrices accu-  
ratè admodum diligenterque tractan-  
de sunt, quòd videlicet periculum sit, ne  
dum eas implere studeamus, crassam quan-  
dam pelliculam procreemus, quæ visum im-  
pediat. Et rursus crassas cicatrices atque  
callosas, quæ diuturnæ fuerunt, velle cu-  
rare, est operam perdere, quòd maius pericu-  
lum sit ex acrimonia collyriorum quibus ci-  
catrices exterere nitimur, quàm emolumenti  
ex cicatricis imminutione expectandum sit:

exulcerantur enim faciliè vicinæ oculi par-  
tes. Videndum etiam est num una cum  
leucomate, vel cicatrice coniuncta sit, aut  
glaucofis aut suffusio: siquidem si harum  
alterutra affuerit, frustra cicatrices abster-  
sevimus. Ceterū abstergentia talia esse oportet,  
quæ morsus aut erosionis serè experta  
in totum sint, ex etenim oculis maximè con-  
uenient: inter quæ primas faciliè obinet lac  
equæ cum modico melle assidue illitum.

*De alio genere inflammationis oculorum.*

**E**ST etiam genus inflammationis, in qua si cui tument ac  
distendantur cum dolore oculi, sanguinem ex fronte  
emitti necessarium, multaquæ aqua calida caput atque oculos  
fouere, \*gargarizari ex lenticula, vel ex fici cremore, inungi  
acribus medicamentis, quæ suprà comprehensa sunt, maxi-  
mequæ eo quod Sphæriorum nominatur, quod lapidem hæma-  
titen habet. Atque alia quoque vtilia sunt, quæ ad extenuan-  
dam aspritudinem fiunt, de qua protinus dicam. Hanc au-  
tem \*inflammatio oculorum fere sequitur, interdum maior, \*inflatio  
interdum leuior, nonnunquam etiam ex aspritudine lippitu-  
do fit, deinde aspritudinem ipsam auget, fitquæ ea in aliis bre-  
uis, in aliis longa, & quæ vix vnquam finiatur. In hoc genere  
valerudinis quidam crassas durasque palpebras, & ficulneo  
folio & asperato specillo, & interdum scalpello eradunt, ver-  
sasque quotidie medicamentis suffricant. Quæ neque nisi  
in magna vetustaquæ aspritudine, neque sæpe faciendæ sunt.  
Nam melius eodem ratione victus & idoneis medicamentis  
peruenitur. Ergo exercitationibus utemur, & balneo fre-  
quentiore, multaquæ oculorum palpebras aqua calida foue-  
bimus. Cibos autem sumemus acres, & extenuantes.



## ENARRATIO.

**A**N hac sit genuina Celsi lectio, vehementer ambigo; præsertim quando verisimile sit Cornelium nostrum non fuisse adeo recordem aut sui immemorem, ut nomen hoc genus inflammationis, inflammationem oculorum ferè subsequi dixerit: quo fit ut nisi quid obsteret, loco inflammationis, et inflammationis restituendū censē, idq; tam in titulo quā in principio paragraphi legendūq; Est etiam aliud genus inflammationis. Inflari autē oculum dicūt, quoties absque manifesta causa iurgens oculus, pituita redundantior est, & admodum cum influxu pruritis.

inungi acribus medicamentis.

VEL hinc conicere licet, non esse ei sermonem de inflammationibus, quin acria omnia inflammationem non solum non compescerent, sed eidem fomitem quandam subministrarent, conceptamque iam auferent; inflationi cōtrā, ut quæ ex pituita originem habeat, optimè medeantur. Oportet tamen non immodicè acria, neque calida quæ adhibentur, esse, sed leuiter tantum calida, habereque astrictionem quandam admixtam.

*Cæsarianum collyrium.*

**A**T medicamentum id quod Cæsarianum vocatur, habet atramenti sutorij p. i. \*. misyos p. \*. piperis albi p. v. \*. papaueris lacrymæ, gummi, singulorum p. ii. \*. cadmiæ cloræ p. iii. \*. stibis p. vi. \*. Satisq; constat, hoc collyrium aduersus omne genus oculorum valetudinis idoneum esse, exceptis his quæ lenibus\* nutriuntur.

\* Alias curantur.

## ENARRATIO.

SI opobalsamum, æruginem rasam, & crocum addas, stasticum Prosechij reddideris.

*Hieracis collyrium.*

**I**N quoque quod Hieracis nominatur, ad aspritudinem potest: Habet myrrhæ p. i. \*. ammoniaci thymiamatis p. ii. \*. æruginis rasæ p. iii. \*. cum aqua pluuiatili. Ad idem idoneum est etiam id quod \* Canopite est, & id quod Smilion vocatur, & id quod Pyxinum, & id quod Sphæron. Si composita medicamenta non adsunt, felle caprino, vel quàm optimo melle satis commodè aspritudo curatur.

\* Canopite

## ENARRATIO.

**E**XTAT apud Galenum quoddam collyrium ad obliquum visum, & scabram affectiones quod hieracinum appellat, nihil enim hoc commune habens.

De Xe-



*De Xerophthalmia, genere aride lippitudinis.*

**E**ST etiam genus aride lippitudinis, *Ξεροφθαλμία* Græci appellant: neque tument, neque fluunt oculi, sed rubent tantum, & cum dolore quodam \* grauescunt, & noctu prægravi pituita inalescunt: quantoque \* minor generis huius impetus, tanto finis minus expeditus est. In hoc vitio multum ambulare, multum exerceri, lauari sæpe, ibique desudare, multaque frictione vti necessarium est. Cibi neque qui impleant, neque nimium acres apti sunt, sed inter hos medij. Manè vbi concoxisse manifestum est, non alienum est ex sinapi gargarizare, tum deinde caput atque os diutius \* perfricare.

\* fere leui,  
& pruriginose grauescunt & palpebræ citra duri-  
tiem vltimam noctu prægravi pituita inhaerescunt.  
\* maior  
\* aliàs  
deficere.

## ENARRATIO.

**L**IPPITUDO sicca est, quoties subaridus factus fuerit oculus, & pruriginosus, & leuiter dolens citra duriem palpebrarum, Græci *Ξεροφθαλμία* vocant. Curationem huius non negligere oportet, quod, si inueterauerit, suffusionis, ulcerationis ac staphylomatum causa sit.

*Rhinion collyrium.*

**C**OLLYRIUM verò aptissimum est, quod Rhinion vocatur. Habet myrrhæ p. i. \*. papaueris lacrymæ, acaciæ succi, piperis, gummi, singulorum p. i. \*. lapidis hæmatitis, lapidis phrygi, lycij, lapidis scissilis, singulorum p. ii. \*. æris combusti p. iiii. \*. Ac pyxinum quoque eodem accommodatum est.

## ENARRATIO.

**E**ST apud Galenum Phædro ascriptum aliud collyrium quod rhinema inscribitur; Rhinion collyrium; est & apud eundem neutrum tamen cum hoc convenit.

*Ad oculos scabros, collyria.*

**S**I verò scabri oculi sunt, quod maximè in angulis esse consuevit, potest prodesse Rhinion id quod suprà positum est: potest similiter prodesse id quod habet æruginis rasæ, piperis longi, papaueris lacrymæ, singulorum p. \*. ii. piperis albi, gummi, singulorum p. \*. iiii. cadmiæ elotæ, cerussæ, singulo-

cc 3

singulo-



\* Asij,

\* lachrymæ  
descriptæ, quæ  
eadem fere &  
à Dioscoride  
tradiuntur.

\* inditum

\* leuibus

\* leuant

\* exasperet,

singulorum p. vi. \*. Nullum tamen melius est quàm Euelpidis, quod Basilicon nominabat. Habet papaueris lacrymæ, cerussæ, lapidis \* Asij, singulorum p. ii. \*. gummi p. xiii. \*. piperis albi p. iiii. \*. croci p. vi. \*. pserici p. xiii. \*. Nulla autem per se materia est, quæ Psoricon nominetur, sed chalcitidis aliquid, & cadmiæ dimidio plus ex aceto simul contendantur, idque in vas fictile \* additum, & contactum siculneis foliis sub terra reponitur, sublaturumque post dies viginti rursus teritur, & sic appellatur. Verum in basilico quoque collyrio conuenit, ad omnes affectus oculorum id esse idoneum, qui non \* lenibus medicamentis curantur. Vbi non sunt autem medicamenta composita, scabros angulos \* leuant & mel & vinum. Succurritque & his, & aridæ lippitudini, si quis panem ex vino subactum super oculum imponit. Nam cum fere sit humor aliquis, qui modò ipsum oculum, modò angulos, aut palpebras \* exasperat, sic, & si quid prodit humoris, extrahitur, & si quid iuxta est, repellitur.

## ENARRATIO.

**A**ETIVS lippitudinē scabrā appellat: ortum habet ex humorum acrimonia quæ angulos oculorum erodat atque exulceret, ac lachrymam salfam, & nitrosam stillat. His duobus affectibus congener fere is morbus est quem sclerophthalmiam vocant: est autem oculorum duricies, quoties dura fieri cilia contigerit, aut ipsum oculum duriores & difficulter mobilem, intus ruberem, & humorem nullum fundentem; eius curatio fere eadem est quæ xerophthalmia: nam quæ humiditate quodammodo eliciunt atque secerunt, eidem optime medentur.

Nullum tamen melius.

Si asium lapidem dempseris, collyrium

Ad Caligationem oculorum, quæ propter lippitudinem  
oritur, remedia & collyria.

**C**ALIGARE verò oculi nonnunquam ex lippitudine, nonnunquam etiam sine hac propter senectutem, imbecilli-

psoricum Scribonij ad xerophthalmiam effeceris; commiscetur autem aqua pluviali.

Nulla autem per se.

**D**IOSCORIDES chalcitidos partes duas accipit, cadmiæ unam tantummodo, & ex aceto conterit: Galenus autem de psorico sic scribit. Conficitur hoc medicamentum dupla chalcitide admixta lithargyro, arte tamen utrisque ex aceto acerrimo solutis, sicque in nonam ollam coniectis: nam simoestate mediâ diebus quadraginta obrutum sepelies.



cilitatē inue aliam confuerunt. Si ex reliquiis lippitudinis id vitium est, adiuuat collyrium quod Asclepias nominatur. Adiuuat \* id quod ex crocomagmate fit.

\* &amp; id

## ENARRATIO.

**C**ALIGO interim confectum inuadere, modo etiam seipsum se infundere solet, quæ paulatim visum impedit atque laesat: varias subsequitur causas; at quæ confectum irruit, originem suam tribuere solet ueruo optico; crassum & glutinosum humo-

ribus infarcto, aut eodem resolutionem patiente.

Si ex reliquiis.

**NAM** aliqui ante localia dicta remedia, opus esset uenæ sectione, cucurbitularum medicamentum applicatione, aut alui purgatione.

Διά κρόκου collyrium.

**P**ROPRIE etiam ad id componitur, quod *διά κρόκου* vocant: habet piperis p. i. \*. croci \* cilicis, papaueris lacrymæ, \* cilicij, cerussæ, singulorum p. ii. \*. pforici, gummi, singulorum <sup>al. ficulij,</sup> p. iiii. \*.

## ENARRATIO.

**D**IVERSVM planè ab isto *διά κρόκου* collyrio describit Alexander Trallianus libro primo ulceribus uetustis & ma-

lignis accommodum, & quod ingentes cicatrices exierat. Egineta ab utroque diuersum habet.

*Ad caligationem oculorum, quæ propter senectutem, aut aliam imbecillitatem fit.*

**A**T si ex senectute, aliave imbecillitate id est, rectè inungi potest, & melle quàm optimo, & cyprino, & oleo uetere. Commodissimum tamen est, balsami partem vnam, & olei veteris, aut cyprini partes duas, mellis quàm acerrimi partes tres miscere. Utilia quoque huic medicamenta sunt, quæ ad caliginem proximè, quæque ad extenuandas cicatrices supra comprehensa sunt. Cuicumque verò oculi caligabunt, huic opus erit multa ambulatione atque exercitatione, frequenti balneo, ubi totum quidem corpus perfricandum est, præcipuè tamen caput, & quidem irino, donec infudet, velandumque postea, nec detegendum antequam sudor & calor domi conquierint. Tum cibis utendum acribus, & extenuantibus, interpositisque aliquibus diebus, ex sinapi gargarizandum.

ENARR-



## ENARRATIO.

huic opus erit. *lationes utiles sunt: quin & infernarum  
IN umbrosis potissimum locis deambu- partium exercitio vitendum docet Aëlius.*

*De suffusione oculorum.*

*\*pituita,* **S**UFFUSIO quoque (quam Græci *ὑπόχρωσις* nominant) interdum oculi *\*potentia*, qua cernit, se opponit. Quod si inueterauerit, manu curandum est. Inter initia nonnunquam etiam certis observationibus discutitur. Sanguinem ex fronte vel naribus mittere, in temporibus venas adurere, gargarizando pituitam euocare, suffumigare oculos acribus medicamentis, inungere expedit. Viæctus optimus est, qui pituitam extenuat.

## ENARRATIO.

**H**YPOCHYMA seu hypochysis, quam suffusi nem dicunt Latini, est, ut ait Aëlius, humorum præterfusio, circa pupillam congelatorum, ut ubi perfecta fuerit, visum impedit. Paulus glaucoma & hypochyma pro vno eodemque morbi genere apud veteres usurpatum fuisse auctor est: differunt tamen quod glaucoma sit mutatio crystallini humoris in glaucum colorem; hypochyma verò, ut iam dictum est, humorum sit suffusio, inter vneam ac crystallum, den tunicam conuulgentium. Ac glaucomata qui- dem omnia curationem non recipiunt: suffusiones verò recipiunt, sed non omnes.

*Sanguinem ex fronte.*

CELSVS per omnia sibi similis in ocularibus morbis semper ex vena frontis sanguinem mittit. Galenus tamen, & quotquot sunt Græci primum cubiti venam incidunt, ac deinde cucurbitulas occipitis eius scarificatione effigunt; deinde aut frontis venam aperiunt, aut vnam earum quæ in canthis oculorum delitecent.

*De resolutione oculorum, quæ Paralysis dicitur.*

**A**c ne resolutio quidem oculorū, quam *παράλυσις* Græci nominant, alio viæctus modo, vel aliis medicamentis curanda est. Exposuisse tantum genus vitij satis est. Igitur interdum euenit, modò in altero oculo, modò in utroque, aut ex ictu aliquo, aut ex morbo comitiali, aut ex distentione nervorum, qua vehementer oculus ipse concussus est, ut his neque quoquam intendi possit, nec omnino consistat: sed huc illucve sine ratione moueatur, ideoque ne conspectum quidem rerum præster.

ENAR-



## ENARRATIO.

**T**OTIVS oculi paralyfis difficilem admodum curationem admittit; atque ea potissimum quæ nam grandioribus accidit: quod si una cum oculi nostri principis innadat, prognosticū relinquenda est. Est tamen ubi circa solam palpebram fiat resolutio, ac tunc quidem oculus semper conclu-

sus est, & palpebra non sentit; si oculus paralyticus sit, motus ad dextram & sinistram efficere non potest, quemadmodum nec sursum, nec deorsum, frequentissime apoplexin, ac distentionem corporis comitatur, quandoque & priuatim sepe innadat.

## De Mydriasi oculorum.

**N**ON multum ab hoc malo distat id, quod *μυδρίασις* Græci vocant. Pupilla effunditur & dilatatur, aciesque eius hebescit\*: ac penè difficillimè genus id imbecillitatis eliditur. In utraque verò, id est, & paralyfi, & mydriasi, pugnandum est per eadem omnia, quæ in caligine oculorum præcepta sunt, paucis tantum mutatis: siquidem ad caput irino interdum acetum, interdum nitrum adiiciendum est\*, melle inungi satis est. Quidam in posteriore vitio calidis aquis vti relictisque. Quidam sine vlla manifesta causa subito obæcati sunt. Ex quibus nonnulli cum aliquandiu nihil vidissent, repentina profusione alui lumen receperunt. Quo minus alienum videtur, ex recenti re & interposito tempore medicamentis quoque moliri deiectiones, quæ omnem noxiam materiam in inferiora depellant.

\* ac p. o.  
ligatur.  
Diffic.

\* oculos  
verò mel-  
le

\* &

## ENARRATIO.

**M**YDRIASIM vel pupilla dilationem Aëtius valde agere curabilem dicit; quam enim membranosa sit uniusformis tunica; ubi semel distenta fuerit, induratur, neque facile amplius contrahi potest: scilicet autem morbus hic puerilem potissimum ætatem ob tunicarum imbecillitatem affligere.

## Ex quibus nonnulli.

Si res enim est si materia ad infernas partes decumbat atque propellatur, humorum illapsus qui acervatim ad oculos fiebat, aliò derivandum; ac sic tandem pulsa morbi causa, morbum ipsum & minorem & leniorem futurum.

## De imbecillitate oculorum.

**P**RÆTER hæc imbecillitas oculorum est, ex qua quidem interdum satis, noctu nihil cernunt, quod in foeminam

dd

bene



\* alijs,  
humore  
iocin al.  
saute

bene respondentibus menstruis non cadit. Sed sic laborantes inungi oportet \* sanguine iocinoris, maximè hircini, si minus, caprini, ubi id assum coquitur, excepto: atque edi quoque ipsum iecur debet. Licet tamen etiam iisdem medicamentis non inutiliter uti, quæ vel cicatrices, vel aspritudinem extenuant: quidam contrito semine portulacæ mel adiciunt, eatenus ne id ex specillo distiller, eoque inungunt. Exercitationibus, balneo, frictionibus, gargazationibus iisdem, his quoque utendum est.

## ENARRATIO.

**I**MBECILLES oculi dicuntur, qui neque album, neque lucidum, neque rufum spectare possunt, sed tali causa oblita illachrymare coguntur. Celsus: sub imbecillis oculis nyctalopes, quos lusciosos aut misticiosos vocant Latini, comprehendit: idque, quoniam distincte sunt affectiones, an sanæ recte fecerit, indicent alij. Est autem, ut ait Paulus, nyctalops vitium quo per diem homo cernit, sole deinde occiduo obscurius, nocte omnino nihil: alius tan. en contingit, ut nocte melius cernant, interdum deterius; ac nocte lucens luna, omnino vult:

## sanguine iocinoris.

**I**DEM tradit Trallianus, qui iecur ac feli hircino plurimum in hoc casu attribuit. Iunat, inquit, fel hircinum; praterea succurrit nyctalopis iecur hircinum, si ex eodem assatur ichora colligas, & inde lumina perungas; facit idem hepar ipsum comman. ducatum. Quin & vapor decocti iecinoris apertis oculis. hanc nyctalopas sanat. Idem tradunt Dioscorides, & Plinius Naturalis historia libro XXVII. capite XI.

*Ad oculos, qui extrinsecus offenduntur, cum sanguine suffusi sunt.*

\* harum  
\* celeberrimeque

**E**T hæc quidem in ipsis corporibus oriuntur. Extrinsecus verò interdum si ictus oculum lædit, ut sanguis in eo suffundatur, nihil commodius est, quàm sanguine vel columbæ, vel palumbi, vel hirundinis inungere. Neque id sine causa fit, cum \* horum acies extrinsecus læsa interposito tempore in antiquum statum redeat, \* celeberrimeque hirundinis. Vnde etiam locus fabulæ factus est, aut per parentes, aut id herba chelidonia restitui, quod per se sanescit. Eorum ergo sanguis nostros quoque oculos ab externo casu commodissimè tuetur, hoc ordine, ut sit hirundinis optimus, deinde palumbi, minimè efficax columbæ & illi ipsi, & nobis. Supra percussam verò oculum ad inflammationem leniendam, non est alie.



est alienum imponere etiam cataplasmata. Sed ammoniacus, vel quilibet alius quàm optimus teri debet, sic ut ei paulatim oleum adiiciatur, donec crassitudo strigenti fiat. Id deinde miscendum est cum ordeacea farina, quæ ex mulso decocta sit. Facile autem recognitis omnibus, quæ medici quoque prodiderunt, apparere cuilibet potest, vix vllum ex his, quæ suprà comprehensa sunt, oculi vitium esse, quod non simplicibus quoque, & promptis remediis submoueri possit.

• Armeniacus legendus, ut subaudiatur lapis.  
al. Sal ammoniacus,

• subito remoueri

## ENARRATIO.

**G**ALENVS ἀπὸ τοῦ αἵματος ὀφθαλμοῦ, hoc est, sanguineas suffusiones, nominare solet.

ut sit hirundinis optimus.

ETS I hirundines in cibo sumptas ad aciem oculorum commendat Dioscorides, & post eundem Galenus; earundem tamen combustarum, aut exiccatarum puluerem cum melle, obscuris caliginosisq; oculis utilissimè illini dicat; nondum tamen, quod sciam, hoc elogio decantari earundem sanguinem comperi. Verum, vix est, sine fabula sine res gesta sit, quod de chelidonia herba scribit Plinius, si apud omnes in con-

fesso est, palumbinum, columbinum, ceterumque sanguinem ad sigillatos oculos plurimum prodesse; cur non idem, sicuti hic fecit Cornelius Celsus, sanguini hirundinis attribueret audeamus? quando Aëtius idem asinino sanguini adscribat, & quando tota hirundinum substantia (excepit stercore) visum acuat?

Sed ammoniacus.

VARIANT hic exemplaria; Pynzanum malè Ammoniacus: reliqua rectius habent, Armeniacus: quod & annotauit Ioannes Casarius.

## CAPVT VII.

De aurium morbis, & curationibus.

**H**ACTENVS in oculis ea reperiuntur, in quibus medicamenta plurimum possint. Ideoque ad aures transeundum est, quarum usum proximum à luminibus natura nobis dedit. Sed in his aliquanto maius periculum est: nam vitia oculorum intra ipsos nocent. Aurium inflammationes doloresq; interdum etiam ad dementiā mortemque præcipitant. Quo magis inter initia protinus succurrendum est, ne maiori periculo locus sit. Ergo ubi primum dolorem aliquis sensit, abstinere & continere se debet. Postero die, si vehementius malum est, caput tondere, idque irino vnguento calido

• ipsis tantummodo noc.



\*catapla-  
smati  
\*cortices

\*decoquā-  
tur:

\*argenti  
(al. nitri)  
spumæ,  
lycij

lido perungere & operire. At magnus cum febre vigiliaque dolor exigit, ut sanguis quoque mittatur. Si id aliqua causæ prohibent, alius soluenda est. Cataplasmata quoque calida subinde mutata proficiunt, siue fœni Græci, siue lini, siue alia farina ex mulso decocta est. Rectè etiam subinde admouentur spongiæ, ex aqua calida expressæ. Tum leuato dolore, ceratum circundari debet ex irino aut cyprino factum. In quibusdam tamen melius, quod ex rosâ factum est, proficit. Si vehemens inflammatio somnum ex toto prohibet, adici cataplasinata debent, papaueris, \*corticis fricti atque contriti, sic ut ex his pars dimidia sit, eaque tum simul ex passo misto \*decoquatur. In aurem verò infundere aliquod medicamentum oportet, quod semper antè tepefieri conuenit, commodissimeque per strigilem instillatur. Vbi auris repleta est, super lana mollis addenda est, quæ humorem intus contineat. Et hæc quidem communia sunt. Medicamentum verò est & rosæ, & radicum arundinum succus, & oleum in quo lumbrici cocti sunt, & humor ex amaris nucibus, aut ex nucleo mali perfici expressus. Composita verò ad inflammationem doloremque leniendum hæc fere sunt: Castorei, papaueris lacrymæ pares portiones conteruntur, deinde adicitur his passum. Vel papaueris lacrymæ, croci, myrrhæ par inodus, sic teritur, ut inuicem modò rosâ, modò passum instilletur. Vel id quod amarum in ægyptia faba est, conteritur, rosâ adiecta. Quibus myrrhæ quoque paulum à quibusdam miscetur, vel papaueris lacrymæ, aut thus cum muliebri lacte, vel amararum nucum cum rosæ succo. Vel castorei, myrrhæ, papaueris lacrymæ pares portiones cum passo. Vel croci p. i. \*. myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum p. \*. 3. quibus cum teruntur, paulatim miscentur passi cyathi tres, mellis minus cyatho. Idque ex primis medicamentis est. Vel papaueris lacryma ex aceto. Licet etiam compositione uti Themisonis, quæ habet castorei, opopanacis, papaueris lacrymæ ex aceto, singulorum p. ii. \*. spumæ lycij p. iii. \*. Quæ contrita passo excipiuntur, donec cerati crassitudinem habeant, atque ita reponuntur. Vbi usus requiritur, rursus idem medica-



medicamentum adiecto passo, \* specillo teritur. Illud per-  
petuum est, quotiescunque crassius medicamentū est, quā  
ut in aurem instillari possit, adiiciendum cum esse humorem,  
ex quo id componi debet, donec satis liquidum sit. Si verō  
pus quoque aures habent, rectē lycium per se infunditur, aut  
irinum vnguentum, aut porri succus cum melle, aut cen-  
tauræ succus cū passo, aut dulcis punici mali succus in ipsius  
cortice tepesfactus, adiecta myrrhæ exigua parte. Rectē etiam  
miscentur myrrhæ (quam *σακτλῶ* \* cognominat) p. i. \*. croci  
tantundem, nuces amaræ \* xv. mellis sesquicyathus. Quæ  
contrita, cū vtendum est, in cortice punici mali tepesfiant.  
Ea quoque medicamenta quæ oris exulcerati causa compo-  
nuntur, æquē vlcera aurium sanant. Quæ si vetustiora sunt,  
& multa sanies fluit, apta compositio est, quæ ad auctorem  
Erasistratum refertur, piperis p. i. \*. croci p. i. 3. \*. myrrhæ,  
misycoscti, singulorum p. ii. \*. æris combusti p. ii. \*. Hæc  
ex vino teruntur. Deinde vbi inaruerunt, adiiciuntur passi-  
heminae tres, & simul coquuntur. Cū vtendum est, adii-  
citur his mel & vinum. Est etiam Ptolemæi chirurgi medi-  
camentum, quod habet lentisci p. i. \*. gallæ p. i. \*. ompha-  
cis p. i. \*. succum punici mali. Est Menophili validum ad-  
modum, quod ex his constat, piperis longi p. i. \*. castorei  
p. ii. \*. myrrhæ, croci, papaveris lacrymæ, nardi syriaci, thu-  
ris, malicorij, ex Ægyptia faba partis interioris, nucum ama-  
rarum, mellis quā optimi, singulorum p. iiii. \*. Quibus,  
cū teruntur, adiicitur acetum quā acerrimum, donec  
crassitudo in his passi fiat. Est Cratonis, cinnamomi, casia,  
singulorum p. i. \*. lycij, nardi, myrrhæ, singulorum p. i. \*.  
aloes p. ii. \*. mellis cyathi tres, vini sextarius. Ex quibus  
vinum cum lycio decoquitur, deinde his alia miscentur. Ac  
si multum puris, malusque odor est, æruginis rasæ, thuris, sin-  
gulorum p. ii. \*. mellis cyathi duo, aceti quatuor simul in-  
coquuntur. Vbi vtendum est, dulce vinum miscetur. Aut  
aluminis scissilis, papaveris lacrymæ, acaciæ succi par pondus  
miscetur, hisque adiicitur hyoscyami succi dimidio minor  
quā vnus ex superioribus portio, eaque trita, ex vino di-  
dd. 3. luuntur.

\* pistillo

\* cognominant).  
\* xxv.



\* , albi pi-  
peris &  
longi,

\* faniem  
\* tandem  
al. tum

luuntur. Per se quoque hyoscyami succus satis proficit. Com-  
mune verò auxilium aduersus omnes aurium casus, iam quæ  
vfu comprobatum Asclepiades composuit. In eo sunt cin-  
namomi, casie, singulorum p. i. \*. floris iunci rotundi, ca-  
stori \* albi, piperis longi, amomi, myrobalani, singulorum  
scrupuli duo, thuris masculi, nardi syriaci, myrrhæ pinguis,  
croci, spumæ nitri, singulorum p. ii. \*. Quæ separatim con-  
trita, rursus mista ex aceto conteruntur, atque ita condita, vbi  
vtendum est, aceto diluuntur. Eodem modo commune au-  
xilium auribus laborantibus est, Polybii sphragis ex dulci  
vino liquata. Quæ compositio priore libello continetur.  
Quòd si & sanies profluit, & tumor est, non alienum est,  
misto vino per oricularium clysterem eluere, & tum infun-  
dere vinum austerum cum rosa mistum, cui spodij paulum  
sit adiectum, aut lycium cum lacte, aut herbæ sanguinalis  
succum cum rosa, aut mali punici succum cum exigua parte  
myrrhæ. Si sordida quoque vlcera sunt, melius mulso eluun-  
tur, & tum aliquod ex his, quæ suprâ scripta sunt, quod mel  
habeat, infunditur. Si magis pus profluit, & caput vtiq; ten-  
dendum est, & multa calida aqua perfundendum, & gargari-  
zandum, & vsque ad lassitudinem ambulandum, & cibo mo-  
dico vtendum est. Si cruor quoque ex vlceribus apparuit, ly-  
cium cum lacte debet infundi, vel aqua, in qua rosa decocta  
sit, succo aut herbæ sanguinalis, aut acaciæ adiecto. Quòd si  
super vlcera caro increuit, eaq; mali odoris \* sanguinem fun-  
dit, aqua tepida elui debet: \* tamen infundi id, quod ex thure  
& ærugine, & aceto, & melle fit, aut mel cum ærugine in-  
coctum. Squama quoque aris cum sandaraca contrita per  
fistulam rectè instillatur.

#### ENARRATIO.

Q VONIAM, vt quarto De locis  
affectis docet Galenus, secundum lo-  
cum obinet sensorium auditus in tenuitate  
à visu; velut gustus sensorium in crassitu-  
dine secundum locum obinet à tactu: pro-  
pterea ab oculis ad aures recto tramite pro-

greditur Celsus. Est autem functionis au-  
ditus noxa triplex: aut enim debilitatur, aut  
deprauatur, aut aboletur; quare pro noxa  
differentia, interim surdastros, modo ob-  
audientes, aliàs etiam surdes appellare so-  
lemus.

Aurium



## Aurium inflammationes.

AURIVM dolorem solent vocare, ut auctor est Galenus, quoties in profundo ex auditorio meatu doloris sensus affligat; unde in Praenotionibus Hippocrates: Auris dolor acutus cum febre continua, ac forti, horrendum est; periculum enim est deliraturum esse hominem, ac periturum. Proinde quum hic modus minimè tutus sit, circa mentem advertere oportet. etiam aliis signis, ac primo etiam die. Pervenit autem iuniores homines septimo die, & adhuc citius ex hoc morbo; senes verò longè tardius: nam febres, & deliria minùs ipsis accidunt; & hac de causa aures ipsis suppurantur. Verùm his quidem atantius recidina morbi contingentes plurimos occidunt. ac verò iuniores priusquam suppuratur auris, perunt. Hinc non absimile est quod Trallianus dicit, Sine meatu, inquit, siue alia ipsius interna partícula quapiam frequenter in inflammatione laboret, acutissima pericula vicinâ regionis, & genere substantiæ inducit: nam nervus qui internam auris superficiem sublinat, quum sit sensibilis, validos dolores, acutosque excitat, ut etiam cerebrum in consensum perducatur, ita ut febres & deliria sic affectis oriuntur.

## ex amaris nucibus:

AMYGDALAS amaras intelligis.

## Composita verò.

SI quidem maximus, ac vehementissimus dolor ex inflammatione urgeat, necesse est sensum stupefacientibus uti, quoties videlicet per dolorem ad mortis discrimen tendat æger; utendūque iis tantum monet Paulus, quæ sensum leuiter stupefaciunt, quod non mediocriter periculum sit ne cerebrum nervo per quem facultas audiendi erogatur, vicinum, consortij lege afficiatur. Sed neque sapius, sicuti docet Trallianus, eadem in usum recipienda erunt; verum

ubi coactus fueris; idque semel tantum ante iterum tentandum trahit. Galenus tertio De compositione medicamentorum locatum libro, longo ante usum tempore (siue pari pondere, siue duplo castoreo admisceatur opium) præparatum id esse debere scribit, & misceat in vehementissimis quidem doloribus pari, in minoribus verò duplo castorei; liquorem verò quo diluuntur ex nullo sapam esse vult, quod multo magis quam dulcia vina dolorem sedet.

## Specillo teritur.

ETSI Galenus, & Aërius, sicuti Cel-sus quoque, specillum adiciant, Iam tamen Cornarius id specillo supernacaneum esse putat.

myrrhæ (quam *σάκκην* &c:

HOC est, pinguedinis recentis myrrhæ cum aqua exigua tusa, & origano expressæ; sic enim statim describit Dioscorides: Cel-sus paulo post myrrham pinguem appellat.

## Est Menophilii validum.

GALENVS compositionem hanc partim ab obturatione liberantem, partim resiccantem, partim discutientem, ac nonnihil concoctioriam esse dicit; adicit tamen alumen fixissile, & loco longi piperis albi substituit.

## Polybij sphragis.

HIC iam tertio monitum velim lectorem, passim pro Polybij pastillo Polyidæ restituendum esse.

## cui spodij paulum.

SI in pulverem redigatur spodium, ac auritus infletur, per se prodesse dicit Trallianus.

## id, quod ex thure.

ID EM planè habet Alexander Trallianus.

*Aduersus*



*Aduersus aurium vermes.*\*prola-  
buntur,

**V**BI verò vermes orti sunt, si iuxta sunt, protrahendi oriculario specillo sunt. Si longius, medicamentis enecandi, cauendumque ne postea nascantur. Ad vtrunque proficit album veratrum cum aceto contritum. Elui quoque aurem oportet vino, in quo marrubium decoctum sit. Sic emortui vermes in primam auris partem \*prouocabuntur, vnde facillimè educi possunt.

## ENARRATIO.

**V**ERMES in auribus aut generatos, aut extrinsecus illapso amara & acris occidunt, & ex imo in summam auris, vnde facillime enelli possint, euocant.

Elui quoque aurem.

IDEM effecerit apisthium, si in vino decoquatur, atq. ex eo ablutio aut suffitum fiat.

*Ad compressa aurium foramina.*

**S**IN foramen auris compressum est, & intus crassa sanies subest, mel quàm optimum addendum est. Si id parum proficit, mellis cyatho & dimidio, æruginis rasæ p. ii. \*. addiciendum est, incoquendumque, & eo vtendum. Iris quoque cum melle idem proficit. Item mellis & rosæ scrupuli duo. Item galbani p. ii. \*. myrrhæ cum melle, & fellis taurini, singulorum p. ii. \*. vini quantum satis est ad myrrham diluendam.

## ENARRATIO.

**E**ST interdum ubi impediēte crassa sorde aurium foramina compressiora sint, Græci θλάσις vocant: in qua quidem affectione nihil adhibendum præcipit Hippocrates; verum si humor crassus sit, omnibus modis eliciendus est: cui negotio opportunis-

sima sunt, quæcunque citra mordacitatem sensuum sunt partium: cuius generis censentur quæ lapides in ranibus conerunt. in quem usum Galenus libro. 27. 1. 1. radices cucumeris siluestris, ari, dracunculi, bryonia ac similia plurimum commendat.

*Ad grauem auditum.*

**V**BI verò grauius aliquis audire cœpit, (quod maximè post longos capitis dolores euenire consuevit,) in primis aurem ipsam considerare oportet. Apparebit enim aut crusta, qualis



qualis super vlcera innascitur, aut sordium coitus. Si crusta est, infundendum est aut oleum calidum, aut cū melle ærugo, vel porri succus, aut cum mulso nitri paulum. Atque vbi crusta à corpore iam recedit, eluenda auris aqua tepida est, quo facilius ea per se diducta oriculario specillo protrahatur. Si sordes æquē molles sunt, eodem specillo eximendæ sunt. At si duræ sunt, acetum & cum eo nitri paululum coniciendum est. Cumque emollitæ sunt, eodem modo elui aurem purgarique oportet. Quod si capitis grauitas manet, attondendum idem, & leniter, sed diu perfricandum est: adiecto vel irino vel \*laureo oleo, sic vt vtrilibet paulum aceti misceatur: tum diu ambulandum, leniterque post vnctionem aqua calida caput fouendum. Cibisque vtendum ex imbecillissima, & media materia, magisque assumendæ dilutæ potiones, nonnunquam gargarizandum est. Infundendum autem in aurem castoreum cum aceto, & laureo oleo, & succo radiculae corticis: aut cucumeris agrestis succus, adiectis \*contritis rosæ foliis. Inmaturæ quoque vix succus cum rosâ instillatus, aduersus \*surditatem satis proficit.

\* laurio

\* contritæ

\* sordiditatem

## ENARRATIO.

Quod si capitis grauitas.

**T**RALLIANVS humerorum exercitationes admittit, easque ex usu esse dicit: verum equitationes & gestationes quæ in curru obveniunt, suspectas habet, quod videlicet: vertiginosum quodammodo

hominem reddant. subinde caput condendum dicit, atque id perfricandum, quæries grauari & crassius succis quodammodo infarciri senserimus. Calida etiam lauacra laudat: verum si marina ad manum sit, eandem præfert.

*Ad sonitum aurium intra seipsas.*

**A**LIVD vitij genus est, vbi aures intra seipsas sonant. Atque hoc quoque fit, ne externum sonum accipiant. Leuissimum est, vbi id ex grauedine est. Peius, vbi ex \*morbo, capitisve longis doloribus incidit. Pessimum, vbi magnis morbis venientibus, maximeque comitali, prouenit. Si ex grauedine est, purgare aurem oportet, & spiritum continere, donec inde humor aliquis expumet. Si ex morbo vel capitis dolore, quod ad exercitationem, frictionem, perfusionem,

cc

garga-



gargarizationemque pertinet, eadem facienda sunt. Cibis non utendum nisi extenuantibus. In aurem dandus radicula succus cum rosa, vel cum succo radicis ex cucumere agresti, vel castoreum ex aceto, & \* laureo oleo. Veratrum quoque cum aceto conteritur, deinde melle cocto excipitur, & inde collyrium factum in aurem demittitur. Si sine his coepit, ideoque nouo metu terret, in aurem dari debet castoreum cum aceto, vel irino, vel \* laureo oleo, aut huic mistum castoreum cum succo nucum amararum, aut myrrha\* & nitrum cum rosa & aceto. Plus tamen in hoc quoque proficit victus ratio. Eademque facienda sunt, quae supra comprehendit, cum maiore quoque diligentia: & praeterea donec his sonus finiat, à vino abstinendum. Quod si simul & sonus & inflammatio est, \* laureum oleum coniecisse abunde est, aut id quod ex amaris nucibus exprimitur, quibus quidam vel castoreum, vel myrrham miscent.

## ENARRATIO.

**A**VRIVM sonitus accidere solet, interim ex multis sensus acrimonia, & subtilitate; magna autem ex parte statuosum spiritum subsequi consuevit: quin & ex febrium decretoriis (quod omnium lenissimum est, & manu auxiliari non eget, ut quod per se curetur breui) malum hoc oritur; & interdum ex partium imbecillitate

conualescentibus ex morbis, eoque peius censendum, quo maioribus morbis succedere nam, ut in Protrheticis auctor est Hippocrates, in febre ardente, sonitus aurium accedentibus cum visus hebetudine, & gravitate in naribus accedente, melancholico modo mense monentur.

*Ad ea quae in aurem inciderunt extrahenda.*

**S**OLET etiam interdum in aurem aliquid incidere, ut calculus, aliquodve animal. Si pulex intus est, compellendum eo lanae paulum est, \* quo ipse is subit, & simul extrahitur. Si non est secutus, aliudve animal est, specillum lanae inuolutum in resinam quam glutinosissimam, maximeque terebinthinam demittendum, idque in aurem iniiciendum, ibique vertendum est. Utique enim comprehendet & eximet. Sin aliquid exanime est, specillo oriculario protrahendum est, aut hamulo retuso paulum recurvato. Si ista nihil profi-



proficiunt, potest eodem modo resina protrahi. Sternutamenta quoque admota id commodè elidunt, aut oriculario clystere aqua vehementer intus compulsa. Tabula quoque collocatur media inhærens capitibus utrinque pendentibus, superque eam homo deligatur in id latus versus, cuius auris eo modo laborat, sic ut extra tabulam emineat. Tum malleo caput tabulæ, quod à pedibus est, feritur: atque ita concussa aure, id quod inest, excidit.

## ENARRATIO.

Sternutamenta quoque.

**S**TERNUTAMENTIS enim, ut docet Trallianus, admotis, meatus auris, spiritus concussione moventur, & referantur; atque ita commodè id quod incidit eliditur.

aut oriculario clystere.

Si pravi humores in auribus creuerint, plurimum proderit eosdem aqua mulsæ elue-

re, ac deinde clysteri oriculario (μολυσμα  
aut ἀπορρύτις vocant) in aures immisso,  
suctu quod nocet euellitur.

Tabula quoque.

EANDEM curandi rationem tradit ex Archigene Galenus, & post illum Aëtius: Aegineta autem super circulum quendam imponit, capiti que vehementius concussit.

## CAPUT VIII.

*De Narium morbis, & curationibus.*

**N**ARES verò intus exulceratas fouere oportet vapore aquæ calidæ, id est sponsia expressa atque admota. Fit & subiecto vase oris angustî, calida aqua repleto. Post id momentum illinenda vlcera sunt, aut plumbi recremento, aut cerussa. Aut argenti spumam cum quolibet horum aliquis conterit, ei que dum teritur, inuicem vinum & oleum myrteum adiicit, donec mellis crassitudinem \*fecerit. Sin autem \*faciat. ea vlcera \*circa nares sunt, pluresque crustas & odorem foedum \*intra habent, quod genus Græci ὀζανραν appellant, sciri quidem debet, vix ei malo posse succurri. Nihilominus tamen hæc tentari possunt, ut caput ad cutem tondeatur, assidueque vehementer perfricetur, multa calida aqua perfundatur, multa ei ambulatio sit, cibus modicus, neque acer, neque valentissimus. Tum in narem ipsam mel cum exiguo modo resinæ te-

cc 2

rebin-



rebinthinæ coniiciatur, quod specillo quoque inuoluto lana fit, attrahaturque spiritu is succus, donec in ore gustus eius sentiat. Sub his enim crustæ resolvuntur, quæ tum per sternutamenta elidi debent. Puris vlceribus vapor aquæ calidæ subiiciendus est. Deinde adhibendum aut lycium ex vino dilutum, aut amurea, aut omphacium, aut menthæ, aut marrubij succus, aut atramentum sutorium, quod candens factum, deinde contritum sit: aut interior scillæ pars contrita, sic ut horum cuilibet mel adiciatur. Cuius in cæteris admodum exigua pars esse debet: in atramento sutorio tanta, <sup>\* sit,</sup> ut ea misturaliquida <sup>\* sit,</sup> cum scilla utique pars maior, inuoluendumque lana specillum est, & in eo medicamento intingendum, eoque vlcera implenda sunt. Rursusque linamentum inuolutum & oblongum eodem medicamento illinendum, <sup>\* demitt.</sup> demittendumque in nares, <sup>in nares,</sup> & ab inferiore parte <sup>&</sup> leniter deligandum. Idque per hyemem, & ver, bis die: per æstatem, & autumnum ter die fieri debet. Interdum verò etiam in naribus carunculæ quædam similes muliebribus mammis nascuntur, hæque <sup>\* in im. p.</sup> imis partibus, quæ carnosissimæ <sup>q. cartila</sup> sunt, inhaerent. <sup>g. nosæ</sup> Has curare oportet, medicamentis adurentibus, sub quibus ex toto consumuntur. Polypus verò est caruncula, modò alba, modò subrubra, quæ narium ossi inhaeret, & modò ad labra pendens, nares implet, modò retrò per id foramen, quò spiritus à naribus ad fauces descendit, adrò increfcit, uti post vnam conspici possit, strangulatque hominem maxime, austro aut euro flante, fereque mollis est, raro dura: eaque magis spiritum impedit, & nares dilatat, <sup>\* fereque</sup> quæ fere *καρπυώδης* est, itaque attingi non debet. Illud aliud genus fere quidem ferro curatur, interdum tamen inarescit, si addita in nares per linamentum aut penicillam ea compositio est, quæ habet minij sinopici, chalcitidis, calcis, sandaracæ, singulorum p. l. \*. atramenti sutorij p. ii. \*.

## ENARRATIO.

**OZÆNA**, ut inquit Galenus, ex acrimia & putredinosorum humorum incurabilia vlcera facere solent, non tamen graueolentia; Scitotinus grauem narium, sunt influxu: nam si solum acres fuerint, odoreni verit ozænas; estq; curati admodum.



dum difficile aut incurabile omnino vitium.  
Oportet autem, si curationem aggrediamur, affectam partem per pharmaca mixtam vim habentia resiccare, hoc est per repellentia simul & diaphorica.

### Puris ulceribus.

Hic simplicia ulcera ab ozani distinguuntur.

Interdum verò etiam.

Σαρκώματα vocat Paulus Ἐγίδια.

### Polypus verò est.

POLYPUS est tumor præter naturam in naribus, ex crassis & viscosis humoribus generatus: Hippocrates ex pituita nasci auctor est. Species autem eius recensentur ab eodem, libro De morbis; quas Celsus hic singulatim enarrasse videtur.

### CAPUT IX.

#### De Dentium dolore, & curationibus.

IN Dentium autem dolore, qui ipse quoque maximis tormentis annumerari potest, vinum ex toto circuncidendum est. Cibo quoque primo abstinendum, deinde comodico mollique utendum, ne mandentis dentes irriter, tum extrinsecus admouendus per spongiam vapor aquæ calidæ, imponendumque ceratum ex cyprino aut irino factum, lanaque id comprehendendum, caputque velandum est. Quod si grauior is dolor est, vtiliter & aluus ducitur, & calida cataplasinata super \*maxillas iniiciuntur, & ore humor calidus cum medicamentis aliquibus continetur, sæpiusque mutatur. Cuius rei causa & quinquefolij radix in vino mixto coquitur, & hyoscyami radix, vel in posca, vel in vino mixto coquitur, sic ut paulum his salis adiciatur, & papaueris non \*nimium: aridi cortices, & mandragoræ radix, eodem modo. Sed in his tribus utique vitandum est, ne quod haustum erit deuoretur. Ex populo quoque alba, cortex radice in hunc usum in vino mixto recte coquitur, & in aceto \*cornu ceruinum rasum, & nepeta cum teda pingui: ac \*ficus item pinguis vel in mulso, vel in aceto & melle, ex quibus cum ficus decocta est, is humor percolatur. Specillum quoque lana inuolutum in calidum oleum demittitur, eoque \*ipso dens fouetur. Quinetiam quædam quasi cataplasmata in dentem ipsum illinuntur. \*in quem usum ex malo punice acido atque arido, malicorij pars interior cum pari portione, & gallæ, &

\*minimū:  
al., non nimium ar.  
cor.

\*cornu  
ceruinum  
mentum

\*ficus item  
pingui

\*decocta.  
\*ipse

\*ad.

cc 3

pinci:



pinci corticis conteritur, misceturque his minium: eaque contrita aqua pluuiatili coquuntur. Aut panacis, papaueris lacrymae, peucedani, vuae taminiae sine seminibus, pares portiones conteruntur. Aut galbani partes tres, papaueris lacrymae pars quarta. Quicquid dentibus admotum est, nihilominus supra maxillam, ceratum, quale supra posui, esse debet lana obrectum. Quidam etiam myrrhae, cardamomi, singulorum

\* ficatorum  
pinguium,  
fortasse le-  
gendū, aut  
paruarū. al.  
caprifico-  
rum pul-  
ueris, id est  
cineris, al.  
fermenti  
putris,  
\* qualis  
fere est,  
quæ ha-  
bet pap.

\* parua-  
rum, vel  
pinguiū:  
ut supra.  
al., piperis

\* pertestas  
exc.  
Pastinaca.  
\* coniectū:  
sed id tū  
canna in-  
uolutum  
demitti  
conin al.  
coniectum  
dentem  
citāt. sed  
id tamen  
inuolutum  
in lanula  
demitti

p. i. \*. croci, pyrethri, \* ficatorum partes, singulorum p. iiii. \*. sinapis p. viii. \*. contrita linteolo illinunt, imponuntque in humero partis eius qua dens dolet. Si is superior est, à scapulis: si inferior, à pectore. Idque dolorem leuat: & cum leuauit, protinus submouendum est. Si verò exesus est dens, festinare ad eximendum eum, nisi res coëgit, non est necesse. Sed cum omnibus fomentis, quæ supra posita sunt, adiciendæ quædam valentiores compositiones sunt, quæ dolorem leuant, \* quales hæc sunt. Habet autem papaueris lacrymae p. i. \*. piperis p. ii. \*. \* pſoreos p. x. \*. quæ contrita galbano excipiuntur: idque circumdatur. Aut Menemachi maximè ad maxillares dentes, in qua sunt croci p. i. \*. cardamomi, thuris fuliginis, ficatorum \* partes, pyrethri, singulorum p. iiii. \*. sinapi p. viii. \*. Quidam autem immiscent pyrethri, piperis, elaterij, singulorum p. i. \*. aluminis scissilis, papaueris lacrymae, vuae taminiae, sulphuris ignem non experti, bituminis, lauri baccarum, sinapis, singulorum p. ii. \*. Quod si dolor eximi cum cogit, & piperis semen cortice liberatum, & eodem modo bacca hederæ coniecta in id foramen, dentem findit, isque \* forte stans exciderit. Et plani piscis, quam pastinacam nostri, *ῥυζωρα* Græci vocant, aculeus torretur, deinde conteritur, resinaque excipitur, quæ denti circumdata hunc soluit. Et alumen scissile in id foramen \* coniectum demitti commodius est, quia sic dente seruat, dolorem leuat. Hæc à medicis excepta sunt. Sed agrestium experimento cognitum, cum dens dolet herbam menthastrum cum suis radicibus velli debere, & in peluem coniici, supraque aquam infundi, collocarique iuxta sedentem hominem vndique veste coniectum, tum in peluem candentes silices de-  
mitti,

\* fiores



mitti, sic ut aqua tegantur, hominemque cum hiante ore vaporem excipere, ut supra dictum est, undique inclusum. Nam & sudor plurimus sequitur, & per os continens pituita defluit, idque sæpe longiorem, sæpe annuam valetudinem bonam præstat.

## ENARRATIO.

**E**TSI nonnulli contendunt, dentem sicut os est, doloris esse expertum; Galenus tamen in libro De usu partium sexto, tum libro De ossibus, asserit eos eundem vim sentiendi habere: idque se experientia in seipso, libro De compositione medicamentorum localium, compertisse aperit confirmat: percepit etenim in semetipso, non dolentem, modo, sed etiam pulsanter dentem, quemadmodum carnosæ partes inflammatione vexata consueverant. unde non immerito Celsus dentium dolorem maximis tormentis annumerari posse dicit. Consistit ergo dentium dolor, vel in dentium, ut iam dixi, substantia aut in nervo ad radicem subtratto, vel in gingivarum inflammatione. In genere tamen omnes quotquot sunt dentium dolores, Galenus duabus contrariis causis acceptas fert, inopia videlicet & redundantia alimenti quod ipsis suppeditatur: inopia quidem aridiores, tabidiores & tenuiores eos reddit; redundantia vero consimilem in eis excitare affectionem potest, qualis est circa carnosas partes phlegmone. Celsus singulas doloris dentium causas parim perpendens, confusa admodum remedia in medium profert: ac quantumvis experientia comprobata pleraque sint, & ratio ipsa dicet eadem, utilia admodum esse; in hoc tamen non satis observasse methodum videtur, quod frigidis calida, calidisque frigida statim subiunxerit.

## &amp; quinquæfolij radix.

**Q**UINQUEFOLII radici non modò facultas attribuitur, ut dentium dolori mederi possit, verum etiam eosdem illas servare creditur, si quotidie commanducetur.

## Ex populo albâ.

**I**STHVC an verum sit, ambigo.

## Specillum quoque.

**C**LARIVS nonnihil Scribonius Largus hanc curandi rationem describit: Vbi dolor, inquit, fuerit, auriscalpium lana molli innoluitur; deinde tingitur fermentissimo oleo; atque ita denti primum, deinde proximis gingivis superponitur bis terve, donec hebetescat aliqua ex parte dolor: post hoc medicamento dens operitur. Si repetierit, aut permanserit nihilominus aliquis dolor, super medicamentum auriscalpium cum lana ex oleo candenti eodem modo imponere sapius oportebit, hoc est donec dolor tollatur.

## vux timineæ.

**I**AM antè dictum est timineæ legendum esse.

## pyrethri, ficorum partes.

**H**IC, ut in Menemachi statim subsequente compositione, ficorum pinguium substitues; quod & annotavit Ioannes Casarini.

## Et plani piscis, quam.

**P**LINIVS libro XXXII. capite VII. Pastinacæ, inquit, radio scarificare gingivas, & in dolore est utilissimum, conseriturque is, & cum helleboro albo illitus dentem sine vexatione extrahit.

## Et alumen scissile.

**I**DEM testatur Scribonius Largus: Nec minus, inquit, alumen fissum lineolo fissò circumdatum, & ita dolenti pressum dentibus continere prodest.

## herbam menthastrum.

**M**ENTHASTRUM commenducatum dentibus dolentibus summè prodesse auctor est Scribonius.

De Test-



## CAPVT X.

*De Tonsillis, & earum cura.*

Radix dul-  
cis.  
\* cont. in p.  
\* Lenibuf-  
que

Si verò tonsillæ sine exulceratione per inflammationem intumuerunt, caput velandum est extrinsecus, is locus vapore calido fouendus, multa ambulatione vtrendum, caput in lecto sublime habendum, gargarizandumque est ex reprimentibus. Radix quoque ea, quam dulcem appellant, \* contusa & in passo, mulsove decocta idem præstat. \* Leniterque quibusdam medicamentis eas illini non alienum est, quæ hoc modo fiunt: Ex malo punico dulci succus exprimitur, & eius sextarius in leni igne coquitur, donec ei mellis crassitudo sit, tum croci, myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum p. ii. \*. per se conteruntur, paulatimque his adiciuntur vini lenis cyathi duo, mellis vnus, deinde priori succo ista miscentur, & rursus leniter incoquantur. Aut eiusdem succi sextarius eodem modo coquitur, atque eadem ratione trita ei adiciuntur hæc: Nardi \* p. \*. omphacij p. i. \*. cinnamomi, myrrhæ, casia, singulorum p. i. \*. Eadem autem hæc & auribus, & naribus purulentis accommodata sunt. Cibus quoque in hac valetudine lenis esse debet, ne exasperet. Quod si tanta inflammatio est vt spiritum impediat, in lecto conquiescendum, à cibo abstinendum, neque assumendum quicquam præter aquam calidam est. Alius quoque ducenda est. Gargarizandum ex fico & mulso. Illinendum mel, cum omphacio. Intrinsecus admouendus, sed aliquanto diutius, vapor aquæ calidæ, donec ea suppurent, & per se aperiantur. Si pure substante non rumpuntur, hi tumores incidendi sunt, deinde ex mulso calido gargarizandum ex fico. At si modicus quidem tumor & exulceratio est, fursurum cremori ad gargarizandum \* paulum mellis adiciendum est, illinendaque vlcera hoc medicamento. Passi quamdulcissimi tres heminae ad vnam coquantur, tum adicitur thuris p. i. \*. croci, myrrhæ, singulorum p. i. \*. \* leniterque omnia rursus feruescunt. Vbi plura vlcera sunt, eodem

\* ex fico  
paul.

\* leniter-  
que



eodem futurum cremore, vel lacte gargarizandum est. Atque hinc quoque cibis lenibus opus est, quibus adiacere dulce vinum potest.

## ENARRATIO.

QVEMADMODVM glandula indurata, inquit Paulus, struma appellatur; ita etiam tonsilla inflammationem experit, aut supra modum naturalem aucta, & veluti desiccata, cibi potisque & spiritus iter impediens, e regione sibi invicem utrimque opposita, eodem partis vocabulo tonsilla, Græcis ἀρτιάδης nominantur, alij

παρὰ τὴν ὥραν dicere malunt, hodie columellam appellant. Inflammatio ex dolore & colore dignoscitur: siquidem ubi solummodò tumet, aperto ore maiores quidem, ceterum sibi ipsis concolores apparent; verum ubi inflammatio easdem exercet, seipsis rubicundiores, & dolorifica redduntur.

## CAPVT XI.

*De Oris ulceribus, & curationibus, & quæ Anthera sunt.*

VLCEA autem oris, si cum inflammatione sunt, & parum pura ac rubicunda sunt, optimè his medicamentis curantur, quæ supra posita ex malis punicis fiunt. Continendusque saepe ore reprimens cremor est, cui paulum mellis sit adiectum. Utendum ambulationibus, & non acri cibo. Simulatque verò pura vlcera esse cœperunt, lenis humor, interdum etiam quàm optima aqua ore continenda est. Prodestque assumptum purum vinum, pleniorque cibus, dum acribus vacet. Inspergi que vlcera debent alumine scissili cui dimidio plus gallæ immaturæ sit adiectum. Si iam crustas habent, quales in adultis esse consuerunt, adhibendæ sunt hæ compositiones quas Græci ἀνθήρας nominant. Iunci quadrati, myrrhæ, sandaracæ, singulorum p. iiii. \*. aluminis pares portiones. Aut croci, myrrhæ, singulorum p. ii. \*. iridis, aluminis scissilis, sandaracæ, singulorum p. iiii. \*. iunci quadrati p. viii. \*. Aut gallæ, myrrhæ, singulorum p. ii. \*. aluminis scissilis p. ii. \*. rosæ foliorum p. iiii. \*. Quidam autem croci p. \*. aluminis scissilis, myrrhæ, singulorum p. i. \*. sandaracæ p. ii. \*. iunci quadrati p. iiii. \*. miscent. Priora arida insperguntur. Hoc cum melle illinitur, neque vlceribus

ff

bus



bustantum, sed etiam tonsillis. Verum ea longè periculosissima vlcera sunt, quas *ἀνθήρας* Græci appellant, sed in pueris: hos enim sæpe consumunt, in viris & mulieribus idem periculum non est. Hæc vlcera à gingiuis incipiunt, deinde palatum, totumque os occupant, tum ad vuam faucesque descendunt. Quibus obsessis, non facile fit, ut puer conualescat. Ac miserius etiam est, si lactens adhuc infans est, quominus imperari remedium aliquod potest. Sed in primis nutrix cogenda est exerceri ambulationibus, hisque operibus, quæ superiores partes mouent. Mittenda in balneum, iubendaque ibi calida aqua mammas perfundere, tum alenda cibus lenibus, & his qui facile non corrumpuntur. Potiones, si febricitat puer, aquæ: si sine febre est, vini diluti. Ac si alius nutrici substitit, ducenda est. Si pituita eius in os coit, vomere debet. Tum ipsa vlcera perungenda sunt melle, cui <sup>\* ros,</sup> rhus, quem syriacum vocant, aut amaræ nuces adiectæ sunt. Vel mistis inter se rosæ foliis aridis, pineis nucleis, menthæ coliculo, melle. Vel eo medicamento, quod ex moris fit, quorum succus eodem modo quo punici mali ad mellis crassitudinem coquitur, eademque ratione ei crocum, myrrha, alumen, vinum, mel, miscetur. Neque quicquam dandum, <sup>\* à quo</sup> ad quod humor euocari possit. Si verò iam firmior puer est, gargarizare debet his fere, quæ suprà comprehensa sunt. At <sup>\* leniora</sup> si <sup>\* lenia</sup> medicamenta in eo parum proficiunt, adhibenda ea, quæ adurendo crustas vlceribus inducant. Quale est scissile alumen, vel chalcitis, vel atramentum sutorium. Prodest <sup>\* maxima</sup> etiam fames, & abstinencia quanta <sup>\* maximè</sup> imperari potest. Cibus debet esse lenis. Ad purganda tamen vlcera interdum caseus ex melle rectè datur.

## ENARRATIO.

quas Græci *ἀνθήρας*.

**A**NATHERAS, inquit Ioannes *Manardus* libro octauo, vocant medici, compositiones quasdam agnitudinis oris accommodatas, quibus rosa miscetur: quo

fit ut non floridas antidotos, reddendum pueri, uti fecit *Marcellus Virgilius*, sed eadem voce utendum, ubi & hunc *Celsi* locum citat. Videtur tamen paulo latius apud medicos *anthera* nomen usurpatum: nam *Celsus* ipse capite *XVIIII*. huius libri, *medicamento*.



mento anthera dicto, non solum ad oris, sed  
 & ad pndendum partium ulcera vititur:  
 & Galenus libro De compositione medica-  
 mentorum localium quarto, illitionem ad  
 oculos antheram dictam describit. Praterea  
 Paulus Aegineta ad fissuras calcaneorum  
 aliam compositionem antheram nominatam  
 recenset; quarum neutra, contra quam Ma-  
 nardus refert, rosas recipit; sicuti nec haec  
 quas hic in medium producit auctor noster,  
 prater eam qua ordine tertia est, qua rosa  
 foliorum \* p<sup>o</sup> 1111. recipit. Habet tamen

Scribonium composuit quoddam medicamen-  
 tum, quod anthera vocari dicit, ad omnia  
 ulcera accommodum rosas recipiens.

sed in pueris.

SECUNDO libro pueritia maximè fa-  
 miliares esse aphthas dictum est, atque eas-  
 dem Galenus in pueris contra quam auctor  
 noster facillimè curari auctor est; qua verò  
 accidunt iis qui ad perfectam aetatem perue-  
 nerunt, non ita facillè, praesertim ubi ob  
 viscosorum humorum defluxum excitantur.

## CAPUT XII.

De \* lingua ulceribus.

\* lingua-  
rum

Linguae quoque ulcera non aliis medicamentis egent,  
 quam quæ prima parte superioris capitis exposita sunt.  
 Sed quæ in latere eius nascuntur, diutissimè durant. Viden-  
 dumque est, num contra dens aliquis acutior sit, qui sanescere  
 saepe vlcus eo loco non sinit, ideoque limandus est.

\*Gingivæ

## CAPUT XIII.

De parodontidibus, gingivarum tuberculis, deque  
 aliis ulceribus gingivarum.

SOLENT etiam interdum iuxta dentes in gingivis tuber-  
 scula quædam oriri dolentia, \* παροδοντίδας Græci appel-  
 lant. Hæc initio leniter sale contrito perfricare oportet, aut  
 inter se mixtis sale fossili, com busto cupresso, nepeta, deinde  
 eluere os cremore lenticulæ, & inter hæc hiare, donec pituitæ  
 satis profluat. In maiore verò inflammatione iisdem medi-  
 camentis utendum est, quæ ad ulcera oris supraposita sunt: &  
 mollis linamenti paulum inuoluendum aliqua compositione  
 ex his, quas antheras vocari dixi, demittendumque id inter  
 dentem & gingivam: quod si durior erit, & id prohibebit,  
 extrinsecus admouendus erit spongiæ vapor calidus, impo-  
 nendumque ceratum. Si suppuratio se ostendet, diutius eo

Aldus contin-  
 git hoc caput  
 cum preceden-  
 te, neque ti-  
 tu'um addit.  
 \* παρυντίδας

ff 2

vapore



\* tuberculum

\* eius  
\* παρὰ ὀν-  
τος vel πα-  
γελος fuit,  
siue non  
fuit, d. p.  
feratur,  
aut d. c. a.  
fr. v. a. v.  
o. m. id p.  
f. v. cōfue-  
uit. Quod  
ubi

vapore vtendum erit, & continendum ore calidum mulsū, in quo ficus decocta sit. Itemque \* subcrudum incidendum, ne si diutius ibi pus permanferit, os lædat. Quod si maior is tumor est, commodius totus exciditur, sic vt ex vtraque parte dens liberetur. Pure exempto, si levis plaga est, satis est ore calidam aquam continere, & extrinsecus fouere eodem vapore. Si maior est, lenticulæ cremore: vt iisdem medicamentis, quibus cætera vlcera oris curantur. Alia quoque vlcera in gingiuis plerunque oriuntur, quibus eadem quæ in reliquo ore succurrunt. Maximè tamen mandere ligustrum oportet, succumque \* eum ore continere. Fit etiam interdum, vt ex gingiuæ vlcere, siue \* parodontides sint, siue non sint, diutius pus feratur. Quod aut dente corrupto, aut fracto, vel aliter vitiato osse, maximeque id per fistulam venire consuevit. vbi incidit, locus aperiendus, dens eximendus: testa ossis, si qua \* excessit, recidenda est: si quid vitiosum est, radendum. Post quæ, quid fieri debeat, suprâ in aliorum vlcerum curatione comprehensum est. Si verò à dentibus gingiuæ recedunt, eadem antheræ succurrunt. Vtile est etiam pyra, aut mala non permatura mandere, & ore eum humorem continere. Idemque præstare non acre acerrimum in ore retentum potest.

\* abscessit,

#### ENARRATIO.

Solent etiam.

**S**VSPICATUR hic mendum esse post Manardum Gulielmum Pantinum, legendumque παρὰ ὀντος, idque quod Galenus, Ægineta, & Aetius, & alii eos Scribonius Largus, ita nominarunt. est autem, vt scribunt, Parulis exiguis abscessus gingiuas infestans, Epulis autem tuberculum carnis est iuxta dentium aliquem in gingiuis oriens.

Mihi verò, vt aliquid post tantos viros liceat, non omnino malè παρὰ ὀντος legi videatur, quando vocabuli ipsius etymon abscessum circa dentes exprimere videatur: nam quod Pynzanum perperam parodontides impresserit, clarius est quam vt dici debeat, praesertim quando dicto ipsa abscessum an- rimum denotet, tum quod Celsus paulo post de parodontides scribat.

#### CAPVT XIII.

De Vuae morbo, & curatione.

**V**VÆ vehemens inflammatio terrere quoque debet. Itaque in hac abstinentia necessaria est, & sanguis rectè mitti.



mittitur: & si id aliqua res prohibet, alius utiliter ducitur, caputque super hæc velandum, & sublimius habendum est: tum aqua gargarizandum, in qua simul rubus & lenticula decocta sit. Illinenda autem ipsa vua vel omphacio, vel galla, vel alumine scissili, sic ut cuilibet eorum mel adiciatur. Est etiam medicamentum huic aptum, quod Andronium appellatur. Constat ex his, alumine scissili, squama æris rubri, atramento sutorio, galla, myrrha, misy. Quæ per se contrita mistaque rursus paulatim adiecto vino austero teruntur, donec his mellis crassitudo sit: ubi horum aliquo illita vua est, chelidonix quoque succo per cochlear illita vua maxime prodest. Fere multa pituita decurrit, cumque ea quieuit, ex vino calido gargarizandum. Quod si minor in ea inflammatio, lascererere, ei que adicere frigidam aquam satis est, eamque aquam

Androniū.

\* sit. Chel.  
q. succus  
p. c. i. v.  
m. prodest.  
Vbi horū  
aliquo il-  
lita vua est  
fere m.

\* cochleari

\* cochleario exceptam ipsi vuæ subicere: Ac mediocriter eam tumescentem aqua quoque frigida, eodem modo subiecta, reprimit. Ex eadem autem aqua gargarizandum quoque est, vel cum lasere, vel sine eo hac curatione vuæ subiecta est.

\* eo. Ac de  
cur. vuæ  
productæ  
per manū  
ratio sub-  
iecta est.

## ENARRATIO.

**G**VRGVLIO, columella, & vua, tam particula, quam affectus nomen est: est autem caruncula, quam gutturi natura pro regimento dedit, quæ voci ad magnitudinem, & pulchritudinem confert. quare Paulus ex Ægina medicus, gurgulionem tanquam aliquod vocis plestrum esse dicit: per eam enim aer ingreditur, scinditur, ac vehementia impetus eiusdem rumpitur. subiacet autem caruncula hæc distillationibus à capite, quæ eandem frequentissime corripunt; ac pro similitudine rei cui assimilatur denominationem accipere solet: siquidem quoties acino vua simile summum gurgulionis apparet, vua appellatur; at si eadem caruncula in longum per deflexionem deducatur, columella dicitur; quemadmodum si gracilescat omnino, & loro similis propendeat, lorum vocatur affectio.

quod Andronium.

DESCRIBIT § LXIII. aliud medicamentum Andronium Largus: quod habet, mali granati corticis \* p<sup>o</sup> x. mali terra \* p<sup>o</sup> ix. aloës \* p<sup>o</sup> iiii. myrrha \* p<sup>o</sup> ii. galla \* p<sup>o</sup> viii. aluminis fissi \* p<sup>o</sup> iii. æris floris \* p<sup>o</sup> ii. teruntur, inquit, & cribrantur sicca, & curiosè deinde admiscerur passum creticum, dum habeat mellis spissitudinem: quod ut operosius ad herpetem, sacrum ignem, cancerumque oris utilissimum dicit.

ff 3

CAPVT.



## CAPVT XV.

*De Cancro oris.*

Si quando autem vlcera oris cancer inuasit, primò considerandum est, num malus corporis habitus sit, ei que occurrendum, deinde ipsa vlcera curanda. Quòd si in summa parte id vitium est, satis proficit anthera humido vlceri arida inspersa: sicciori cum exigua parte mellis illita. Si paulo altius, chartæ combustæ partes duæ, auripigmenti pars vna. Si penitus malum descendit, chartæ combustæ partes tres, auripigmenti pars quarta. Aut pares portiones salis fricti, & iridis frictæ. Aut item pares portiones chalcitidis, calcis, auripigmenti. Necessarium autem est linamentum in \*rosa tingere, & super adurentia medicamenta imponere, ne vicinum & sanum locum lædant. Quidam etiam in acris aceti hemina frictum salem coniiciunt, donec tabescere desinat: deinde id acetum coquunt, donec exsiccet, eumque salem contritum inspergunt. Quoties autem medicamentum iniicitur, & antè & post os diluendum est, vel cremore lenticulæ, vel aqua in qua aut eruum, aut \*oleæ, aut verbenæ decoctæ sint, sic vt cuilibet eorum paulum mellis misceatur. Accetum quoque ex scilla retentum ore, satis aduersus hæc vlcera proficit \*. Ex aceto cocto sali, sicuti suprà demonstratum est, rursus mixtum acetum. Sed & diu continere vtrumlibet, & id bis aut ter die facere, prout vehemens malum est, necessarium est. Quòd si puer est, cui id incidit, specillum lana inuolutum in medicamentū demittendum est, & super vlcus tenendum, ne per imprudentiam adurentia deuoret. Et si dolor in gingiuis est, mouenturque aliqui dentes, \*refici eos oportet: nam curationes vehementer impediunt. Si nihil medicamenta proficiunt, vlcera erunt adurenda. Quod tamen in labris ideo non est necessarium, quoniam excidere commodius est. Et id quidem æquè adustum atque excisum, sine ea curatione, quæ corpori manu adhibetur, impleri non potest. Gingivarum verò ossa, quæ hebetia sunt, in perpetuum

\* fractæ.

\* rosaceo

\* oleæ folia,

\*: &amp; ex

\* refigi



petuum visione nudantur. Neque enim postea caro incre-  
scit. Imponenda tamen adustis lenticula est, donec sanita-  
tem, qualis esse potest, recipiant.

## ENARRATIO.

**M**OLESTVM admodum vitium quam latius serpat, eidem obuiam ire, atque  
est, ut ait Largus, quoties cancer os ut possimus optime mederi. in quem usum  
corripit, quod in iniuriis neglectum brevi summe commendat precedente capite a nobis  
temporis spacio moris causa est, oportet igi- ascriptum medicamentum Andronium.  
tur quamprimum visum fuerit, & ante

## CAPVT XVI.

*De Parotidibus, quæ sub auribus oriuntur.*

**H**ÆC in capite fere medicamentis egent. Sub ipsis verò  
auribus oriri παρὼνδες solent, modò in secunda valetu-  
dine ibi inflammatione orta, modò post longas febres, illuc  
impetu morbi conuerso. Id abscessus genus est. Itaque nul-  
lam nouam curationem desiderat. Animaduersionem tan-  
tummodo hanc habet necessariam, quia si sine morbo id in-  
tumuit, primum \*reprimendum experimentum est. Si ex  
aduersa valetudine, illud inimicum est, maturarique, & quàm  
primum aperiri, commodius est.

\* reprimen-  
dum ex-  
perimentum  
est.

## ENARRATIO.

**P**AROTIDES sunt è genere inflam-  
mationum: sunt autem glandulis circa  
aures affectis. Vsu autem venire videntur,  
ut interdum in secunda valetudine emer-  
gant; quemadmodum hic quoque inserit  
Celsus: nonnunquam etiam post morbos,  
maximèque febres, illuc impetu morbi per  
decretorium conuerso, & facta digestionem  
evidenti accidunt: quæ sanè tanquam mi-  
nimè exitiales promptissimè curantur, ac se-  
curitatem promittunt, plurimòque à gra-  
uissimis etià accidentibus vendicant. Quin-  
etiam contingit nonnunquam ex humoribus  
redundantia, proficisci cum grauedine natu-  
ram irritante parotides: serunturque in pe-  
ricula non leuia, nisi maturè suppurentur,  
ac digerantur. Galenus omnibus parotidi-  
bus pharmaca attractoria adhibet; atque  
si hac nihil efficiant, etiam cucurbitulas ap-  
plicat: Admittitur enim, inquit, ut humor  
peccans ex profundo ad cutem attrahatur;  
idq; potissimum, si in capite affectio sit fir-  
mata, humoribus videlicet in ipso obscura-  
tis. Celsus nescio quàm rectè in dextera  
valetudine oris parotidibus reprimenda ap-  
plicat.

## CAPVT



## CAPVT XVII.

*De Umbilici prominentis curatione.*

**A**D Umbilicos verò prominentes, ne manu ferroque utendum sit, antè tentandum est, vt abstineant, alius his ducatur, imponatur super umbilicum id, quod ex his constat: Cicutæ & fuliginis, singulorum p. i. \*. cerussæ elotæ p. iiii. \*. plumbi eloti p. viii. \*. ouis duobus, quibus etiam solani succus adiicitur. Hoc dilutius impositum esse oportet, & interim conquiescere hominem, cibo modico vt, sic vt vitentur omnia infantia.

## ENARRATIO.

**P**LINIUS prociduum Umbilicem nominat; Græci, vt docet Paulus libro sexto, ἰζομφαλὸς vocant, alij pueros quibus procidus est umbilicus, Exumbilicæves dicere solent: Auicennas umbilici augmentum appellat. Efficitur autem variis de causis: contingit enim interdum peritoneo illic disrupto ac procideme, aut omento, aut

intestino: interdum colluvis ociosi humoris sub umbilico contractâ; interdum verò carne subnatâ; aliquando sanguine irruente propter venæ aut arteriæ rupturam, vt in aneurysmatibus: interdum non sanguine, verum spiritum solum irruente. Curantur iisdem quibus tam ex inguinum: quæquam non vsque adeo vehementia requiritur.

## CAPVT XVIII.

*De obscænarum partium vitii,  
& curationibus.*

\* accom-  
modata

**P**ROXIMA sunt ea, quæ ad partes obscænas pertinent, quarum apud Græcos vocabula & tolerabilius se habent, & accepta iam vsu sunt, cùm omni ferè medicorum volumine atque sermone iactentur: apud nos fœdiora verba, ne consuetudine quidem aliqua verecundiùs loquentium \* commodata sunt: vt difficilis hæc explanatio sit, simul & pudorem, & artis præcepta seruantibus. Neque tamen ea res à scribendo detertere me debuit. Primum vt omnia quæ salutaria accepi, comprehenderem: dein quia in vulgus eorum curatio etiam præcipuè cognoscenda est, quæ inuitissimus quisque alteri ostendit.

*De Colis*



*De Colis morbis, & curationibus.*

**I**GITUR si ex inflammatione Coles intumuit, reduci que  
 summa cutis, aut rursus induci non potest, multa calida  
 aqua fouendus locus est. Vbi verò glans contacta est, oricu-  
 lario quoque clystere inter eam, cutemque aqua calida infe-  
 renda est. Si mollita sic & extenuata cutis, <sup>\*duceant</sup> ducenti paruit,  
 expeditior reliqua curatio est. Si tumor vicit, imponenda est  
 vel lenticula, vel marrubium, vel oleæ folia ex vino cocta, sic  
 ut cuilibet eorum, dum teritur, mellis paulum adiiciatur. Sur-  
 sumque coles ad ventrem deligandus est. Quod in omni  
 curatione eius necessarium est. Ilque homo continere se de-  
 bet, & abstinere à cibo, & potione aquæ tantum à siti vindi-  
 cari. Postero die rursus adhibendum iisdem rationibus aquæ  
 fomentum est, & cum vi quoque experiundum, an cutis se-  
 quatur. Ea que si non parebit, leuiter <sup>\*summa</sup> summo scalpello con-  
 cidenda erit. Nam cum sanies profluxerit, extenuabitur is  
 locus, & facilius cutis ducetur. Siue autem hoc modo victa  
 erit, siue nunquam repugnauerit, vlceri vel in cutis <sup>\*interiore</sup> vltiore  
 parte, vel in glande vltimæ eam in cole reperientur: quæ ne-  
 cesse est, aut pura siccæ sint, aut humida, & purulenta. Si  
 sicca sunt, primum aqua calida fouenda sunt: deinde impo-  
 nendum lycium ex vino est, aut amurca cocta cum eodem,  
 aut cum rosa butyrum. Si leuis his humor inest, vino eluenda  
 sunt, tum butyri, & rosæ <sup>\* & mel-</sup> mollis paulum, & resinæ terebin-  
 thinæ pars quarta adiicienda est, eoque vtendū. <sup>lis</sup> Aut si pus ex  
 his profluit, ante omnia elui mulso calido debent. Tum im-  
 poni piperis p.i.\*. myrrhæ p.ii.\*. croci, misyos cocti, singu-  
 lorum p.ii.\*. Quæ ex vino austero coquuntur, donec mel-  
 lis crassitudinem habeant. Eadem autem compositio tonsil-  
 lis, vix <sup>\*manden-</sup> madentiori, nariumque vlceribus accommodata  
 est. Aliud ad eam, piperis p.i.\*. myrrhæ p.i.\*. croci p.ii.\*.  
 misyos cocti p.i.\*. aris combusti p.ii.\*. quæ primum ex  
 vino austero conteruntur, deinde vbi inaruerunt, iterum te-  
 runtur ex passi tribus cyathis, & incoquuntur, donec visci cras-  
 situdinem habeant. Ærugo quoque cum cocto melle, & ea  
 quæ

§§

quæ



\* Ac quæ ad oris vlcera suprà comprehensa sunt, curant. \* Aut Eratostheni compositio, aut Cratonis rectè super purulenta natura-  
 listæ ponitur. Folia quoque oleæ ex nouem cyathis vini co-  
 quuntur. His adiicitur aluminis scissilis p. iiii. \*. lycij p. vii. \*.  
 \* At mellis scs quicquid. \* Ac si plus puris est, id medicamentum  
 ex melle: si minus, ex vino diluitur. Illud perpetuum est,  
 post curationem dum inflammatio manet, quale supraposi-  
 tum est, cataplasma super dare, & quotidie vlcera eadem ra-  
 tione curare. Quod si pus & multum, & cum malo odore  
 cœpit profluere, elui cremore lenticulæ debet, sic, vt ei mel-  
 lis paulum adiciatur: aut oleæ, aut lentisci folia, vel marru-  
 bium decoquendum est, eoq̃ humore eodem modo cum  
 melle vtendum, imponendaq̃ eadem, aut etiam ompha-  
 cium cum melle, aut id quod ex arugine & melle ad aures  
 fit, aut compositio Andronis, aut anthera, sic, vt ei paulum  
 mellis adiciatur. Quidam vlcera omnia, de quibus adhuc  
 dictum est, lycio ex vino curant. Si verò vlcus latius atque al-  
 tius. serpit, eodem modo elui debet. Imponi verò, aut arugo,  
 aut omphacium cum melle, aut Andronis compositio, aut  
 \* myrrhæ, \* myrrhæ, aut croci, aluminis scissilis cocti, rosæ  
 \* croci, foliorum aridorum, gallæ, singulorum p. i. \*. minij sinopici  
 p. ii. \*. Quæ per se singula primùm teruntur, deinde iuncta  
 iterum melle adiecto, donec liquidi cerati crassitudinem  
 \* habeant, \* habeant: tum in æneo vase leniter coquuntur, ne super-  
 in æneo fluant. Cùm iam guttæ indurescunt, vas ab igne remouetur,  
 idq̃ medicamentum, prout opus est, aut ex melle aut ex  
 vino liquatur. Idem autem per se etiam ad fistulas vtile est.  
 Solet etiam interdum ad neruos vlcus descendere, proste it-  
 \* coacta, que pituita multa, saniestenuis malique odoris, \* non cocta,  
 at. aq. aut aquæ similis, in qua caro recens lota est. Doloresq̃  
 is locus & punctiones habet. Id genus quamuis inter puru-  
 lenta est, tamen lenibus medicamentis curandum est, quale  
 est emplastrum *παραδρυμακον* ex rosa liquatum, sicut thuris  
 quoque paulum ei misceatur. Aut id quod ex butyro, rosa,  
 resina, melle fit, suprà verò à me positum est. Præcipueq̃  
 id vlcus multa calida aqua fouendum est, velandumq̃, ne-  
 que



que frigori committendum. Interdum autem per ipsa vlcera, coles sub cute excus, sic vt glans excidat. Sub quo casu cutis ipsa circuncidenda est. Perpetuumq. est, quoties glans, aut ex cole aliquid vel excidit, vel abscinditur, hanc non esse seruandam, ne concidat, vlcerique agglutinetur, ac neque reduci possit postea, & fortasse fistulam quoque vrinae includat. Tubercula etiam, quæ *φύματα* Græci vocant, circaglandem oriuntur, quæ vel medicamentis vel ferro aduruntur: & cum crustæ exciderunt, squama æris inspergitur, ne quid ibi rursus increseat.

## ENARRATIO.

Igitur si ex.

Ac si plus puris est.

**C**ELSVS vitium hoc sequente libro *φύματα*, alij *περὶ φύματος* dicere maluerunt.

OMNE etenim vlcus, in quavis etiam parte corporis, sordidum, purgat, vel per se, aut cum iride, terræ malo aut simili aliquo mixtum.

vel lenticula.

lycio ex vino curant.

SCRIBONIVS Laryx lentem costam & ex aqua iridam, & rosaceo oleo admixtam, mirificè prodesse auctor est; & si maior tumor sit, mali granati corum ex aqua costum & trinum lenticula pari pondere miscere docet.

EST enim lycium, ut auctor est Galenus, *εργασίς*, hoc est ex diversis generis substantiis coalitum: unde quum & digeratur & desiccat non parum, & astrictionis cuiusdam particeps sit, ad vlcera continuantia, & purredines vtilissimum dicit.

De Cancro, qui in cole nascitur, curatione.

**H**ÆC citra cancrum sunt, qui cum in reliquis partibus, tum in his quoque vel præcipuè vlcera infestat. Incipit à nigritie, quæ si cutem occupavit, protinus specillum subiiciendum, eaque incidenda est, deinde oræ vulsellaprehendendæ: tum quicquid corruptum est, excidendum, sic vt ex integro quoque paulum \* demat, idq. adurendum. Quoties \* demas, quid vltum est, id quoque sequitur, vt imponenda lenticula sit, deinde vbi crustæ exciderunt, vlcera sic, vt alia, curentur. At si cancer ipsum colem occupavit, inspergenda aliqua sunt ex adurentibus, maximeq. id quod ex calce, chalcitide, auripigmento componitur. Si medicamenta vincuntur, hinc quoque scalpello quicquid corruptum est, sic vt aliquid etiam integri \* trahat, præcidi debet. Illud quoque æque perpetuum \* detrahat, est, exciso cancro vulnus esse adurendum. Sed siue ex me-

gg 2

dicamen-



dicamentis, siue ex ferro crustæ occalluerunt, magnum periculum est, ne his decidentibus ex cole profusio sanguinis insequatur. Ergo longa quiete & immobili penè corpore opus est, donec ex ipso crustæ puræ leniter resoluantur. At si vel volens aliquis, vel imprudens, dum ingreditur, immaturè crustas diduxit, & fluit sanguis, frigida aqua adhibenda est. Si hæc parum valet, decurrendum est ad medicamenta, quæ sanguinem supprimunt. Si ne hæc quidem succurrunt, aduri diligenter & timidè debet, neque villo postea motu dandus eidem periculo locus est.

## ENARRATIO.

**C**ANCER omnibus locis nascitur, maximè tamen fungosis.

protinus specillum.

**S**OLI cancri, ut auctor est Galenus, curationem huiusmodi admittunt, qui in summa parte corporis hærent, quique exulcerati sunt, atque adeò laborantes fatigant, ut ipsi vltro chirurgi operam efflagitent, & simul in talibus partibus existant,

quas rescare aut exurere vix cum radicibus possis: ac tum quidem pramonendi sunt tam astantes, quam ager ipse de periculo quod ex sanguinis profusione oriri possit: nam nisi summa cautio adhibeatur, metuendum est ne propter vasorum multitudinem, profusio sanguinis insequatur, quæ agrè sisti possit. Phagedænas autem, & alia maligna ulcera, eodem quo cancos modo curare docet Galenus.

*De Phagedæna in cole nascentis curatione.*

\* genus  
cancri  
• ibi oriri

**N**ONNVNQVAM etiam id \*genus ibi cancri, quod *φάγεται* à Græcis nominatur, \*oriri solet, in quo minimè differendum, sed protinus iisdem medicamentis occurrendum est, & si parum valent, ferro adurendum. Quædam etiam nigrities est, quæ non sentitur, & serpit, ac si sustinui-  
mus, usque ad vesicam tendit, neque succurri postea potest. Si id in summa glande circa fistulam vrinæ est, prius in ea tenue specillum demittendum est, ne claudatur: deinde id ferro adurendum. Si verò altè penetrauit, quicquid occupatum est, præcidendum est. Cæterùm eadem, quæ in aliis can-  
cris, facienda sunt.

*De Carbunculo, qui in cole nascitur.*

**O**CCALLESCIT etiam in cole interdum aliquid, id quæ omni penè sensu caret, quod ipsum quoque excidi debet.

Carbun-



Carbunculus autem ibi natus, ut primum apparet, oriculario clystere eluendus est. Deinde ipse quoque medicamentis vrendus, maximeque chalcitide cum melle, aut ærugine cum cocto melle. \* Vbi is excidit, liquidis medicamentis vtendum est, quæ ad \* ora vlcis componuntur.

\* aut ouil-  
lo stercore  
& contrito  
cum eodẽ  
melle.  
Vbi is

*De Testicularum morbis, & eorum curatione.*

**I**N testiculis verò, si qua inflammatio sine ictu orta est, sanguis ex talo mittendus est, à cibo abstinendum, imponendum \* ex faba farina ex mulso cocta, cum cumino contrito ex melle cocto. Aut contritum cuminum cum cerato ex rosa facto. Aut lini semen frictum, contritum, & in mulso coctum, aut tritici farina ex mulso cocta cum cupresso, aut lilij radix contrita. \* Aut si iidem induruerunt, imponi debet lini vel fœnigræci semen ex mulso coctum, aut ex cyprino ceratum: aut similia ex vino contrita, cui paulum croci sit adiectum. Si vetustior iam durities est, maximè proficit cucumeris agrestis radix ex mulso cocta, deinde contrita. Si ex ictu tument, sanguinem mitti necessarium est, magisque si etiam liuent. Imponendum verò vtrumlibet ex his, quæ cum cumino componuntur, supraque proposita sunt. Aut ea compositio quæ habet nitri cocti p. i. \*. resinæ pinæ, gummi, singulorum p. ii. \*. vuae tamihæ sine seminibus p. iiii. \*. mellis quantum satis sit ad ea cogenda. Quod si ex ictu testiculis aliquid \* desit, fere quoque increfcit, neque aliter succurri potest, quàm si inciso scroto, & pus emissum, & ipse testiculus excisus est.

\* cataplasma ex fabæ far. c. m. c. c. c. contrito & ex m. coacto.

\* At si

\* hæsit, f. pus quoq.

**ENARRATIO.**

In testibus verò.

**S**ERENVS Sammonicus ex vino decoquit, dicens:  
Vel bulbi ex mulso, vel cera immixta cupresso,  
Aut faba cum tepidis Bacchi decocta fluentis.

cocta cum cupresso.

IDEM tradit Plinius libro XXIIII.

capite v. & Serenus, ut iam dixi, nisi quod ceram ex mulso, cupresso, admiscet. Hippocrates cupressi ramenta, & amayacum in passo aqua temperato decoquit, atque collinit ulceratos partes.

Si vetustior iam.

ORIBASIVS & Æginesa lolij farinam eidem addunt.



*De Rhagadiis, & Condylomate, & Hamorrhoidibus,  
aliisque ani morbis, & curationibus eorum:  
& primò de Rhagadiis.*

*\* necnō in  
\* abhorren-  
das  
\* scindi-  
tur.* **A**NVS quoque multa tædiiq̃ue plena mala recipit, *\* nec* in se multum *\* abhorrentes* curationes habet. At primū in eo sæpe, & quidem pluribus locis, cutis *\* exciditur*, *Ραγάδα* Græci vocant. Id si recens est, quiescere homo debet, & in aqua calida desidere. Columbina quoque oua coquenda sunt, & ubi induruerunt, purganda: deinde alterum iacere in aqua bene calida debet, altero calido foueri locus, sic ut inuicem utroque aliquis utatur. Tum tetrapharmacum, *\* æsypum* aut rhypodes rosa diluendum est, aut *\* hyssopum* recens miscendum cum cerato liquido ex rosa facto. Aut eidem cerato liquido plumbum elotum adiciendum. Aut resina terēbinthina myrrha, aut spuma argenti vetus oleum. *\* E quol.* Et quolibet ex his id perungendum. Si quicquid læsum est, extrā est, neque intus reconditum, eodem medicamento tinctum linamentum superdandum est, & quicquid antè adhibuimus cerato contegendum. In hoc autem casu neque acris cibis *\* nec* utendum, neque asperis, nec aluum comprimentibus: *\* ne* aridum quidem quicquam satis utile est, nisi admodum paulum. Liquida, lenia, pingua, glutinosa meliora sunt. Vino leni uti nihil prohibet.

**ENARRATIO.**

**R**HAGADES siue fissura in sede sunt, *primū per medicamenta; deinde, si non* quandoque in astrictiore parte seu min- *successerint, per chirurgiam sunt.* sculo adstringente; quandoque verò in ano: *Columbina quoque oua.* & aliquando ex insistentium acrimonia consistunt; aliquando autem propter condylomatum inflammationem, partes circumscissuram sustinent. Curationes quidem *IDEM testatur Hippocrates libro De fistulis; recipit tamen pro aqua vinem nigrum, ut intestinum confrinet.*

*De Condylomate.*

**C**ONDYLOMA autem est tuberculum, quod ex quadam inflammatione nasci solet. Id ubi ortum est, quod ad quietem, cibos, potionesq̃ue pertinet, eadem seruari debent, quæ proximè scripta sunt. Iisdem etiam ouis rectè tubercu-



berculum id fouetur. Sed desidere antè homo in aqua debet, in qua verbenæ decoctæ sunt ex reprimentibus. Tum rectè imponitur & lenticula cum exigua mellis parte, & fertula campana ex vino cocta, & rubi folia contrita cum cerato ex rosa facta, & cum eodem cerato contritū vel cotoneum malū, vel malicorij ex vino cocti pars interior, & chalcitis \*cocta \* vsta atque cōtrita, deinde \* hyssopo ac rosa excepta. Et ex ea compositione, quæ habet thuris p. i. \*. aluminis scissilis p. ii. \*. cerussæ p. iii. \*. spumæ argenti p. v. \*. Quibus dum reruntur, inuicem rosa & vinum instillatur. Vinculum autem ei loco linteolum, aut panniculus quadratus est, qui ad duo capita duas ansas, ab altera verò parte totidem fascias habet: cumque subiectus est, ansis ad ventrem datis à posteriore parte in eas adductæ fasciæ coniiciuntur, atq. vbi artatæ sunt, dexteriori sinistra, sinisteriori dextra procedit, circumdataque circa aluum inter se nouissimè nodo deligantur. Sed si vetus condyloma iam induruit, neque sub his curationibus desidit, aduri medicamento potest, quod ex his constat, æruginis p. ii. \*. myrrhæ p. iiii. \*. gummi p. viii. \*. thuris p. xii. \*. stibis, papaueris lacrymæ, acaciæ, singulorū p. xvi. \*. quo medicamento quidam etiam vlcera, de quibus proximè dixi, renouant. Si \* hoc parum in condylomate proficit, adhiberi possunt etiam vehementiùs adurentia. Vbi consumptus est tumor, ad medicamenta lenia transeundum est. \* id nondum in

## ENARRATIO.

CONDYLOMATA interim cum inflammatione sunt, interim sine eadem: quæ inflammationis expertia sunt, mollia esse consueverunt; quæ verò inflammationem adiunctam habent, dura magna ex parte sunt. Celsus inflammationem solam subsequi contendit. Sunt autem condylomata tubercula quæ in sede sunt, rugâ aliquâ corporum in ano conduplicatorum insurgente, ac præter naturam intumescente; nonnulli

varices cæcas appellant: Paulus non antè quàm obcalluerit condyloma appellat; significat quando intumuit tantum, tuberculum nominat. quod & Celsus fecisse videtur, qui paulo pòst fungum vlcus pro tuberculo Æginetæ accepisse videtur: nam quid aliud per fungū velit, ingenuè fateor me ignorare.

Vinculum autem ei loco.

HVIC nō absimile est Heliodori vinculum quod inscribitur, Cassura iūctura ad anū.

## De Hemorrhoidibus.

TERTIVM autem vitium est, ora venarum \* tanquam \* tanq. ca. ex capitulis quibusdam surgentia, quæ sæpe sanguinem fundunt.



fundunt, αἱμορροΐδες Græci vocant. Idque etiam in ore vulvæ  
fœminarum incidere consuevit. Atque in quibusdam parum  
tutò supprimitur, qui sanguinis profluuium imbecilliores non  
sunt. Habent enim purgationē hanc, non morbum. Ideo  
que curati quidam cum \* sanguinis exitum non haberent,  
inclinata in præcordia ac viscera materia, subitis & grauissimis  
morbis correpti sunt. Sicuti verò id nocet, is desidere in aqua  
ex verbenis debet: imponere maximè malicorium cum ari-  
dis rosæ foliis contritum, aut ex his aliqua quæ sanguinem  
supprimunt. Solet autem \* oriri inflammatio, maximè ubi  
dura aluueum locum læsit. Tum in aqua dulci desidendum  
est, & id fouendum ouis, imponendi vitelli cum rosæ foliis  
ex passo \* subactis: idque si intus est, digito illinendum: si  
extrà, super illitum panniculum imponendum est. Ea quo-  
que medicamenta, quæ recentibus scissuris posita sunt, hic  
idonea sunt. Cibis verò in hoc casu iisdem, quibus in priori-  
bus, vtendum est. Si ista parum iuuant, solent imposita me-  
dicamenta adurentia, ea capitula absumere. At si iam vetu-  
stiora sunt, sub auctore Dionysio inspergenda sandaraca est,  
deinde imponendum quod ex his constat: Squamæ æris, au-  
ripigmenti, singulorum p. v. \*. saxi calcis p. viii. \*. postero  
die acu compungendum. Adustis capitulis fit cicatrix, quæ  
sanguinem fundi prohibet. Sed quoties is suppressus est, ne  
quid periculi afferat, multa exercitatione digerenda materia  
est. Prætereaque & viris & fœminis, quibus menstrua non  
proueniunt, interdum ex brachio sanguis mittendus est.

## ENARRATIO.

**I**DEM tradit Auicennas; atque eas tan-  
tū curationem recipere docet, quæ pro-  
muent: nam quæ in profundo delitecunt,  
incurabiles dicit: sunt enim hæmorrhoides  
quandoque in osculo uteri, quandoque in  
collo, & aliquando in ipso vtero; & ali-  
quando, licet rarò, in pudendo contingunt.  
Respondent per omnia iis quæ in ano sunt:  
nam & sanguinem sæpenumero profun-  
dunt.

## Ideoque curati quidam.

Sic Hippocrates sexto De morbis vul-  
garibus, Qui hæmorrhoides habent, inquit,  
neque peripneumonia, neque pleuritis, ne-  
que phagedæna, neque furunculo, neque tu-  
berculis terebinthi figuram habentibus, corri-  
piuntur; fortassis autem neque lepra, for-  
tassis neque vitiligine. Rationem reddidi-  
mus secundo libro, ubi multa ad locum hunc  
facientia in medium attulimus.

Si ames



*Si anus vel os vuluæ procidit, qua curatione utendum sit.*

**A**T si anus ipse, vel os vuluæ procidit (nam id quoque interdum fit) considerari debet purumne id sit, quod prouolutum est, an humore mucoso<sup>\*circum-</sup> circumdatum. Si purum<sup>detur.</sup> est, in aqua desidere homo debet, aut salsa, aut cum verbenis, vel malicorio incocta. Si humidum, vino austero subluendum est, illinendumque fæce vini combusta. Vbi utrolibet modo curatum est, intus reponendum est, imponendaque plantago contrita, vel folia salicis in aceto cocta, tum lintecolum, & supèr lana æquè deliganda, cruribus inter se deuinctis.

## ENARRATIO.

aut salsa.

plantago contrita.

**P**ER muriam (inquit Aërius) aut aquam marinam prius anum fouere solemus prolapsum; & sæpe nullo alio auxilio opus habemus.

**I**N pueris tamen astringentium usum remittere oportet, & mitiora adhibere.

*De ulcere fungo simili in ano.*

**F**VNGO quoque simile vlcus in eadem sede nasci solet. Id, si hyems est, egelida: si aliud tempus, frigida aqua fouendum est: deinde<sup>\*</sup> spuma æris inspergenda, supraque ceratum<sup>\*squama</sup> ex myrteo factum, cui paulum<sup>\*æris squa-</sup> squamæ fuliginis, calcis sit ad-<sup>ma, thuiis</sup> iectum. Si id hac ratione non tollitur, vel medicamentis ve-<sup>fol. & cal. C.</sup> hementioribus, vel ferro adurendum est.<sup>adiectum,</sup>  
<sup>si hac rat.</sup>

## CAPVT XIX.

*De digitorum vlceribus.*

**D**IGITORVM autem vetera vlcera commodissimè curantur, aut lycio, aut myrrha cocta, cum utrolibet vinum adiectum est. In iisdem recedere ab vngue caruncula cum magno dolore consuevit,  $\pi\pi\rho\upsilon\gamma\iota\omicron\nu$  Græci appellant. Oportet alumen melinum rotundum in aqua liquare, donec mellis crassitudinem habeat: tum quantum eius aridi fuit, tantundem mellis infundere & <sup>\*</sup>radiculam miscere, donec similis<sup>\*radicula</sup> h h croco



\* malunt:  
cū

\* squamæ  
æris

\* aliquid  
\* aliās  
p. IIII.

\* nascun-  
tur.

croco colore fiat, eoque illinere. Quidam ad eundem usum decoquere simul \* maluam solent: cū paria pondera aluminis aridi & mellis miscuerint. Si hac ratione ea non exciderunt, excidenda sunt: deinde digiti fouendi aqua ex verbenis, imponendumque super medicamentum ita factū: Chalcitis, malicorium, squama æris excipiuntur fico pingui leniter cocto ex melle. Aut chartæ combustæ, auripigmenti, sulphuris ignem non experti par modus cerato miscetur ex myrteo facto. Aut æruginis rasæ p. I. \*. \* squamæ p. II. \*. mellis cyatho coguntur, aut pares portiones miscentur, saxi calcis, chalcitidis, auripigmenti. Quicquid horum impositum est, tegendum linteolo aqua madefacto est, tertio die digitus resoluendus est. Si quid aridi est, iterum excidendum, similisque adhibenda curatio est. Si non vincitur, purgandus scalpello, tenuibusque ferramentis adurendus est, & sicut reliqua vsta curandus est. At vbi scabri vngues sunt, circumaperiri debent, quā corpore contingunt, tunc super eos ex hac compositione \* æquē imponi sandaracæ, sulphuris, singulorum p. II. \*. nitri, auripigmenti, singulorū \* p. II. \*. resinæ liquidæ p. VIII. \*. Tertioque id die resoluendum est. Sub quo medicamento vitiosi vngues cadunt, & in eorum locum meliores \* renascuntur.

#### ENARRATIO.

πτερυγίων.

SVNT nonnulli qui perperam πτερυγίων cum πτερυγίαις, hoc est Latinorum Redumiis, confundant, atque idem esse existiment; quod πτερυγίων has magnā ex parte subsequi soleat. Est autē πτερυγίων (quem admodum auctor est Ægineta libro 6. cap. 85.) in unguitibus carnis incrementum partem unguis operiens. Fit autem potissimum in pedis natiisque pollicibus. in pedibus quidem ex offensione magna ex parte: in

manibus autem ex neglecta redumiā, & post inflammationem in pus mutatā.

excipiuntur fico.

ABTIVS caricis pingues torret, ita ut probe teri possint; atque sic cum melle misceat.

At vbi scabri vngues.

GRÆCI leprosos vngues dicunt: Auicenna baras, & lepram patientes vngues vocat: Celsus, sicut & Plinius, scabros dicere maluit.

AVRE-



A V R E L I I  
C O R N E L I I C E L S I  
D E  
R E M E D I C A  
L I B E R S E P T I M V S ,  
D E C H I R V R G I A .

A BALDVINO RONSSEO *Gandensi, medico,*  
*Enarrationibus illustratus.*

*De Chirurgica, & qui in ea claruerint, & qualis  
esse Chirurgus debeat, & quid in hoc  
libro describatur.*



**T**ERTIAM esse medicinæ partem, quæ manu curet, & vulgo notum, & à me propositum est. Ea non quidem medicamenta atque victus rationem omittit, sed manu tamen plurimum præstat, estque eius effectus inter omnes medicinæ partes evidentissimus. Siquidem in morbis cum multum fortuna conferat, eademque sæpe salutaria, sæpe vana sint, potest dubitari secunda valetudo medicinæ, an corporis beneficio contigerit. In his quoque, in quibus medicamenti maxime nitimur, quamvis profectus evidentior est, tamen sanitatem & per hæc frustra quæri, & sine his reddi sæpe manifestum est. Sicut in oculis quoque deprehendi potest, qui à medicis diu vexati, sine his interdum sanescunt. At in ea parte, quæ manu curat, evidens est, omnem profectum, ut aliquid ab aliis adiuuetur, hinc tamen \* plurimum trahere. \* vt plur.  
Hæc autem pars cum sit vetustissima, magis tamen ab illo parente omnis medicinæ Hippocrate, quam à prioribus ex-  
h h z culta



culta est. Deinde posteaquàm diducta ab aliis habere professores suos cœpit, in Ægypto quoque increuit, Philoxeno maximè auctore, qui pluribus voluminibus hanc partem diligentissimè comprehendit. Gorgias quoque & Sostratus, & <sup>\*Heronēs,</sup> Hieron, & Apollonij duo, & Ammonius Alexandrinus, multiq̃ue alij celebres viri, singuli quædam reppererunt. Ac Romæ quoque non mediocres professores, maximeq̃ue nuper Tryphon pater, & Euelpistus, <sup>\*Phlegestis filius,</sup> & ut ex scriptis eius intelligi potest, horum eruditissimus Meges, quibusdam in melius mutatis, aliquantum ei disciplinæ adiecerunt. Esse autem chirurgus debet adolescens, aut certè adolescentiæ propior, manu strenua, stabili, nec unquàm intremescente, eaq̃ue non minus sinistra, quàm dextra promptus, acie oculorum acri, claraq̃ue, animo intrepidus, immisericors, sic ut sanari velit eum, quem accipit, non ut clamore eius motus, vel magis quàm res desiderat, properet, vel minus quàm necesse est, secet: sed perinde faciat omnia, ac si nullus ex vagitibus alterius affectus oriatur. Potest autem requiri, quid huic parti propriè vendicandum sit, quia vulnerum quoque vlcèrumq̃. multorum curationes, quas alibi executus sum, chirurgi sibi vendicant. Ego eundem quidem hominè posse omnia ista præstare concipio. Atque ubi se diuiserunt, eum laudo, qui quamplurimum percipit. Ipse autem huic parti ea reliqui, in quibus vulnus facit medicus, non accipit, & in quibus vulneribus vlcèribusq̃ue plus perfici manu, quàm medicamento credo: tum quicquid ad ossa pertinet, quæ deinceps exequi adgreddiar, dilatisq̃ue in aliud volumen ossibus, in hoc cætera explicabo: præpositisq̃ue his, quæ in qualibet parte corporis sunt, ad ea, quæ proprias sedes habent, transibo.

## CAPVT I.

*De Luxatis.*

<sup>\*detergeturq̃ue</sup> **L**UXATA igitur, in quacunque parte corporis sunt, quamprimum sic curari debent, ut quâ dolor est, ea scalpello cutis crebro incidatur, <sup>\*detergeturq̃ue</sup> eodem aduerso profluens



fluens sanguis. Quod si paulò tardiùs subuenitur, iamque etiam rubor est, quæ rubet corpus, si tumor quoque accessit, quacunque is est, id optimum auxilium est. Tum superdanda reprimentia sunt: maximeque lana succida ex aceto & oleo. Quod si leuior is casus est, possunt etiam sine scalpello imposita eadem mederi. Et si nihil aliud est, cinis quoque maximè ex sarmentis. Si is non est, quilibet alius ex aceto, vel etiam ex aqua coactus.

## ENARRATIO.

Luxata igitur.

IMPROPRIE admodum luxationis nomine hic usus videtur Celsus pro con-

iusione: clarum namque est luxatum mem-  
brum id propriè dici, quod suo loco motum  
est; de quo sequenti libro tractat.

## CAPVT II.

*De his quæ per se intumescunt, quomodo  
excidenda, & curanda sint.*

VERVM hoc quidem promptum est. In his autem ne-  
gotium maius est, quæ per se vitio intus orto intume-  
scunt, & ad suppurationem spectant. Ea omnia genera abs-  
cessuum esse aliàs proposui, medicamentaque eis idonea exe-  
cutus sum. Nunc superest, vt dicam in iisdem quæ manu  
fieri debeant. Ergo priusquam indurescant, cutem incidere,  
& cucurbitulam accommodare oportet, quæ quicquid illuc  
malæ corruptæque materiæ coit, extrahat, idque iterum ter-  
tioque rectè fit, donec omne iudicium inflammationis \*ex-  
cidat. Neque tamen fas non est, nihil \*cucurbitula agere. \*excedat.  
Interdum enim, sed rarò, quicquid abscedit, velamento suo \*cucurbi-  
includitur, id antiqui tunicam nominabant. Meges, quia tunicam  
tunica omnis neruosa est, dicit non nasci sub eo vitio neruum,  
quo caro consumeretur, sed subiecto iam vetustiore pure cal-  
lum circumdari. Quod ad curationis rationem nullo loco per-  
tinet, quia quicquid dixi, si tunica est, idem si callus est, fieri  
debet. Neque vlla res prohibet, etiam si callus est, tamen  
quia cingit, tunicam nominari. Tum pure quoque maturior  
h h 3. hæc



hæc interdum esse consuevit. Ideoque quod sub ea est, extrahi per cucurbitulam non potest. Sed facile id intelligitur, vbi nihil admota illa mutauit. Ergo siue id incidit, siue iam durities est, in hac auxilij nihil est. Et vt aliàs scripsi, vel auer- tenda concurrens eò materia, vel digerenda, vel ad maturita- tem perducenda est. Si priora contigerunt, nihil præter ea necessarium est. Si pus maturuit in alis quidem & in ingui- nibus, raro secandum est. Item vbiunque mediocris abs- cessus est. Item quoties in summa cute, vel etiam carne vi- tium est, nisi festinare \* curantis imbecillitas cogit. Satisque est \* cataplasmata efficere, vt per se pus aperiatur. Nam fere sine cicatrice potest esse is locus, qui expertus ferrum non est. Si autem altius malum est, considerari debet, neruofutne is locus sit, an non sit. Nam si sine neruis est, candenti ferra- mento aperiri debet. Cuius hæc gratia est, quod exigua pla- ga diutius ad pus euocandum patet, paruaque postea cicatrix fit. At si nerui iuxta sunt, \* in his periculum est, ne vel disten- dantur hi, vel membrum debilitent. Necessaria verò opera scalpelli est. Sed cætera etiam subcruda aperiri possunt. Inter neruos verò vltima expectanda maturitas est, quæ cutem ex- tenuet, ei que pus iungat, quod propius reperiatur. Itemque \* aliam rectam \* plagam desiderant in \* carne, quia fere vehe- menter cutem \* extenuat, tota ea super pus excidenda est. Semper autem vbi scalpellus admouetur, id agendum est, vt & quam minimæ, & quàm \* parcissimæ plagæ sint: cum co- tam vt necessitati succurramus & in modo & in numero. Nam maiores sinus, latius interdum etiam in duabus aut pluri- bus lineis incidendi sunt. Dandaque opera, vt unus sinus exi- tum habeat, nequis humor intus subsidat, qui proxima & ad- huc sana rodendo sinuet. Est etiam in rerum natura, vt cutis latius excidenda sit. Nam vbi post longos morbos totus cor- poris habitus \* vitiatus est, lateque se sinus \* diffudit, & in co- pars cutis pallor, scire licet eam iam emortuam esse, & inuti- lem futuram. Ideoque excidere commodius est, maximè si circa articulos maiores id euenit, cubantemq. agrum fluens alius \* exercuit, neque per alimenta quicquam corpori acce- dit.

\* cebantis

\* catapla-  
smatis

\* in hoc.

\* alia

\* solum pl.

\* cute: a-

lia, quia

\* extenuat,

\* paucis-

simæ

\* suffudit,

\* exhau-  
rit, al. ex-  
hausit,



dit. Sed excidi ita debet, ut plaga ad similitudinem myrtei folij fiat, quo facilius sanescat. Idque perpetuum est. \* Vbi-  
cunque medicus ex quacunque causa cutem excidit, pure  
effuso in alis vel inguinibus, linamento opus non est. Spon-  
gia ex vino imponenda est. In cæteris partibus si æquè ea li-  
namenta superuacua sunt, purgationis causa paulum mellis  
infundendum, dein glutinantia super danda. Si illa necessi-  
ria sunt, super ea quoque similiter dari spongia eodem modo  
ex vino expressa debet. Quando autem linamentis opus sit,  
quando non sit, aliàs dictum est. Cætera eadem, incisa sup-  
puratione, facienda sunt, quæ ubi per medicamenta rupta est,  
facienda esse proposui.

\*, vbi. m.  
& quac.  
de cau. c.  
excidat.  
Pure.

## ENARRATIO.

**A**BSCISSVM, ἀπόσκη Græci vo-  
cant, eius duplex genus est, ut xliii.  
methodi docendi docet Galenus; unum, quum  
phlegmone in pus versâ, pus ipsum tanquam  
in sinu aliquo est collectum; alterum, quum  
nulla præcedente phlegmonè humor aliquis  
statim ab initio, isq; aliis specie aliis, catæ-  
rurum omnino acris, in parte aliqua colligitur.  
Porro excoriat hic circumposita corpora, spa-  
cium videlicet sibi moliens, vel inter duas  
innicas, vel sub certis membranis.

## Ergo priusquam.

**E**TSI quam maxime utilis sit usus  
cucurbitæ; cavendum tamen est, ne ante  
universalem purgationem applicetur, quod  
periculum sit ne plus noxii humoris ad par-  
ticulam affectam attrahatur, quam per ean-  
dem enacuari possit.

## Si pus maturuit.

**I**DEM suadere videtur Galenus xlii.  
methodi Therapeutice: Si pus aliquod, in-  
quit, notabile in suppurante particula sit  
contentum, non expedit (quod nonnulli fa-  
ciunt) protinus incidere; imò exhalationem  
moliri medicamentis ad id valentibus, quo-  
rum usus ex effectu sit contestatus. A duris  
autem abstinendum est; qualia emplastra  
sunt: nam & phlegmones reliquas contra-

hant, & rursus phlegmonem in egra parte  
excitant; quo fit ut Celsus cataplasmata sa-  
tis id efficere dixerit. Verum cur si in-  
flammationi contumax sit phlegmon, in alis  
& inguinibus raro secundum dicitur, admo-  
dum demoror; præsertim quando Galenus,  
Aetius, atque alij omnes iurepide sectionem  
faciant, adhibita interim cautione, ne ner-  
uos, arterias aut tendones incidamus. Nam  
alioqui si ultra tempus sectionem differamus,  
gravissimo symptomati fenestram aperiemus.  
Siquidem (ut secundo De arie curatio ad  
Glaucōnem libro Galenus) tumores qui in  
abscessum vertuntur, tarde inciduntur, aut  
medici imperitia, aut eorum qui curantur  
timiditate, sectionem non admittunt,  
sed diutius protelando, cutem ab eiusmodi  
pure erodi sistantium. hanc videri a  
congesto in abscessu pure, atritii panniculi  
in modum, vehementer attenuari sæpè con-  
tingit, unde & eiusmodi cutem ægrè coa-  
lescere videmus. Resectione igitur tam in  
alis quam in inguinibus, ex Galeni & Aetij  
Amideni præscripto, utemur ad myrtei folij  
formam, longa videlicet & angusta; quis  
etiam si sit ferat occasio, ut sub axillis pars  
aliqua ex erosione computruerit, non ve-  
rentur portionem aliquam suppurantis par-  
tis excindere.

Semper



Semper autem.

SI QUIDEM magnarum sectionum occasione, ut auctor est Galenus libro XIII. Methodi. particula ubi ad cicatricem est perducta, non solum turpissima redditur, sed etiam sit imbecillis, & quæ saepe homini ad mortem sit in mora.

ad similitudinem myr-  
rei folij.

SECTIO quæ myriacei folij formam

imitatur, est longitudinis, quàm latitudinis maioris, ac facillimè curationem admittit: nam circularis figura ad curationem inidonea est, atque ob id rotunda ulcera difficilius curationem recipere dicunt.

linamento opus non est.

GALENVS tantum siccantibus utitur. De mellis preparaturâ legio eundem De arte curativa secundo.

### CAPVT III.

De bonis malisque signis exulceratorum.

PROTINVS autem quantum curatio efficiat, quantumque aut sperari aut timeri debeat, ex quibusdam signis intelligi potest, fereque iisdem quæ in vulneribus exposita sunt. Nam bona signa sunt, somnum capere, facile spirare, siti non confici, cibum non fastidire, si febricula fuit, ea vacare. Itemque habere pus album, \*leue, non fœdi odoris. Mala sunt, vigilia, spiritus grauitas, sitis, cibi fastidium, febris, pus nigrum, aut feculentum, & fœdi odoris. Item procedente curatione eruptio sanguinis: aut si antequàm sinus carne impleatur, ora \*carnosæ fiunt. Illa quoque ipsa carne hebet nec firma, deficere tamen animam, vel ipsa curatione vel postea, pessimum omnium est. Quinetiam morbus ipse siue subito solutus est, dein suppuratio exorta est, siue effuso pure permanet, non iniuste terret. Estque inter causas timoris, si sensus in vulnere rodentium non est. Sed ut hæc ipsa fortuua huc illucve \*discernit, sic medici partium est, eniti ad \*reperiendam sanitatem. Ergo quoties vlcus \*resiluerit, eluere id: si reprimendus humor videbitur, vino ex aqua pluuiatili misto, vel aqua in qua lenticula cocta sit, debebit. Si purgandum erit, mulso: rursusque imponere eadem. Vbi iam repressus videbitur humor, vlcusque purum erit, produci carnem conueniet, & foueri vulnus pari portione vini ac mellis, superque imponi spongia ex vino & rosa tincta. Per quæ

\* laue

\* callosæ fiunt, il. q. i. c. h. n. firma. Deficere t. a. vel in ipsa

\*decernit,

\*recupera-

\*resiluerit,



quæ cum caro producat, plus tamen (ut aliàs quoque dixi) victus ratio eo confert, id est solutis iam febribus & cibi cupiditate reddita, balneum rarum, quotidiana, sed lenis, gestatio, cibi portionesque corpori reficiendo: \* Aptæque omnia quæ per medicamenta suppuratione quoque rupta sequuntur, sed quia magno malo vix sine ferro mederi licet, in hunc locum reseruata sunt.

\* aptæ.  
Quæ o. p.  
m. l. q. ru-  
pta seq.

## ENARRATIO.

Itemque habere pus  
album.

& foueri vulnus.

PUS, inquit in Prædictionibus Hippocrates, optimus est, si candidum, æquale, lenique & quam minimè fetidum est: maxime verò contrarium huic, deterrimum est; nam quod putidum, & graneolens est, putrefactionem denotat.

VINUM enim per se inter omnia præsidia est aptissimum, quum glutinandi vim quam habet ulceribus necessariam ad penitiores usque partes transmittat: hinc Hippocrates, Ulcera, inquit, vniuersa nisi vino humectare non oportet, si non in articulo fuerit ulcus. Celsus ad modicam absterisionem non omnino malè mel addidit.

## CAPVT IIII.

## De fistulis.

ADVERSUS fistulas quoque, si altius penetrant, ut ad ultimas demitti collyrium non possit, si tortuosæ sunt, si multiplices, maius in manu quàm in medicamentis præsidium est, minusque operæ est, si sub cute transuersæ feruntur, quàm si rectè intus tendunt. Igitur si sub cute transuersa fistula est, demitti specillum debet, supraque id ea incidi: si flexus reperiuntur, hi quoque simul specillo & ferro \*persequendi sunt. Idemque faciendum, si plures se quasi ramuli ostendunt. Vbi ad fines fistulæ ventum est, excidendus ex toto callus est, superque fibulæ dandæ, & medicamentum quo glutinetur. At si rectè subter tendit, vbi, quò maximè ferat, specillo exploratum est, \*excidi is sinus debet, dein fibula oris cutis iniicienda est, & æquè glutinantia medicamenta superdanda sunt. Aut si corruptius vlus, quod interdum ossè vitiato fit, vbi id quoque curatum est, pus mouentia. Solent autem inter costas fistulæ subter \*exire: quod vbi incidit, eo

\* rectæ

\* persequen-  
di

\* incidi

\* ire,



\* autē ubi

loco costa ab utraque parte decidenda & eximenda est, ne quid intus corruptum relinquatur: solent \* ubi crustas transierunt, septum id, quod transversum à superioribus visceribus intestina discernit, violare. Quod intelligi & ex loco, & ex magnitudine doloris potest, & quia nonnunquam spiritus eò cum humore quasi bullante prorumpit, maximeque si hunc ore ille continuit. In eo medicamini locus nullus est. In ceteris verò quæ circa costas sanabilia sunt, pingua medicamenta inimica sunt, ceteris quæ ad vulnera accommodantur, uti licet. Optimè tamen sicca linamenta, vel, si purgandum aliquid videtur, in melle tineta imponuntur. Ventri nullum os subest, sed ibi perniciosæ admodum fistulæ fiunt, adeo ut Solstratus insanabiles esse crediderit. Id non ex toto ita se habere usus ostendit. Et quidem (quod maximè mirum videri potest) tutior fistula est contra iecur, & lienem, & ventriculum, quam contra intestina: non quo perniciosior res ibi sit, sed quo alteri periculo locum faciat. Cuius experimento moti quidam auctores parum modum rei cognoverunt. Nam venter sæpe etiam telo perforatur, prolapsaque intestina conduntur, & oras vulneris futura comprehendunt, quod quemadmodum fiat, mox indicabo. Itaque etiam ubi tenuis fistula abdomen perumpit, excidere eam licet, futuraque oras coniungere. Si verò ea fistula intus patuit, excisa necesse est latius foramen relinquat, quod nisi magna vi utique ab interiore parte sui non potest, qua quasi membrana quædam finit abdomen, quam *περιτόριον* Græci vocant. Ergo ubi aliquis ingredi ac moveri cœpit, rumpitur illa futura, arque intestina solvantur. Quo fit, ut pereundum homini sit. Sed non omni modo res ea desperationem habet. Ideoque tenuioribus fistulis adhibenda curatio est.

\* scripserunt, parum tamen modum.

## E N A R R A T I O.

pus mouentia.

habet; cephalica autem omnia secantia.

POST callosarum partium sectionem, carnosius quidem partibus suppurandi distanti exilientis, & desquamata ossa exiccare conabimur, inquit Aetius Basilicenus quidam emplastrum suppurandi vim

Solent autem.

PAVLVS Ægimetra nequaquam attingendas, vel certe cum multa artificiosa diligentia attingendas dicit.

De ani



*De ani fistulis.*

**P**ROPRIAM etiamnum animaduersionem desiderant <sup>\* ex,</sup>  
<sup>\* hanc ad</sup>  
<sup>has</sup>  
 ea, quæ in ano sunt. In hac demisso specillo, ad vlti-  
 mum eius caput incidi cutis debet, dein nouo foramine spe-  
 cillum educi lino sequente, quod in aliam eius partem ob idi-  
 psum perforatam coniectum sit. Ibi lino prehendum,  
 vinciendumque cum altero capite est, vt laxè cutem, quæ su-  
 per fistulam est, teneat. Idque lino esse debet crudum, &  
 duplex triplexve, sic tortum vt vnitas facta sit. Interim autem  
 licet negotia agere, ambulare, lauare, cibum capere perinde  
 atque sanissimo. Tantummodo id lino bis die saluo nodo  
 ducendum est, sic vt subeat fistulam pars quæ <sup>\* superior</sup> fuerit.  
 Neque committendum est, vt id lino putrescat. Sed ter-  
 tio quoque die nodus resoluendus est, & ad caput alterum re-  
 cens lino alligandum, eductoque vetere, id in fistula cum  
 simili nodo relinquendum. Sic enim id paulatim cutem, quæ  
 supra fistulam est, incidit, simulque & id sanescit, quod à li-  
 no relictum est, & id quod ab eo morderetur, inciditur. Hæc  
 ratio curationis longa, sed sine dolore est. Qui festinat, astrin-  
 gere cutem lino debet, quo celerius secet, noctuque <sup>\* penicil-</sup>  
<sup>\* ex pen.</sup>  
 lo tenuia quædam intus demittere, vt cutis hoc ipso extenue-  
 tur, quo extenditur. Sed hæc dolorem mouent. Adijcitur ce-  
 leritati <sup>\* sic</sup>, vt tormento quoque, si & lino & id quod ex <sup>\* sicut</sup>  
 penicillo est, aliquo medicamento illinitur, ex his quibus cal-  
 lum exedi posui. Poterit tamen fieri vt ad scalpelli curatio-  
 nem etiam illud loci veniendum sit, si intus fistula fert, si mul-  
 tiplex est. Igitur in hac genera demisso specillo duabus lineis  
 incidenda cutis est, vt media inter eas habenula tenuis admo-  
 dum eiciatur, ne protinus <sup>\* ora</sup> ora coeant, sitque locus aliquis  
<sup>\* ora</sup>  
 linamentis, quæ quàm paucissima superinijcienda sunt, om-  
 niaque eodem modo faciendâ, qui in abscessibus positus est.  
 Si verò ab vno ore plures sinus erunt, <sup>\* rectè</sup> fistula scalpello  
<sup>\* rectè</sup>  
 erit incidenda, ab eo cæteræ quæ iam patebunt lino excipien-  
 dæ: si intus aliqua procedet, quod ferrum tutò peruenire non  
 poterit, collyrium demittendum erit. Cibus autem in omni-



bus eiusmodi casibus, siue manu siue medicamentis, agetur, dari debet humidus, potio liberalis, diuque aqua: ubi iam caro increfcit, tum demum & balneis raris vtendum erit, & cibis corpus implentibus.

## ENARRATIO.

In hac demisso specillo.

PAVLVS Ægineta, hanc per linum curandi rationem, ad eos tantum pertinere ait, qui scalpelli pertimescunt. Ceterum Celsus hunc medendi modum ex Hippocratis libro De fistulis mutuatus est, ubi sic habet: Crudum linum tenuissimum accipio, & ad palmi longitudinem quinquuplicato, & pilum equinum circumdato; deinde facto specillo stanneo in summa parte perforato, & initio lini complicati in specil-

lum immisso, in fistulam demittito, & simul sinistra manus digiti in sedem indito, &c.

Neque committendum est.

HIPPOCRATES ne putrescat, equinâ setâ obuoluit.

Qui festinat.

GALENVS in eiusmodi casu perquirendum ab egrotante dicit, malit ne tardius ac sine magna molestia sanari, an celerius, sed cum maiore tormento.

## CAPVT V.

De Telis è corpore extrahendis.

TELA quoque quæ illata corporibus intus hæserunt, magno negotio sæpe eiciuntur. Suntque quædam difficultates ex generibus eorum, quædam ex his sedibus, in quas illa penetrarunt. Omne autem telum extrahitur, aut ab ea parte qua venit, aut ab ea in quam tetendit. Illic viam qua redeat, ipsum sibi fecit. Hic à scalpello accipit. Nam contra mucronem caro inciditur. Sed si non altè telum insedit, & in summa carne est, aut certè magnas venas & loca neruosa non transit, nihil melius est, quàm quàm venit, id euellere. Si verò plus est, per quod telo reuertendum, quàm quod perumpendum est. iamque venas neruosque id\* transit, commodius est aperire quod superest, \*itaque extrahere. Nam & propius petitur, & tutius euellitur, & in maiore membro si medium mucro transit, facilius sanescit quod peruium est, quia vtrunque medicamento fouetur. Sed si retro telum recipiendum est, amplianda scalpello plaga est, quo facilius id sequatur, quoque minor oritur inflammatio: quæ maior fit,

\*transit,

\*eaque  
alac ita



fit, si ab illo ipso telo dum redit, corpus laniatur. Item si ex alia parte vulnus aperitur, laxius esse debet, quam ut telo postea transeunte amplietur. Summa autem utraque parte ita habenda cura est, ne nervus, ne vena maior, ne arteria incidatur. Quorum ubi aliquid detectum est, excipiendum huiusmodi retuso est, abducendumque scalpello. Vbi autem satis incisum est, telum eximendum est, tum quoque eodem modo & eadem cura habita, ne sub eo quod eximetur, aliquid eorum laedatur, quæ tuenda esse proposui. Hæc communia sunt. Propria quædam in singulis telorum generibus subiicienda sunt, quæ protinus subiiciam. Nihil tam facile in corpore quam sagitta conditur, eademque altissime insidit. Hæc autem eveniunt, & quia magna vi fertur illa, & quia ipsa in angusto est. Sæpius itaque ab altera parte, quam ex qua venit, recipienda est, præcipueque quia fere spiculis cingitur, quæ magis laniant, si retro, quam si contra trahuntur. Sed inde aperta via, caro diduci debet ferramento ad similitudinem facti Græcæ literæ  $\psi$ . Deinde ubi apparuit, si mucro, si arundo inhæret, propellenda est, donec ab altera parte apprehendi & extrahi possit. Si iam illa decidit, solumque intus ferrum est, mucro vel digitis apprehendi, vel forcice, atque ita educi debet. Neque alia ratio extrahendi est, ubi ab ea parte qua venit, euelli magis placuit. Nam ampliato vulnere, aut arundo, si inest, euellenda est: aut si ea non est, ferrum ipsum. Quod si spicula apparuerunt, eaque brevia & tenuia sunt, forcice ibi comminui debent, vacuumque ab his telum educi: si ea maiora valentioraque sunt, fistis scriptoris calamis contegenda, ac ne quid lacerent, sic euellenda sunt. Et in sagittis quidem hæc observatio est. Latum verò telum si conditum est, ab altera parte educi non expedit, ne ingenti vulnere ipsi quoque ingens vulnus adiciamus. Euellendum est ergo genere quodam ferramenti, quod Diocleum Græci graphiscum vocant, quoniam auctore Dioclem habet, quem inter præcos maximosque medicos fuisse iam posui. Lamina vel ferrea vel ænea etiam ab altero capite duos utrinque deorsum conuersos uncas habet, ab altero duplicata latetibus,



\* extrema,  
leuiterque  
in

\* leuiterque extrema in eam partem inclinata, quæ sinuata est, insuper ibi etiam parte inclinata, quæ perforata est. Hæc iuxta telum transuersa demittitur. Deinde, ubi ad imum mucronem ventum est, paulum torquetur, ut telum foramine suo excipiat. Cum in cauo mucro est, ilico duo digiti subiecti partis alterius vncis, simul & ferramentum id extrahunt & telum. Tertium genus telorum est, quod interdum euelli debet, plumbea glans, aut lapis, aut simile aliquid, quod perrupta cute, integrum intus infedit. In omnibus his latius vulnus aperiendum, idque quod inest, ea quæ venit, forfice extrahendum est. Accedit verò aliquid difficultatis sub omni ictu, si telum vel ossi inhaesit, vel in articulo se inter duo ossa demersit, in esse usque eo mouendum est, donec is locus laxetur, qui mucronem momordit, & tum vel manu vel forfice telum extrahendum est, quæ ratio in dentibus quoque eiciendis est. Et vix vnquam ita telum non sequitur. Sed si morabitur, excuti quoque \* ictum aliquo ferramento poterit. Vltimum est, ubi non euellitur, terebra iuxta forare, ab eo quoque foramine ad speciem literæ ¶ contra telum os excidere, sic ut lineæ quæ \* deducuntur, ad telum spectent: eo facto id necesse est labet, & facile auferatur. Inter duo verò ossa si per ipsum articulum peruerit, circa vulnus duo membra fasciis haberi sive deliganda, & per has in diuersas partes diducenda sunt, ut nervos distendant. Quibus extentis laxius inter ossa spatium est, ut sine difficultate telum recipiatur. Illud videndum est, sicut in aliis locis posui, ne quis nervus, aut vena, aut arteria à telo lædatur, dum id extrahitur, eadem scilicet ratione quæ supra posita est. At si venenato quoque telo qui ictus est, iisdem omnibus, si fieri potest, etiam festinantius actis adiicienda curatio est, quæ vel epoto veneno, vel à serpente ictis adhibetur. Vulneris autem ipsius extracto telo medicina non alia est, quàm quæ esset, si corpore icto nihil inhaesisset. De qua satis alio loco dictum est.

\* victum

\* diducuntur,

ENAR-



## ENARRATIO.

**P**ROLIXE admodum Gelsus atque clarè telorum eximendorum rationem edocuit; adeò ut ampliore enarratione non egeat.

## Diocleum.

**I**OANNES Casarius, legendum for-  
tassis beleleum, ἀπὸ τοῦ βίλ & ἡλ & λε,   
vel beleleum ex eadem derivatione; sed  
κατὰ συνήθειαν ἡλ & vocalium. Ægine-

ta eiusdem meminit; alij Diocleum à Diocle  
inventore nominant.

## At si venenato.

**PAVLVS** Ægineia totam carnem quæ  
veneno iam immutata est, si quidem fieri  
poteat, præcidere iubet; ἀγροῦ, si autem carnem  
quod à sana carne differat: pallida enim,  
sublimida, & velut emortua apparet.

## CAPVT VI.

*De Gangliis, & Meliceride, & Atheromate, &  
Steatomate capitis tuberculis.*

**H**ÆC venire in qualibet parte corporis possunt. Reliqua  
certas sedes habent, de quibus dicam, orsus à capite. In  
hoc multa variaque tubercula oriuntur, γαγγλία, μελικεριδας,  
& ἀθήρωματα nominant, aliisque etiamnum vocabulis quæ-  
dam alij discernunt, quibus ego στατώματα quoque adiciam.  
Quæ quamvis & in ceruice & in alis & in lateribus oriri so-  
lent, per se tamen non posui, cum omnia ista mediocres dif-  
ferentias habeant, ac neque periculo terreant, neque diuerso  
genere curentur. Omnia autem ista & ex partuulo incipiunt,  
& diu paulatimque increfcunt, & tunica sua includuntur.  
Quædam ex his dura ac renitentia, quædam mollia ceden-  
tiaque sunt: quædam spatio nudantur, quædam recta capillo  
suo permanent, fereque sine dolore sunt. Quid intus ha-  
beant, ut coniectura præfagiri potest, sic ex toto cognosci,  
nisi cum eiecta sunt, non potest. Maximè tamen in his quæ \* ex cta  
renitentur, aut lapillis quædam similia, aut concreti confer-  
ti que pili reperiuntur. In his verò quæ cedunt, aut melli si-  
mile aliquid, aut tenui puliculæ, aut quasi rasæ cartilagini,  
aut carni hebeti, & cruentæ, quibus aliqui colores esse con-  
fuerunt, fereque ganglia renitentur. Atheromati subest,  
quasi tenuis pulicula. Meliceridi liquidior humor, ideoque  
pressus



\* & sub c.  
es scara-  
retur,

pressus circumfluit. Scatomati pingue quiddam, idque latissimè patere consuevit, resoluitque totam cutem superpositam, sic, ut ea labet, cum in cæteris sit adstrictior. Omnia derafa antè, si capillis conteguntur, per medium oportet incidere: sed scatomatis tunica quoque secanda est, ut effundatur quicquid intus coit: quia non facilè à cute, \* subiecta carne, ea separatur. in cæteris ipsa tunica inuiolata seruanda est. Protinus autem alba & intenta se ostendit. Tum scalpelli manubiolo diducenda à cute & à carne est, eiciendaque cum eo quod intus tenet. Si quando tamen ab inferiore parte tunicæ musculus inhæsit, ne is lædatur, superior pars illius decidenda, alia ibidem relinquenda est. Vbi tota exempta est, committendæ oræ, fibulaque his iniicienda, & super medicamentum glutinans dandum est. Vbi vel tota tunica, vel aliquid ex ea relictum est, pus mouentia adhibenda sunt.

#### ENARRATIO.

γᾶλῳ.

CELSVS ganglia in capite potissimum oriri dicit; quamvis & alias sedes habeant: Paulus & Aëtius id negant, ac frequentius quidem manuum iuncturas ac talos occupare dicunt, rariūque cutium & caput. Est autem ganglium tumor inaequalis, parvus, & dum comprimitur stupidum sensum exhibens, non in alto, sed ipsa sub cute radices agens.

neque diuerso genere.

GANGLIA tamen, si talos aut manuum iuncturas obfederint, sectionem recusant, quā alioqui in capite admittunt; quum alias periculum esset ne sectione pars affecta vitula redderetur.

& tunica sua includuntur.

IN hoc ab abscessibus differunt, qui nulla peculiari membrana, aut tunica inclusi sunt.

Maximè tamen in his.

VIDETVR hic tacitè innuere tuberculi quandam speciem, in qua res diuersæ conti-

nentur; exempli causa, cænum, rhantus, mucus, ossa, pili, lapides, ostraca, & id genus alia, quale non ita dudum videre contigit. Erat supra gigni tumor, quem nec omnino remittentem, nec cedentem rectè appellaueris. hic indies magis ac magis excresecbat; & quum medicamentis non cederet, ad manus operam deuenimus. incisione igitur facta primum sanguis, deinde substantia quadam papyro bibula non aliusmodi sese obtulit; quam cum paulatim cum sua tunica euulsissemus, vulnus sicuti reliqua recentia vulnera restituiimus. Aëtius sub atheromate comprehendisse videtur, quum dicit, aliquando in pultaceo humore lapidosa quadam duraque corpora, & alia tanquam sulphurisamenta comprehendit; aliquando velut gallinarum ossicula mansa; interdum etiam se uinisse testatur velut pilos crassissimo humore complicatos.

sed scatomatis tunica.

IN meliceride & atheromate tunica incisionē formidamus, quod nimirum si humor euacuatus fuerit, ac tumor conciderit,

tunica



tunica difficulter excoriari & curari poterit: rem quum adiposa illa pinguedo difficulter effluat, in tunica disseitione, usque adeo vrgens periculum non est; quod quum non concidat tumor, leni occasione tunicam ipsam eduxeris.

## CAPVT VII.

*De oculorum vitiis quæ scalpello & manu curantur.*

**S**ED vt hæc neque genere vitij neque ratione curationis inter se multum distant, sic in oculis, quæ manum postulant, & ipsa diuersa sunt, & aliter aliterque curantur. Igitur in superioribus palpebris vesicæ nasci solent pingues grauesque, quæ vix attollere oculos sinunt, leuesque pituitæ cursus, sed assiduos in oculis mouent. Fere verò in pueris nascuntur. Oportet compresso digitis duobus oculo, atque ita cute intenta, scalpello \*transuersam lineam incidere, suspensa leuiter manu, ne vesica ipsa vulneretur, & vt \*locus ei patefactus est, ipsa prorumpat, tum digitis eam apprehendere oportet, & euellere. Facile autem sequitur. Dein superungi collyrio debet ex his aliquo, quo lippientes oculi superinunguntur, paucissimisque diebus cicatrix inducitur. Molestius est, vbi incisa vesica est. Effundit enim humorem, neque postea, quia tenuis admodum est, potest colligi. Si fortè id incidit, eorum aliquid imponendum est, quæ puri mouendo sunt.

\*transuersa  
\*quà locus

## ENARRATIO.

**PAVLVS** libro sexto hydatides nominat: Est autem, vt ipse dicit, pinguis quadam substantia palpebræ cuti naturaliter sulcata. Horis antelucanis potissimum defluxione tentantur, neque contra solis splendorem cernere sistent, sed illachrymant continuisque lippitudinibus instantur. pueris (quemadmodum docet Celsus) peculiare vitium; atque ius præsertim qui natura humidiores sunt. Anicennas alfernac, Haliabbas scissuram nominat.

*De Crishe tuberculo palpebrarum.*

**I**N eadem palpebra super pilorum locum, tuberculum paruum nascitur, quod à similitudine ordei, à Græcis *κ.β.η* nominatur. Tunica quiddam quod difficulter maturescit,

kk

compre-



comprehensum est. Id vel calido pane, vel cera subinde calefacta foueri oportet, sic ne nimius is calor sit, sed facile ea parte sustineatur. Hac enim ratione saepe discutitur, interdum concoquitur. Si pus se ostendit, scalpello diuidi debet, & quicquid intus humoris est exprimi. Eodem deinde vapore postea quoque foueri, & super inungi, donec ad sanitatem perueniat.

## ENARRATIO.

**C**RITHE interculum est oblongum  
figura hordeum representans, ordeolum  
ob id ab Anicenna nominatur: alij  $\pi\acute{o}\sigma\theta\iota\alpha\varsigma$   
seu praputiolum dicere maluerunt.

cera subinde calefacta.  
EIVSDEM facultas est musca at-  
que apis corpus, abiecto capite, si eodem cri-  
the frueretur.

*De Chalazis palpebrarum.*

**A**LIA quoque quædam in palpebris huic non dissimilia  
\*nec nascuntur, sed neque utique figuræ eiusdem, & mobi-  
lia simul atque digito huc vel illuc impelluntur. Ideoque ea  
 $\chi\alpha\lambda\acute{\alpha}\zeta\iota\alpha$  vocant. Hæc incidi debent, si sub cure sunt, ab ex-  
teriore parte: si sub cartilagine, ab interiore. Dein scalpelli  
\*deducenda manubriolo diducenda ab integris partibus sunt. Ac si in-  
tus plaga est, inungendum primò lenibus, deinde acrioribus.  
Si extra, superdandum emplastrum, quo id glutinetur.

## ENARRATIO.

**C**HALAZIVM Latini grandinem no-  
minant: dicunt autem grandine affici  
palpebras, ut auctor est Aetius, quum emer-  
sis ipsis rotunda quædam eminentia pellici-  
da grandini similes apparent: quibus dissectis  
humor emacnatur similis candido oui: Pan-

lus ociosi humoris in palpebra colluuiem esse  
dicit. Fit etiam extra palpebras nonnun-  
quam chalazia subduris subis persimilis. hæc  
quando violentius attingitur, dolores ingen-  
tes suscitatur.

*De ungue oculorum, quod  $\pi\epsilon\pi\acute{\epsilon}\rho\gamma\iota\omega\varsigma$  à Græcis vocatur.*

**V**NGVIS verò, quod pterygion Græci vocant, est mem-  
branula nervosa oriens ab angulo, quæ nonnunquam  
ad pupillam quoque peruenit, eiq̃ officit. Sæpius à narium,  
interdum etiam à temporum parte nascitur. Hunc recen-  
tem:



tem non difficile est discutere medicamentis, quibus cicatrices in oculis extenuantur. Si inueterauit, iamque ei crassitudo quoque accessit, excidi debet. Post abstinentiam verò vnius diei, vel aduersus in sedili contra medicum is homo collocandus est, vel sic auersus, ut in gremium eius caput resupinus effundat. Quidam si in sinistro oculo vitium est, aduersum: si in dextro, resupinum collocari volunt. Alteram autem palpebram à sinistro diduci oportet, alteram à medico. Sed ab hoc, si ille aduersus est, inferiorem: si supinus, superiorem. Tum idem medicus hamulum acutum paulum mucrone, intus recuruato subiicere extremo vngui debet, eumque infigere, atque eam quoque palpebram tradere alteri, ipse hamulo apprehenso leuare vnguem, eumque acu traicere linum trahente. Deinde acum ponere, lini duo capita apprehendere, & per ea erecto vngue, si qua parte oculo inhæret, manubriolo scalpelli diducere, donec ad angulum veniat. Deinde inuicem modò remittere, modò attrahere, ut sic & initium eius, & finis anguli reperiatur. Duplex enim periculum est, ne vel ex vngue aliquid relinquatur, quod exulceratum vix ullam recipiat curationem, vel ex angulo quoque caruncula abscindatur, quæ si vehementius vnguis ducitur, sequitur. Ideoque decipit: ac si abscissa est, <sup>\* patet</sup> patet foramen, <sup>al. patefecit</sup> per quod postea semper humor descendit, <sup>\* pūda</sup> Græci vocant. Verus ergo anguli finis utique noscendus est, qui ubi satis constitit, non nimium adducto vngue scalpellus adhibendus est, deinde excidenda ea membranula, ne quid ex angulo lædatur. Eo deinde ex melle linamentum superdandum est, supraque linteolum, & aut spongia, aut lana succida; proximisque diebus diducendus quotidie oculus est, ne cicatrice inter se palpebræ glutinentur. Siquidem id quoque tertium periculum accedit, eodemque modo linamentum imponendum, ac nouissime inungendum collyrio, quo vlcera ad cicatricem perducuntur. Sed ea curatio <sup>\* verna</sup> vere esse debet, aut certe ante hyemem. De qua re ad plura loca pertinente semel dixisse satis erit. Nam duo genera curationum sunt. Alia in quibus eligere tempus non licet, sed utendum est eo, quod

kk 2

incidit,



incidit, sicut in vulneribus, & in fistulis. Alia in quibus nullus dies vrget, & expectare tutissimum & facile est, sicut euenit in iis, quæ & tardè crescunt, & dolore non cruciant, in his verè expectandum est. Aut si quid magis pressit, melior tamen autumnus vel æstas, quàm hyems est. Atque is ipse medius, iam fractis æstatibus, nondum ortis frigoribus. Quo magis autem necessaria pars erit, quæ tractabitur, hoc quoque maiori periculo subiecta est, & sæpe quo maior plaga facienda, eo magis hæc temporis ratio seruabitur.

## ENARRATIO.

**E**ANDEM curandi rationem describunt Paulus & Aetius: Cassius duplex pterygii genus facit; primum, quoties nervosa quædam eminentia adnatæ adnascitur, quæ ab angulo maiori oritur, & progreditur usque ad corneam, & papillam: alterum, quæ adnata in callosum tuber excrescit, quo piscatores maximè infestari idem auctor est.

## Duplex enim periculum.

PRÆTER hæc etiam cauendum docet Aetius ne palpebras attingamus; incisis enim palpebris, inquit, his concretiones accidunt.

quod exulceratum vix.

NON solum exulceratur, sed & frequenter regeneratur, quemadmodum de tunica melicevidis tamen antea diximus: quare si quid eius reliquum sit, pharmaco aliquo consumendum est.

ῥιῶδα Græci vocant.

IOANNES Cæsarum auctoritate Herimoli Barbari, & Galeni ῥιῶδα (cum antea esset ῥιῶδα) legendum contendit, nec male: nam & Paulus sic appellat: Aetius verò ῥιῶδα nominat.

## De Encanthide tuberculo.

**E**XCURATIONE verò vnguis, ut dixi, vitia nascuntur, quæ ipsa aliis quoque de causis oriri solent. Interdum enim fit in angulo parum vngue exciso, vel aliter tuberculum, quod palpebras parum diduci patitur, ἑρμαθίς Græcè nominatur. Excidi hamulo & circuncidi debet, hic quoque diligenter temperata manu, ne quid ex ipso \* abscindat. Tum exiguum linamentum respergendum est, vel cadmia, vel atramento sutorio, inque cum angulum diductis palpebris inse-  
rendum, supraque eodem modo deligandum, proximitque diebus similiter nutriendum, tantum ut primis aqua egleida, vel etiam frigida foueatur.

\* absin-  
datur.

ENARR-



## ENARRATIO.

**E**NCANTHIDEM vocat, quum magnum oculi angulum ad nasum autus carne excrescit: Avicenna additionem carnis lachrymalium vocat. Mortuus canis admodum familiaris, atque eos potissimum homines inuadit, qui frequenter in mari versantur. Estq; duplex: aut enim maligna est, aut non maligna; atque hac quidem do-

lore vocat malis, & subluxa est: Illa in-  
aqualis & pungentes dolores affert, ac in-  
totum dimittenda est ut inchoatilis.

ne quid ex ipso absin-  
datur.

NAM si quid eius excindatur, peri-  
culum est ne subsequatur cecitas.

## De Ancyloblepharo oculorum vitio.

**I**NTERDUM inter se palpebrae coalescunt, apeririq; non potest oculus. Cui malo solet etiam illud accedere, ut palpebrae cum albo oculi cohaerescant: scilicet cum in utroque fuit vlcus negligenter curatum. Sanescendo enim quod diduci potuit & debuit, \* glutinabit, *αγκυλοβλέφαρον* sub utro-  
que vitio Graeci vocant. Palpebrae tantum inter se cohaerentes, non difficulter diducuntur; sed interdum frustra, nam rursus glutinantur. Experiri tamen oportet, quia bene res sapius cedit. Igitur aduersum specillum inferendum, diducendaeque eo palpebrae sunt, deinde exigua penicilla interponenda, donec exulceratio eius loci finiatur. \* Aut ubi albo  
ipsius oculi palpebra inhaerit, Heracides Tarentinus auctor est, aduerso scalpello subsecare magna cum moderatione, ut neque ex oculo, neque ex palpebra quicquam abscindatur, ac si necesse est, ex palpebra potius. Post haec inungatur oculus medicamentis, quibus asperitudo curatur, quotidieque palpebra \* vertatur, non solum ut vlceri medicamentum induca-  
tur, sed etiam ne rursus inhaereat, ipsique \* etiam praecipia-  
tur, ut saepe eam duobus digitis attollat. Ego sic restitutum esse neminem meminisse. Meges se quoque multa tentasse, neque vnquam profuisse, quia semper iterum oculo palpebra inhaerit, memoriae prodit.

## ENARRATIO.

**P**AULVS Aegineta *σχερόστας ἐφ' οὐδ' ἄρ' ἔστιν* no. inat; Avicennas inuista-  
tionem appellat: Aerius quum ad album  
concretio palpebrarum facta fuerit, & oculi  
molius,

k k. 3.



motus impeditur, affectionem ἀγκύλωσις  
vocat.

suadet, dum scalpello pterygiū destinato  
concrecionem exolvit. anceps tamen videtur  
esse curandi ratio.

Heraclides Tarentinus.

IDEM scire est quod Aëtius faciendum

*De Aegilope, fistula oculorum.*

ETIAM NVN in angulo, qui naribus propior est, ex ali-  
quo vicio quasi parva fistula aperitur, per quam pituita  
assiduè distillat, αἰγίλωπα Græci vocant; idque assidue malè  
habet oculum, nonnumquam etiam exeso osse vsq. ad nares  
penetrat, idque interdum naturam carcinomatis habet. Vbi  
intentæ venæ, & \* recuruatæ sunt, \* color pallet, cutis dura  
est, & leui tactu irritatur, inflammationemque in eas partes,  
quæ coniunctæ sunt, euocat. Ex his eos qui quasi carcinoma  
habent, curare periculosum est. Nam mortem quoque ca-  
res maturat. \* Ea verò quibus ad nares tendit, superuacuum:  
neque enim sanescunt. At quibus id in angulo est, potest ad-  
hiberi curatio, \* cū \* eam non ignotum sit esse difficilem,  
quantoque angulo propius id foramen est, tanto difficilior  
est, quoniam perangustum est in quo versari manus possit.  
Recenti tamen re mederi facilius est. Sed hamulo summum  
eius foraminis excipiendum, deinde totum id cavum, sicut  
in fistulis dixi, vsque ad os excidendum, oculoque & cæteris  
iunctis partibus bene obtectis, os ferramento adurendum  
est vehementius. Quod si iam carie vexatum est, quo cras-  
sior his \* squama accedat, quidam adurentia imponunt, vt  
atramentum sutorium, vel chalcitidem, vel æruginem rasam.  
Quod & tardius & non idem facit. Osse adusto curatio se-  
quitur eadem, quæ in cæteris vstis.

ENARRATIO.

QVAM Celsus & Græci aegilopa vo-  
cant, Plinius epinyctidi appellare vi-  
detur; est eam, vt scribit libro xx. cap. vi.  
epinyctis vltis aciem hebetans & in angulo  
oculi perpetim humer emanans: quæ de-  
finitionem non omnino malè continere aegilope

lopi dixerit, quisquis eius accidentia penitus  
considerarit; perpetim enim ex angulo humor  
distillat, & aciem oculorum (si diutius per-  
seuerauerit, quod ferè fit,) hebetat. Vix  
curatione admittit; tum partium tenuitatis  
causa, tum periculi ne oculum consortij lege  
afficiat.



afficiatur. Quod si exeso osse ad nares usque penetrarit, carcinomatis naturam iam quodammodo induit: quo fit ut periculi plenum malum, ac mortem si non inferre, curationi certe omnino rebelle esse dicamus.

os ferramento adurendum.

VSTIONIS modum docet Aetius lib. XII. cap. LXXXVI. Paulus consueque adurit duras squammas abscedit; aut tamen esse qui terebra usi, humerem aut pus in nares deriuare contenderint.

*De Pilis palpebrarum oculum irritantibus.*

**P**ILI verò qui in palpebris sunt, duabus de causis oculum irritare consueuerunt. Nam modò palpebræ superioris summa cutis relaxatur, & procidit: quo fit, ut eius pili ad ipsum oculum conuertantur, quia non simul cartilago quoque se remittit. Modò sub ordine naturali pilorum alius ordo subcrefcit, qui protinus intus ad oculum tendit. Curationes verò hæc sunt. Si pili nati sunt, qui non debuerunt, tenuis acus ferrea ad similitudinem hastæ lata, in ignem conicienda est. Deinde candens sublata palpebra sic, ut eius perniciosi pili in conspectum curantis veniant, sub ipsis pilorum radicibus \*super ab angulo immittenda est, ut ea tertiam partem palpebræ \*transeat. Deinde iterum tertioque usque ad alterum angulum. Quo fit, ut omnes pilorum radices adustæ emorian-  
 tur. Tum superimponendum medicamentum est, quod inflammationem prohibeat, atque vbi crustæ exciderunt, ad cicatricem perducendum. Facillime autem id genus sanescit: quidam aiunt acu transui iuxta pilos in exteriorem partem palpebræ oportere, eamque transmitti duplicem capillum muliebrem ducentem: atque vbi acus transiit, in ipsius capilli sinum, quâ duplicatur, pilum esse iniiciendum, & per eum in superiorem palpebræ partem attrahendum, ibique corpori adglutinandum & imponendum medicamentum, quo foramen quoque glutinetur: sic enim fore, ut is pilus \*ferrumen in exteriorem partem postea spectet. Id primum fieri non potest, nisi in pilo longiore, cum fere breues eo loco nascantur. Deinde si plures pili sunt, necesse est longum tormentum, cum toties acus transuet, magnam inflammationem moueat. Nouissimè cum humor aliquis ibi subsit, oculo & ante per pilos, & tum per palpebræ foramina affecto, vix fieri potest,



potest, ut gluten, quo vinctus est pilus, non resoluator. Eoque fit, ut is eo unde vi abductus est, redeat. Ea verò curatio, quæ palpebræ laxioris ab omnibus frequentatur, nihil habet dubij. Siquidem oportet coniecto oculo mediam palpebræ cutem, siue ea superior, siue inferior est, apprehendere digitis, ac leuare, tum considerare quantulo detracto futurum sit, ut naturaliter se habeat. Siquidem hic quoque duo pericula circumstant: si nimium fuerit excisum, ne contegi oculus non possit: si parum, ne nihil actum sit, & frustra sectus aliquis sit.

\* Quod

\* inferiore

Quà deinde incidendum videbitur, per duas lineas atramento notandum est, sic ut de \* interiore quæ pilos continet, & propiore ei linea aliquid relinquatur, quod apprehendere acus postea possit. His constitutis scalpellus adhibendus est, & si superior palpebra est, antè: si inferior, postea propius ipsi pilis incidendum, initiumque faciendum in sinistro oculo, ab eo angulo qui tempori: in dextro, ab eo qui naribus propior est, idque quod inter duas lineas est, excidendum. Deinde oræ vulneris inter se simplici futura committendæ, operiendusque oculus est: & si parum palpebra descendet, laxanda utique: si nimium, aut adstringenda, aut etiam rursus tenuis habenula ab ulteriore ora excidenda. Vbi secta est, aliæ futuræ adiciendæ, quæ supra tres esse non debent. Præter hæc in superiore palpebra sub pilis ipsi incidenda linea est, ut ab inferiore parte diducti pilis sursum spectent. Idque si levis inclinatio est, etiam solum satis tuetur. Inferior palpebra eo non eget. His factis, sponsia ex aqua frigida expressa super deliganda est. Postero die glutinans emplastrum iniiciendum. Quarto futura tollenda est, & collyrio quod inflammationes reprimat, superinungendum.

#### ENARRATIO.

**V**TRUMQUE vitium Græci indifferenter *τρεχίνον* nominant: particularis tamen *disorchia* vocant pilorum subrotationem, duplicemque eorumdem ordinem: Galenus *τρεχόντι βελίφαρα*, Amicennas interiores & externos pilos appellat. Ex multa humiditate ferè omni solet. Palpe-

bra verò laxationem propriè *φωλάζωσις* dicunt.

quidam aiunt acu.

IDEM tradit Paulus lib. VI. cap. XIII. atque hanc quidem emulsionem anatrochismum appellat, atque vtiliorem longè eandem,



dicat, quæ per adhesionem fit: quam tamen  
anctor noster potius loco habere videtur.

ne contingi oculus.

ET ne si aliud vitium actum sit, mus-  
culus latur. Chirurgia hanc rationem  
habet apud Aetium libro VII.

*De Lagophthalmo oculorum.*

**N**ONNVNQVAM autem nimium sub hac curatione excisa  
cute euenit, vt oculus non contegatur. Idque interdum  
etiam alia de causa fit, *λαγόφθαλμος* Græci appellant. In quo  
si nimium palpebræ deest, nulla id restituere curatio potest.  
Si exiguum, mederi licet: paulum infra supercilium cutis in-  
cidenda est lunata figura, cornibus eius deorsum spectanti-  
bus. Altitudo esse plagæ vsque ad cartilagineum debet, ipsa  
illa nihil læsa. Nam si ea incisa est, palpebra concidit, neque  
attolli postea potest. \* Cute igitur tantum diducta fit, vt pau-  
lum in ima oculi ora descendat, hiantem scilicet super plagam, in  
quam linamentum coniiciendum est, quod & coniungi di-  
ductam cutem prohibeat, & in medio carunculam citet: quæ  
vbi eum locum impleuit, postea rectè oculus operitur.

\* Cutis

ENARRATIO.

**L**AGOPHTHALMVM vocant, quoties  
superior palpebra sursum retracta est,  
& apertus est oculus: sicuti in leporitis ac-  
cidere solet: Anicennas palpebra inuersa-

tionem, & aspera vocat. Accidit autem  
aut naturaliter, aut ex cicatrice vulneris.  
Chirurgiam hanc ex Demosthene refert Aë-  
tius libro VII. capite LXXIII.

*De Ectropio.*

**V**T superioris autem palpebræ vitium est, quod parum  
descendit, ideoque oculum non contegit: sic inferioris,  
quod parum sursum attollitur, sed pendet & hiat, neque po-  
test cum superiore committi. Atque id quoque euenit inter-  
dum ex simili vitio curationis, interdum etiam senectute,  
*ἐκτροπίον* Græci vocant. Si ex mala curatione est, eadem ratio  
medicinæ est, quæ supra posita est, plagæ tantum cornua ad  
maxillas, non ad oculum, conuertenda sunt. Si ex senectute  
est, tenui ferramento id totum extrinsecus adurendum est,

11

deinde



deinde melle inungendum, & quarto die vapore aquæ calidæ fouendum, inungendumque medicamentis ad cicatricem perducentibus.

## ENARRATIO.

**E**CTROPII dicuntur quibus inferior palpebra inuersa est. Paulus nunquam à natura prouenire aucter est; sed cit; qui ex senectute non raro oriri vult. nonnunquam ex relaxatione quam medica-

mentam id effracia inflammatione precedente concitavunt: Celsus contrarium dic;

*De Staphylomate oculi.*

**H**ÆC fere circa oculum in angulis palpebrisque incidere consueverunt. In ipso autem oculo nonnunquam summa attollitur tunica, siue ruptis intus membranis aliquibus, siue laxatis, & similis figura acino fit. Vnde id *καρφωσις* Græci vocant. Curatio duplex est. Altera ad ipsas radices per medium transuere acu duo lina ducente. Deinde alterius lini duo capita ex superiore parte, alterius ex \*interiore adstringere inter se, quæ paulatim secando id excidunt. Altera in summa parte eius ad lenticulæ magnitudinem excidere, deinde spodium aut cadmiæ infricare. Utrolibet autem facto, album oui lana excipiendum & imponendum, posteaque vapore aquæ calidæ fouendus oculus, & lenibus medicamentis vngendus est.

## ENARRATIO.

**S**TAPHYLOMA Latine vitationem dicere possumus: curatur autem manus actione, ut docet Aegineta, non ut abolutum visum restituamus, verum ut moderatim agrotantis decorem conciliemus.

Altera ad ipsas radices.

PRIORIS huius curationis Paulus lib. VI. cap. XIX. & Aetius lib. VII. cap. XXXV. meminere: ubi sensu multo citius huius modum explicat Aetius, atque actionem secundam constructionem vocat.

*De Clavis oculorum.*

**C**LAVI autem vocantur callosa in albo oculi tubercula, quibus nomen à figuræ similitudine est. Hos ad imam radicem perforare acu commodissimum est, infraque canx excidere, deinde lenibus medicamentis inungere.

ENAR-



## ENARRATIO.

QVVM maximum factum fuerit staphyloma, ut extra palpebras transgredatur, & induretur ita ut ipsa coruiformis tunica circumscripta callosa facta sit, & affectionem causiingat, clauis appellatur, inquit Aetius, quoniam per omnia clauis capiti similis existit. Hac affectio visus de-

trahentium, & figura deformitatem coniunctam habet, etque egre omnino curam nem admittit: nam quantumuis per chirurgum deformitati aliquo modo consulere possimus, visus certe saltem nunquam autaro restituenus.

## De natura oculorum, &amp; eorum suffusione.

SUFFUSIONIS iam aliàs feci mentionem, quia cum recens incidit, medicamentis quoque saepe discutitur. Sed ubi vetustior facta est, manus curationem desiderat, quæ inter subtilissimas haberi potest. De qua antequam dico, paucis ipsius oculi natura indicanda est. Cuius cognitio, cum ad plura loca pertineat, tum vel præcipue ad hunc pertinet. Is igitur summas habet duas tunicas, ex quibus superior à Græcis *μεγαλειδης* vocatur. \* Ea qua parte alba \* est, satis crassa, pupillæ loco extenuatur. Huic inferior adiuncta est media parte, quæ pupilla est, modico foramine concaua, circâ tenuis, vltionibus partibus ipsa quoque plenior, quæ \* *μεινιδης* à Græcis nominatur. Hæ duæ tunicæ cum interiora oculi cingant, rursus sub his coeunt, extenuataque, & in vnum coactæ, per foramen, quod inter ossa est, ad membranam cerebri perueniunt, ei que inhærescunt. Sub his autem qua parte pupilla est, locus vacuus est: deinde infra rursus tenuissima tunica, quam Herophilus *αφαρροειδης* nominauit. Ea media subsidit, \* eo que cauo continet quiddam, quod à vitri similitudine *υαροειδης* Græci vocant. Id neque liquidum, neque aridum est, sed quasi concretus humor, ex cuius colore pupillæ color vel niger est, vel cæsius, cum summa tunica tota alba sit. Id autem superueniens ab interiore parte membrana includit, sub his gutta humoris est, oui albo similis, à qua videndi facultas proficiscitur, *μευειδοειδης* à Græcis nominatur. Igitur vel ex morbo, vel ex ictu concreuit humor sub duabus tunicis, quæ locum vacuum esse proposui: isque paulatim

\* Ea que  
est crassa  
pup.

\* *μεγαλειδης*

\* ea que  
alioque



\* Virij  
eius

\* in al.  
vertitur,

\* curatio-  
ni,

\* duritie  
quadam

\* lumini  
aduersus,  
sic vt con-  
tra medi-  
cum

\* vt

\* est acuta,  
aut certè  
nō demit-  
tenda, sed  
recta est,  
per

\* parte

latum indurefcens interiori potentia se opponit. \* Vitiiq̃ue  
eius plures species sunt, quædam sanabiles, quædam quæ cu-  
rationem non admittunt. Nam si exigua suffusio est, si im-  
mobilis, colorem verò habet marinæ aquæ, vel ferri nitentis,  
& à latere sensum aliquem fulgoris relinquit, spes superest. Si  
magna est, si nigra pars oculi amissa naturali figura in aliam  
vertit, si suffusioni color cæruleus est, aut auro similis, si la-  
bat, & hac atque illac mouetur, vix vnquam succurritur.  
Ferè verò peior est, quo ex grauiore morbo, maioribûsve ca-  
pitis doloribus, vel ictu vehementiore orta est. Neque ido-  
nea \* curatio si senilis ætas est, quæ sine nouo vitio tamen  
aciem hebetem habet. At ne puerilis quidem, sed inter hæc  
media ætas. Oculus quoque curationi neque exiguus, neque  
concauus satis opportunus est, atque ipsius suffusionis quæ-  
dam maturitas est. Expectandum igitur est donec iam non  
fluere, sed \* durities quædam concreuisse videatur. Ante cu-  
rationem autem modico cibo vti, bibere aquam triduo de-  
bet, pridie ab omnibus abstinere. Post hæc in aduerso sedili  
collocandus est loco lucido, \* lumine aduerso, sic vt contrà  
medicus paulo altius sedeat. A posteriore autem parte caput  
eius, qui curabitur, minister contineat, \* & immobile id præ-  
stet. Nam leui motu eripi acies in perpetuum potest. Quin  
etiam ipse oculus qui curabitur, immobilior faciendus est,  
super alterum lana imposita & deligata. Curari verò sinister  
oculus dextra manu, dexter sinistra debet. Tum acus admo-  
uenda \* est, aut acuta, aut fortè non nimium tenuis, eaque  
demittenda. Sed recta est per summas duas tunicas medio  
loco inter nigrum oculi & angulum temporis propiorem è re-  
gione mediæ suffusionis, sic ne qua vena lædatur. Neque ta-  
men timide demittenda est, quia inani loco excipitur. Ad  
quem cum ventum est, ne mediocriter quidem peritus falli  
potest, quia prementi nihil renititur. Vbi cō ventum est, in-  
clinanda acus ad ipsam suffusionem est. Leuiterque ibi verti  
& paulatim eam deducere infra regionem pupillæ debet: vbi  
deinde eam transit, vehementius imprimi vt inferiori \* parti  
insidat. Si hæsit, curatio expleta est. Si subinde redit, eadem  
acu



acu magis concidenda, & in plures partes dissipanda est, quæ singulæ & facilius conduntur, & minus latè efficiunt. Post hæc educenda acus recta est, imponendūque est lana molli exceptum oui album, & supra, quod inflammationem coercet, atque ita deuinciendum. Post hæc opus est quiete, abstinentia, lenium medicamentorum inunctionibus, cibo, qui postero die satis maturè datur, primum liquido, ne maxillæ laborent, deinde, inflammatione finita, tali, qualis in vulnibus propositus est. Quibus ut aqua quoque diutius bibatur, necessario accedit.

## ENARRATIO.

Is igitur summas.

**Q**UANTUM *Galenus* atque eo posteriores, sex oculi tunicas esse dicunt; *Celsus* tamen, in hoc antiquos sequutus, tres tantum, corneam videlicet, rhagoidem, quæ & charoædes dicitur, & arachnoëdem describit; atque inter has duos tantum humores, eum nempe qui à crystalli similitudine crystallinus, & à vitro fuso hyaloëdes appellatur, constituit. *Galenus* atque eo posteriores, his tertium humorem adiiciunt, quem aqueum nominant. Realdus Columbus excrementum quoddam esse existimat, in hoc *Theophilus* sequutus, qui ab aqueo humore lachrymas exprimi suspicatus est: quæ opinio alius non satis placeat, quod ex oculorum glandulis easdem ferri dicunt.

Igitur vel ex morbo.

*Galenus* & *Paulus* etiam ex immoderato vomitu fieri dicunt.

quædam sanabiles.

**O**CULVS, inquit *Paulus*, suffusione tentatus concluditur, & palpebra magno digito ad oculum premitur, eiq; adducitur, simulque hac illac exprimitur; & deinde oculo aperto, & mente ei adhibita suffusionem conspiciamus: in iis enim quibus humor nondum coaruit, fusio quædam ex digiti impressione oboritur, ac primum latior apparet, rursum in suam figuram, & magnitudinem recurrit. At in confirmatis suffusionibus nulla immutatio, nec latitudinis nec figure ex impressione obuenit. Discretionem præterea, sicuti & *Celsus*, ex colore, atque eandem planè curationē describit: quare si quis huius loci ampliores enarrationem requirat, eundem lib. v. cap. XXI. consulat.

## De Pituita oculorum.

**D**E pituitæ quoque tenuis cursu, qui oculos infestat, quatenus medicamentis agendum est, iam explicui. Nunc ad ea veniam, quæ curationem ex manu postulant. Animaduertimus autem quibusdam nunquam siccescere oculos, sed semper humore tenui madere, quæ res asperitudinem continuat, & ex leuibus momentis inflammationes & lippitudines

excitat,



\* necessaria

\* parent

\* qualque

\* rectas  
vel rectas  
deduce-  
rent,

\* diducitque

excitat, totam denique vitam hominis infestat. Idque in quibusdam nulla ope adiuuari potest, in quibusdam sanabile est. Quod primum discrimen est, nosse oportet, ut alteri succurratur, alteri manus non iniiciatur. Ac primum superuacua curatio est in his qui ab infantibus id vitium habent, quia necessario mansurum est usque mortis diem. Deinde non \* necessario etiam in his, quibus non multa, sed acris pituita est. Si quidem manu nihil adiuuantur, medicamentis, & victus ratione, quæ crassiorem pituitam reddit, ad sanitatem perueniunt. Lata etiam capita vix medicina \* parent. Tum interest venæ pituitam emittant, quæ inter caluariam & cutem sunt, an quæ inter membranam cerebri, & caluariam. Superiores ferè per tempora oculos rigant, inferiores per eas membranas, quæ ab oculis ad cerebrum tendunt. Potest autem adhiberi remedium his, quæ supra os fluunt, non potest his, quæ sub osse. Ac ne his quidem succurritur, quibus pituita utrinque descendit, quia leuata altera parte, nihilominus altera infestat. Quid sit autem, hac ratione cognoscitur. Raso capite ea medicamenta, quibus in lippitudine pituita suspenditur, à superciliis usque ad verticem illini debent. Si sicci oculi esse cœperunt, apparet per eas venas, quæ sub cute sunt, irrigari. Si nihilominus madent, manifestum est sub osse descendere. Si est humor, sed lenior, duplex vitium est. Plurimi tamen ex laborantibus reperiuntur, quos superiores venæ exerceant, ideoque pluribus etiam opitulari licet. Idque non in Græcia tantummodo, sed in aliis quoque gentibus celebre est, adeo ut nulla medicina pars magis per nationes \* quoque exposita sit. Reperti in Græcia sunt, qui nouem lineis cutem capitis inciderint, duabus in occipitio rectis, una super eas transuersa, dein duabus super aures, una inter eas item transuersa, tribus inter verticem & frontem rectis. Reperti sunt, qui à capite \* recte eas lineas ad tempora \* diducerent, cognitisque ex motu maxillarum musculorum intus, leuiter super eos cutem inciderent, \* inducitque per retulos hamos oris infereret linamenta, ut neque inter se cutis antiqui fines committerentur, & in medio caro increseceret, quæ venas ex quibus



quibus humor ad oculos transfiret adstringeret. Quidam etiam atramento duas lineas duxerunt, à media aure ad mediam alteram aurem, deinde à naribus ad verticem. Tum ubi lineæ committebantur, scalpello inciderunt, & post sanguine fuso, os ibidem adusserunt. Nihilominus autem & in temporibus, & inter frontem atque caluariam eminentibus venis idem candens ferrum adinouerunt. Frequens curatio est, venas in temporibus adurere, quæ fere, quidem in eiusmodi malo tument, sed tamen ut insentur, magisque se ostendant, ceruix ante modice deliganda est: tenuibusque ferramenti & retusis venæ adurendæ, donec in oculis pituitæ cursus conquiescat. Id enim signum est quasi excavatorum itinerum, per quæ humor ferebatur. \* Valentior tamen medicina est, ubi tenues conditæque venæ, ideoque legi non possunt. Eodem modo ceruice deligata, retentoque ab ipso spiritu, quo magis venæ prodeant, atramento notare eas contra tempora & inter \* ceruicem, ac frontem, deinde ceruice resoluta, quæ notæ sunt, venas incidere, & sanguinem mittere. Vbi satis fluxit, tenuibus ferramenti adurere. Contra tempora quidem, timide, ne subiecti musculi, qui \* maxillas tenent, sentiant: inter frontem verò & verticem, vehementer, ut sic squama ab osse recedat. Efficacior tamen etiamnum est Afrorum curatio, qui verticem usque ad os adurunt, sic ut squamam remittat. Sed nihil melius est, quam quod in Gallia quoque Comata sit, ubi venas in temporibus & in superiore capitis parte legunt. Adusta quomodo curanda sint, iam explicui. Nunc illud adiicio, neque ut crustæ decidant, neque ut vlcus impleatur adustis venis esse properandum, ne vel sanguis erumpat, vel citò pus supprimatur, cum per hoc siccescere eas partes opus sit, per illud exhauriri opus non sit. si quando tamen sanguis eruperit, infricanda medicamenta esse, quæ sic sanguinem supprimant, ne adurant. Quemadmodum autem venæ deligendæ sint, quidque lectis his faciendum sit, cum venero ad crurum varices, dicam.

\* post sanguinem effusum

\* Violentior

\* verticem ac frontem oportet, deinde

\* maxillâ

ENARR.



## ENARRATIO.

**P**ITUITÆ tenuis cursum Græcorum esse epiphoram dictum est: ad quam licet non planè eadem esse videatur, proximè accedit Plinio oculorum illachrymatio dicta.

alienis humoribus etiam naturales absumentur, & ad extremam siccitatem oculum deducatur, unde & incurabilis affectio oritur.

Frequens curatio est.

Reperti in Græcia sunt.

CURATIONEM hanc quæ per vsionem fit, non admodum commendat Aëtius, quod vsione ad profundum facta, una cum

TVM videlicet quum vasa in fronte & temporibus distenta, & caput quodammodo reuinctum esse videatur.

## CAPVT VIII.

*De aurium morbis, qui manu & scalpello curantur.*

**V**ERVM vt oculi multiplicem curationem, etiam manus exigunt: sic in auribus admodum pauca sunt, quæ in hac medicinæ parte tractentur. Solet tamen euenire vel à prima natali die protinus, vel postea facta exulceratione, deinde per cicatricem aure repleta, vt foramen in ea nullum sit, ideoque audiendi vsu careat. Quod ubi incidit, specillo tentandum est, altène id repletum, an in summo tantum glutinatum sit. Nam si altè est, prementi non cedit: si in summo, specillum protinus recipit. Illud attingi non oportet, ne sine effectus spe distentio oriatur neruorum, & ex ea mortis periculum sit. Hoc facilè curatur. Nam quæ cauum esse debet, vel medicamentum aliquod imponendum est ex adurentibus, vel candente ferro aperiendum, vel etiam scalpello incidendum. Cumque id patefactum, & iam vlcus purum est, iniicienda eò pinna est, illita medicamento cicatricem inducente: circaque idem medicamentum dandum, vt curis circa pinnam lanescat: quo fit vt ea remota, postea facultas audiendi sit. At ubi aures, in viro puta perforatæ sunt, & offendunt, traicere id cauum celeriter candente acu satis est, vt leniter eius ora exulcerentur, aut etiam adurente medicamento idem exulcerare, postea deinde imponere id quod purget, tum quod eum locum repleat, & sic cicatricem inducat. Quod si magnum id foramen est (sicut solet esse in his,



his, qui maiora pondera auribus gesserunt) incidere quod superest ad extremum oportet: supra deinde oras scalpello exulcerare, & postea fuere, ac medicamentum, quo id glutinetur, imponere. Tertium est, si quid ibi curti est, sarcire: quæ res cum in labris quoque & naribus fieri possit, eandem etiam rationem habeat, simul explicanda est.

## ENARRATIO.

Solet tamen euenire.

*bit autem Paulus libro VI. capite XXIII. eandem planè chirurgiæ rationem.*

*Ἰσχυροτέρως Græci vocant. Desiri-*

## CAPUT IX.

*Curta in auribus, labrisque ac naribus, quomodo  
sarciri & curari possint.*

**C**URTA igitur in his tribus, ac si qua parua paria sunt, curari possunt. Si qua maiora sunt, aut non recipiunt curationem, aut ita per hanc ipsam deformantur, ut minus indecora ante fuerint. Atque in aure quidem & naribus deformitas sola timeri potest. In labris verò si nimium contracta sunt, usus quoque necessarij iactura fit, quia minus facile & cibus assumitur, & sermo explicatur. Neque enim creatur ibi corpus, sed ex vicino adducitur: quod in leui \* mutatione, & nihil eripere, & fallere oculum potest: in magna non potest. Neque senile autem corpus, neque quod mali habitus est, neque in quo difficulter vlcera sanescunt, huic medicinæ idoneum est, quia nusquam celerius cancer occupat, aut difficilius tollitur. Ratio curationis eiusmodi est. Id quod \* curatum est, in quadratum redigere, ab interioribus eius angulis lineas transversas incidere, quæ citiorem partem ab ulterio-

\* mutilatione,

\* curtam  
al. curra-  
tum al.  
curandum

\* resolui-  
mus,

ex toto diducant: deinde ea quæ sic \* reposuimus, in vnum adducere. Si non satis iunguntur, ultra lineas, quas antè fecimus, alias duas lunatas, & ad plagam conuersas immittere, quibus summa tantum cutis diducatur. Sic enim fit, ut facilius quod adducitur, sequi possit: quod non vi cogendum

m m

est,



\* demissū

\* tamen

\* imisve  
narium  
al. gena-  
rum\* ha quinque  
voces irrepta-  
viani i mar-  
gine.

\* curta

est, sed ita adducendum, ut ex facili subsequatur, & \* dimissum non multum recedat. Interdum \* autem ab altera parte cutis haud omnino adducta, deformem quem reliquit locum, reddit. Huiusmodi loci altera pars incidenda, altera intacta habenda est. Ergo neque ex imis auribus, neque ex medio naso \* imis venarum partibus, neque ex angulis labrorum quicquam attrahere tentabimus. Vtrinque autem petemus, si quid summis auribus, si quid imis, \* *si quid aut medio naso*, aut mediis naribus, aut mediis labris deerit. Quæ tamen interdum etiam duobus locis \* curata esse consueverunt. Sed eadem ratio curandi est. Si cartilago in eo quod incisum est eminet, excidenda est. Neque enim aut glutinatur, aut acutò traicitur. Neque longè tamen excidi debet, ne inter duas oras liberæ cutis, vtrinque coitus puris fieri possit. Tum iunctæ oræ inrer se suendæ sunt, vtrinque cute apprehensa, & quæ priores lineæ sunt, eà quoque futuræ iniiciendæ sunt. Sicis locis, ut in naribus, illita spuma argenti satis proficit. In vltiores verò lunatasque plagas linamentum dandum est, ut caro increfcens vulnus impleat, summaque cura quod ita futurum est, tuendum esse, apparere ex eo potest, quod decanero suprà posui. Ergo etiam tertio quoque die fouendum erit vapore aquæ calidæ, rursusque idem medicamentum iniiciendum, fereque septimo die glutinatum est. Tum futuræ eximi, & vlcus ad sanitatem perducere debent.

## ENARRATIO.

Curta.

GRAECI *κροβάμματος* vocant, ut ait Paulus.

## CAPVT X.

*De Polypicuratione per ferrum.*

POLYPVM verò, qui in naribus nascitur, præcipuè ferro curari iam aliàs posui. Ergo etiam hunc ferramento acuto in modum spathæ facto resolueri ab ossè oportet: adhibita diligentia, ne infrà cartilago lædatur, in qua difficilis curatio est.



tio est. Vbi abscissus est, vnco ferramento extrahendus est. Tum implicitum linamentū, vel aliquid ex penicillo respergendum est medicamento, quo sanguis supprimitur, eoque nares leniter implendæ. Sanguine suppresso, linamento \* vlcusculum purgandum est. Vbi purum est, eò pinna eodem modo, quo in aure suprà positum est, medicamento illita, quo cicatrix inducitur, intus demittenda, donec ex toto id sanescat.

## ENARRATIO.

NON quibus polypi manualet alio- linidi ac maligni, cum cancri naturam in-  
nem admittunt; sed qui neque male- duentes attingi non debent, ac non nisi can-  
fici admodum, sed laxi quodammodo & fria- dente ferro urendi atque extirpandi sunt.  
biles sunt: nam duri & tactu renitentes,

## CAPVT XI.

## De Ozena.

ID autem vitium, quod ὄζαυα à Græcis vocatur, si medicamentis non cederet, quemadmodum manu curandum esset, apud magnos Chirurgos non reperi. Credo, quia res rarò ad sanitatem satis proficit, cum aliquod in ipsa curatione tormentum habeat. Apud quosdam tamen positum est, vel \* subtilem fistulam, vel enodem scriptorium calamum in na- rem esse coniiciendum, donec sursum ad os perueniat: tum per id tenue ferramentum candens dandum esse ad ipsum os, deinde adustum locum purgandum esse ærugine & melle. Vbi purus est, lycio ad sanitatem perducendum. Vel na rem incidendam esse ab ima parte ad os, vt & conspici locus possit, & facilius candens ferramentum admoueri. Tum sui na rem debere, & adustum quidem vlcus eadem ratione curari. Sutura verò illini vel spuma argenti, vel alio glutinante.

## De oris vitiis, quæ manu &amp; ferro curantur.

## CAPVT XII.

## De dentibus.

IN ore quoque quædam manu curantur. Vbi in primis dentes nonnunquam mouentur, modò propter radicum  
mm 2 imbecil-



\* made-  
scientium

\* infidat.

\* forcipe,  
et sic in re-  
liquis.

\* rarum,

\* factum  
\* intume-  
scit

\* aut

imbecillitatem, modò propter gingivarum \*arescentium vi-  
tium. Oportet in utrolibet candens ferramentum gingivis  
ad mouere, vt leuiter attingat, non vt \*incidat. Aduſtæ gin-  
giuæ melle illinendæ, & mulſo eluendæ ſunt. Vt pura vlcera  
eſſe cœperunt, arida medicamenta infricanda ſunt ex his  
quæ reprimunt. Si verò dens dolores mouet, eximiq. cum,  
quia medicamenta nihil adiuuant, placuit, circumradi de-  
bet, vt gingiua ab eo reſoluatur. Tum is concutiendus eſt.  
Eaque faciendæ, donec bene moueatur. Nam dens hærens  
cum ſummo periculo euellitur, ac nonnunquam maxilla lo-  
co mouetur. Idq. etiam maiore periculo in ſuperioribus  
dentibus ſit, quia poteſt tempora oculòſve concutere. Tum  
ſi fieri poteſt manu, ſi minus, \* forcice, dens excipiendus eſt.  
Ac ſi exeuſus eſt, antè id foramen vel linamento, vel bene ac-  
commodato plumbo replendum eſt, ne ſub forcice confrin-  
gatur. Recta verò forfex ducenda eſt, ne inflexis radicibus  
os \* earum, cui dens inhæret, parte aliqua frangatur. Neque  
ideo nullum eius rei periculum eſt, vtique in dentibus breui-  
bus, qui ferè longiores radices habent. Sæpe enim forfex cum  
dentem comprehendere non poſſit, aut fruſtra comprehen-  
dat, os gingiuæ prehendit & frangit. Protinus autem vbi  
plus ſanguinis profluit, ſcire licet, aliquid ex oſſe fractum eſſe.  
Ergo ſpecillo conquirenda eſt teſta, quæ receſſit, & voſſella  
protrahenda eſt. Si non ſequitur, incidi gingiua debet, donec  
labans oſſis teſta recipiatur. Quod ſi \* fractum ſtatim non  
eſt, \* indureſcit extrinſecus maxilla, vt iſ hiare non poſſit.  
Sed imponendum calidum ex farina \* & fico cataplaſma eſt,  
donec ibi pus moueatur. Tum incidi gingiua debet. Pus  
quoque multum profluens, oſſis fracti nota eſt. Itaque etiam  
tum id extrahi conuenit. Nonnunquam etiam eo læſo, fi-  
ſtula ſit, quæ eradi debet. Dens autem ſcaber, qua parte ni-  
ger eſt, radendus eſt, illinendusq. roſæ flore contrito, cui  
gallæ quarta pars, & altera myrrhæ ſit adiecta. Continen-  
dumq. ore crebro vinum meracum. Atque in eo caſu ve-  
landum caput, ambulatione multa, friſſione capitis, cibo non  
acri vtendum eſt. At ſi ex ictu, vel alio caſu aliqui labant  
dentes,



dentem, auro cum his qui bene hærent vincendi sunt. Continendaq. ore reprimenda, ut vinum in quo malicorium decoctum, aut in quo galla candens coniecta sit. Si quando etiam in pueris alter dens nascitur quàm prior excidat, is qui cadere debuit, circum purgandus & euellendus est, is <sup>\* autem</sup> qui natus est in locum prioris quotidie digito adurgendus, donec <sup>qui</sup> ad iustam magnitudinem perueniat. Quotiescunque dente exempto radix relicta est, protinus ea quoque ad id facta <sup>\* forcipe,</sup> forcipe, quam rhizan Græci vocant, eximenda est. Tonfillas autem, quæ post inflammationes induruerunt, <sup>quam gignit</sup> autem à Græcis appellantur, cum sub leui tunica sint, oportet digito circumradere & euellere: si ne sic quidem resoluuntur, hamulo excipere, & scalpello excidere, tum vlcus aceto eluere, & illinere vulnus medicamento, quo sanguis supprimatur.

## ENARRATIO.

## Nam dens hærens.

**O**MNIBVS dentibus id commune est, quòd ex tertia uernorum syzygia tenues uerni ad eorundem radices ferantur, quibus uenula ac parua arteria subseruiuntur; unde præterquam alia ossa sentiunt, & nutriuntur, & quodammodo, ait Galenus, per arteriam pulsant. Superiores autem inferioribus tenacius implantantur, ac fixius hærent, aliusque suas radices figunt: nam

& numero & longitudine radicum inferiores vincunt; unde & maiori cum molestia euelluntur, & conuulsiois periculum non raro inferunt, cerebro ipso lege consortij affecto.

## Si quando etiam in pueris.

ISTVD appendicem dentium nominant: radicem enim euulsus dens, nequam renascitur.

## De Vsa.

**V**VA si cum inflammatione descendit, dolorique est, & subrubicundi coloris, præcidi sine periculo non potest. Solet enim multum sanguinem effundere. Itaque melius est his uti, quæ aliàs proposita sunt. Si verò inflammatio quidem nulla est, nihilominus autem ea ultra iustum modum à pituita <sup>\* deducta</sup> deducta est, & est tenuis, acuta, alba, præcidi debet. Item, quæ si ima, liuida, & crassa, <sup>\* s. verò,</sup> summa, tenuis est. Neque quicquam commodius est, quàm volsella prehendere, sub eaque <sup>ten.</sup> quod volumus excidere. Neque enim vllum periculum est,

m m 3

ne



ne plus minúsve præcidatur, cum liceat tantùm infra volfellam relinquare, quantum inutile esse manifestum est, idque præcidere quo longior vna est, quàm esse naturaliter debet. Post curationem eadem facienda sunt, quæ in consillis proximè posui.

## ENARRATIO.

**ÆGINETA** duplicem quæ per manum administratur, vna curationem describit; alteram videlicet quæ vssione, atque aliam quæ volfella obitur. Atqui contracte omnes, cruenta, rotunda nec oblonga vel subnigra vna, attingi scalpello non debent. præcidendum autem id est, quod præternatura modum eminet, ita ut non nimis altè incisio fiat, præcisam enim vnam celerimè ingulare auctor est Aëtius.

*De Lingua.*

**LINGVA** verò quibusdam cum subiecta parte à primo natali die iuncta est, qui ob id ne loqui quidem possunt. Horum extrema lingua volfella prehendida est, sub eaque membrana incidenda, magna cura habita, ne venæ quæ iuxta sunt, violentur, & profusione sanguinis noceant. Reliqua curationis vulneris in prioribus posita est. Et plerique quidem ubi consanuerunt, loquuntur. Ego autem cognoui, qui succisa lingua cum abunde super dentes eam \*premeret, non tamen loquendi facultatem cōsecutus est. Aded in medicina etiam ubi perpetuum est, quod fieri debet, non tamen perpetuum est, id quod sequi conuenit.

## ENARRATIO.

**VITIVM** hoc Ægineta ἀγκυλό- aitionem lingua vocat: alij ligationem linguæ nomine nominat: Anicenna abbrevi- gna dicere maluerunt.

*De Abscessu sub lingua.*

**SUB** lingua quoque interdum aliquid abscedit, quod ferè consistit in tunica, doloreque magnos \*mouet: quod si exiguum est, incidi semel satis est: si maius, summa cutis usque ad tunicam excidenda est, deinde vtrinque oræ hamulis excipiendæ, & tunica vndique circumdata liberanda est: magna diligentia per omnem curationem habita, ne qua maior vena incidatur.

*De La-*



## De Labris.

**L**ABRA autem saepe finduntur, eaque res habet cum dolore etiam hanc molestiam, quod sermo prohibetur, qui subinde eas rimas cum dolore diducendo sanguinem citat. Sed has, si in summo sunt, medicamentis curare commodius est quæ ad vlcera oris fiunt. Si verò aliùs descenderunt, necessarium est tenui ferramento adurere, quod spathæ simile quasi transcurrere, non imprimi debet. Postea facienda eadem sunt, quæ in auribus adultis exposita sunt.

## CAPUT XIII.

## De Cervicis vitiiis, &amp; curatione.

**A**T in ceruice inter cutem & asperam arteriam tumor increfcit, βεργχελήνη Græci vocant, quo modò caro hebes, modò humor aliquis melli aquæve similis includitur, interdum etiam minutis ossibus pili immisti. Ex quibus quicquid est, quod tunica continetur, potest adurentibus medicamentis curari, quibus summa cutis cum superiecta tunica exeritur. Quo facto, siue humor est, profluit: siue quid densius, digitis educitur, tum vlcus sub linamentis sanescit. Sed scalpelli curatio breuior est. Medio <sup>\*exeditur</sup> tumore vna linea inciditur vsque ad tunicam: Deinde vitiosus sinus ab integro corpore digito separatur, totusque cum velamento suo eximitur. Tum aceto cui vel sâlem vel nitrum aliquis adiecit, eluitur, oræque vna sutura iunguntur, cæteraque eadem quæ in aliis futuris superiniiciuntur. Leniter deinde, ne fauces vrgat, deligatur: si quando autem tunica eximi non potuerit, intus inspergenda adurentia, <sup>al. exurit.</sup> linamentisque id curandum: <sup>\*tumor</sup> est, cæteris pus mouentibus. <sup>\*linamentis, idque</sup>

## ENARRATIO.

At in ceruice.

**B**RONCHOCELE tumor grandis & rotundus est in ceruice, ab interiore

parte, quam bronchon nominant, denominationem sortita: omnis enim tumor apud antiquos πῆλη vocabatur. Ægineta, sicut. & Aëtius, duplicem bronchoceles differentiationem.



tiam posuit; alteram videlicet quæ partium dilatatione fiat, atque hanc tanquam depuratoriam omnino relinquendam consilium; alteram in qua aut humor aliquis aut substantia in tunica continetur, quemadmodum

iam antè de steatmate, atheromate & meliceride diximus: atque hæc curationem admittit, eamque duplicem, nempe aut per incisionem aut per usionem.

## CAPVT XIII.

*De Umbilici vitis.*

**S**VNT etiam circa Umbilicum plura vitia, de quibus propter raritatem inter auctores parum constat. Verisimile est autem id à quoque prætermisum, quod ipse non cognoverat, à nullo id quod non viderat fictum. Commune omnibus est, umbilicum indecorè prominere. Causæ requiruntur. Meges tres has posuit. Modò intestinum eò irrumperè, modò omentū, modò humorem. Sofstratus nihil de omento dixit. Duobus iisdem adiecit, carnem ibi interdum increlescere; eamque modò integram esse, modò carcinomati similem. Gorgias ipse quoque omenti mentionem omisit. Sed eadem tria causatus, spiritum quoque interdum eò dixit irrumperè. Hieron omnibus his quatuor positis, & omenti mentionem habuit, & eius quod simul & omentum & intestinum habuerit. Quid autem horum sit, his indiciis cognoscitur. Vbi intestinum prolapsū est, tumor neque durus, neque mollis est, omni frigore comminuitur: non solum sub omni calore, sed etiam retento spiritu crescit. Sonat interdum, atque vbi resupinatus est aliquis, delapso intestino ipse desidit. Vbi verò omentum est, cætera similia sunt, tumor mollior ab ima parte, \* latus extenuatum in ventrem est, si quis apprehendit, clabitur. Vbi utrunque est, indicia quoque mixta sunt, & inter utrunque mollities. At caro durior est, semperque etiam resupinato corpore tumet, prementiq. non cedit, prioribus faciliè cedentibus. Si vitiosa est, easdem notas habet, quas in carcinomate exposui. Humor autem si premitur, circumfluit. At spiritus pressus cedit, sed protinus redit, resupinato quoque corpore tumorem in eadem figura tenet. Ex his id quod ex spiritu vitium est, medicinā non admittit. Caro quoque carcinomati similis cum periculo tractatur.

Itaque

\* non imminuitur:

\* vna

\* latus, extenuatus in ventrem est:



Itaque omittenda est. Sana excidi debet, idque vulnus linamentis curari. Humorem quidam vel inciso summo tumore effundunt, & vulnus \* iisdem linamentis curant. In reliquis variæ sententiæ sunt. Ac resupinandum quidem corpus esse res ipsa testatur, ut in \* vterû siue intestinum, siue omentum est, delabatur. Sinus verò umbilici tum vacuus à quibusdam duabus regulis \* exceptus est, vehementerque earum capitibus deligatis, ibi emoritur. A quibusdam ad imum acu traiecitur, duo lina ducente, deinde utriusque lini duobus capitibus diuersæ partes astringuntur. Quod in vna quoque oculi sit. Nam \* sic id quod supra vinculum est, moritur. Adiecerunt quidam, ut antequam vincirent, summum vna linea inciderent, exciderentque quo facilius digito demisso, quod illuc irrupisset, depellerent, tum deinde \* vinxerunt. Sed abunde est, iubere spiritum continere, ut tumor quantus maximus esse potest, se ostendat, tum imam basim eius atramento notare, resupinatoque homine digitis tumorem cum premere, ut si quid delapsum non est, manu cogatur. Post hæc umbilicum attrahere, & quâ nota atramenti est, lino vehementer astringere. Deinde partem superiorem aut medicamentis, aut ferro adurere donec emoriatur, atque ut cætera vsta vlcus mutire. Idque non solum vbi intestinum vel omentum vel vtrumque est, sed etiam vbi humor est, optimè proficit. Sed antè quædam videnda sunt, ne quod ex vinculo periculum sit. Nam curationi neque infans, neque aut robustus annis, aut senex aptus est, sed à septimo ferè anno ad quartumdecimum. Deinde ei corpus idoneum est id, quod integrum est. At quod mali habitus est, quodque papulas, impetigines, similiaque habet, idoneum non est. Leuibus quoque tumoribus faciliè subuenitur. At in eorum, qui nimis magni sunt, curatione periculum est. Tempus autem anni & autumnale, & hybernum vitandum est. Ver idoneum maximè est. Ac prima æstas non aliena est. Præter hæc abstinere pridie debet. neque id satis est: sed aluus quoque ei ducenda est, quo facilius omnia quæ excesserunt, intra aluum confidant.

n n

E N A R -



## ENARRATIO.

**E**ξέμφαλον vocari diximus: Paulum easdem umbilici prominentis causas, & signa libro VI. capite LI. describit.

Idque non solum.

ÆGINETA tamen adlionem hanc ad omnes aut intestini curacionem tantum

pertinere ait: Nam si caro, inquit, aut humor aut sanguis vitium creavit, tumoris medio circulatim præciso, deinde eoque incidet extra peritonæum sublato, curacionem in umbilico carni generanda dicata tentabimus.

## CAPVT XV.

*Quomodo aqua hydropicis emittatur.*

**A**QUAM his qui hydropici sunt, emitti oportere aliàs dixi. Nunc quemadmodum id fiat, dicendum. Quidam autem sub umbilico fere quatuor interpositis digitis à sinistra parte. Quidam ipso umbilico perforato, facere consueverunt. Quidam cute primùm adusta, deinde interiore abdomine inciso, quia quod per ignem diuisum est, minus celementer coit. Ferramentum autem demittitur, magna cura habita, ne qua vena incidatur. Id tale esse debet, ut ferè tertiam digiti partem latitudo mucronis impleat. Demittendumque ita est, ut membranam quoque transeat, qua caro ab interiore parte finitur, eò tum plumbea aut ænea fistula iniicienda est, vel recuruatis in exteriorem partem labris, vel in \* media circumfurgente \* quodam nodo, ne tota intus delabi possit, huius ea pars quæ intrà, paulo longior esse debet, quàm quæ extrà, ut ultra \* vltiorem membranam procedat. Per hanc effundendus humor est. Atque ubi maior pars eius euocata est, cludenda demisso linteolo fistula est. & in vulnere, si id vltum non est, relinquenda. Deinde per insequentes dies circa singulas heminas emittendum, donec nullum aquæ vestigium appareat. Quidam tamen etiam non vltà cute protinus fistulam recipiunt, & super vulnus spongiam expressam deligant. Deinde, postero die rursus fistulam demittunt, quod recens vulnus paulum diductum patitur, ut si quid humoris superest, emittatur. Idque bis ita fecisse contenti sunt.

ENAR-

\* medio  
\* quadam  
mota,  
\* interio-  
rem



## ENARRATIO.

Demittendumque ita est.

CAVENDVM tamen est, ne ea parte sectionem moliamur, cui vitium incumbit: nam si licet e primario affectu ortum sit, dexteriore umbilici parte sectionem fa-

ciemus; siu primario iecinoris affectui malum fuerit acceptum, à sinistro umbilici parte dissecavimus: sed & non quævis hydropis species chirurgiam admittit, verum ea tantum, quæ ascites dicitur, in qua videlicet humor in uterum influit.

## CAPVT XVI.

*De intestinorum vulneratorum curationibus.*

NONNVNQVAM autem venter ictu aliquo perforatur, sequiturque ut intestina euoluantur. Quod ubi incidit, protinus considerandum est, an integra ea sint, deinde an his color suus maneat. Si tenuius intestinum perforatum est, nihil profici posse iam retuli. Latius intestinum sui potest, non quòd certa fiducia sit, sed quòd dubia spes certa desperatione sit potior. Interdum enim glutinatur. Tum si utrumlibet intestinum lividum, aut pallidum, aut nigrum est, quibus illud quoque necessario accedit, ut sensu careat, medicina omnis inanis est. Si verò adhuc ea sui coloris sunt, cum magna festinatione succurrendum est. Momento enim alienantur externo & insueto spiritu circumdata. Resupinandus autem homo est coxis erectioribus. Et si angustius vulnus est, quàm ut intestina commodè refundantur, incidendum est donec satis pateat. Ac si iam sicciora intestina sunt, perluenda aqua sunt, cui paulù admodum olei sit adiectum. Tum minister oras vulneris leuiter diducere manibus suis, vel etiam duobus hamis membranæ interiori iniectis debet medicus priora semper intestina quæ posteriora prolapsa sunt, conde-  
re, sic ut orbium singulorum locum seruet. Repositis omnibus, leniter homo concutiendus est. Quo fit, ut per se singula intestina in suas sedes diducantur, & inibi \*concidant. His conditis omentum quoque considerandum est, ex quo si quid iam nigri & emortui est, forfice excidi debet. Si quid integrum est, \*leniter super intestina \*deduci: sutura autem  
nn 2 neque

\*confidant

\*leniter  
\*deduci:



\*facienda  
vel iniicienda

\*fit quæ  
acuta, propinqua  
quæ ret. e.

\*expres-  
sam

neque summæ cutis, neque interioris membranæ per se satis proficit, sed vtriusque. Et quidem duobus linis \*vincienda est spissior, quàm alibi: quia & rumpi facilius motu ventris potest, & non æquè magnis inflammationibus pars ea exposita est. Igitur in duabus acubus fila traicienda, eaq. duabus manibus tensa, & prius interiori membranæ futura iniicienda est, sic ut sinistra manus in dexteriore ora, dextra in sinistriori à principio vulneris orsa, ab interiori parte in exteriorem acum immittat. Quo fit, ut ab intestinis ea pars semper acuum longè \*sit, quæ retusa est. Semel utraque parte traiecta permutandæ acus inter manus sunt, ut ea sit in dextra, quæ fuit in sinistra, ea veniat in sinistram, quam dextra continuit. Iterumque eodem modo per oras immittendæ sunt. Atque ita tertio & quarto, deincepsque permutatis inter manus acubus includenda plaga. Post hæc eadem fila, eademque acus ad cutem transferendæ. Similique ratione ei quoque parti utraque futura iniicienda, semper ab interiori parte acubus venientibus, semper inter manus traiectis. Dein glutinantia iniicienda. Quibus aut spongiam, aut succidam lanam ex aceto \*impressam accedere debere manifestius est, quàm ut semper dicendum sit. Impositis his leuiter deligari venter debet.

#### ENARRATIO.

Interdum enim glutinatur.

**P**RÆSERTIM si non disscissum, neque aliè vulnere fuerit: verum & tunc quidem difficulter congruitur, tum propter intestinorum, ut antè diximus, substantiam, tum quòd vulnus ipsum oculus sese non offerat, atque localia non admittat; sicut in omnibus intrinsecis videre licet, in quibus per potiones eandem consolidare solent.

Et si angustius vulnus.

**P**RIVS tamen considerandum monet Galenus, & post eum Albucas, an statim in restinum distendens, ipsum remitti prohibeat: nam tum quidem ante ulteriorem vulveris apertionem resoluentibus ac modicè calidis fovendum est intestinum, atque sensim in suam sedem restituendum. vide Paulum libro VI. capite LII.

#### CAPUT.



## CAPVT XVII.

*De Interiore parte abdominis rupta, & qua ratione curanda sit.*

**I**NTERDVM tamen vel ex ictu aliquo, vel retento diutius spiritu, vel sub graui fascie interior abdominis membrana superiore cute integra, rumpitur. Quod fœminis quoque ex utero sæpe euenire consuevit, sitque præcipuè circa illa, sequitur autem cum superior caro mollis sit, ut non satis intestina contineat, hisque intenta cutis indecorè intumescat. Atque id quoque aliter ab aliis curatur. Quidam enim per acum duobus lineis ad imam basim immissis, sic utrinque deuinciunt, quemadmodum & in umbilico, & in yua positum est, ut quicquid \* super vinculum est, emoriatur: quidam medium tumorem excidunt, ad similitudinem myrtacei folij, quod semper eodem modo seruandum esse iam posui, & tum oras futura iungunt. Commodissimum est autem resupinato corpore, experiri manu, qua parte is tumor maxime cedat, quia necesse est ea parte rupta membrana sit, quaque integra est, ea magis obnitatur, tum qua rupta videbitur, \* im-  
mittendæ scalpello \* duæ tunicae sunt, ut exciso medio inter-  
rior membrana utrinque recentem plagam habeat, quia quod  
vetus est, futura non coit, loco patefacto. Si qua parte mem-  
brana non nouam plagam, sed veterem habet, tenuis exci-  
denda habena est, quæ tantum ora eius exulceret. Cætera,  
quæ ad futuræ reliquam curationem pertinent, suprâ com-  
prehensa sunt.

\* supra

\* inciden-  
dæ  
\* duæ li-  
near

## ENARRATIO.

**P**ER abdominis membranam peritonæum intelligit; Arabes siphac nomi-  
nant. est autem peritonæum circa pubis os  
tenuissimum; unde & itidem facillimè  
distrumpitur, illaque intestina in scrotum  
ruunt.

*De Varicibus ventris.*

**P**RÆTER hæc euenit, ut in quorundam ventribus varices sint, quarum quia nulla alia curatio est, quàm quæ in cruribus esse consuevit, tum eam partem explanaturus, hanc quoque eò differo.

n.n. 3

CAPVT.



*De Testiculorum natura, & morbis eorum.*

VENIO autem ad ea, quæ in naturalibus partibus circa testiculos oriri solent, quæ quo facilius explicem, prius ipsius loci natura paucis proponenda est. Igitur testiculi simile quiddam \* glandulis habent. Nam sanguinem non emittunt, & omni sensu carent. Doient autem in ictibus & inflammationibus tunica, quibus hi continentur. Dependent verò ab inguinibus per singulos nervos, quos κρεμοσῆρας Græci nominant, cum quorum utroque binæ descendunt & venæ & arteriæ. Hæ autem tunica conteguntur tenui, nervosa, sine sanguine, alba, quæ \* ἐνθροεδῆς à Græcis nominatur: super eam valentior tunica est, quæ interiori vehementer ima parte inhaeret, Darton Græci vocant. Multæ deinde membranulae venas & arterias, eosque nervos comprehendunt. Atque inter duas quoque tunicas superioribus partibus leues, paruulaeque sunt. Haecenus propria utrique testiculo & velamenta & auxilia sunt. Communis deinde utrique, omnibusque interioribus sinus est, qui iam conspicitur à nobis, ὄρχην Græci, serotum nostri vocant, ilque ab ima parte medius tunicis leuiter innexus est, à superiore tantum circumdatus est. Sub hoc igitur plura vitia esse consueverunt. Quæ modò ruptis tunicis, quas ab inguinibus incipere proposui, modò his integris sunt. Siquidem interdum vel ex morbo primum inflammatur, deinde postea pondere abrumpitur, vel ex ictu aliquo protinus rumpitur tunica, quæ diducere ab inferioribus partibus intestina debuit, tum pondere eò deuoluitur, aut omentum, aut etiam intestinum. Atque ibi reperiata via, paulatim ab inguinibus in inferiores quoque partes \* demissum, subinde nervosas tunicas, & ob id eius recipientes diducit, ἐντροχήλην & ἐπιπλοκήλην Græci vocant, apud nos indecorum, sed commune his Hernia nomen est. Deinde si descendit omentum, nunquam in seroto tumor tollitur, siue inedia fuit, siue corpus huc illucve conuersum, aut aliquo

\* glandulis

\* ἐνθροεδῆς

serotum

\* nifunt,

Hernia.



aliquo modo collocatum. Itemque si retentus est spiritus, non magnopere increfcit, tactu verò inæqualis est, & mollis, & lubricus. At si intestinum quoq. descendit, \* tumor is sine  
 inflammatione modò minuitur, modò increfcit. Estque  
 ferè sine dolore, & cum conquiescit aliquis, aut iacet, inter-  
 dum ex toto \* desidit, interdum sic \* diuiditur, vt in scroto  
 exiguae reliquiae mancant. \* At si clamore & satietate, & si sub  
 aliquo pondere is homo nixus est, crefcit, frigore omni con-  
 trahitur, calore \* diffunditur. Estque tum scrotum & rotun-  
 dum, & tactu leue, idque quod subest, lubricum est: si pres-  
 sum est, ad inguen reuertitur, demissumque iterum cum quo-  
 dam quasi murmure deuoluitur. Et id quidem in leuioribus  
 malis euenit. Nonnunquam autem, stercore \* accepto vastius  
 tumet, retroque compelli non potest: adfertque tum dolo-  
 rem & scroto, & inguinibus, & abdomini: nonnunquam sto-  
 machus quoque affectus, primùm ruffam bilem per os red-  
 dit, deinde viridem, quibusdam etiam nigram. Integris verò  
 membranis interdum eam partem humor \* distendit.  
 eius quoque species duæ sunt. Nam vel inter tunicas is in-  
 crefcit, vel in membranis, quæ ibi circa venas & arterias sunt,  
 vbi hæ grauata occaluerunt. Ac ne ei quidem humori, qui  
 inter tunicas est, vna sedes est. Nam modò inter summam  
 & mediam, modò inter mediam & imam consistit. Græci  
 communi nomine quicquid est, *ὀδρονήλην* appellant: nostri,  
 vt scilicet nullis discriminibus satis cognitis, hoc quoque sub  
 eodem nomine, quo \* priora habent. Signa autem quædam  
 communia sunt, quædam propiora. Communia, quibus hu-  
 mor deprehenditur. Propria, quibus locis humorem subesse  
 dicimus: si tumor est, nunquam ex toto se remittens, sed in-  
 terdum leuior, aut propter famem, aut propter febriculam,  
 maximeque in pueris, isque moris est, si non nimius humor  
 subest. At si is vehementer increuit, renititur sic, vt vter re-  
 pletus, & arte astrictus. Venæ quoque in scroto instantur, &  
 si digito pressimus, cedit humor, circumfluentque id quod  
 non premitur, attollit, & tanquam in vitro cornuæ per scro-  
 tum apparet, isque. (quantum in ipso est) sine dolore est. Sedes  
 autem

\* humor  
his\* desinit,  
\* distendi-  
tur,

\* At clam.

\* distendi-  
tur.

\* concepto

\* disten-  
dit.

\* propiora



visu, vel  
tactu,

autem eius sicprehenditur: Si inter summam mediam-  
que tunicam est, cum digitis duobus pressimus, paulatim hu-  
mor inter eos reuertens subit, scrotum ipsius albidius est. Si  
ducitur, aut nihil, aut paruulum intenditur, testiculus eaparte  
neque visu, neque tactu sentitur. At si sub media tunica est,  
intentum scrotum magis se attollit, adeo, vt superior coles  
sub tumore eo delitescat. Præter hæc æquè integris tunicis  
ramex innascitur, *κισσοκήλην* Græci appellant, cum venæ intum-  
lescunt. Hæ quoque intortæ conglomeratæque ad superio-  
rem partem, vel ipsum scrotum implent, vel mediam tuni-  
cam, vel imam. Interdum etiam sub ima tunica circa ipsum  
testiculum neruumque eius crescunt. Ex his eæ quæ in  
ipso scroto sunt, oculis patent: hæ verò quæ mediæ imæve  
tunicæ insident, vt magis conditæ, non æquè quidem cernun-  
tur, sed tamen etiam visui subiectæ sunt, præterquam quod  
& tumoris aliquid est, pro venarum magnitudine & modo:  
& id prementi magis reuitur, ac per ipsos venarum toros  
inæquale est: & qua parte id est, testiculus magis iusto de-  
pendet. Cum verò etiam super ipsum testiculum neruum-  
que eius, id malum increuit, aliquanto longius testiculus ipse  
descendit, minorque altero fit, vtpote alimento amisso. Rarò,  
sed aliquando caro quoque inter tunicas crescit, *σαρκοκήλην*  
Græci vocant. Interdum etiam ex inflammatione tumet  
ipse testiculus, ac febres quoque adfert, & nisi celeriter ea in-  
flammatio conuicuit, dolor ad inguina atque ilia peruenit,  
partesque hæ intumescunt: neruus ex quo testiculus depen-  
det, plenior fit, simulque indurescit: super hæc inguen quo-  
que nonnunquam varices implent, *βεβρωκήλην* appellant.

#### ENARRATIO.

quos *κρημασῆρας*.

**A**LIJ parastatas nominant: spinalis  
medulla ex cerebro propagines sunt.

quæ *ἐρυθροειδῆς*.

VERBUM hoc (inquit Ioannes Ca-  
sarius) quum de eo diu iam dubitarem quo-

nam modo scribendum esset, propterea quod  
uondum ad manus mihi erant Galeni ope-  
ra Græca omnia, unde ipsum restitui posse  
conieciabam; nec falsò: tandem à doctissimo  
Georgio Agricola restitutum accipio; quæ  
tamen & ipse de eius verbi scriptura, se ali-  
quando dubitasse literis ad me scriptis testa-  
tur, quod apud ipsum Galenum loco vno

ait



aut altero ita scriptum inuenierit, *ἐν τῇ ἐν-  
δῆς*, per τ non per θ, in eodem significatu; id  
quod Articorum cōsuetudine, proprietatē ve  
factum à Galeno existimat, ut qui ε pro λ  
scribere consueuerant, ut *πελῖσανον ἀντὶ τοῦ  
κλίσανου*. Verum quum idem verbum apud  
eundem Galenum locis compluribus, & apud  
alios eiusdem professionis auctores scriptum  
inuenisset, eo quo nunc modo annotatum  
est, hic quoque scribendum adiudicabat; ver-  
bum videlicet deductum ἀπὸ τῆς ἐλύτρεν  
αἰδῆς. Sunt tamen alij doctissimi viri,  
quibus per θ scribendum magis placuerit,  
quum passim in suis translationibus tuni-  
cam aut pelliculam rubicundam red-  
diderint.

### Nonnumquam autem stercore.

PAVIUS interdum periculum asserre  
docet; & Aëtius mortem nonnumquam mi-  
nari contendit.

### Signa autem quædam.

AETIVS libro XIII. capite XXII.  
ex Leonida clarius paulo signa hæc descri-  
bit, in hunc modum: Hernia aquosa quan-  
doque ex occulta, quandoque ex manifesta  
causa contingit: ex occulta quidem, quum  
aquosus humor circa partes corporis, colorum  
qua scrotum contexunt, ac implicari, san-  
guini admixtus collectus fuerit: ex mani-  
festa verò, quando ex plaga collisis aut fra-  
ctis vasis sanguis effluens ad aquosam sub-  
stantiam transmutatur. Vbi igitur spontè  
constiterit aquosus humor collectus, subflauus  
ac pallidus inuenitur; ubi verò ex plaga,  
cruentam ac fœculentam materiam inue-  
nies. Humor autem vel intra rubicundam  
testiculi pelliculam consistit, vel extra eam,  
inter ipsam & pelliculas adiacentes; vel in  
propria pellicula velut vesica quadam con-

tinetur: atque hoc genus herniam in tunica  
superaguata vocamus. Aliquando verò du-  
plex hernia oboritur, quum collectio, & in  
rubicunda tunica, & in superaguata consi-  
stet. Si quidem igitur in pellicula rubicunda  
humor collectus fuerit, tumor unius coloris  
apparet, sine dolore: in principio dum adhuc  
parua collectio est ad contactum cedens; po-  
stèa verò aucta collectione, testiculus humore  
undique circumdatus occultatur, ac tumor  
in ambitu extensus ac veniens, ad tactum  
hernia carnosæ sufficionem plerique exhibet.  
possunt tamen tactu discerni: nam her-  
nia carnosæ omnino renuitur; verò aquosa  
digitis cedit. Si verò in superaguata tunica  
humor colligitur, tumor ipse, siue magnus  
siue parvus fuerit, omnino circumscribetur.  
At si simul in rubicunda quoque pellicula  
collectus fuerit, duo tumores deprehenden-  
tur, alter in superaguata, alter in rubicunda  
tunica. Quod si extra rubicundam pellicu-  
lam collectio fiat, testiculus tactui occurrit.  
Hæc ex Leonida Aëtius: quæ idè adscripta  
volui, quòd ad capitis huius declarationem  
plurimum facere viderentur. Solent porro  
hernie aut ramicis species hisce nominibus  
distingui: *ἐν τῇ ἐσχάτῃ* vocant, quoties in  
scrotum intestinum deuoluitur; Latini inte-  
stinorum ramicem, Auicenna rupinam no-  
minat. *ἐπιπλοκήλην*, si omentum descen-  
dat; Auicenna Zirbi, Latini omenti rami-  
cem dicunt. *ὀδὲ ἐσχάτῃ*, Latini & Auicen-  
na indifferenter aqua ramicem appellant.  
*σπερματική* autem carnosam ramicem di-  
cimus; ut *κυστική*, varicosum: quod  
accidit quoties vena ultra modum repleta  
glomerantur. Si affectio composita est ex  
omenti & intestini simul prolapsu, *ἐπι-  
πλοσπερματική* vocant: *βομβανική*  
verò, si non in scrotum, sed in inguina de-  
uoluantur contenta; nos inguinis ramicem  
dicimus.



## CAPVT XIX.

*De testicularum curationibus communibus, & primò de incisione & curatione inguinis, vel scroti.*

**H**is cognitis, de curatione dicendum est, in qua quædam communia omnium sunt, quædam propria singulorum. Prius de communibus dicam. Loquar autem nunc de his, quæ scalpellum desiderant. Nam quæ vel sanari non possint, vel aliter nutrirî debeant, dicendum erit, simul \* ad species singulas venero. Inciditur autem interdum inguen, interdum scrotum. In vtraque curatione, homo ante \* triduo bibere aquam, pridie abstinere etiam à cibo debet, ipso autem die collocari supinus: deinde si inguen incidendum est, idque iam pube contegitur, antè radendum est, & tum extento scroto, ut cutis inguinis intenta sit, id incidendum sub imo ventre, quæ cum abdomine tunicæ inferiores committuntur. Aperiendum autem audacter est, donec summa tunica, quæ ipsius scroti est, incidatur, perueniaturque ad eam, \* qua media est plaga facta. Foramen deorsum versus subest. In id demittendus est sinistræ manus digitus index, ut diductis interuenientibus membranulis \* simul laxet. Minister autem sinistra manu comprehenso scroto, sursum versus eum debet extendere, & quammaximè ab inguinibus abducere: primùm cum ipso testiculo, dum medicus omnes membranas, quæ super mediam tunicam sunt, si digito deducere non potest, scalpello abscindat. Deinde sine eo, ut is \* delapsus ipsi plagæ iungatur, digitoque inde promatur, & super ventrem cum duabus suis tunicis collocetur. Inde si quæ vitiosa sunt, circuncidenda sunt. In quibuscùm multæ venæ discurrant, tenuiores quidem præcidi protinus possunt: maiores verò antè longiore lino deligandæ sunt, ne periculosè sanguinem fundant. Sin media tunica vexata erit, aut sub ea malum increuerit, excidenda erit, sic, ut altè ad ipsum inguen præcidatur. Infrà tamen non tota demenda est. Nam quod ad basim testiculi vehementer cum ima tunica connexum est,

\* ac ad

\* triduo

\* quæ med.  
est. Plaga  
facta for.  
\* sinum

\* elapsus



est, excidi sine summo periculo non potest. Itaque ibi relin-  
quendum est. Idem in una quoque tunica, si læsa est, facien-  
dum est. Sed non à summa inguinis plaga, verum infra pau-  
lum ea abscindenda, ne læsa abdominis membrana inflam-  
mationes moueat. Neque tamen nimium ex ea sursum re-  
linquendum est, ne postea sinuetur, & sedem eidem malo  
præstet. Purgatus\* ita testiculus per ipsam plagam, cum ve-  
nis & arteriis, & nervo suo\* leuiter demittendus est, viden-  
dumque ne sanguis in scrotum descendat, neve concretus  
aliquo loco maneat. Quæ ita fient, si venis vinciendo medi-  
cus prospexerit: lina quibus capita earum continebuntur, ex-  
tra plagam dependere debebunt, quæ pure orto sine vlllo do-  
lore excident. Ipsi autem plagæ iniiciendæ duæ fibulæ sunt,  
& insuper medicamentum quo\* glutinentur. Solet inter-  
dum ab altera ora necessarium esse aliquid excidi, vt cicatrix  
maior & latior fiat. Quod vbi incidit, linamenta supèr non  
\*fulcienda, sed leuiter tantum ponenda sunt, supraque ea  
quæ inflammationem repellant, id est, ex aceto vel lana suc-  
cida vel spongia. Cætera eadem quæ vbi pus moueri debet,  
adhibenda sunt. At cum\* infra incidi oportet, resupinato  
homine subiicienda sub scroto sinistra manus est, deinde id  
vehementer apprehendendū, & incidendum. Si paruulum est  
quod nocet, modicè, vt tertia pars integra ad sustinendum  
testiculum infra relinquatur. Si maius est, etiam amplius, vt  
paulum tantummodo ad inum, cui testiculus insidere possit,  
integrum maneat. Sed primò rectus scalpellus, quam leuif-  
sima manu teneri debet, donec scrotum ipsum diducat. Tum  
inclinandus mucro est, vt\* transuersa membrana secet, quæ  
inter summam mediamque tunicam sunt. At si vitium in  
proximo est, mediam tunicam attingi non oportet. Si sub  
illa quoque conditur, etiam illa incidenda est, sic vt tertia  
quoque, si illa vitium tegit. Vbicunque repertum malum est,  
ministrum ab inferiore parte exprimere moderatè scrotum  
oportet, medium digito, manubriolo, vel scalpello diductam  
inferiorem partem tunica extrà collocare: deinde eam ferra-  
mento, quod ad similitudinem curuum vocant, incidere,

\* itaque  
\* leniter

\* glutine-  
tur.

\* fascienda

\* inguen

\* transuer-  
sas mem-  
branas



sic ut in eadem intrare duo digiti, index & medius, possint.  
 • *confectis* His deinde \*coniectis, excipienda reliqua pars tunicae, & inter  
 digitos scalpellus immittendus est, eximendumque aut effun-  
 dendum quicquid est noxium. Quamcunque autem tuni-  
 cam quis violavit, illam quoque debet excidere, ac mediam  
 quidem (ut supra dixi) quam altissime ab inguine, imam au-  
 tem paulo infra. Ceterum antequam excidantur, hæ quo-  
 • *summa* que vinciri lino \*summè debent, & eius lini capita extra pla-  
 • *illis* gam relinquenda sunt, sicut in \*aliis quoque venis, quæ id re-  
 quisierint. Eo facto testiculus intus reponendus est, oræque  
 scroti suturis inter se committendæ, neque paucis, ne parum  
 glutinentur, & longior fiat curatio; neque multis, ne inflam-  
 mationem augeant. Atque hinc quoque videndum est, ne quid  
 in scroto sanguinis maneat. Tum imponenda glutinantia  
 sunt. Si quando autem in scrotum sanguis defluxit, aliquidve  
 concretum ex eo decedit, incidi subter id debet, purgatoque  
 eo spongia acri aceto madens circumdari. Deligatur autem  
 vulnus omne, quod ex his causis factum est. Si dolor nullus  
 est, quinque primis diebus non est resoluendum, sed bis die  
 • *irroran-* tantum aceto \*irroranda lana vel spongia. Si dolor est, tertia  
 • *dum* die resoluendum, & ubi fibulae sunt, hæ incidendæ, ubi lina-  
 mentum, id mutandum est: rosaque & vino madefaciendum  
 id, quod imponitur. Si inflammatio increfcit, adiciendum  
 prioribus cataplasma ex lenticula & melle, vel ex malicorio,  
 quod in austero vino coctum sit, vel ex his mistis. Si sub his  
 inflammatio non conquirit, post diem quintum multa ca-  
 lida aqua vulnus fouendum, donec scrotum ipsum & exte-  
 nuetur, & rugosius fiat. Tum imponendum cataplasma ex  
 triticea farina, cui resina pinea adiecta sit. Quæ ipsa si robu-  
 stus curatur, ex aceto: si tener, ex melle coquenda sunt. Ne-  
 • *virium* que dubium est, quodcumque \*initium fuit, si magna in-  
 flammatio est, quin ea, quæ pus mouent, imponenda sint.  
 Quod si pus in ipso scroto ortum est, paulum id incidi de-  
 bet, ut exitus detur. Linamentumque eatenus imponendum  
 est, ut foramen tegat. Inflammatione finita, propter nervos  
 • *propiore* \*priori cataplasmate, deinceps utendum est. Hæc propriè  
 ad eius-



ad eiusmodi vulnera pertinent. Cetera & in curatione, & in victu similia his esse debent, quæ in alio quoque vulnerum genere præcepimus.

## ENARRATIO.

deinde si inguen incidendum.

**E**TSI omnes veteres intestinorum ramis inciso inguine curationem moliri sint; Paulus tamen à recentioribus magis

probatam dicit eam quæ per usionem fit, quam & ipse Aetius commendat: nam, Tutissima, inquit, curatio herniarum, chirourgia & usione perficitur, si peritus artifex contingat; tutior tamen ipsa chirourgia est usio.

## CAPUT XX.

*De intestini curatione.*

**H**IS propositis, ad singulas species veniendum est, ac si cui parvulo puero intestinum descendit, ante scalpellum experienda iunctura est. Fascia eius rei causa fit, cui imo loco pila assuta est ex panniculis facta, quæ ad repellendum intestinum ipsi illi subiicitur, deinde reliqua fasciæ pars arcè circumdatur, sub quo sæpe & intus compellitur intestinum, & inter se tunicæ glutinantur. Rursus si ætas processit, multumque intestini descendisse ex tumore magno patet, adiiciunturque \*dolor & vomitus, quæ ex stercore, & ex cruditate eò delapso ferè accidunt, scalpellum adhiberi sine perniciæ non posse manifestum est. Levandum tantummodo malum, & per alias curationes extrahendum est. Sanguis mitti ex brachio debet, deinde, si vires patiuntur, imperanda tridui abstinencia est: si minus, certè pro vi corporis quàm \*longissima. Eodem verò tempore supèr habendum cataplasma ex lini semine, quod antè aliquis ex mulso decoxerit. Post hæc & farina hordeacea cum resina iniicienda, & is demittendus in solium aquæ calidæ, cui oleum quoque adiectum sit, dandumque aliquid cibi \*lenis calidi. Quidam etiam aluum ducunt. Id ducere aliquid in scrotum potest, educere ex eo non potest. Per ea verò, quæ suprà scripta sunt, levato malo, si quando aliàs dolor reuerterit, eadem erunt facienda. Sine

\*dolores

\*longissima.

\*levis



\* non nisi  
cum  
\* incidenda  
\* diducta  
\* is ipse

dolore quoque, si multa intestina prolapsa sunt, secari superuacuum est, non quod excludi à seroto non possint, nisi tamen id inflammatio prohibuit, sed quod repulsa inguinibus immorentur, ibique tumorem excitent, atque ita fiat mali non finis sed mutatio. At in eo quem scalpello curari oportebit, simulatque ad mediam tunicam vulnus in inguine factum peruenierit, duobus hamulis ea iuxta ipsas oras apprehendi debet, dum eductis omnibus membranulis medicus eam liberat. Neque enim \* cum periculo lādatur, quæ \* excidenda est, cum intestinum esse nisi sub ea non possit. Vbi \* deducta autem erit, ab inguine vsque ad testiculum incidere debet, sic, ne \* ipse lādatur, tum excidi. Ferè tamen hanc curationem puerilis ætas, & modicum malum recipit. Si vir robustus est, maiusque id vitium est, extrahi testiculus non debet, sed in sua sede permanere. Id hoc modo fit. Inguen eadem ratione vsque ad mediam tunicam scalpello aperitur, eaque tunica eodem modo duobus hamis excipitur, sic ut à ministro testiculus catenus contineatur, ne per vulnus exeat: tum ea tunica deorsum versus scalpello inciditur, sub eaque index digitus sinistræ manus ad imum testiculum demittitur, eumque ad plagam compellit. Deinde dextræ manus duo digiti pollex atque index, venam & arteriam & neruum, tunicamque eorum à superiore tunica diducunt. Quod si aliquæ membranulæ prohibent, scalpello resoluuntur, donec ante oculos tota iam tunica sit. Excisis quæ excidenda sunt, repositoque testiculo, ab ora quoque eius vulneris, quod in inguine est, demenda habenula paulò latior est, quo maior plaga sit, & plus creare carnis possit.

## ENARRATIO.

**A**GINETA cum tantum qui ex intensione critæ, intestinum ramice chirurgiā curandum dicit: Alexander Benedictus libro XXI. capite XXV. à se primum proditum curandi citra ferramentum alium modum dixerit: qui etsi ma-

num emixto desiderare videatur, vnicā tamen punctione consistat, & nec sanguinis profusum, neque ullam inflammationem comitem habet, eam curationem non solum in intestini, sed & in omni ramice viliissimam dicit.

## CAPUT



## CAPVT XXI.

*De Omenti curatione.*

**A**T si omentum descendit, eodem quidem modo, quo  
 supra scriptum est, aperiendum inguen diducendæque  
 tunicae sunt. Considerandum autem est, maiorne is modus,  
 an exiguus sit. Nam quod paruulum est, super inguen in  
 alutem vel digito vel auerso specillo repellendum est. Si plus  
 est, sinere oportet dependere, quantum ex vtero prolapsum  
 est, idque adurentibus medicamentis illinere, donec emoria-  
 tur & excidat. Quidam hinc quoque duo lina acu traiciunt,  
 binisque singulorum capitibus diuersas partes astringunt. Sub  
 quo æquè, sed tardiùs emoriatur. Adicitur tamen hinc quo-  
 que celeritati, si omentum super vinculum illinitur medica-  
 mentis quæ sic exedunt, ne erodant, \*σπτηνὰ Græci vocant. \*σπτηνὰ  
 Fuerunt etiam qui omentum forfice præciderent, quod in  
 paruulo non est necessarium. Si maius est, potest profusio-  
 nem sanguinis facere. Siquidem omentum quoque venis  
 quibusdam etiam maioribus illigatum est. Neque verò si  
 \*discisso ventre id prolapsum forfice præciditur, cum & \*discisso  
 emortuum sit, & aliter tutiùs auelli non possit, inde huc ex-  
 emplum transferendum est. Vulnus autem curari, si \*reli- \*reductū  
 ctum omentum est, sutura debet. Si id amplius \*fuit, & ex- \*fuit,  
 tra emortuum est, excisis oris, sicut supra propositum est. Si  
 verò humor intus est, incidendum est, in pueris quidem in-  
 guen, nisi in his quoque liquoris eius maior modus prohibet:  
 in viris verò & ubicunque multus humor subest, scrotum.  
 Deinde si inguen incisum est, eò protractis tunicis humor  
 effundi debet. Si scrotum, & sub hoc protinus vitium est,  
 nihil aliud quàm humor est effundendus, abscindendæque  
 membranulae sunt, si quæ eum continuerunt: deinde eluen-  
 dum id ex aqua, quæ vel salem adiectum, vel nitrum habeat:  
 si sub media imãve tunica, totæ hæ extra scrotum collo-  
 eandæ, excidendæque sunt.

CAPVT



**R**AMEX autem, si super ipsum scrotum est, adurendus est tenuibus & acutis ferramentis, quæ ipsis venis infingantur, cum eo ne amplius quàm has vrant, maximeque ubi inter se implicatæ glomerantur, eò ferrum id admouendum est, tum super farina ex aqua frigida subacta iniicienda est, utendumque eo vinculo, quod idoneum esse ani curationibus posui. Tertio die lenticula cum melle imponenda est, post eiectionis crustis vlcera melle purganda, rosa implenda, ad cicatricem aridis linamentis perducenda sunt. Quibus verò super mediam tunicam venæ tument, incidendum inguen est, atque tunica promouenda, ab eaq. venæ digito vel manubriolo scalpelli separandæ. Qua parte verò inhærebunt, & ab superiore & ab inferiore parte lino vinciendæ, tum sub ipsis vinculis præcidendæ, reponendusque testiculus est. At ubi supra tertiam tunicam ramex infedit, mediam excidi necesse est. Deinde, si duæ tresve venæ tument, & ita pars aliqua obsidetur, ut maiore \* vitio vacet, idem faciendum quod supra scriptum est, ut ab inguine & à testiculo deligatæ venæ præcidantur, isque condatur. Sin totum id ramex obsiderit, per plagam demittendus digitus index erit, subiiciendusque venis, sic ut paulatim protrahat æquè adducendo, donec is testiculus par alteri fiat. Tum fibulæ oris sic \* vinciendæ, ut simul eas quoque venas comprehendant. Id hoc modo fit: Acus ab exteriori parte oram vulneris perforat. Tum non per ipsam venam, sed per membranam eius immittitur, per eamque in alteram oram compellitur. Venæ vulnerari non debent, ne sanguinem fundant. Membrana semper inter has venas est, ac neque periculum affert, & \* filo comprehensas illas abundè tenet. Itaque etiam satis est, duas fibulas esse: tum venæ quæcunque protractæ sunt in ipsum inguen, \* aduerso specillo comprehendere debent: soluendi fibulas tempus \* inflammatione finita & purgato vulnere est, \* ut \* una simul & \* ima oras

\* sui parte  
vit.

\* iniicien-  
da,

\* filum

\* auerso  
specillo  
pellid.

\* &

\* ima

oras



oras & venas cicatrix deuinciat. Vbi verò inter imam tunicam & ipsum testiculum neruumque eius ramex ortus est, vna curatio est, quæ totum testiculum abscindit. Nam neque ad generationem quicquam is confert, & omnibus indecorè, quibusdam etiam cum dolore dependet. Sed tum quoque inguen incidendum, media tunica promenda, atque excidenda est, idem in ima faciendum, neruusque ex quo testiculus dependet, præcidendus. Post id venæ & arteriæ ad inguen lino deligandæ, & infra vinculum abscindendæ sunt.

## ENARRATIO.

Ramex autem si.

**V**IDE ne non legendum sit De varicis curatione: & rursum, Varix autem; ita ut hic varicosum ramicem intelligamus, quemadmodum iam ante quoque per omentum ac intestinum, omenti at-

que intestini ramicem comprehendimus: nam quod ita legendum censeam, facit quod curatio quam hic habet Celsus, omnino conveniat cum ea quam varicoso ramici ascribit Paulus: quanquam si quis veterem lectionem servare malit, non improbo.

## CAPVT XXIII.

*De Carne quæ inter tunicas testiculorum concrevit, & de neruo indurato.*

**C**ARO quoque, si quando inter tunicas concrevit, nihil dubij est, quin eximenda sit, sed id ipso scroto inciso fieri commodius est. At si neruus induruit, curari res neque manu neque medicamento potest. Vrgent enim febres ardentes, & aut virides aut nigri vomitus: præter hæc ingens sitis, & linguæ aspritudo, fereque à die tertio spumans bilis aluo cum rosione redditur. Atque neque assumi faciliè cibus, neque contineri potest, neque multo post extremæ partes frigescent, tremor oritur, manus sine ratione extenduntur, deinde in fronte frigidus sudor, cumque mors sequitur.

## ENARRATIO.

At si neruus induruit.

**S**VADENT propterea alij, ut ramicom hunc cen deploratum, ac desperata

salutis omnino, relinquamus prognostici, ac repudiemus.

P P

De



## CAPVT XXIIII.

*De Ramice inguinis.*

**V**BI verò in ipso inguinē ramex est, si tumor modicus est, semel incidi: si maior, duabus lineis debet, ut medium excidatur: deinde non extracto testiculo, sicut intestinis quoque prolapsis interdum fieri docui, colligendæ venæ, vinciendæque vbi tunicis inhærebunt, & sub his nodis præcidendæ sunt. Neque quicquam noui curatio vulneris eius requirit.

## ENARRATIO.

deinde non extracto. *id incisum magnum admodum periculum  
asserat.*  
**N**ON solum à testiculis temperandum est, sed & à peritonæo, quòd

## CAPVT XXV.

*Ad tegendam glandem colis, si nuda est.*

**A**B his ad ea transeundum est, quæ in cole ipso fiunt, in quo si glans nuda est, vultque aliquis eam decoris causa tegere, fieri potest, sed expeditius in puero quàm in viro. In eo cui id naturale est, quàm in eo, qui quarundam gentium more circumcisus est. In eo cui glans parua iuxtaque eam cutis, spatiosior verò ipse coles est, quàm in quo contraria his sunt. Curatio autem eorum, quibus id naturale est, cuiusmodi est: Cutis circa glandem \*apprehenditur & extenditur, donec illam ipsam condatur, ibique deligatur. Deinde iuxta pubem in orbem tergus inciditur, donec coles nudetur: magnaque cura cauetur ne vel vrinæ iter, vel venæ, quæ ibi sunt, incidantur. Eo facto cutis ad vinculum inclinatur, nudaturque circa pubem velut circulus, \*eoque linamenta dantur, ut caro increseat & id impleat, satilque velamenti suprà latitudo plagæ \*præstat. Sed donec cicatrix sit, vinctum esse id debet, in medio tantum relicto exiguo vrinæ itinere. At in eo qui circumcisus

\*prehenditur,

\*super coque

\*præstat.



cum cūsus est, sub circulo glandis scalpello diducenda cutis ab interiore cole est. Non ita \*dolet, quia summo soluto, diduci <sup>• vero dol.</sup> deorsum usque ad pubem manu potest. Neque ideo sanguis profluit. Resoluta autem cutis rursus extenditur. <sup>ra glan-</sup> dem. Tum multa frigida aqua fouetur, \*emplastrumque <sup>\* empla- stroq. cir- cumdatur, quod va- lenter</sup> circa datur, quod valentem inflammationem reprimat, proximisque diebus ut propè à fame victus est, ne fortè eam partem satietas excitet. Vbi iam sine inflammatione est, deligari debet à pube usque circulum. Super glandem autem aduerso emplastro imposito induci. Sic enim fit, ut inferior pars glutinetur, superior ita sanescat, ne inhæreat.

## ENARRATIO.

**P**AVLVS Ægineta lib. VI. cap. LIII. <sup>muniis nullam difficultatem pariat; tum quod neque tantum indecori afferat, ut ch- rurgi opera omnino opus sit.</sup> duplicem administrationis modum explicat: inter artis tamen opera neutrum requiri, docet; tum quod affectus obcundis

*Quomodo glans penis contecta aperiri possit.*

**C**ONTRA si glans ita contecta est, ut nudari non possit, quod vitium Græci φήρωτον appellant, aperienda est. Quod hoc modo fit: Subter à summa ora cutis inciditur recta linea usque ad frænum, atque ita superius tergus relaxatum cedere retro potest. Quod si parum sic profectum est, aut propter angustias, aut propter duritiem tergoris, protinus triangula forma cutis ab inferiore parte excidenda est, sic ut vertex eius ad frænum basis in tergo extremo sit. Tum superdanda linamenta sunt, aliaque medicamenta quæ ad sanitatem perducant. Necessarium autem est donec cicatrix sit conquiescere. Nam ambulatio atterendo vlcus sordidum reddit.

*Infibulandi ratio.*

**I**NFIBVLARE quoque adolescentulos interdum vocis, interdum valetudinis causa quidam consueverunt. Eiusque hæc ratio est. Cutis quæ super glandem est extenditur, nota-

PP 2

turque



\* perforatur,

\* infra

\* inditur,  
quæ quo  
leuior, eo  
melior est.

turque vtrunque à lateribus atramento quâ perforatur, deinde remittitur. Si super glandem notæ reuertuntur, nimis apprehensum est, & \* vltra notari debet. Si glans ab his libera est, is locus idoneus fibulæ est. Tum quâ notæ sunt, cutis acu filum ducente transuitur, cuiusque fili capita inter se deligantur, quotidieque id mouetur, donec circa foramina cicatriculæ fiant. Vbi hæ confirmatæ sunt, exempto filo fibula \* additur, quæ quo melior, eo leuior est. Sed hoc quidem sæpius inter superuacua, quàm inter necessaria est.

## CAPVT XXVI.

*De Urinæ reddendæ difficultate, & de Calculo,  
curationibusque eorum.*

\* emollire

**R**ES verò interdum cogit \* emoliri manu urinam, cum illa non redditur, aut quia senectute iter eius collapsum est, aut quia calculus, vel concretum aliquid ex sanguine intus se opposuit. At mediocris quoque inflammatio sæpe eam reddi naturaliter prohibet. Idque non in viris tantummodo, sed in fœminis quoque interdum necessarium est. Ergo aneæ fistulæ fiunt, quæ ut omni corpori ampliori minori que sufficiant, ad mares tres, ad fœminas duæ medico habendæ sunt. Ex virilibus maxima decem & quinque est digitorum: media, duodecim: minima, nouem. Ex muliebribus, maior nouem: minor, sex. Lucruas verò esse eas paulum, sed magis viriles oportet, \* leuesque admodum: ac neque nimis plenas, neque nimis tenues. Homo tum resupinus, eo modo quo in curatione ani figuratur, super subsellium aut lectum collocandus est. Medicus autem à dextro latere sinistra quidem manu colem masculi continere, dextra verò fistulam demittere in iter urinæ debet. Atque vbi ad ceruicem vesicæ ventum est, simul cum cole fistulam inclinatam in ipsam vesicam compellere, eamque vrina reddita recipere. Fœmina breuius urinæ similiter & rectius iter habet, quod mammulæ simile inter imas oras super naturale positum, non minus sæpe auxilio



auxilio eget, \*aliquanto minus difficultatis \*exigit. Nonnunquam etiam prolapsus in ipsam fistulam calculus, qui subinde ea extenuatur, non longè ab exitu inhærescit. Eum si fieri potest, oportet \*vellere, vel oriculario specillo, vel eo ferramento, quo in sectione calculus protrahitur. Si id fieri non potuit, cutis extrema quam plurimum attrahenda, & condita glande lino vincienda est, deinde à latere recta plaga coles incidendus, & calculus eximendus est, tum cutis remittenda. Sic enim fit, ut incisum colem integra pars cutis contegat, & urina naturaliter profluat.

\* sed aliq.  
\* exhibet.

\* euellere,

## ENARRATIO.

At mediocris quoque.

tur, suppuratione facta, & eruptione soluitur.

Q VIBVS in urinaria fistula, inquit Hippocrates, tubercula nascun-

*Quæ curatio calculosis adhibeatur.*

CVM vesicæ verò calculique facta mentio sit, locus ipse exigere videtur, ut subiiciam quæ curatio calculosis, cum aliter succurri non potest, adhibeatur. Ad quam festinare, cum præceptum sit, nullo modo conuenit: ac neq. in omni tempore, neque in omni ætate, neque in omni vitio id experendum est, sed solo vere, in eo corpore, quod iam nouem annos, nondum quatuordecim excessit, & si tantum mali subest, ut neque medicamentis vinci possit, neque etiam trahi posse videatur, quo minus interposito aliquo spatio interimat. Non quo \*interdum etiam temeraria medicina proficiat, sed quo \*tamen non sæpius utique in hoc fallat, in quo plura & genera & tempora periculi sunt. Quæ simul cum ipsa curatione proponam. Igitur ubi vltima experiri statutum est, antè aliquot diebus victu corpus præparandum est, ut modicos, ut salubres cibos, ut minime glutinosos assumat, ut aquam bibat. Ambulandi verò inter hæc exercitatione utatur, quo magis calculus ad vesicæ ceruicem descendat. Quod an incident, digitis quoque, sicut in curatione docebo, demissis cognoscitur. Vbi eius rei fides est, pridie is puer in ieiunio continendus est, & tum loco ca-

P.P. 3

lido.



lido curatio adhibenda, quæ hoc modo ordinatur: Homo præualens & peritus in sedili alto confidit, supinumque cum & aduersum super genua sua coxis eius collocatis comprehendit, reductisque eius cruribus, ipsum quoque iubet manibus ad suos poplites datis eos quam maximè possit attrahere; simulque ipse sic eos continet. Quod si robustius corpus eius est qui curatur, duobus sedilibus iunctis duo valentes insidunt, quo & sedilia & interiora crura inter se \* deligantur, ne diduci possint. Tum is super duorum genua eodem modo collocatur, atque alter prout confedit sinistrum crus eius, alter dextrum, simulque ipse poplites suos attrahit. Siue autem vnus, siue duo continent, super humeros eius suis pectoribus incumbunt. Ex quibus euenit, ut inter ilia sinus super pubem sine vllis rugis sit extensus, & in angustum compulsa vesica, facilius calculus capi possit. Præter hæc etiamnum à lateribus duo valentes obiciuntur, qui circumstantes \* leuate, vel vnum vel duos, qui puerum continent, non sinunt. Medicus deinde diligenter vnguibus circuncisis, \* atque sinistra manu duos eius digitos, indicem & medium, leniter prius vnum, deinde alterum in anum eius demittit, dextraque digitos super imum abdomen leniter imponit, ne si vtrinque digiti circa calculum vehementer concurrerint, vesicam lædant. Neque verò festinanter in hac re, ut in plerisque, agendum est, sed ita ut quam maximè id tutò fiat. Nam læsa vesica nervorum distentiones cum periculo mortis excitat. Ac primùm circa cervicem quæritur calculus. Ibi repertus minore negotio expellitur. Et ideò dixi, ne curandum quidem, nisi cum hoc indiciis suis cognitum est. Si verò aut ibi non fuit, aut recessit retro, digiti ad ultimam vesicam dantur, paulatimque dextra quoque manus eius vltra translata subsequitur. Atque ubi repertus est calculus, qui necesse est in manus incidat, eo curiosius deducitur, quo minor \* leuiorque est, ne effugiat, id est, ne sæpius agitata vesica sit. Ergo vltra calculum dextra semper manus eius opponitur, \* sinistra digiti deorsum eum compellunt, donec ad cervicem peruenitur. In quam si oblongus est, sic compellendus est, ut pronus exeat: si planus, sic,

\* deligantur,

\* leuari al.  
ab leuari  
al labere  
\* sedet, atque sinistra manus duos digitos

\* leuiorq.

\* sinistra digitis eum compellit,



sic, ut transuersus sit: si quadratus, ut duobus angulis sedeat:  
 si altera parte plenior, sic ut prius ea, qua tenuior sit, euadat.  
 In rotundo nihil interesse ex ipsa figura patet, nisi si \*leuior  
 altera parte est, ut ea antecedit. Cum iam eò \*venit, ut in-  
 cidi super vesicæ ceruicē iuxta anum cutis plaga lunata vsque  
 ad ceruicem vesicæ \*debeat, cornibus ad coxas spectantibus  
 paulum, deinde ea parte qua strictior ima plaga est, etiamnum  
 sub cute altera transuersa plaga facienda est, qua ceruix ape-  
 riatur, donec vrinae iter pateat, sic ut plaga paulo maior, quam  
 calculus sit. Nam qui \*meru fistulæ, quam illo loco \*ἐπὶ τῆς  
 Græci vocant, parum patefaciunt, cum maiore eodem peri-  
 culo reuoluuntur, quia calculus iter, cum vi premitur, facit,  
 nisi accipit. Idque etiam perniciosius est, si figura quoque  
 calculi vel asperitudo aliquid eò contulit. Ex quo & sanguinis  
 profusio, & distentio neruorum fieri potest. Quæ si quis eua-  
 sit, multo tamen patentiore fistulam habiturus est, rupta  
 ceruice, quam habuisset incisa. Cum verò patefacta est, in  
 conspectu calculus venit, in cuius corpore nullum discrimen  
 est. Ipse si exiguus est, digitis ab altera parte propelli, ab altera  
 protrahi potest. Si maior, eiiciendus à superiore ei parte vn-  
 cus est, eius rei causa factus. Is est ad extremum tenuis, in  
 semicirculi speciem retusæ latitudinis, ab exteriori parte \*le-  
 uis, qua corpori iungitur, ab interiori asper, qua calculum at-  
 tingit. Isque longior potius esse debet. Nam brevis extra-  
 hendi vim habet. Vbi iniectus est, in vtrunque latus inclinan-  
 dus est, ut appareat calculus, & teneatur, quia si apprehensus  
 est, ille simul inclinatur. Ideoque eo \*minimè  
 cum adduci uncus cœperit, calculus intus effugiat, hic in  
 oram vulneris incidat, eamque conuulneret. In quâ re quod  
 periculum esset, iam supra proposui. Vbi satis teneri calcu-  
 lum patet, eodem penè momento triplex motus adhibendus  
 est, in vtrunque latus, deinde extra; sic tamen, ut leniter id  
 fiat, paulumque primò calculus attrahatur: quo factò, attol-  
 lendus uncus extremus est, uti intus magis maneat, facilius-  
 que illum producat. Quòd si aliquando à superiore parte cal-  
 culus parum commodè comprehendatur, à latere erit appre-  
 hendend-

\*leuior

\*venit, in-  
cidi

\*debet,

\*meatum

\*ἐπὶ τῆς  
vel ἐπὶ τῆς

\*leuis,

\*minimè



hendendus. Hæc est simplicissima curatio. Sed varietas rerum quasdam etiamnum animaduersiones desiderat. Sunt enim quidam non asperi tantummodo, sed spinosi quoque calculi, qui per se quidem delapsi in ceruicem, sine villo periculo eximuntur. In vesica verò non tutò vel hinc conquiruntur, vel attrahuntur, quoniam vbi illam conuulnerant, ex distentione neruorum mortem maturant: multoque magis, si spina aliqua vesicæ inhæret, eamque cum duceretur, duplicauit. Colligitur autem eo, quòd difficilius vrina redditur, in ceruice calculum esse: eo quòd cruenta destillat, illum esse spinosum, maximeque id sub digitis quoque experiendum est, neque adhibenda manus, nisi id constitit. Ac tum quoque leniter intus digiti obiciendi, ne violenter promouendo conuulnerent, tum incidendum. Multi hinc quoque scalpello vti sunt. Meges (quoniam is infirmior est, potestque in aliqua prominentia incidere, incisoque super illam corpore, quòd cauum subest, non secare, sed relinquere, quod iterum incidi necesse sit) ferramentum fecit rectum, in summa parte labrosum, in ima semicirculatum acutumque. Id receptum inter duos digitos indicem ac medium super pollice imposito sic deprimebat, vt simul cum carne, si quid ex calculo prominebat, incideret. Quo \* cum sequebatur, vt semel quantum satis esset, aperiret. Quocunque autem modo ceruix ea parte facta est, leniter extrahi, quod asperum est, debet, nulla propter festinationem vi admota.

\*consequatur,

#### ENARRATIO.

in eo corpore, quod.

**A**GINETA tamen etiam ante nonnum annum, idq; usque ad XIIII. propter corporum molliundinem, pueros facillimè curationem recipere auctor est: senes autem, quòd corpus eorum contumax sit, vix sanescere; mediam aetatem, medio inter has se habere loco.

Ambulandi verò.

NON solùm ambulandum, sed & con-

cutiendum corpus alij censent; atque interdum ex alto saltare iubent, vt eo impetu lapsi loco dimoueatur.

Nam læsa vesica.

QVVM enim nervosa planè sit vesica, eadem læsa facillè in consortium trahet spinalem medullam, & cerebrum ipsum; vnde & lethales omnino conuulsiones oriuntur.

Signa



*Signa calculorum, vel arenosorum, vel mollium.*

**A**t calculus arenosus, & antè manifestus est; quoniam, & urina quæ redditur, arenosa est: & in ipsa curatione, quoniam inter subiectos digitos neque æquè <sup>\* sed len.</sup> leniter renitur, & insuper dilatatur. Item mollis calculus, & ex pluribus minutisq; sed inter se parum astrictis compositus <sup>\* indica-</sup> indicatur, in se attrahens quasdam quasi squamulas. Hos omnes <sup>tur, de se</sup> leniter permutatis subinde digitorum vicibus sic oportet <sup>abstrahēs</sup> adducere, ne vesicam lædant, nè intus aliquæ dissipatæ reliquæ mancant, quæ postmodum curationi difficultatem faciant. Quicquid autem ex his in conspectum venit, vel digitis vel vncō eximendum est. At si plures calculi sunt, singuli protrahi debent: sic tamen, ut si quis exiguus supererit, potius relinquatur. Siquidem in vesica difficulter inuenitur, inuentusq; celeriter effugit. Ita longa inquisitione vesica læditur, excitatq; inflammationes mortiferas, adeò ut quidam secti, cum diu frustra per digitos vesica esset agitata, decesserint. Quibus accedit etiam quòd exiguus calculus, ad plagam urina postea <sup>\* promo-</sup> promouente, excidit. Si quando autem is maior, <sup>uetur, &</sup> non videtur, nisi rupta ceruice, extrahi posse, findendus est. <sup>excidit.</sup> Cuius repertor Ammonius, ob id Lithotomos cognominatus est. Id hoc modo fit. Vncus iniicitur calculo, sic ut facillè eum <sup>\* concussus</sup> concussum quoque teneat, ne is retro reuoluatur. Tum fer-  
ramentū adhibetur crassitudinis modicæ, prima parte tenui, sed retusa, quod admotum calculum ex altera parte ictum findit: magna cura habita, ne aut ad ipsam <sup>\* vesicam</sup> vesicam per fer-  
ramentum perueniat, aut calculi fractura ne quid incidat. <sup>fer.</sup>

## ENARRATIO.

Si quando autem is.

**C**URATIONEM hanc tanquam minimè tutam hodie ferè reiciunt. Paullus minus periculi in parvo, quam magno

lapide esse restatur, quòd qui magno calculo torquantur, cruciatibus atque inflammationibus perferendis magis assueverint, ac proinde ad dissectionē aut curationem opportunius sese habcant.



*De Calculis feminarum.*

\* parum  
proprie,  
tamen quæ-  
dam  
\* cum vi-  
na in cer-  
uicem co-  
pellit,

**H**Æ verò curationes in fœminis quoque similes sunt: de quibus \* tamen parum proprie quædam dicenda sunt. Siquidem in his ubi paruulus calculus est, scapellus superuacuum est, quia \* is urinam in ceruicem non compellit, quæ & breuior, quàm in maribus, & laxior est. Ergo & per se sæpe excidit, & si in primo quod est angustius inhæret, eodem tamen vinco sine vlla noxa educitur. At in maioribus calculis necessaria eadem curatio est. Sed virgini subiici digiti tanquam masculo: mulieri per naturalia eius debent. Tum virgini quidem sub ima sinistiore ora. Mulieri verò inter urinae iter & os pubis incidendum est, sic ut utroque loco plaga transuersa sit: neque terreri conuenit, si plus ex muliebri corpore sanguinis profluit.

## ENARRATIO.

**R**ARIS multò mulieres, quàm viri calculis afficiuntur; idque tum propter colli vesicae breuitatem; tum etiam eiusdem (ut sic dicam) amplitudinem: unde crassos & sæculentos humores minore quàm viri molestia excernunt. quibus accedit, quòd dum iuuenes sunt, quietiores ac sedentariæ magis viris sint.

Sed virgini subiici digiti.

QVOD virginitus per anum, non secus ac in viris, digitos subiiciunt, in causâ est tum pudendi ipsius angustia, tum pellicula hymenis impedimentum.

*Quæ curatio calculo euulso habenda sit.*

\* excipit

**C**ALCVLO euulso, si valens corpus est, neque magnopere vexatum, sinere oportet sanguinem fluere, quo minor inflammatio oriatur. Atque ingredi quoque cum paulum non alienum est; ut excidat, si quid intus concreti sanguinis mansit. Quòd si per se non desistit, rursus ne vis omnis intereat, supprimi debet. Idque protinus in imbecillioribus ab ipsa curatione faciendum est. Siquidem ut distentione neuorum periclitatur aliquis, dum vesica eius agitur: sic alter metus \* excipitur remotis medicaminibus, ne tantum sanguinis profluat ut occidat. Quod ne incidat, desidere is debet



debet in acre acetum, cui aliquantum salis sit adiectum. Sub quo & sanguis ferè conquietitur, & astringitur vesica, ideoque minus inflammatur. Quod si parum proficit, agglutinanda cucurbitula est, & inguinibus & coxis, & super pubem. Vbi iam satis vel euocatus est sanguis, vel prohibitus, resupinus collocandus est; sic ut caput humile sit coxæ paulū excitentur: ac super \*vulnus imponendum est duplex aut triplex linteolum, aceto madens. Deinde interpolitis duabus horis, in solium is aquæ calidæ resupinus demittendus est, sic, ut à genibus ad umbilicum \*in aqua aqua teneat, cætera vestimentis circumdata sint, manibus tantummodo pedibusque nudatis, ut & minus digeratur, & ibi diutius maneat. Ex quo sudor multus oriri solet, qui spongia subinde \*in facie facile detergendus est, finisque eius fomenti est, donec infirmo offendat. Tum multo is oleo perungendus, inducendusque hapsus lanæ mollis, tepido oleo repletur, qui pubem & coxas & inguina, & plagam ipsam contactam eodem ante se linteolo protegat, isque subinde oleo tepido madefaciendus est, ut neque frigus ad vesicam admittat, & nervos leniter molliat. Quidam cataplasmatibus calefacientibus utuntur. Ea plus pondere nocent, \*quia quæ vesicam urgendo vulnus irritant, quàm calore proficiunt. Ergo ne vinculum quidem ullum necessarium est. Proximo die, si spiritus difficilius redditur, si vrina non excedit, si locus circa pubem maturè intumuit, scire licet in vesica sanguinem concretum remansisse. Igitur demissis eodem modo digitis leniter pertractanda vesica est, & discutienda si qua coierunt. Quo fit, ut per vulnus postea procedant. Non alienum etiam est, oriculario clystere acetum nitro mistum per plagam in vesicam compellere. Nam sic quoque discutiuntur, si qua cruenta coierunt. Eaque facere etiam primo die conuenit. Si timemus, ne quid intus sit, maximeque ubi ambulando id elicere imbecillitas prohibuit, cætera eadem facienda sunt: ut demittatur in solium, ut eodem modo panniculus, eadem lana superiniiciatur. Sed neque sæpe, neque tamdiu in aqua calida puer habendus, quàm adolescens est; infirmus quàm valens; leui, quàm grauiore inflammatione



\* imus fe-  
det, medio-  
cris & cum

\* vrina

\* trans-  
fluens

adfectus: is cuius corpus digeritur, quàm is cuius astrictum est. Inter hæc verò si somnus est, & æqualis spiritus, & madens lingua, & sitis modica, & venter \* imus, sed & medio-  
cris est cum febre modica dolor, scire licet rectè procedere curationem. Atq. in his inflammatio fere quinto vel septimo die finitur. Qua leuata, solium superuacuum est. Supini tantummodo vulnus aqua calida fouendum est, vt si quid  
\* vrinae rodet, abluatur. Imponenda autem medicamenta sunt pus mouentia, & si purgandum vlcus videbitur, melle linendum. Id si rodet, rosa temperabitur. Huic curationi aptissimum videtur Euneapharmacum emplastrum. Nam & seuum habet ad pus mouendum, & mel ad vlcus repurgandum: medulla etiam, maximeque vitulina, quod in id ne fistula relinquatur, præcipuè proficit. Linamenta verò tum super vlcus non sunt necessaria, super medicamentum ad id continendum, rectè imponuntur. At vbi vlcus purgatum est, puro linamento ad cicatricem perducendum est. Quibus temporibus tamen, si felix curatio non fuit, varia circa pericula oriuntur. Quæ prælagire protinus licet, si continua vigilia est, si spiritus difficultas, si lingua arida est, si sitis vehemens, si venter imus tumet, si vulnus hiat, si \* transfluens vrina id non rodit, si similiter ante tertium diem quædam liuida excidunt, si is aut nihil, aut tardè responderet, si vehementes dolores sunt, si post diem quintum magnæ febres vrgent, & fastidium cibi permanet, si cubare in ventrem iucundius est. Nihil tamen prius est, distentione nervorum, & ante nonum diem vomitu bilis. Sed cum inflammationis sit metus, succurri abstinencia modicis & tempestiuis cibis, inter hæc fomentis, de quibus suprà scripsimus, oportet.

#### ENARRATIO.

Deinde interpositis.

SUNT quibus hæc curatio non satis arideat.

hapsus lanæ mollis.

HAPSUS id Latinè dici videtur, quod Græci πλάσσειν: ita enim Linææ verbum

illud verbi πλάσσειν in Therapentica Galeni duobus quos ob eruanit, locis. Caterū πλάσσειν Suidas exponit οὐκ ἀποσπῆσαι: Hesychius ἑλθεῖν. Hapsus ergo significare videri potest, vel sacculum, crumenam, vel huiusmodi aliquid rectorium, aut velanē aut cingulum sacculi aut crumena modo factum. hæc Celsinus.

CAPVT



## CAPVT XXVII.

*De cancro qui excisa vesica nascitur, & qua  
curatione vti deceat.*

**P**ROXIMVS canceri metus est: is cognoscitur, si & per  
vulnus, & per ipsum colem fluit sanies mali odoris, cum-  
que eo quædam à concreto sanguine non abhorrentia, te-  
nuesque carunculæ lanulis similes: præter hæc si oræ vulne-  
ris aridæ sunt, si dolent inguina, si febris non defuit, eaque  
in noctem augetur, si inordinati horrores accedunt. Confi-  
derandum autem est, in quam partem cancer istendat. Si ad  
colem, indurefcit is locus, & rubet, & tactu dolorem excitat,  
testiculique intumescunt. Si in ipsam vesicam, ani dolor se-  
quitur, coxæ durescunt, non facile crura extendi possunt. Ac  
si in alterutrum latus, oculis id expositum est, parsque vtrin-  
que easdem notas, sed minores habet. Primum autem ad  
rem pertinet, corpus rectè iacere, vt superior pars semper  
eadem sit, in quam vitium fertur: ita si ad colem it, supinus  
is collocari debet: si ad vesicam, in ventrem: si in latus, in id  
quod integrius est. Deinde vbi ventum fuerit ad curatio-  
nem, homo in aquam demitteretur, in qua marrubium deco-  
ctum sit, aut cupressus, aut myrtus: idemque humor clystere  
intus adicietur. Tum superponetur lenticula cum malico-  
rio mista, quæ vtraque ex vino decocta sint: vel rubus aut oleæ  
folia eodem modo decocta aliaque medicamenta, quæ ad co-  
hibendos purgandosque caneros proposuimus, ex quibus,  
si qua erunt arida, per scriptorium calamum inspirabuntur.  
Vbi stare cœperit cancer, mulso vulnus eluetur. Vitabitur-  
que eo tempore ceratum, quod ad recipiendum id malum  
corpus emollit: potius plumbum elotum cum vino inunge-  
tur, superque idem linteolo illicitum imponetur. Sub quibus  
perueniri ad sanitatem potest cum eo tamen quod non igno-  
remus, orto Cancro sæpe affici stomachum, cui cum vesica  
quoddam consortium est, exque eo fieri, vt neque retineatur  
cibus, neque si quis retentus est, concoquatur, neque corpus

\* ea

\* lamulis  
al. squa-  
mulis

\* ea fit,

\* iniicie-  
tur.\* decipien-  
dum

alatur:



alatur: ideoque ne vulnus quidem aut putgari, aut ali possit, quæ necessario mortem maturant: sed ut his succurri nullo modo potest, sic à primo tamen \* diu tenenda ratio curationis est. In qua quædam observatio ad cibum quoque potionemque pertinens necessaria est. Nam cibus inter principia non nisi humidus dari debet. Vbi vlcus purgatum est, ex media materia olera & fassamenta semper aliena sunt. Potione opus est non \* modica. Nam si parum bibitur, accenditur vulnus, & vigilia urget, & vis corporis minuitur. Si plus æquo assumitur, subinde vesica impletur, eoque irritatur. Non nisi aquam autem bibendam esse manifestius est, quàm ut subinde dicendum sit. Solet verò sub eiusmodi victu \* venire, ut alius non reddatur. Hæc aqua ducenda est, in qua vel scœnum græcum, vel malua decocta sit. Idem humor rosa mistus in ipsum vulnus oriculario clystere \* agendus est, ubi id rodit vrina, neque purgari patitur. Fere verò primò per vulnus exit hæc, deinde eo sanescente diuiditur, & pars per colem descendere incipit, donec ex toto plaga claudatur, quod interdum tertio mense, interdum non ante sextum, nonnunquã exacto quoque anno fit. Neque desperari debet solida glutinatio vulneris, nisi ubi aut vehementer rupta ceruix est, aut ex cancro multæ magnæque carunculae, simulque nervosa aliqua exciderunt. Sed ut vel nulla ibi fistula, vel exigua admodum relinquatur, summa cura providendum est. Ergo cum iam ad cicatricem vulnus \* tendit, extentis iacere feminibus & cruribus oportet, nisi tamen molles arenosive calculi fuerunt. Sub his enim tardiùs vesica purgatur. Ideoque diutius plagam patere necessarium est, & tum demum ubi iam nihil tale extrà fertur, ad cicatricem perducitur: quòd si antequam vesica purgata est, oræ se glutinarunt, dolorque & inflammatio redierunt, vulnus digitis vel \* aduerso specillo diducendum est, ut torquentibus exitus detur, hisque effusis tum diutius \* pura vrina descendat. Tum demum quæ cicatricem inducant, imponenda sunt, \* extendique, ut supra docui, pedes quàm maximè \* vincti. Quod si fistulae metus ex his causis, quas proposui, subesse videbitur, quo faciliùs claudatur ea,

tur ea,



tur ea, vel certè coangustetur, in anum quoque danda plumbea fistula est: extentisque cruribus, femina taliq[ue] inter se deliganda sunt, donec qualis futura est, cicatrix sit.

## ENARRATIO.

QUUM cancrofa ulcera antiqui maligna & difficulter curationem recipienti, nonnunquam soleant nominare, inducor omnino, ut & hic Celsus nostrum canceri nomen pro sordido ulcere cum inflammatione accepisse credam; idq[ue] potissimum, quod dicat, Is locus rubet, & tactu &c. Neque enim, ut cinis notum est, cancer rubet, sed ex nigrore quopiam linet potius. His accedit quod neque statim nisi post exulcerationem sanies mali odoris effluat.

orto Cancro saepe affici stomachum.

SICUTI per propaginem nervorum cum stomacho consortium sortita est vesica; sic & eidem iscur facillimè coaficitur: procedunt enim duo validi meatus ab aëria ad vesicam; unde contingit nonnunquam vesica affecta, nec hepar, nec stomachum omnino suo fungi officio.

## CAPUT XXVIII.

*Si naturalia foeminarum concubitus non admittunt, quomodo curari conveniat.*

ET hoc quidem commune esse maribus & foeminis potest. Propriè verò quædam ad foeminas pertinent, ut in primis quod earum naturalia nonnunquam inter se glutinatis oris, concubitus non admittunt. Idq[ue] interdum evenit protinus in utero matris, interdum exulceratione in his partibus facti, & per malam curationem his oris sanescendo iunctis. Si ex utero est, membrana ori vulvæ opposita est. Si ex ulcere, caro id replevit. Oportet autem membranam duabus lineis inter se transuersis incidere ad similitudinem litteræ X, magna cura habita, ne urinæ iter violetur. Deinde undique eam membranam excidere: \* ac si caro increvit, necessarium \* at est recta linea patefacere. Tum ab ora vel volsella vel hamo apprehensam, tanquam habenulam excidere: & intus implicitum in longitudinem linamentum, λημίσκον Græci vocant, in aceto tinctum demittere, supraq[ue] succidam lanam aceto madentem deligare. Tercio die solvere \* vlcus, & sicut alia \*, & vlcus vlcera curare. Cumq[ue] iam ad sanitatem tendet, plumbeam sicut fistulam



fistulam medicamento cicatricem inducente illinere, eam-  
que intus dare. Supraque idem medicamentum iniicere,  
donec ad cicatricem plaga perueniat.

## ENARRATIO.

quod earum naturalia.

circa vteri osculum eadem fit obturatio.

**A**ETIVS, si ex vtero malum sit,  
infracturam id occidere docet: nam qui-  
buldam in ipsius pudendi alis, sine latius  
membrana aut caro obturans adnascitur;  
aliis in ipso pudendi sinu id contingit; aliis

ad similitudinem literæ X.

ÆGINETA, & Aetius recta li-  
nea scalpello fistulis accommodato commis-  
suras dissolvunt.

## CAPVT XXIX.

*Qua curatione partus emortuus ex vtero excutiat.*

\* concepit **V**BI \* concipit autem aliqua, si iam propè maturus par-  
tus intus emortuus est, neque excidere per se potest,  
adhibenda curatio est, quæ numerari inter difficillimas po-  
test. Nam & summam prudentiam moderationemque de-  
siderat, & maximum periculum affert. Sed ante omnia vulvæ  
natura mirabilis, cum in multis aliis, tum in hac re quoque  
facile cognoscitur. Oportet autem ante omnia resupinam  
mulierem transverso lecto sic collocare, ut feminibus eius ipsius  
ilia comprimantur. Quo fit, ut & imus venter in conspectu  
medici sit, & infans ad os vulvæ compellatur, quæ emortuo  
partu id comprimit, ex interuallo verò paulum \* dehiscere.  
Hac occasione usus medicus, vinctæ manus indicem digitum  
primùm debet inferere, atque ibi continere, donec iterum  
\* os ada- \* ad os aperiatur, rursusque alterum digitum demittere de-  
periat. bebit, & per easdem occasiones alios, donec tota esse intus  
\* facilita- \* facultatem multum confert, &  
tem magnitudo vulvæ, & vis neruorum eius, & corporis totius  
habitus, & mentis etiam robur, cum præsertim intus non-  
nunquam etiam duæ manus dari debeant. Pertinet etiam  
\* dum in- ad rem quam calidissimum esse imum ventrem, & extrema  
flamma- corporis, neque \* cum inflammatione incepisse, sed recenti re  
tioris cæ- protinus  
pisse,



protinus adhiberi medicinam. Nam si corpus iam intumuit, neque demitti manus, neque educi infans, nisi ægerrimè potest, sequiturque sæpe cum vomitu & cum tremore mortifera neruorum distentio. Verùm intus emortuo corpori manus iniecta protinus habitum eius sentit. Nam aut in caput aut in pedes conuersum est, aut in transuersum iacet, fere tamen sic ut vel manus eius vel pes in propinquo sit. Medici verò propositum est, ut eum manu dirigat, vel in <sup>\* manus,</sup> caput, vel etiam in pedes, si fortè aliter compositus est: ac si nihil aliud est, manus vel pes apprehensus, corpus rectius reddit: nam manus in caput, pes in pedes eum conuertet. Tum si caput proximum est, demitti debet vncus vndique læuis, acuminis brevis, qui vel oculo, vel auri, vel ori, interdum etiam fronti rectè iniicitur, deinde attractus infantem educit. Neque tamen quolibet is tempore extrahi debet. Nam si compresso vuluæ ore id tentatum est, non emittente eo infans abrum-pitur, & vnci acumen in ipsum os vuluæ delabitur, sequiturque neruorum distentio, & ingens periculum mortis. Igitur compressa vulua, conuiescere: hiant, leniter trahere oportet, & per has occasiones paulatim eum educere. Trahere autem dextra manus vncum, sinistra intus posita infantem ipsum, simulque dirigere eum debet. Solet etiam euenire, ut is infans humore distendatur, exque eo profluat foedi odoris sanies. Si quid tale est, indice digito corpus illud forandum est, ut effuso humore extenuetur. Tum id leniter per ipsas manus recipiendum est, nam vncus iniectus <sup>\* enect</sup> facile he- <sup>corp. facile</sup> beti corpusculo eleuabitur. <sup>elabitur.</sup> In quo quid periculi sit, supra positum. Sed in pedes quoque conuersus infans non difficulter extrahitur: quibus apprehensis per ipsas manus commodè educitur. Si verò transuersus est, neque dirigi potuit, vncus alæ iniciendus, paulatimque attrahendus est. Sub quo fere ceruix replicatur, retroque caput ac reliquum corpus spectat. Remedio est, ceruix præcisa, ut separatim vtraque pars auferatur. Id vnco fit, qui priori similis in <sup>\* interiore</sup> t. parte p. t. acie

r r

maiore



maiore parte extracta, caput in vacuâ vuluam prolabitur: extrahi que sine summo periculo non potest, si tamen id incidit, super ventrem mulieris duplici panniculo iniecto, valens homo non imperitus à sinistro latere eius debet assistere, & super anum ventrem eius duas manus imponere, altera que alteram premere. Quo fit, ut illud caput ad os vuluæ compellatur. Idq. eadem ratione quæ suprà posita est, vincto extrahitur. At si pes alter iuxta repertus est, alter retro cum corpore est, quicquid\* protractum est, paulatim abscindendum est: & si clunes os vuluæ urgere cœperunt, iterum retro repellendæ sunt, conquisituq. pes eius adducendus. Aliæque etiamnum difficultates faciunt, ut qui solidus non exit, concisus eximi debeat. Quoties autem infans protractus est, tradendus ministro est. Is cum supinis manibus sustinere, medicus deinde sinistra manu leniter trahere umbilicum debet, ita ne abrumpat, dextraque eum sequi usque ad eas, quas

*prola-  
pium*

*Secunda.* secundas vocant, quod velamentum infantis intus fuit, hisque ultimis apprehensis venulas membranulasque omnes eadem ratione manu diducere à vulua, totumque illud extrahere, & si quid intus præterea concreti sanguinis remanet. Tum compressis in vnum feminibus, illa in conclavi collocanda est, modicum calorem sine ullo perflatu habente. Super anum ventrem eius imponenda lana succida in aceto & rosa tincta. Reliqua curatio talis esse debet, qualis in inflammationibus, & in his vulneribus, quæ in nervosis locis sunt, adhibeatur.

*adhibe-  
tur.*

## ENARRATIO.

Tum si caput proximum est.

QVONIAM vincti mentionem hic facit, non fuerit inutile explicare, qui potissimum loci vinctum admittant. In capite igitur, ad infigendum instrumentum idonei sunt oculi, aurium meatus, os, mentis pars inferior: in thorace, axilla, clavicula, præcordia, pectus, vertebrarum articuli, ingulum: in cruribus, ossa pubis, fœmininum pudendum.

Igitur compressa vulua.

TUM enim infusionibus pinguis crendum est ex prescripto Aetij: ad hæc infusio- nibus, irrigationibus & cataplasmatibus; quod inflammatione aliquatenus sedata, & osim- lo dilataro scire educatur.

Trahere autem dextra.

Æqualiter trahendum est, non solum in directum, sed & in obliquum.

Di



## CAPVT XXX.

*De Ani vitis, & eorum curatione.*

**A**N I quoque vitia vbi medicamentis non vincuntur, manus auxilium desiderant. Ergo, si qua scissa in co vetustate induruerunt, iamque callum habent, commodissimum est ducere alium, tum spongiam calidam admouere, vt relaxentur illa, & foras prodeant. Vbi in conspectu sunt, scalpello singula excidere, & vlcera \*renouare, deinde imponere linamentum molle, & super linteolum illitum melle, locumque cum molli lana implere, & ita vincire altero die, deincepsque cæteris lenibus medicamentis vt, quæ ad recentia eadem vitia necessaria esse aliàs proposui, & vtique per primos dies sorbitionibus eum sustinere, paulatim deinde cibis adicere aliquid, generis tamen eius, quod eodem loco præceptum est. Si quando autem ex inflammatione pus in his oritur, vbi primum id apparuit, incidendum est, ne anus ipse suppuret. Neque tamen antè properandum est: nam si crudum incisum est, inflammationis multum accedit, & puris aliquanto amplius concitatur. His quoque vulneribus, lenibus cibis, iisdemque medicamentis opus est.

*De condylomatum curatione.*

**A**T tubercula, quæ condylomata appellantur, vbi induruerunt, hac ratione curantur: Alius ante omnia ducitur, tum vossella tuberculum apprehensum iuxta radices exciditur. Quod vbi factum est, eadem sequuntur, quæ supra post curationem adhibenda esse proposui. Tantummodo si quid increfcit, squama æris coercendum est. Ora etiam venarum fundentia sanguinem sic tolluntur: Vbi sanguini qui effluit, sanies adicitur, alius \*acrius ducitur, quo magis \*ora \*acrioribus \*ora \*omnes \*venæ al. omnia venarum



• ex aqua  
• doleat.

ano committitur. Imponenda spongia \* aqua calida est, donec id \* libeat. Deinde aut vngue, aut scalpello supra nodum id exulcerandum est. Quod nisi factum est, magni dolores subsequuntur, interdum etiam urinae difficultas. Si id maius est, & basis latior, hamulo vno aut altero excipiendum est, paulumque supra basim incidendum, neque relinquendum quicquam ex eo capitulo, neque quicquam ex ano demendum est. Quod consequitur is, qui neque nimium, neque parum hamos ducit. Quam incisum est, acus debet immitti, infraque eam lino id capitulum alligari: si duo triaue sunt, imum quodque primum curandum est. Si plura, non omnia simul, ne tempore eodem vndique tenerae cicatrices sint: si sanguis profluit, excipiendus est spongia, deinde linamentum imponendum. Vngenda femina & inguina, & quicquid iuxta vlcus est, ceratumque superdandum est. Farina ordeacea calida implendus is locus est: sic deligandus est. Postero die is desidere in aqua calida debet, eodemque cataplasmate foueri. Ac bis die, & ante curationem, & post eam, ceruices ac femina liquido cerato perungenda sunt, tepidoque is loco continendus. Interpositis quinque aut sex diebus, oriculario specillo linamenta educenda. Si capitula simul non exciderunt, digito promouenda. Tum lenibus medicamentis, iisdemque, quae alibi posui, vlcera ad sanitatem perduenda. Finito vitio, quemadmodum agendum esset, iam alias superius exposui.

#### ENARRATIO.

vt omnia vela.

quasi capitula conspicimus, reddas. Habes autem apud Paulum lib. VI. cap. LXXIX.

MIII magis placeret lectio, si et omnia vela, in et omnes venae,

aliam, qua per eniuriam fit, administrationem.

#### CAPVT XXXI.

##### De varicum curatione.

**A** his ad crura proximus transitus est, in quibus orri varices non difficili ratione tolluntur. Huc autem & earum venularum quae in capite nocent, & eorum varicum qui in ven.



in ventre sunt, curationem distuli: quoniam ubique eadem est. Igitur vena omnis, quæ noxia est, aut adusta tabescit, aut manu exciditur. Si recta est, si quamvis transversa, tamen simplex, si modica est, melius aduritur. Si curua est, & velut in orbem quosdam implicatur, pluresque inter se inuoluuntur, vtilius eximere est. Adurendi ratio hæc est: Cutis superinciditur, tum patefacta vena, tenui & retuso ferramento candente modicè premittitur, vitaturque, ne plagæ ipsius oræ adurantur, quas reducere hamulis facile est. Id interpositis fere quaternis digitis per totum varicem fit, & tum superimponitur medicamentum, quo adusta sanantur. \* At exciditur hoc modo: Cute eadem ratione super venam incisa, hamulo oræ excipiuntur, scalpelloque vndique à corpore vena diducitur, caueturque, ne inter hæc ipsa lædatur, ei que reclusus hamulus subiicitur, \* impositoque eodem fere spatio quod supra positum est, in eadem vena idem fit: quæ quò tendat, facile hamulo extenso cognoscitur. Vbi iam idem, quacunque varices sunt, factum est, vno loco adducta per hamulum vena præciditur, deinde quæ proximus hamus est, attrahitur & euellitur, \* ibi rursus abscinditur. Ac sic vndique varicibus crure liberato, tum plagarum oræ committuntur, & super emplastrum glutinans iniicitur.

\* Exciden-  
di ratio  
hæc est:

\* interpo-  
sitoque

\* ibique

## CAPVT XXXII.

*Curatio digitorum coherentium.*

**A**T si digiti vel in utero protinus, vel propter communem exulcerationem postea cohæserunt, scalpello diducuntur, dein separatim vterque non pingui emplastro circumdatur. Atque ita per se vterque sanescit. Si verò sit vlcus in digito, posteaque malè indurata cicatrix curuam eum reddit, primum malagma tentandum est. Dein, si id nihil prodest (quod & in veteri cicatrice, & ubi nerui læsi sunt, euenire consuevit) videre oportet, neruine id vitium, an cutis sit. Si nerui est, attingi non debet, neque enim sanabile est: si cutis,

¶ ¶

tota.



tora cicatrix excidenda est, quæ ferè callosa efficit, ut extendi digitum non patiat, tum rectus sic ad nouam cicatricem perducendus est.

## ENARRATIO.

At si digiti.

Q V V M ex altius quam quisquam  
alius singulas chirurgiæ partes absol-

nerit Celsus, nescio quomodo aduatos digi-  
tos prætermiserit: siquidem sicuti coheren-  
tes digiti sectione curantur, sic & si qui ad-  
nascantur digiti, statim præcidendi sunt.

## CAPVT XXXIII.

## De Gangræna curatione.

G A N G R Æ N A inter vngues alasque aut inguina nasci,  
& si quando medicamenta vincuntur, membrum præ-  
cidi oportere, alio loco mihi dictum est. Sed id quoque cum  
periculo summo fit. Nam sæpe in ipso opere, vel profusione  
sanguinis, vel animæ defectione moriuntur. Verùm hic quo-  
que nihil interest an satis tutum præsidium sit, quod vnicum  
est. Igitur inter sanam viciatamque partem incidenda scal-  
pello caro vsque ad os est: sic ut neque contra ipsum articu-  
lum id fiat: & potius ex sana parte aliquid excidatur, quam  
ex agra relinquatur. Vbi ad os ventum est, reducenda ab eo  
sana caro, & circa os subsecanda est, ut ea quoque parte ali-  
quid \* os nudetur: dein id ferrula præcidendum est, quam  
proximè sanæ carni etiam inhaerenti: ac tum frons ossis  
quam ferrula exasperauit, \* lauanda est, supraque inducenda  
cutis, quæ sub eiusmodi curatione laxa esse debet, ut quàm  
maximè vndique os contegat. Quod cutis inducta non fue-  
rit, id linamentis erit contegendum, & super id spongia ex  
aceto deliganda. Cætera postea sic facienda, ut in vulneribus,  
in quibus pus moueri \* debet, præceptum est.

\* ossis

\* lauando

\* non de-  
bet,

## ENARRATIO.

& potius ex sanâ parte.

G A L E N V S mortificatam partem ita  
resecandam vult, ut nihil prorsus pu-

tridi ac cariosi supersit: periculum enim est,  
ne si quid reliqui sit, id quod sanum est  
contagione contamineat.

AVRE-



A V R E L I I  
C O R N E L I I C E L S I

D E  
R E M E D I C A


L I B E R O C T A V V S ,

A B A L D V I N O R O N S S E O *Gandensi, medico,*  
*Enarrationibus illustratus.*

C A P V T I .

*De positu & figura \* totius humani corporis.*

\* OSTIUM 10-  
tius



**S**UPEREST ea pars quæ ad ossa pertinet, quæ quo facilius accipi possit, prius positus, figurasque eorum indicabo. Igitur calvaria incipit ex interiore parte concava, extrinsecus gibba, vtrinque lævis, & quæ cerebri membranam contegit, & quæ cute capillum gignente contegitur. Ea que simplex ab occipitio & temporibus, duplex usque in verticem à fronte est. Ossa que eius ab exterioribus partibus dura, ab interioribus, quibus inter se connectuntur, molliora sunt. Interque ea venæ discunt, quas his alimentum subministrare credibile est: raro autem calvaria solida sine suturis est. Locis tamen æstuosis facilius inuenitur. Et id caput firmissimum, atque à dolore tutissimum est: ex cæteris, quo suturæ pauciores sunt, eo capitis valetudo commodior est. Neque enim certus earum numerus est, sicut ne locus quidem. Ferè tamen duæ super aures, tempora à superiore capitis parte discernunt. Tertia ad aures per verticem tendens occipitium à summo capite diducit. Quarta ab eodem vertice per medium



dium caput ad frontem procedit, eaq. modò sub imo capillo  
 desinit, modò frontem ipsam secans, inter supercilia, finitur.  
 Ex his ceteræ quidem futuræ in vnguem committuntur. Hæ  
 verò quæ super aures transversæ sunt, totis oris paulatim ex-  
 tenuantur, atque ita \* inferiora ossa superioribus leniter \* insi-  
 dunt. Crassissimum verò in capite os post aurem est, \* quia  
 capillus, vt verisimile est, ob id ipsum non gignitur. Sub his  
 quoque musculis qui tempora \* connectunt, os \* medium in  
 interiorem partem \* inclinatum positum est. At facies futu-  
 ram habet maximam, quæ à tempore incipiens, per medios  
 oculos naresq. transversa peruenit ad alterum tempus. A qua  
 breues duæ sub interioribus angulis deorsum spectant. Et  
 malæ quoque in summa parte singulas transversas futuras ha-  
 bent. A mediisque naribus aut superiorum dentium \* gingi-  
 uis per medium palatum vna procedit, aliaq. transversa idem  
 palatum secat. Et futuræ quidem in plurimis hæ sunt. For-  
 amina autem intra caput maxima oculorum sunt, deinde na-  
 rium, tum quæ in auribus habemus. Ex his quæ oculorum  
 sunt, recta simpliciaque ad cerebrum tendunt. Narium duo  
 \* hæ foramina osse medio discernuntur. Siquidem \* hæ primùm  
 à superciliis angulisque oculorum osse inchoantur ad tertiam  
 fere partem: deinde in \* cartilagine versæ quo propius ori de-  
 scendunt, eo magis caruncula quoque molliuntur. Sed ea  
 foramina, quæ \* à summis ad imas nares simplicia sunt, ibi  
 rursus in bina itinera diuiduntur. Aliaque ex his ad fauces  
 peruia spiritum & reddunt & accipiunt, alia ad cerebrum  
 tendunt. In vltima parte in multa & tenuia foramina dissi-  
 pantur, per quæ sensus odoris nobis datur. In aure quoque  
 primò rectū & simplex iter procedendo flexuosum fit, quod  
 ipsum iuxta cerebrum in multa & tenuia foramina diduci-  
 tur, per quæ facultas audiendi est: iuxta ea duo parvuli quasi  
 sinus sunt, superque eos finitur os, quod transversum à genis  
 tendens ab inferioribus ossibus sustinetur, iugale appellari po-  
 test, ab eadem similitudine, à qua id Græci ζυγωδικῶς appel-  
 lant. Maxilla verò est molle os, eaque vna est, cuius eadem  
 & media & etiam ima pars mentum est, à quo vtrunque pro-  
 cedit

\* infirmio-  
 ra  
 \* insident.  
 alio cadit.  
 \* quæ  
 \* cõtegunt,  
 \* malæ  
 \* incitina-  
 tam

\* maxilla

\* hæ

\* cartilagi-  
 nem  
 \* ab imis  
 ad sum-  
 mas

Iugale.



cedit ad tempora, solaque ea mouetur. Nam mala cum toto  
 osse, quod superiores dentes \*exigit, immobiles sunt. Verum \*excipit,  
 ipsius maxillae partes extremae quasi bicornes sunt. Alter pro-  
 cessus intra latior, vertice ipso tenuatur, longiusque proce-  
 dens sub osse iugali subit, & super id temporum musculis illi-  
 gatur. Alter breuior & rotundior, & in eo sinu qui iuxta fo-  
 ramina auris est, cardinis modo fit: ibique huc & illuc se in-  
 clinans maxillae \*facilitatem motus praestat. Duriore osse \*facilita-  
 dentes sunt, quorum pars maxillae, pars superiori ossi malarum tem  
 haeret. Ex his quaterni primi quia secant, *Τετταροι* à Graecis \*τετταροι  
 nominantur, hi deinde quatuor caninis dentibus ex omni Canini.  
 parte cinguntur. Ultra quos utrinque fere maxillares qua- Maxillares  
 terni sunt, praeterquam in his in quibus tres ultimi qui serò  
 gigni solent, non increuerunt. Ex his priores singulis radici-  
 bus, maxillares utique binis, quidam etiam ternis quaternisque  
 nituntur. Fereque longior radix breuiorem dentem edit, re-  
 cti que dentis recta etiam radix, cui flexa est: ex eadem ra-  
 dice in pueris nouus dens subit, qui multo saepius priorem ex-  
 pellit, interdum tamen supra infraue eum se ostendit. Caput  
 autem spina excipit. Ea constat ex vertebriis quatuor & vi-  
 ginti. Septem in ceruice sunt, duodecim ad costas, reliquae  
 quinque sunt proximae costis. Haec teretes breuesque ab utro-  
 que latere, processus duos exigunt: \*mediae perforatae, quae \*medio  
 spinæ medulla cerebro commissa descendit, circa quoque  
 \*per duos processus tenuibus cauis peruiæ, per quae à mem- \*subter  
 brana cerebri similes membranulae deducuntur. Omnesque  
 vertebrae exceptis tribus summis à superiore parte in ipsis pro-  
 cessibus parum desidentes sinus habent, ab inferiore alios deor-  
 sum versus processus exigunt. Summa igitur protinus caput  
 sustinet, per duos sinus receptis exiguis eius processibus. Quo  
 fit, ut caput sursum deorsum \*versus \*tuberibus exasperetur, \*versum  
 \*inferitur secunda superiori parti \*inferiore. Quod ad circuitum per- \*mouea-  
 tinet, pars summa angustiore orbe finitur. Itaque superior tur, & tu-  
 summae circumdata, in latera quoque caput moueri finit. ber.  
 Tertia eodem modo secundam excipit. Ex quo facilis ceruici  
 mobilitas est. Ac ne \*sustinere quidem caput posset, nisi \*sustineri  
 f f vtrin-



vtrunque recti valentesque nervi collum continerent, quos  
 \* *καρτεραι* Græci appellant. Siquidem horum inter omnes  
 flexus alter semper intentus ultra prolabi superiora non pati-  
 tur. Iamque vertebra tertia tubercula quæ inferiori infe-  
 rantur, \* *exigit*, excipit. Cæteræ processibus deorsum spectantibus,  
 in inferiores insinuantur, ac per sinus quos vtrunque habent,  
 superiores accipiunt, multisque nervis & multa cartilagine  
 continentur. Ac sic vno flexu modico in \* *promptu* dato  
 cæteris negotiis homo & rectus insistit, & alioqui ad necessa-  
 ria opera curuatur. Infra cervicem verò summa costa con-  
 tra humeros sita est, inde undecim inferiores usque ad imum  
 pectus perveniunt, hæque primis partibus rotundæ & leniter  
 quasi capitulatæ, vertebrarum transuersis processibus ibi quo-  
 que paulum \* *sinuatis* insinuatis inhaerent. Inde \* *latefcit*, patefcunt, & in ex-  
 teriorem partem recuruatæ, paulatim in cartilaginem dege-  
 nerant. Eaque parte rursus in interiora leniter flexæ com-  
 mittuntur cum osse pectoris. Quod valens ac durum à fau-  
 cibus incipit, ab utroque latere lunatum, & à præcordiis iam  
 ipsum quoque cartilagine molitum terminatur: sub costis  
 verò prioribus quinque, quas \* *ὀστέα* Græci nominant, bre-  
 ues tenuioresque, atque ipsæ quoque paulatim in cartilagi-  
 nem versæ, extremis abdominis partibus inhaerescunt, ima-  
 que ex his maiore iam parte nihil nisi cartilago est. Rursus  
 à ceruice duo lata ossa vtrunque ad scapulas tendunt, nostri  
 scoptula operta, \* *ὠμοπλάται* Græci nominant. Ea in summis  
 verticibus sinuata ab his triangula, paulatimque latefcencia  
 ad spinam tendunt, & quo latiora quaque parte sunt, hoc he-  
 betiora. Atque ipsa quoque in imo cartilaginosa, posteriore  
 parte velut innatant, quoniam nisi in summo nulli ossi inhae-  
 rescunt. Ibi verò validis musculis nervisque constricta sunt.  
 At à summa costa paulo interius quàm ubi ea media est, os  
 excrescit, ibi quidem tenue, procedens verò quo propius lato  
 scapularum ossi sit, eo plenius latiusque & paulatim in exte-  
 riora curuatur: quod propius altera verticis parte modicè in-  
 tumescens, sustinet iugulum. Id autem ipsum recuruum ac  
 neque inter durissima ossa numerandum, altero capite in eo  
 quod

scoptula  
 operta.



quod posui, altero in exiguo sinu pectoralis ossis insidit: paulumque motu brachij mouetur, & cum lato osse scapularum infra caput eius, neruis & \* cartilagini connectitur. Hinc humerus incipit, extremis vtrunque capitibus tumidus, mollis, sine medulla cartilaginofus: medius teres, durus, medullifus, leniter gibbus, & in priorem & posteriorem, interiorem & exteriorem partem. Prior autem pars est, quæ à pectore est, posterior quæ ab scapulis, interior quæ ad latus tendit, exterior quæ ab eo recedit: quod ad omnes articulos pertinere in vltioribus patebit. Superius autem humeri caput rotundius, quàm cætera ossa, de quibus adhuc dixi, \* verticillatis scapularum \* ossibus paruo excessu inferitur, ac maiore parte ex transitu neruis deligatur. At inferius duos processus habet, inter quos quod medium est, magis etiam extremis partibus sinuatur. Quæ res sedem brachio præstat, quod constat ex ossibus duobus. Radius, quem *ῥαδις* Græci appellant, superior breuiorque, & primò tenuior, rotundo & leniter cauo capite exiguum humeri tuberculum recipit, atque ibi neruis & cartilagine continetur. Cubitus inferior longiorque, & primo plenior in summo capite, duobus quasi verticibus extantibus in sinu humeri, quem inter duos processus eius esse proposui, se inferit. Primò verò duobus radiis brachij ossa iuncta paulatim dirimuntur, rursusque ad manum coeunt, modo crassitudinis mutato. Siquidem ibi radius plenior, cubitus admodum tenuis est. Dein radius in caput cartilaginofum confurgens, in verticem eius sinuatur. Cubitus rotundus in extremo, parte altera paulum procedit. Ac ne sæpius dicendum sit, illud ignorari non oportet, plurima ossa in cartilaginem \* desinere, nullum articulum non sic finiri. neque enim aut moueri posset, nisi \* leui inniteretur; aut cum carne neruisque coniungi, nisi ea media quadam materia committeret. In manu verò prima palmæ pars ex multis minutisque ossibus constat, quorum numerus incertus est. Sed oblonga omnia & triangula structura quadam inter se connectuntur, cum inuicem superior alterius angulus, alterius planities sit, eoque fit ex his \* vnus ossis paulum

\* cartilagini  
giue

\* verticillatis  
\* ossibus  
inferitur,

Radius.

Cubitus.

\* desinere  
\* leui

\* veluti  
vnus



\* vertice

\* superio-  
risPecten.  
\* subter

Femina.

\* inferiori  
quoque  
parte\* extor-  
sus

Patella.

lum in interiora concaui species. Verum ex manu duo exigui  
processus in sinus radij coniciuntur. Tum ex altera parte  
recta quinque ossa ad digitos tendentia palmam explent, à  
quibus ipsi digiti oriuntur, qui ex ossibus ternis constant,  
omniumque eadem ratio est. Interius os in \* verticem sinua-  
tur, recipitque \* exterioris exiguum tuberculum, nervique ea  
continent, à quibus orti ungues indurescunt. Ideoque non  
ossi, sed carni magis radicibus suis inhaerent. Ac superiores  
quidem partes sic ordinatae sunt. Ina verò spina in coxarum  
osse delidit, quod transversum longeque valentissimum,  
vulvam, vesicam, rectum intestinum tuetur, idque ab exte-  
riore parte gibbum, ad spinam resupinatum, à lateribus, id  
est, in ipsis coxis sinus rotundos habet: à quibus oritur os,  
quod pectinem vocant, idque. \* super intestina sub pube trans-  
versum ventrem firmat: rectius in viris, recurvatum magis  
in exteriora in foeminis, ne partum prohibeat. Inde femina  
oriuntur, quorum capita rotundiora etiam quam humero-  
rum sunt, cum illa ex ceteris rotundissima sint. Infra verò  
duos processus à priore & à posteriore parte habent. Dein  
dura, & medullosa & ab exteriori parte gibba: rursus ab \* in-  
ferioribus quoque capitibus intumescunt. Superiora in sinus  
coxarum, sicut humeri in ea ossa, quae scapularum sunt, coniciun-  
tur, tum infra \* introrsus leniter tendunt, quo aequalius supe-  
riora membra sustineant. Atque in eo inferiora quoque ca-  
pita media sinuantur, quo facilius excipi à cruribus possint.  
Quae commissura, osse paruo, molli, cartilaginoso tegitur,  
patellam vocant. Haec super innatans, nec ulli ossi inhaerens,  
sed carne & nervis deligata, pauloque magis ad femoris os  
tendens, inter omnes crurum flexus iuncturam tuetur. Ipsum  
autem crus est ex ossibus duobus. Etenim per omnia femur  
humero, crus verò brachio simile est: adeo ut habitus quo-  
que & decor alterius ex altero cognoscatur, quod ab ossibus  
incipiens, etiam in carne respondet. Verum alterum os ab  
exteriore parte supra positum est, quod ipsum quoque Sura  
recte nominatur. Id brevius, supraque tenuius ad ipsos talos  
intumescit. Alterum à priore parte positum, cui Tibiae no-  
men.



men est, longius & in superiore parte plenius solum cum femoris inferiore capite committitur, sicut cum humero cubitus. Atque ea quoque ossa infra supraque coniuncta <sup>\* medio,</sup> vt in brachio dehiscunt. Excipitur autem crus infra <sup>\* osse</sup> ossa ex transuerso talorum, idq. ipsum super os calcis situm est, quod quadam parte sinuatur, quadam excessus habet, & procedentia ex talo recipit, & in sinum eius inseritur. Idque sine medulla durum, magisq. in posteriorem partem proiectum, teretem ibi figuram repræsentat. Cætera ossa pedis ad eorum quæ in manu sunt, similitudinem instructa sunt. Plantæ palmis, digiti digitis, ungues unguibus, respondent.

## ENARRATIO.

rarò autem caluaria solida sine suturis est.

**S**VTVR <sup>Æ</sup> capiti in hunc usum attributa sunt, tum ut fuliginosi humores, &crementa, per easdem commodius expurgarentur atque transmitterentur, tum ut prohiberent ne unico ictu tota caluaria confringeretur. Quare sine externas sine internas causas spectes, soliditas cerebri, ut hic inferre videtur Celsus, capite firmitudinem nullam afferet: verum id grauissimis periculis subicit. sicuti inueni cuidam in cuius caluaria suturarum vestigia nulla apparebant, Patavi accidisse Roaldus Columbus libro primo Anatomicarum administrationum refert: qui quum grauissimo capitis dolore premeretur, atque appropinquissimis remediis sedando dolori videretur, non prius dolere desit, quam vitam morte commutaret. Adde quòd qui solida atque crassa caluaria sunt, stolidi, indociles, atque obliuiosi magna ex parte sint. Si quis tamen hic Celso patrocinari velit, atque inferre, caput quò pauciores suturas habeat, eò minus subiacere externis ludentibus causis; is tamen fateatur necesse est, internis afficientibus causis magis subiectum esse.

Neque enim certus.

OCTO tantum generatim sutura esse

dicuntur; quarum tres, lambdoides videlicet, sagittalis & coronalis, propria ac vere vocantur; quinque reliquæ spurie appellantur, quas rectius commissuras quàm suturas dixeris; cuiusmodi sunt squamosa una, atque ea quam additamentum lambdoidis sutura Galenus vocat, & illa quæ à canis temporum ortum habet, eaque quæ os frontis à capitis osse discriminat.

Narium duo foramina.

HVIUS reddit Galenus libro De usu partium VIII. rationem.

Maxilla verò.

NON solùm homini, sed & omnibus animantibus maxilla superior motu caret, crocodilo excepto, qui eandem mouet, inferioréque immobilem seruat, pſittacôque, qui (vix à nonnullis obseruatum est) utranque maxillam simul eodémque tempore mouet, separatimque alteram.

Duriore osse dentes.

DURISSIMI dentes sunt, præsertim molares & canini (nam incisorij reliquis molliores sunt) ut cibis conficiendis sufficerent, neque ab his contererentur.

Ultra quos utrinque.

GALENVS & reliqui Anatomici  
ss 3. utrinque



virique quinos molares constitunt: esse tamen quandoque, quod rarius est, quando quaterni tantum sint.

### præterquam in his.

CELSVS hic eos dentes intelligere videtur, quos genuinos ac nouissimos vocant; vulgus, quod tardè nascantur, sapientia dentes appellat; raro siquidem ante xxviii. annum aut trigentesimū pronuntiant; uti etiam nonnullis, quemadmodum memorie prodit Plinius, ante sexagesimum aut octuagesimum annum non pullulascunt.

### Omnesque vertebræ.

SUPREMA tamen vertebra omnium capacissima & tenuissima est, protinusque caput ipsum sustinet, per duos sinus receptis suis processibus; aliquando quidem exactè conplectitur secundæ vertebræ tubercula, & gibbositates vel capitis eminentias, aliquando ab illis recedit plurimum. Processum habet à superiore sui parte omnium magnis obfusum, & parum admodum prominens, adeo ut hunc nullum esse dicat Galenus; à lateribus virique alium transversum, perforatum, parte antica conspicuum. Secunda vertebra angustior validiorque est, processum admodum magnum & plurimum bifidum habens à parte posteriore; duos item alios à lateribus superioris vertebræ similes, sed eos multo minores tantum. Eius verò processum posteriorem, qui bifidus est, Hippocrates dentem vocat; Galenus à signa turbinata pyrenoidem; eminet enim, ac sursum spectat priori spondylo virique quibusdam vinculis alligatus, quæ ab utroque superioris vertebræ latere pariter interna prodeunt: ita ut valido rotundoque ligamento nixa duæ priores vertebræ, caput in viramnis partem spectant. Hæc Carolus Stephanus, libro De diss. part. hum. corporis.

### καεστὰς Græci appellant.

CÆSARIUS: Sic quidem Ludovicus Calius auctor Latinarum Lectionum dicendos esse contendit: quod & se posse probare dicit per Galenum & Apollonium in Argo-

nauticis. eosdem tamen Hermolaus Barbarus καεστὰς appellandos putavit.

### & à præcordiis.

HANC à gladioli similitudine ensiformem, & à clypei forma, seuiformem cartilaginem vocant.

### sub costis verò.

HIC exemplaria præter rationem variare video: nam siue ῥόας siue ῥόας legeris, idem est; quoniam ῥόας Græci dicantur costæ breuiores mollioræ, quæquas Latini spurias, sicuti & Græci ῥόας, vocant.

### Ac ne sæpius dicendum sit.

GALENVS primo De usu partium libro: Quoniam, inquit, periculum erat ne motiones difficiliter fierent, & eminentia ossium extererentur, duplex rursus auxilium in id natura molita est; primum quidem cartilagine utrumque os subiungens ac obliniens; alterum verò ipsi cartilaginibus humorem vinctuosum ac viscosum velut oleum aliquod superinfundens, per quem facile mobilis simul, & attritus continuæ omnino articulationi ossis facta est.

### In manu verò.

CELSVS postbrachiali seu μετακαρπία quinq; ossa tribuit, contra Galenum. Nam is, & post eum Vesalius & Carolus Stephanus, quatuor tantum attribuerunt: quamquam non incongruum fuerit, si quis primum articulum pollicis cum postbrachiali numeraret. Erunt igitur summa manus ossa quatuordecim, si Celsum sequamur; si Galenum, tredecim: ita ut tria ossa pollicis, uti reliquis quoque digitis, præter se iuncta dicta ossa, ascribamus.

### Quæ commissura, osse paruo.

Επιγνάμνδα Græci vocant, Latini molam aut patellam nominant: est autem os rotundum, genu constituens quæ parte femur tibia annectitur, eique canitari oppositum quæ à poplite per extrema femoris tubercula



*in tubercula producitur, ne crus in anteriora  
aque ac in posteriora infectatur, sed ut ro-  
tus facilius efficiatur. Est autem per totam* *substantiam canernosam in modum pumicis;  
extrinsecus autem cartilagine obvoluitur:  
quo fit ut Celsus cartilagosum dixerit.*

## CAPVT II.

*Ossa vitiata & corrupta quibus signis cognoscantur, & qua ratione curentur.*

**O**MNE autem os, vbi iniuria accessit, aut vitiatur, aut finditur, aut frangitur, aut foratur, aut colliditur, aut loco mouetur. Id quod vitiatum est, primò ferè pingue fit, deinde vel nigrum vel cariosum. Quæ super natis grauibz vlceribus aut fistulis, hisque vel longa vetustate, vel etiam cancro occupatis eueniunt. Oportet ante omnia os nudare vlcere exciso: & si latius eius vitium est, quàm vlcus fuit, carnem subsecare, donec integrum os vndique pateat: tum id quod pingue est, semel iterumve satis est admoto ferramento adurere, vt ex eo statu secedat: aut eradere donec iam aliquid cruoris ostendatur, quæ integrioris nota est. Nam necesse est, aridum sit id quod vitiatum est. Idem in cartilagine quoque læsa faciendum est. Siquidem ea quoque scalpello radenda est, donec integrum id sit, quod relinquatur. Deinde si vel os, siue cartilago rasa est, nitro bene trito respergendum est. Neque alia facienda sunt vbi caries nigritiesve in summo osse est. Siquidem id vel paulo diutius eodem ferramento adurendum vel radendum est. Qui radit hæc, audacter imprimere ferramentum debet, vt & agat aliquid, & maturius definat. Finis est, cum vel ad album os, vel ad solidum ventum est. Albo finiri ex nigritye vitium, soliditate quadam ex carie manifestum est. Accedere etiam cruoris aliquid integro, supra dictum est. Si quando autem altius descenderit, vtrumlibet dubium est. In carie quidem expedita cognitio est. Specillum tenue in foramen dimittitur, quod magis minusve intrando, vel in summo cariem esse, vel altius descendisse testatur. Nigrities colligi quidem potest etiam ex dolore & ex febre. Quæ vbi mediocria sunt, illa altè descendisse non potest.



• h. 4. v. 10  
ces delenda.

test. Manifestior tamen adacta terebra fit. Nam finis vitij est, vbi scobis nigra esse desit. Igitur si caries altè descendit, per terebram vrgenda crebris foraminibus est, quæ altitudine vitium æquent. Tum in ea foramina demittenda candentia ferramenta sunt, donec inde siccum os ex toto fiat. Simul enim post hæc & resoluatur ab inferiore osse quodcunque vitiatum est, & is sinus carne replebitur: & humor aut nullus postea feretur, aut mediocris. Sin autem nigricies\* est, aut si caries ad alteram quoque partem ossis transit, oportet excidi. Atque idem in carie quoque ad alteram partem ossis penetrantè fieri potest. Sed quod totum vitiatum, totum eximendum est. Si inferior pars integra est, eatenus quod corruptum est, excidi debet. Item siue capitis, siue pectoris os, siue costa cariola est, inutilis vitio est, & excidendi necessitas est. Neque audiendi sunt, qui osse nudato, diem tertium expectant, vt tunc excidant. Ante inflammationem enim tutius omnia tractantur. Itaque quantum fieri potest, eodem momento & cutis incidenda est, & os detegendum, & omni vitio liberandum est. Longèque periculosissimum est, quod in osse pectoris est: quia vix etiam si rectè cessit, curatio veram sanitatem reddit.

#### ENARRATIO.

Id quod vitiatum est.

**C**ARO quum tabescit aut liquatur, glutinosa fit & pinguis; unde & ossa laniora quodammodo & pinguiora reddi contingit; sicuti libro De vulneribus ostendit Hippocrates. Nigrescit autem ob acrem inflammationis calorem. Quare non immerito in aphorismis Hippocrates, ex osse agrotante carnem liuidam malam dixit.

asperum, ac fulvum; quibusdam etiam ad cerebrum usque corrosum. Vti in hoc modo affectum incideris, si quidem ultra corrosum fuerit, sinere optimum est, & ulcus quam celerrimè curare: si verò corrosum non fuerit, sed asperum; ad secundam usque laminam rasum expungabis, & veluti fracturam curabis.

vbi caries nigriciesve.

Oportet ante omnia.

**H**IPPOCRATES, Quum caries facta fuerit in osse, dolor ex hoc corripit ipsum os, & progressu temporis attenuatur ac inflatur, & fit in ipso fractura: & si hanc rescueris, comperies ipsum os eleuatum ac

**H**YEME, vt docet Hippocrates, ante decimum quartum, æstate post septimum febris accedit: & postquam hoc factum fuerit, ulcus colorem amittit, & ex ipso sanies panca fluit, & quod inflammatum est, ex ipso emouetur, ac viscosum fit.

Item



Item siue capitis.

quam subsequente capite meningophylaca  
vocari dicit, ne principem aliquam partem  
hic tamen subiicienda lamina est, afficiamus.

## CAPVT III.

*Quomodo os excidatur: & de Modiolo, & Terebra, ferramenti ad id paratis.*

**E**XCIDITVR verò os duobus modis. Si paruulum est, quod læsum est, modiolo, quem *χοιλιον* Græci vocant: Si spatiosum, terebris. Vtriusque rationem proponam. Modiolus ferramentum concuum teres est, imis oris ferratum, per quod medium clauus \* ipse quoque interiore orbe cinctus demittitur. Terebrarum autem duo genera sunt: Alterum simile ei, quo fabri vtuntur. Alterum capituli longioris, quod ab acuto mucrone incipit, deinde subitò latius fit, atque iterum ab alio principio paulo minus quàm æqualiter sursum procedit. Si vitium in angusto est, quod comprehendere modiolus possit, ille potius aptatur. Et si caries subest, medius clauus in foramen demittitur. Si nigrities, angulo scalpri finis exiguus fit, qui clauum recipiat, vt eo insistente circumactus modiolus delabi non possit. Deinde is habena quasi terebra conuertitur. Estque quidam premendi modus, vt & foretur, & circumagatur, quia si \* leuiter imprimitur, parum proficit: Si grauitèr, non mouetur. Neque alienum est instillare paulum rosæ, vel lactis, quo magis lubrico circumagatur. Quod ipsum tamen si \* obtusius est, aciem ferramenti hebetat: at vbi iam iter modiolo pressum est, medius clauus educitur, & ille per se agitur. Deinde cùm sanitas inferioris partis scobe cognita est, modiolus remouetur: at si latius vitium est, quàm vt illo comprehendatur, terebra res agenda est. Ea foramen fit in ipso sine vitiosi ossis atque integri, deinde alterum non ita longè, tertiumque donec totus is locus qui excidendus est, his cauis cinctus sit, atque ibi quoque quatenus terebra agenda sit, scobis significat. Tum excisorius scalper ab altero foramine ad alterum malleolo adactus, id  
t t quod



quod inter vtrunque medium est, excidit: ac si ambitus similis ei fit, qui in angustiore orbem modiollo imprimitur. Vtro modo verò id circumductum est, idem excisorius scalper in osse corrupto planus summam quamque testam <sup>\* læt</sup> læt, donec integrum os relinquatur. Vix unquam nigrities integrum, caries per totum os perrumpit, maximeque ubi vitata caluaria est. Id quoque signi specillo significatur, qui depressus in id foramen, quod intra solidam sedem habet, & ob id renitens aliquid inuenit, & madens exit. Si peruium inuenit, altius descendens inter os & membranam nihil oppositum inuenit, educiturque siccus, non quo non subsit aliqua vitiosa sanies, sed quoniam ibi ut in latiore sede diffusa sit. Siue autem nigrities, quam terebra detexit, siue caries, quam specillum ostendit, os transit, modiolli quidem usus ferè superuacuum est, quia latius pateat necesse est, quod <sup>\* iam</sup> iam altè processit. Terebra verò ea, quam secundo loco posui, utendum, eaque ne nimis incalescat, subinde in aquam frigidam demittenda est. Sed tum maiore cura agendum est, cum iam aut simplex os dimidium perforatum est, aut in duplici, superius. Illud, spatium ipsum: hoc, sanguis significat. Ergo tum lentius ducenda habena, suspendendaque magis sinistra manus est, & sapius attollenda, & foraminis altitudo consideranda: ut quodcumque os perrumpitur, sentiamus: neque periclitemur, ne mucrone cerebri membrana lœdatur. Ex quo graues inflammationes cum periculo mortis oriuntur. Factis foraminibus eodem modo media saepe, sed multo circumspectius excidenda sunt, ne fortè angulus scalpri eandem membranam violet, donec fiat aditus, per quem membranae custos immittatur, *μωρὸς φάρα* Græci vocant. Lamina ænea est, firma, paulum resina, ab exteriori parte læuis, quæ demissa <sup>\* sic ut</sup> est, ut exterior pars eius cerebro propior sit, subinde ei subicitur, quod scalprio discutiendum est: ac si excipit eius angulum, ultra transire non patitur, eoque & audacius & tutius scalprium malleolo subinde medicus ferit, donec excisum vndique os eadem lamina leuetur, tolliq. sine vlla noxa cerebri potest. Vbi totum os eiectum est, circumradendæ <sup>\* leuanda-</sup>



\*lauandæque sunt oræ, & \* si quis scolis membranæ insedit, \*lauandæ  
 colligendum. Vbi superiori parte sublata, inferior relicta est, \* si quid  
 non ora tantum, sed os quoque totum \* lauandum est, vt sine \* ora  
 noxa postea cutis increſcat, quæ aspero \* osse innascens proti- \* lauandæ  
 nus non sanitatem, sed nouos dolores mouet. Patefacto cere- \* osse  
 bro, qua ratione agendum sit, dicam, cum ad fracta ossa per-  
 uenero. Si basis aliqua seruata est, super imponenda sunt  
 medicamenta non pingua, quæ recentibus vulneribus ac-  
 commodantur, supraque imponenda lana succida oleo atque  
 aceto madens. Vbi tempus processit, ab ipso \* ore caro incre-  
 ſcit, eaque factum manu sinum complet. Si quod etiam os  
 adustum est, à parte sana recedit: subitque inter integram at-  
 que emortuam partem caruncula, quæ quod abcessit expel-  
 lat, eaque fere quia testa tenuis & angusta est, \* squama est: \* λειψίς, id  
 id λειψίς à Græcis nominatur. Potest etiam euenire, vt ex est, squa-  
 ictu neque findatur os, neque perfringatur, sed summum \* ta- ma à G.  
 men collidatur, exaspereturque. Quod ubi incidit, radi & tantum  
 \* lauari satis est. Hæc quamuis maximè fiunt in capite, tamen \* lauari  
 cæteris quoque ossibus communia sunt, vt ubicunque idem  
 incidet, eodem remedio sit vtendum. Atque cum ea fracta,  
 fissa, forata, collisa sunt, quasdam proprias in singulis generi-  
 bus, quasdam communes in pluribus curationes requirunt.  
 De quibus protinus dicam, initio ab eadem caluaria accepto.

## ENARRATIO.

## Modiolus.

**V**IDVS Vidius modiolum enim esse  
 putat, quem Hippocrates ferram tere-  
 rem nominat, cuiusque usum in capitis tan-  
 tum affectibus necessarium animat; idque  
 auctoritate Hippocratis: qui dum caluariae  
 os secatur, considerari subinde ferræ circuli  
 vult. Galenus sub finem sexti metho-  
 di Therapeuticae, περιτρίδας vocat: Aërius  
 modiolus usum tamquam noxium omnino  
 reiecit.

## Terebrarum autem.

**Q**UONIAM quæ per terebellam sit

curationem parum tutam existimauerunt ve-  
 teres, vt auctor est Galenus, propterea quod  
 dum audacius eam tractant, duram mem-  
 branam qua ossi subternitur violent; Qui-  
 dam, inquit, quo minus, vsquam aberrent,  
 eiusmodi terebellas excogitauerunt quæ mergi  
 non possint, quas ab argumento περιτρίδας  
 dicunt. Supercurrunt enim pauli (supra tere-  
 bella acutam cuspidem circulus quidam pa-  
 rum extans. Sanè expedit complures id ge-  
 nus preparatas habere ad omnem caluariae  
 crassitudinem: nam crassiori longior terebra  
 conuenit (voco autem ita, cuius spatium  
 quod inter summam est cuspidem, & cir-  
 culum



culum qui extans circumcurrit, malus est) tenuiori breuior: est autē hinc quoque quod iuter est inter cuspides, & quod circumcurrit minus. hactenus Galenus sexto Methodi. Ceterum quoniam parum tuta est curatio, ut diximus, (nam qui sic curantur, debili capite, atq. omnibus casibus obnoxio superuincunt) videndum restat in quibus admitti possit: siquidē si nec contractum, nec fissum sit os, frustra terebella admoventur. quin & si in superficie vulneratus sit, sanies verò ad cerebri membranā succingentem non peringat, inutilis erit eiusdē usus, quemadmodum etiam ubi rima in osse temporis fuerit. Verum si percussus aliquis in capite rimam in calvaria contraxerit exilem aded, ut per eam sanies exudare nequeat; tum demum eiusdē usus erit, ac tum ex Galeni sententia, curam aggrediemur. quam in hunc modum de vulneribus capitis describit Hippocrates: Si ab initio assumptam curationem, inquit, admixtras, non oportet os statim ad membranā perforare ac excindere; non enim conducit membranā osse denudatā esse, ad multum tempus malē afflicta; sed postremum ubi madore corrumpi ac putrescere ipsam periculum est. Est & aliud periculum, si statim os ad membranā vulnerato ipsum auferas, ne in ipso opere membranā per terebellum vulneres. Verum terebrantem oportet, ubi iam valde parum atest ut os iam sit perforatum, & os iam mouetur, à terebratione desistere, & sinere ut os sua sponte discedat. Oportet autem os ipsum quod excidendum est, terebellis in circuitu perforari: cauendum tamen est ne in osibus admodum praeuipis, atque infirmis terebra utaris; periculum enim esset, ne dum circumagitur, terebella & os ad cerebri membranā urgeretur, cerebrūque comprimeret: nam si vel comprimatur vel concutiat cerebrum, ut idem auctor est libro De locis affectis, attonitus morbus illico supervenit.

### Tunc excisforius scalper.

Is potissimum quem Graeci *ἀνδρῶδες* vocant: de cuius, & aliorum scalpellorum usus plura apud Galenum sexto methodi Therap.

### caque ne nimis incalescat.

TREBRANTEM, inquit Hippocrates, frequenter eximere terebellum oportet, caliditatis ossis gratia, & in frigidam aquam immergere. Calefces enim ex circumductione terebellum etiam os excalescens ac resicans admittit, & maius os perforationem ambiens discedere facit, quam alias discessurum fuisset. Si vero etiam statim volucris usque ad membranā perforare & postea os auferre, eodem modo frequenter eximere terebellum convenit, & in frigidam aquam demergere. At si non ab initio curationem assumptis, sed ex alio traditam acceperis, ita ut posterior tardē ad curationem devenias, terebello exculpro statim os ad membranā perforare ac excindere oportet, & exemplo terebello, sapius speculari, tum alias, tum per admotum specillum circumcirca per ipsius terebelli viam: nam multo citius suppuratur os, si suppuratum iam, ac transpiratum perforaveris; & saepe contingit ut non profundum os sit.

### per quem membranæ custos.


HÆC à Galeno in commentariis De officina medici, chirurgicis instrumentis annumeratur, qua etiam vitur in corporibus incidendus; ut quum costam secat, eius membranā intactam relinquit. Hinc non dissimile instrumentum est quod chirurgi nostri vellem dicunt, quum eo attollant os quod in rotum ferē excisum est & iam labat. Verum nimis quoniam Celus noster in describendis ferramentis, chirurgicisque instrumentis sedulus admodum fuit, schemata singulorum ex Vidi Vidi commentariis petere visum fuit, atque huic capiti subiungere.

Modiolus




Ferramentum in imo terebræ semi-  
circula-  
tum.

Modiolus.




Ferramentum quod ima parte  
terebræ vnguis speciem  
sepræsentat.




Ferramentum quod ab ima parte  
terebræ, quasi in pomum  
desinit striatum.



Terebra quæ per  
manubriolum  
vertitur.



Terebella  
alia, aliis  
longiora.



Lamina.


cc 3.



Lamina custos membranæ.



Vestis, quo recentiores membranæ  
tuentur, & os attollunt.



CAPVT



## CAPVT IIII.

*De caluaria curatione.*

**I**GITUR vbica \*pertusa, protinus requirendum est, num \*percuta, bilem is homo vomuerit, num oculi eius obcæcati sint, num obmutuerit, num per nares aurēve sanguis ei effluerit, num conciderit, num sine sensu quasi dormiens iacuerit. Hæc enim non nisi osse fracto eueniunt. Atque vbi inciderunt, scire licet necessariam, sed difficilem curationem esse. Si verò etiam torpor accessit, si mens non constat, si neruorum vel resolutio vel distentio secuta est, verisimile est etiam cerebri membranam esse violatam, eoque in angusto magis spes est. At si nihil horum secutum est, potest etiam dubitari, an os fractum sit. Et protinus considerandum est, lapide, an ligno, an ferro, an alio telo percussum sit, & hoc ipso leni an aspero, mediocri an vastiore, vehementer an leniter. Quia quo mitior ictus fuit, eo facilius os ei restitisse credibile est. Sed nihil tamen melius est, quàm certiore id nota explorare. Ergo quà plaga est, demitri specillum oportet, neque nimis tenue, neque acutum, ne cum in quosdam sinus naturales inciderit, opinionem fracti ossis frustra faciat, neque nimis plenum, ne paruulæ rimulæ fallant. Vbi specillum ad os venit, \*nihil nisi lene & lubricum occurrit, integrum id videri potest. Si quid asperi est, utique quà futuræ non sint, fractum os esse testatur. A futuris se deceptum esse Hippocrates memoriæ prodidit, more scilicet magnorum virorum, & fiduciam magnarum rerum habentium. Nam leuia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt: Magno ingenio, multaquæ nihilominus habituro, conuenit etiam simplex veri erroris confessio, præcipueque in eo ministerio quod vtilitatis causa posteris traditur, ne qui decipiantur eadem ratione, qua quis antè deceptus est. Sed hæc quidem alioquin memoria

\* si nihil  
nisi læue



inoria magni professoris, uti interponeremus effecit. Potest  
 • quia autem futura eo nomine fallere, \* quæ æquè aspera est, ut ali-  
 quis hanc esse, etiam si rima est, existimet eo loco, quo subesse  
 hanc verisimile est. Ergo eo nomine decipi non oportet, sed  
 os aperire tutissimum est. Nam neque utique certa sedes, ut  
 supra posui, futurarum est, & potest idem, & naturaliter com-  
 missum, & ictu fissum esse, iuxta ve aliquid fissum habere.  
 Quin aliquid etiam, ubi ictus fuerit vehementior, quamvis  
 specillo nihil inuenitur, tamen aperire commodius est. At si  
 ne tum quidem rima manifesta est, inducendum super os  
 • deraden- atramentum scriptorium est, deinde scalpro id \* detrahen-  
 dum. Nigritiem enim continet, si quid fissum est. Solet  
 etiam euenire, ut altera parte fuerit ictus, & os altera fiderit.  
 Itaque si grauiter aliquis percussus est, si mala indicia subse-  
 • discussa cuta sunt, neque ea parte qua cutis \* discussa est, rima reperit-  
 tur, non incommodum est parte altera considerare, nunquis  
 locus mollior sit, & tumeat, eumque aperire. Siquidem ibi  
 fissum os reperietur, nec tamen magno negotio cutis sanescit,  
 etiam si frustra defecta est. Os fractum, nisi succursum est,  
 grauibz inflammationibus afficit, difficiliusque postea tra-  
 ctatur. Rarò, sed aliquando tamen euenit, ut os quidem to-  
 tum integrum maneat, intus vero ex ictu vena aliqua in cere-  
 • oculosq. bri membrana rupta aliquid sanguinis mittat, isque ibi con-  
 cretus magnos dolores moueat, \* oculos quibus obcaeret. Sed  
 fere contra id dolor est, & eo loco cute incisa pallidum os re-  
 peritur. Ideoque id quoque os excidendum est. Quacunque  
 autem de causa curatio hæc necessaria est: si nondum satis  
 cutis patefacta est, latius aperienda est, donec quicquid læsum  
 est, in conspectu sit. In quo ipso videndum est, ne quid ex  
 ipsa membranula, quæ sub cute caluariam cingit, super os re-  
 linquatur. Siquidem hæc scalpro terebrisve lacerata, vehe-  
 mentes febres cum inflammationibus excitat. Itaque eam  
 commodius est ex toto ab osse diduci. Plagam, si ex vulnere  
 est, talem necesse est habeamus qualem acceperimus. Si  
 manu facienda est, ea fere commodissima est, quæ duabus  
 • accipit, transuersis lineis litteræ X figuram \* accipit, ut deinde à sin-  
 gulis



gulis procedentibus \* singulis cutis subsequatur. Inter quæ  
 si sanguis fertur, spongia tubinde in aceto tincta cohibendus  
 est, occupandusque obiectis linamentis, & caput altius exci-  
 tandum. Neque id vitium vllum metum, nisi inter muscu-  
 los, qui tempora continent, adfert, sed ibi quoque \* nihil tu-  
 tius fit. In omni vero fisso fractove osse protinus antiquio-  
 res medici ad ferramenta veniebant, quibus id exciderent.  
 Sed multo melius est, antè emplastra experiri, quæ caluariæ  
 causa componuntur. Eorumque aliquid oportet ex aceto  
 molitum, per se super fissum fractumve os imponere, deinde  
 super id aliquanto latius quàm vulnus est, eodem medica-  
 mento illitum linteolum, & præterea succidam lanam aceto  
 tinctam. Tunc vulnus deligare, & quotidie resolvere, simili-  
 terque curare vsque ad diem quintum. A sexto die etiam va-  
 pore aquæ calidæ per spongiam fouere, \* cætera ex eadem fa-  
 cere. Quod si caruncula increfcere cœperit, & febricula aut  
 soluta erit, aut \* leuior, & cupiditas cibi reuerterit, satisque  
 somni accedet, in eodem medicamento erit perseverandum.  
 Procedente deinde tempore, emolliendum id emplastrum  
 adiecto cerato ex rosa factò, quo facilius carnem producat.  
 nam per se reprimendi vim habet. Hac ratione sæpe rimæ  
 callo quodam implentur, estque ea ossis velut cicatrix; & la-  
 tius fracta ossa, si qua inter se non cohærebant, eodem callo  
 glutinantur, estque aliquanto melius velamentum cerebro,  
 quàm caro quæ exciso osse increfcit. Si verò sub prima cura-  
 tione febris intenditur, breuesq. somni & iidem per somnia  
 tumultuosi sunt, vlcus mader, neque alitur, & in ceruicibus  
 glandulæ oriuntur, magni dolores sunt, cibi que super hæc fa-  
 stidium increfcit, tum demum ad manû scalpumque venien-  
 dum est. Duo verò sub ictu caluariæ periculi sunt, ne vel  
 findatur, vel \* medium desidat: si fissum est, possunt oræ esse  
 compressæ, vel quia altera super alteram excessit, vel etiam  
 quia vehementer rursus se commiserunt. Ex quo euenit, vt  
 humor ad membranam quidem descendat, exitum verò non  
 habeat, ac sic eam irriter, & graues inflammationes moueat.  
 Vbi medium desedit, eandem cerebri membranam os vrget,  
 v v interdum

\* alij, lin-  
 gulis: alij,  
 ligulis lo-  
 gunt.

\* nihilo-  
 minus tu-  
 to fit.

\* cætera  
 cad.

\* lenior

\* media



interdum etiam ex fractura quibusdam velut aculeis pungentibus. His ita succurrendum est, ut tamen quam minimum ex osse dematur. Ergo si ora alteri insedit, satis est id quod eminet, plano scalpro excidere; quo sublato iam rima hiat quantum curationi satis est. At si ora inter se comprimuntur, à latere eius interposito digiti spatium terebræ foramen faciendum est, ab eoque scalper duabus lineis ad rimam agendus ad similitudinem \* C. literæ, sic ut vertex eius à foramine basis ad \* rimas sit. Quod si rima longius patet, ab altero foramine rursus similis sinus fieri debet, & ita nihil latens in eo osse concavum est, abundeque exitus datur intus \* latens. Ne si fractum quidem os defecit, totum excidi necesse est. Sed siue totum perfractum est, & ab alio ex toto recessit, siue circumpositæ calvariæ inhæret exigua parte, ab eo quod naturaliter se habet, scalpro diuidendum est: deinde in eo quod defecit iuxta rimam quam fecimus, foramina addenda sunt. Si in angusto noxa est, duo: si latius patet, tria: septaque eorum excidenda: & tum scalper utrinque ad rimam agendus, sic ut lunatum sinum faciat, imaque pars eius intus ad fracturam, cornua ad os integrum spectent. Deinde si qua labent, & ex facili remoueri possunt, forfice ad id facta colligenda sunt, maximeque ea quæ acuta membranam infestant. Si id ex facili fieri non potest, subiicienda lamina est, quam custodem eius membranæ esse proposui, & super eam quicquid spinosum est, & intus eminet, excidendum est: eadem lamina quicquid deorsum insedit attollendum. Hoc genus curationis efficit, ut qua parte fracta ossa tamen inhærent, solidentur: qua parte abrupta sunt, sine ullo tormento sub \* medicamento tempore excidant, spatiumque inter hæc satis \* illi magnum ad extrahendam saniem relinquatur, plusque in osse propugnaculi cerebrum habeat, quam habiturum fuit, eo exciso. His factis, ea membrana acri aceto respergenda est, ut siue aliquid sanguinis ex ea profluit, cohibeatur: siue intus concretus cruor remanet, discutatur. Tum idem medicamentum eodem modo, qui suprapositus est, mollium, ipsi membranæ imponendum est. Cæteraque eodem

\* medica-  
mentis  
\* illis



eodem modo facienda sunt, quæ ad linteolum illitum & lan-  
 nam succidam pertinent, collocandusque is loco in tepido, &  
 curandum quotidie vulnus, bis etiam ætate. Quodd si mem-  
 brana per inflammationem intumuerit, infundenda erit rosa  
 tepida. Si usque eò tumebit, ut super ossa quoque emineat,  
 coërcebit eam bene trita lenticula, vel folia vitis contrita,  
 & cum recenti vel butyro vel adipe anserino mista: cer-  
 uixque molliri debebit, liquido cerato ex irino facto. At si  
 parum pura membrana videbitur, par modus eius emplastri  
 & mellis miscendus erit, idque super infundendum, eiusque  
 continendi causa vnum aut alterum linamentum iniicien-  
 dum, & super linteolo cui emplastrum illitum sit, conte-  
 gendum. Vbi plus pura membrana est, eadem ratione adii-  
 ciendum emplastro ceratum, ut carnem producat. Quod  
 ad abstinentiam verò & primos vltioresque cibos potiones-  
 que pertinet, eadem quæ in vulneribus præcepi, seruanda  
 sunt: eò magis quò periculosius hæc pars afficitur. Quin-  
 etiam cum iam non solum sustineri, sed ali \* his quoque ap-  
 parebunt, tamen erunt vitanda quæcunque mandenda sunt,  
 item fumus, & quicquid excitat sternutamentum. Spem  
 verò certam faciunt membrana \* mobilis ac sui coloris, caro  
 crescens rubicunda, facilis motus maxillæ atque ceruicis.  
 Mala signa sunt, membrana immobilis, nigra, vel liuida: vel  
 aliter coloris corrupti, dementia, acris vomitus, neruorum  
 vel resolutio, vel distentio, caro liuida, maxillarum rigor, at-  
 que ceruicis. Cæteraque quæ ad somnum, cibi desiderium,  
 febrem, puris colorem attinent, eadem quæ in cæteris vulne-  
 ribus, vel salutaria vel mortifera sunt: vbi bene res cedit, in-  
 cipit ab ipsa membrana: vel si os eo loco duplex est, inde quo-  
 que caro crescere, eaque id quod inter ossa vacuum est, re-  
 plet, nonnunquam etiam super caluariam excrescit. Quod  
 si incidit, inspergenda squama æris est, ut id reprimat, cohi-  
 beatque, ea carni superdando, quæ ad cicatricem perducant.  
 Omnibusque ea locis commodè inducitur, excepta frontis  
 ea parte, quæ paulum super id est, quod inter supercilia est.  
 Ibi enim vix fieri potest, ut \* per omnem ætatem sit exulce-  
 ratio,

\* hos q. ap-  
 parebit,  
 al. oportet  
 bit,

\* mollis

\* non per



ratio, quæ linteolo medicamentum habente contegenda sit. Illa utique capite fracto seruanda sunt, ut donec iam valida cicatrix erit, soluenda vitentur, frequens balneum, maior vini modus.

## ENARRATIO.

**H**IPPOCRATES septimo Aphorismorum Aphorismo XIII. Ex plaga in caput super, aut delirium, malum: & Aphorismo XXI. Ex ossis dissectione delirium, si ad vacuum usque processerit. & Aphorismo LVI. Quibus cerebrum concussum fuerit ex aliqua causa, eos voce statim priuari necesse est. & sectione sexta Aphorismorum Aphorismo L. Quibus cerebrum dissectum fuerit, eis necessum est febrem, & bilis vomitum succedere. Horum rationem in commentariis reddit Galenus.

## Et protinus considerandum est.

SECANT, inquit quinto Methodi Galenus, tela quæ acuta sunt; collidunt quæ grauius duræque; abrumpunt omnia quum vehemens ictus fuerit. idem facit casus ab alto, vel graue aliquid durumque incidens.

## Quia quo mitior ictus.

NULLVM etenim capitis vulnus contemni debet; sape namque cutis sola ferro contusa, aut alia quauis re, si non diligenter curetur, ut si concretus sanguis non expurgetur, incrudescens vlcus non parum molestia agro afferet, eiq; periculum minatur.

## A futuris se deceptum.

ET SI Hippocrates hominum capita atque suturas, parum inter se conuenire dicat, non tamen ob id, ut hic inferi Celsus, eundem à futuris deceptum fuisse consequens est. Habet autem libro De vultu capitis sic Hippocrates: Hominum capita nihil inter se commune habent; neque sutura capitis in omnibus eodem loco consistunt: verum quisquis ex priore parte capitis prominen-

tiam habet (est autem prominentia, rotunda ossis pars eminens præ altera,) huius sutura consistunt in capite, velut T. litera Græca pingitur, brevior enim lineam ad prominentiam transversam consistunt habet; altera vero linea per medium caput, sed secundum longitudinem ad collum semper habet: qui vero ex posteriori parte capitis prominentiam habet, huius sutura etiam contrario priori modo consistunt; nam brevior linea transversa super prominentiam fertur; longior per mediam calvariam ad frontem perpetua: At si caput utrimque à priori & posteriori parte promineat, sutura H. literæ similitudinem habent. Caput quod neutra parte prominet, suturas habet ad imaginem X. literæ.

## Solet etiam euenire.

HIPPOCRATES, Frangitur, inquit, calvaria sub vulnere alia parte quam ubi plaga est, atque id nudatum est. Ægina id reprehendit, neque verisimile putat, vnde parte percussa eam findi quæ contraria est. Nobis tamen Brugis Flandriæ oppido id videre contigit: siquidem quum eundem altera parte percusso os nudaretur, ac terebello saucium latius aperiretur, & neque inflammationis neque ossis fissura ibidem aliqua nota subisset, quarto tamen die conuulsu interit. Dissecto igitur undatòque mortui capite, altera parte os fissum, membranaque os contegens inflammata conspiciebatur.

## Si manu facienda est.

IDEM suadet Paulus: Deraso, inquit, super vulnus capite duas lineas iuxta rectos angulos mutuo se secantes quæ X. litera figuram accipiant, incidemus; harum autem alteram esse conuenit, quæ iam præcessit; deinde



inde quatuor in vertice angulos excoriantes, ut totum os quod perforabatur nudum existeret. si quidam sanguis ferretur, linamentis exposita obiectis colibebimus; sin minus, siccis. Hippocrates de dissectionis figura nullam facit mentionem. hoc illi dixisse sufficit, quod catenus incidi debet, quatenus opus esse videatur. Oportet autem ubi secatur diducere ab osse carnem, quae membrana, & osi iuncta est: deinde vulnus uniuersum linamentis implere, quae in posterum diem minimo labore ipsum apertum exhibeant.

### Neque id vitium.

MYSCVLII temporales, quos *νεκροφί-  
τος* vocant, si violentur, distentionem faciunt, maxillaque motum impediunt. Rationem reddit Hippocrates: dicit enim, Vbi caput incidendum est, cetera eius partes intus inciduntur: tempus & regio superior iuxta venam quae per tempora fertur. hic, inquam, locus scalpello attingi non debet: eum enim qui incisus fuerit, nervorum distentio prehendit, ac si tempus sinistrum inciditur, dextrum nervorum distentione occupatur; si dextrum, nervi distenduntur in sinistro. Celsus etsi metum afferre dicat, ibi tamen nihil tutius fieri dicit, quod quam sit verum, alij indicent.

### antè emplastra experiri.

CATAGMATICA aut cephalica appellabant. Aceto autem mollienda dicit, quod id neque simpliciter calidum, neque frigidum dici possit, & quod colligans in corporibus humiditatem consumat. Hippocrati tamen hac curandi ratio suspecta videtur; ut qui vulnus capitis neque vino (quod alioqui ulceribus, si auferuntur fit, quia glutinat & repellit, conuenientissimum est) neque alia quavis re madefaciendum dicit; aut certe quamminimum, & neque cataplasmatibus neque linamentis curandum, quod videlicet cataplasmata resoluunt atque effluunt. Vlcus enim cui nullus affectus innascitur, omnia quae molliunt & maturant, aliena sunt: sub his enim diutius perseuerat immundum, sordidumque & malignum

rediditur; quaeque proxima sunt putrescunt. Videtur tamen Celsus ad eum Hippocratis locum respexisse, ubi dicit: Danda vero opera est, ut vulnus quam celerrime suppuret; hoc enim pacto quae iuxta sunt, inflammari non poterunt, ipsumque purum quam celerrime efficietur; necesse est enim laceratam collisanguine à telo carnem in pus versam tabescere. Atqui idem non vapore aquae calidae per spongiam fovendum dicit; verum siccandum esse vulnus: sic enim mature admodum sauescet, & caro non humida, sed sicca produceretur. & neque simplex vulnus ita curat, sed confusam tantum carnem.

### Si verò sub prima.

VERVM ubi intelligis febrem innadere, inquit Hippocrates, vel quod aliud languenti signum superuenire; nihil cesare debes, sed os ad membranam secare, vel scalpello radere: facile autem secatur, & facile raditur.

### Duo verò sub ictu.

ID os, inquit Hippocrates, quod à suo statu recedens desidit, raro secandum est; & quae maximè desistunt & maximè praeputa sunt, minimè sectionem requirunt; quod videlicet satis spacij habeat (quanquam hic contrarium asserat Celsus) ad sanam educendam, & per se, & quum circa sectionem eiusmodi os ad id facta forcipe demitur: nam & demi alioqui deberet, si cerebri membranam pungeret; aut cerè attolli, si eandem comprimeret, etiam si nulla subesset sanies.

### Ne si fractum quidem.

GALENVS tamen os quod vehementer praeputum est, totum auferri iussit; ubi rimae longius pertineat, eam demum usque ad finem noluit.

### His factis, ea membrana.

IDEM suadet Hippocrates: celerrimè enim purgandam dicit, & siccandam; ne diutius madens hebes fiat, & atrolatur. quae quum ita accidit, periculus est ne putrescat.



infundenda erit rosa.

O L E V M *cisi per se ulceribus inimicum sit, ut auctor est Hippocrates libro De ulceribus, recte tamen adhibetur;*

*praesertim rosaceum, quod reprimendi & leniendi vi praeditum est, in ulceribus capitis & membranae quae per inflammationem intumuit.*

## CAPVT V.

*De narium fracturarum curatione.*

\* iniicien-  
da al. adi-  
genda

\* medio

**I**N narium verò & os & cartilago frangi solet, & quidem modò aduersa, modò à latere. Si aduersa fracta sunt, alterumve ex his, nares desidunt, difficulter spiritus trahitur: si à latere os fractum est, is locus cauus est: si cartilago, in alteram partem nares declinantur. Quicquid in cartilaginem incidit, excitandum leniter est, aut subiecto specillo, aut duobus digitis vtrinq; compressis. Deinde in longitudinem implicata linamenta & molli pellicula cincta circumfutaque intus \* adiicienda sunt. Aut eodem modo compositum aliquid ex arido penicillo. Aut grandis pinna, gummi vel fabrilis glutine illicita, & molli pellicula circumdata, quæ desidere cartilaginem non sinat. Sed si aduersa ea fracta est, æqualiter vtraque naris implenda est. Si à latere, crassius esse debet ab ea parte in qua natus iacet, ab altera tenuius, id quod inferitur. Extrinsecus autem circundanda habena est mollis, \* media illita mistis inter se similia & thuris fuligine, eaque vltra aures ducenda, & fronti duobus capitibus agglutinanda est. Id enim corpori quasi gluten inhærescit, & cum induruit, nares cōmodè continet. Sin quod intus inditū est lædit, sicut maximè fit, vbi interior cartilago perfracta est, excitata nares eadem tantummodo habena continendæ sunt. Deinde, post quatuordecim dies id ipsum demendum est. Resoluitur autem aqua calida, eaque tum is locus quotidie fouendus est. Sin os fractum est, id quoque digitis in suam sedem reponendum est: atque vbi aduersum id ictum est, vtraque naris implenda est: vbi à latere, ea in quam os impulsus est, imponendumque ceratum, & paulo vehementius deligandum est, quia callus eo loco non ad sanitatem tantummodo, sed etiam



etiam ad tumorem increfcit. A tertio die fouendum id aqua calida eft, tantoque magis, quanto propius efle fanitati debet. Quod fi plura erunt fragmenta, nihilominus \* extrinsecus fingula in fuas fedes digitis erunt compellenda, imponendaque extrinsecus eadem habena, & fuper eam ceratum, neque \* vltra fascia adhibenda eft. At fi quod fragmentum vndique refolutum cum cæteris non glutinabitur, intelligetur quidem ex humore, qui multus ex vulnere feretur, volfella verò extrahetur. Finitisque inflammationibus, imponetur aliquod medicamentum ex iis, quæ leniter reprimunt. Peius eft, vbi aut offi, aut cartilagini fractæ, cutis quoque vulnus acceffit. Id admodum rarò fit: fi incidit illa quidem, nihilominus eadem ratione in fuas fedes excitanda funt. Cuti verò fuperimponendum emplaftrum aliquod ex his quæ recentibus vulneribus accommodata funt, fed infuper nullo vinculo deligandum eft.

\* intrinsecus

\* fupra

## ENARRATIO.

**H**OC alienum à vero efle contendit Paulus Ægineta: dicit enim, Narinum pars ima quum fit cartilaginofa, frangi non folet, fed contundi, fima fieri & perneri.

Deinde, poft quatuordecim dies.

Id ante decimumquartum etiam diem

intum erit: nam quum ex omnibus corporis partibus natus facillimè confirmari poffit, atque breui tempore callo obducatur, decem etiam diebus corroboratur, fi non corruptio accedat: quæ eifi accedat, non magnopere turbari oportet, ut auctor eft Hippocrates libro De artionis.

## CAPVT VI.

*De aurium fractarum curatione.*

**I**N aure quoque interdum rumpitur cartilago: quod fi incidit, antequam pus oriatur, imponendum glutinans medicamentum eft. Sæpe enim fuppurationem prohibet, & aurem confirmat. Illud & in hac, & in naribus ignorari non oportet: non quidem cartilaginem ipfam glutinari, circa tamen carnem increfcere, folidarique eum locum. Itaque fi cum cute cartilago rupta eft, cutis vtrinque fuitur. Nunc autem de ea dico, quæ cute integra frangitur. In ea verò fi iam  
pus



\* primis  
temporibus

pus natum est, aperienda altera parte cutis, & ipsa cartilago contrà lunata plaga excidenda est. Deinde vtendum est medicamento leniter supprime, quale lycium est aqua dilutum, donec sanguis fluere desinat. Tum imponendum lin-teolum cum emplastro; sic vt pingue omne vitetur: & à parte posteriore lana mollis auri subicienda est, quæ quod est inter hanc & caput compleat. Tum ea leniter deliganda est, & à tertio die vapore, vt in naribus posui, fouenda. Arque in his quoque generibus abstinentia \* primi temporis necessaria est, donec inflammatio finiatur.

#### ENARRATIO.

**A**GINETA aures tantum contundi, quum cartilaginosa sint, non autem frangi, existimat.

glutinans medica-  
mentum.

**Q**VALIA sunt quæ *traspia* vocantur; sicut ad secundum fere gradum, media ratione inter ea quæ cicatricem trahunt, & carnem regenerant; suntq; astrictionis aliquam participia. ceterum hæc post sectionem tantum adhibenda docet Hippocrates.

In ea verò.

**A**T si ad suppurationem, inquit Hippocrates, citò deueniat, citò quidem aperire

non oportet. Multa quidem ex his quæ suppurari videntur, quandoque resorbentur; etiamsi quis cataplasma aliquod imposuit. Si quis verò aperire cogatur, celerrimè quidem sana fit, si in vltiorem partem perueniat. Illud tamen certò scire expedit, quòd mutila fiet auris, & minor altera, si perusta fuerit.

Tum ea leniter deliganda.

**H**IPPOCRATES deligationes omnes vitandas præcipit: nam & sana auris, inquit, deligatione pressa, dolore & pulsatione, & febre afficitur; & neque laxam deligationem ita quis circumdare poterit, ut non premas.

#### CAPVT VII.

*De maxilla fracta curatione, de quæ quibusdam  
ad omnia ossa pertinentibus.*

**A**B his ad maxillam venturus, indicanda quædam puto communiter ad omnia ossa pertinentia, ne sæpius eadem dicenda sint. Omne igitur os modò rectum vt lignum in longitudinem finditur, modò frangitur transuersum, interdum obliquum: atque id ipsum nonnunquam retusa habet capita, nonnunquam acuta. Quod genus pessimum est, quia neque



neque facillè committuntur, quæ nulli retuso innituntur, & carnem vulnerant, interdum neruum quoque aut muscolum. Quinetiam aliquando plura fragmenta à \* fragmento \* segmento fiunt. Sed in aliis quidem ossibus ex toto saepe fragmentum à fragmento recedit. Maxillæ verò semper aliqua parte etiam vexata, ossa inter se coherant. Igitur in primis digitis duobus vtrinque prementibus, & ab ore, & ab cute omnino ossa in suam sedem compellenda sunt. Deinde si transversa maxilla fracta est, sub quo casu ferè dens super proximum dentem \* excedit, \* excidit, ubi ea in suam sedem collocata est, duo proximi dentes: aut si hi labant, vteriores inter se seta deligandi sunt. Id in alio genere fracturæ superuacuum est. Cætera eadem facienda sunt. Nam linteolum duplex madens vino & oleo superiniiciendum cum eadem simila, & eadem thuris fuligine est. Deinde aut fascia, aut mollis habena \* media in longitudinem incisa, ut vtrinque \* medio mentum complectatur, & inde capita eius supra caput adducta ibi \* deligantur. \* deligantur. Illud quoque ad omnia ossa pertinet dictum erit, famem primum esse necessariam: deinde à die tertio humidum cibum, sublata inflammatione paulo plenior, eumque qui carnem alat: per omne tempus vinum esse alienum. Deinde tertio die resolui debere, fovèrique per spongiam vapore aquæ calidæ, eademque quæ primò fuerunt superdari. Idem die quinto fieri, & donec inflammatio finiatur, quæ vel octavo die, vel septimo ferè \* resolvitur. \* soluitur. Ea sublata rursus ossa esse tractanda, ut si quod fragmentum loco suo non est, reponatur. Neque id esse solvendum, nisi duæ partes eius temporis, intra quod quæque ossa conferuntur, transferint. Fere verò intra quartumdecimum & vnum & vigesimum diem sanescunt, maxilla, malæ, iugulum, pectus, \* latus, os scapularum, costæ, spina \* latum os coxarum, os tali, calx, manus, planta. \* Inter vigesimum & \* intra trigesimum diem crura, brachiaque. \* Inter septimum & \* intra vigesimum & quadragesimum, humeri & femina. Sed in maxilla illud quoque adiciendum est, quod humidus cibis diu assumendus est. Atque etiam cum tempus processit, in lagano,



lagano, similibusque aliis perseverandum, donec ex toto maxillam callus firmarit. Item utique primis diebus habendum silentium.

## ENARRATIO.

PAVLVS Æginera fracturarum differencias hasce ponit: Alia, inquit, fieri dicitur  $\epsilon\alpha\phi\epsilon\rho\eta\delta\acute{o}\nu$  hoc est ad raphani speciem; alia  $\sigma\chi\epsilon\delta\alpha\kappa\eta\delta\acute{o}\nu$ , alia  $\epsilon\iota\varsigma\ \delta\acute{o}\nu\chi\alpha\epsilon$ , alia  $\alpha\lambda\phi\iota\tau\eta\delta\acute{o}\nu$ , alia  $\kappa\epsilon\tau\acute{\alpha}\ \alpha\pi\acute{o}\theta\epsilon\upsilon\sigma\iota\varsigma$ ,  $\eta\ \alpha\pi\omicron\kappa\epsilon\pi\eta\varsigma$ , id est iuxta refractionem.  $\Pi\epsilon\phi\alpha\rho\eta\delta\acute{o}\nu$  igitur fractura est ossis transversim per crassitudinem facta, quæ etiam  $\sigma\kappa\omega\eta\delta\acute{o}\nu$  aut  $\kappa\epsilon\upsilon\lambda\eta\delta\acute{o}\nu$  à nonnullis vocatur, ex cucumerum & caulium fracturæ similitudine.  $\Sigma\chi\epsilon\delta\alpha\kappa\eta\delta\acute{o}\nu$  autem quasi assula modo, est oblonga ossis fissura:  $\epsilon\iota\varsigma\ \delta\acute{o}\nu\chi\alpha\epsilon$ , quasi dicas in unguem, iuxta partem aliquam est fissura, in extremo lunata; quæ etiam  $\kappa\alpha\lambda\alpha\mu\eta\delta\acute{o}\nu$  vocatur.  $\alpha\lambda\phi\iota\tau\eta\delta\acute{o}\nu$ , ad farinæ similitudinem est appellata; estque quando os in multas partes tenues finditur, quæ & ipsa  $\kappa\alpha\epsilon\gamma\iota\delta\acute{o}\nu$  à quibusdam appellatur. Refractio autem quæ  $\alpha\pi\acute{o}\theta\epsilon\upsilon\sigma\iota\varsigma$  dicitur, vel etiam practisio, est quum ossis pars per summitatis rupturam auferitur, ut ablata supernaret. Verum hæ fracturarum differentia ambi-

tiöse nimis, atque curiosa, ut inquit Galenus, à medicis Hippocrate iniuicilis, iis nominibus enarrata sunt non contenti enim fuerunt, omne os quod variè multifariamque sit fractum, explicasse. Ab huiusmodi appellationibus omnino abstinent Hippocrates. Galenus autem duas potissimum simplices fracturarum differentias, à quibus curandi indicationes sumuntur, posuit; rectam, hoc est quæ in longum protrahitur, & transversam. Celsus his obliquam addidit.

famem primum esse necessariam.

ATTENVANDVM, inquit Hippocrates, corpus ad dies decem usque, deinde reuivendum non tardè: si enim primis diebus inflammatio non accesserit, in viginti diebus maxilla corroboratur, quoniam laxa & medulla plena est. Humidum autem citum, hæc est sorbilem & terrem exhibet, quod mandere ipsis nocuum sit.

## CAPVT VIII.

## De Iuguli fracti curatione.

<sup>\*vinctura</sup> IUGVLVM verò si transversum fractum est, nonnunquam per se rursus rectè coit, & nisi mouetur, sanari sine iunctura potest. Nonnunquam verò, maximeque ubi motum est, elabitur, fereque id quod à pectore sub id quod ab humero est, in posteriorem partem inclinatur. Cuius ea ratio est, quod per se non mouetur, sed cum humeri motu consentit. Itaque eo subsistente, <sup>\*super al.</sup> sub id humerus agitur. Rarò verò admodum in priorem <sup>subinde</sup> partem iugulum inclinatur, adeò ut magni professores nunquam se vidisse memoriam mandarent. Sed locuples tamen eius rei auctor Hippocrates est. <sup>\*posterioré</sup> <sup>ve</sup> <sup>par.</sup> Verum



Verum ut dissimilis uterque casus est, sic quædam dissimilia requirit. Vbi ad scapulas iugulum tendit, simul dextra manu \* planè propellendus in posteriorem partem humerus est, & \* placidè illuc in priorem attrahendum. Vbi ad pectus conuersum est, ipsum quidem retro dandum, humerus autem in priorem partem adducendus est. At si is inferior est, non id quod à pectore est, depressendum est, quia immobile est, sed humerus ipse attollendus. Si casu superior est, id quod à pectore est, implendum lana, & humerus ad pectus deligandus est. Si acuta fragmenta sunt, incidi contra cutis debet: ex ossibus ea, quæ carnem vulnerant, præcidenda sunt: tunc retusa ossa committenda sunt. Si quid ab aliqua parte eminet, opponendum ei triplex lintecolum est, in vino & oleo tinctum. Si plura fragmenta sunt, excipienda sunt ex ferula facto canaliculo, eodemque intus incerato, ne fascia diducatur, quæ iugulo composito circumdanda est sæpius potius, quàm valentius. Quod ipsum quoque in omnibus ossibus fractis perpetuum est. A dextro verò iugulo, si id fractum est, ad alam sinistram, à sinistro ad dextram. Rursusque sub ala \* sua fasciari debet. Post hæc si iugulum ad scapulas inclinatum est, brachium ad latus: si in partem priorem, ad cervicem deligandum est. Supinusque homo collocandus, cæteraque eadem facienda, quæ suprà comprehensa sunt. Sunt verò plura ossa fere immobilia, vel dura, vel cartilaginosa, quæ vel franguntur, vel forantur, vel colliduntur, vel finduntur, ut malæ, pectus, \* latus, os scapularum, costæ, spina \* latum os costarum, os tali, calx, manus, planta. Horum omnium eadem curatio est. Si suprà vulnus est, id suis medicamentis nutriendum est. Quo sanescente rimas quoque ossis, aut si quod \* ferrumen est, callus implet. Si cutis integra est, & \* foramen os læsum esse ex dolore colligimus, nihil aliud, quàm quiescendum, imponendumque ceratum est, & leniter deligandum, donec sanitate ossis dolor finiatur.



## ENARRATIO.

**H**IPPOCRATES libro De articulis, In-  
gulum comminutum, si ex toto fractum  
sit, facilius curatur; sin in longitudinem,  
egrius: ex toto fractum dicens, quod non  
adharet aliqua sui parte; quod Celsus trans-  
uersum fractum appellat. Atque hæc quidem  
contraria sunt, atque aliquis existimet: nam  
quod ex toto fractum est, magis in suam se-  
dem compelli potest; ac si summa cura pro-  
videatur, quod sublimius est, magis deorsum  
cogetur idoneo habitu, ac debito vinculo:  
quammis autem ex toto in suam sedem non  
collocetur, tamen ea pars quæ excedit, non  
valde acuta apparebit. At quibus in longi-  
tudinem frangitur, simile vitium est, atque  
ubi ossa diducuntur: non enim ita in suam  
sedem restituitur; extrinsecusque ossis extremitas  
aspicitur admodum acuta.

curas videre licet apud Hippocratem De  
articulis libro.

## Si acuta fragmenta.

**I**DEM planè suadet Ægineta: Nam  
si inguli, inquit, partem aliquam refractam  
instabilem, aut etiam pungentem percipia-  
mus, scalpello in rectum diuisam eandem au-  
feremus: ac reliqua scalpris excisoris, la-  
mina quæ integra tueatur, aut alio scalpro  
propter firmitatem clavicula subiecto exa-  
quabimus. si quidem inflammatione careat,  
sutura; sin aliter, linamentis utemur: &  
splenis diuersis preparatis ad ossis eminentis  
inclinationem maiora ex eis & crassiora su-  
peraccomodabimus; si inflammatio infestet,  
oleo imbuta; si minus, arida.

## Si cutis integra est.

**I**D decimoquarto die, aut ad summum  
vicefimo complebitur.

## Sed locuples tamen.

**V**ARIAS clavicula aut inguli fra-

## CAPVT IX.

## De costarum fractarum curatione.

**P**ROPRIE tamen quædam de costa dicenda sunt, quia  
iuxta viscera est, grauioribusq. periculis is locus expositus  
est. Hæc quoque igitur interdum sic finditur, vt ne summum  
quidem os, sed interior pars eius, quæ rata est, lædatur: in-  
terdum sic, vt eam totam is casus pertrahat. Si tota fracta  
non est, nec sanguis expuitur, nec febricula sequitur, nec quic-  
quam suppurat, nisi admodum rarè, nec dolor magnus est,  
tactu tamen is locus \* leniter indolescit, abunde est eadem  
quæ suprâ scripta sunt, facere, & à media fascia incipere deli-  
gare, ne in alterutram partem hæc cutem inclinet. Ab vno  
verò & vigesimo die, quo utique os esse debet glutinatum, id  
agendum. Cibis vberioribus est vtendum, vt corpus quàm  
plenissimum fiat, quo melius os vestiatur, quod illo loco tene-  
rum adhuc iniuriæ sub tenui cute expositum est. Per omne  
autem

\* leniter  
al. grauius



autem tempus curationis vitandus clamor, sermo quoque, tumultus, ira, motus vehementior corporis, fumus, pulvis, & quicquid vel tussim vel sternutamentum mouet, \* ne spi- \* nec al. na  
ritum quidem magnopere continere expedit. At si tota costa  
perfracta est, casus asperior est. Nam & graues inflammatio-  
nes, & febris, & suppuratio, & saepe vitæ periculum sequitur,  
& sanguis \* ipuitur. Ergo si vires patiuntur, ab eo brachio \* exspoi-  
quod super eam costam est, sanguis mittendus est. Si non  
patiuntur, alius tamen sine villo acri ducenda est, diutiusque  
media pugnandum. Panis verò ante septimum diem non  
assumendus, sed vna sorbitione viuendum, imponendumque  
ei loco ceratum ex lino factum, cui cocta quoque resina  
adiecta sit, aut Polyarchi malagma, aut panaces ex vino &  
rosa & oleo, superque imponenda lana succida mollis, & duæ  
fasciæ à mediis oris, minimeque astrictæ. Multo verò magis  
omnia vitanda, quæ suprà posui, aded, vt ne spiritus quidem  
sæpius mouendus sit. Quod si tussis infestabit, ad id potio  
sumenda erit, vel ex trixagine, vel ex ruta, vel ex herba stœ-  
chade, vel ex cumino & pipere. Grauioribus verò doloribus  
vrgentibus, cataplasma imponi quoque conueniet vel ex lo-  
lio, vel ex hordeo, cui pinguis fici tertia pars sit adiecta. Et id  
quidem interdiu superiacebit. Noctu verò \* idem aut cera- \* item  
tum, aut malagma, aut panni, quia potest cataplasma deci-  
dere. Ergo quotidie \* quoque resoluetur, donec iam cerato \* quæque  
aut malagmate possimus esse contenti, & decem quidem die-  
bus extenuabitur fame corpus, ab vndecimo verò ali inci-  
piet. Ideoque etiam laxior quàm primò fascia circumligabi-  
tur, fereque ea curatio ad quadragesimum diem perueniet:  
\* quæ si modus erit suppurationis, plus malagma quàm cera- \* quod si  
tum ad digerendum proficiet. Si suppuratio vicerit, neque metus  
per quæ suprà scripta sunt discuti potuerit, omnis mora vi-  
tanda erit ne os infra vitietur: sed qua parte maximè tume-  
bit, demittendum erit candens ferramentum, donec ad pus  
perueniat, idque effundendum. Si nusquam caput se osten-  
dit, vbi maximè pus \* subit, sic intelligimus: creta cimolia \* subest,  
totum locum illinimus, & siccari patiemur quo loco maximè  
humor



humor in ea perseveravit, ibi pus proximum erit, eaque vri debeat. Si latius aliquid abscedet, duobus aut tribus locis erit perforandum, demittendum erit linamentum, aut aliquid ex penicillo, quod summum lino sit deinctum, ut facile educatur. Reliqua eadem, quae in ceteris adustis facienda sunt. Vbi purum erit vlcus, ali corpus debeat, ne tabes perniciofa futura id malum subsequatur. Nonnunquam etiam leuius ipso osse adfecto, & inter initia neglecto, non pus, sed humor quidam muceis similis intus coit, mollescitque contra cutis, in qua simili vltione vtendum est.

## ENARRATIO.

**ORDINE** quodam haec caput ex Hippocrate De articulis transumptum est.

Ab vno verò & vicesimo.

**ITA** quidem & ipse Hippocrates sentit: aliis tamen non nisi post vigesimum octauum ferrumen implet.

Cibis vberioribus.

**TUMOR** enim ventris, ut auctor est Galenus, costas fulcit: quare vbi haec rumpatur, qui magis ventricosi sunt, mirus dolent; quibus gracilis venter est & contractus, dolore magis vexantur, quum costas sentiant sine fulcro suspensas. At si febris continens aut inflammatio, hominem detinet, ut postea docet, inedia vri satius est; quoniam magis ladiunt à cibo, quam à costis non fulcitis. At si nulla febris sit, praestat ceterum cibum sumere, ut venter in eum iuniorum assurgat; ut costas sedes sit ac fulcimentum cura offensa partis compressionem.

Ergo si vires patiuntur.

**HIPPOCRATES** absque limitatione venam secare iubet, Celsus exactius non nihil locum ipsum describit, & directo lateris affecti eandem iudicandam edocens.

Si non patiuntur.

**HIPPOCRATES** nullo virum habito

discrimine alium etiam si quammaximè sanguis missus sit, leui aliquo medicamento ducere iubet.

aut Polyarchi malagma.

**HUIUS** descriptionem ponit Celsus libro quinto.

Quòd si tussis infestabit.

**NESCIO** quam appositè hic potionem ex ruta aut pipere insistentibus accommodarit; ut quae sua acrimonia, quantumvis quammaximè attenuare dicas, tussim magis ac magis exagitem.

Grauioribus verò.

**SORANVS** quoque, ut auctor est Aegineta, si magna virgeat necessitas, puta si membrana costas cingens vehementer compungatur, cutim diuidendam docet, ac fractam costa partem deregendam; deinde (lamina, ne iuxta costas regens vulneretur, prius subiecta) ossicula quae pungunt, ingeniose excidenda atque euicenda, ac cruentorum vulnerum modo curanda.

& decem quidem diebus.

**HIPPOCRATES**, - Decem, inquit, diebus inedia vri conuenit: deinde corpus reficere, ac implere. Ad haec dum offensus inedia vritur, arctius alligandus est; vbi pleniore victu laxius.

Si sup-



## Si suppuratio vicerit.

CELSUS brevis admodum hic est: Hippocrates suppurationis causas explicat, atque quorum ossa vitientur, edisserit.

sed quâ parte maximè.

IVXTA illud senis libro De internis affectionibus: Si pus in thoracem prorumpat, quâ tibi monstrare videtur, illic potissimum secans aut urens, primum exiguum puris emittito. Libro tamen De articulis,

(unde hæc desumpsit Celsus) non ante faciendam vulsionem dicit, quam os corruptum esse pro comperto habeamus: eâ interim animadversione habitâ, ne ipsum vulsionem incalcescat.

Nonnunquam etiam.

MVCCVS hic facit illius os corruptum, doloribusque locum exercet; neque alia ratione expelli potest, quam vulsionem aut incisionem.

## De spine curatione.

IN spina quoque est quod propriè notemus. Nam si id \*ex<sup>quod ex</sup> vertebra excidit, aliquo modo fractum est, locus quidem concavus fit, punctiones autem in eo sentiuntur, quia necesse est ea fragmenta spinosa esse. Quo fit, ut homo in \*interio-<sup>anterior</sup> rem partem subinde nitatur. Hæc noscendæ rei causæ sunt. Medicamentis verò iisdem opus est, quæ \*plurima parte<sup>prima</sup> huius capitis exposita sunt.

## ENARRATIO.

Medicamentis verò.

CONVENIT, inquit Ægineta, id quod refractum est, auferre, cute ex-

trinsecus incisa futurisque commissæ; remedio cruentis idoneo vii.

## CAPVT X.

*De humerorum, brachiorum, femorum, crurum, digitorum fractorum vel euulsorum, communibus curationibus.*

SIMILES rursus ex magna parte casus curationesq. sunt humeris & femoribus. Communia etiam quædam humeris, brachiis, femoribus, cruribus, digitis. Siquidem ea \*minimè periculose media franguntur. Quo propior fra-<sup>minus</sup> ctura capiti vel superiori vel inferiori est, eo peior est. Nam & maiores dolores adfert, & difficilius curatur. \*Ea maximè<sup>Earum</sup> tolerabilis est simplex, transversa: peior, ubi fragmenta, atque  
ubi



\* pessima vbi obliqua: \* pessimum vbi eadem acuta. Nonnunquam autem fracta in his ossa in suis sedibus remanent: multo saepius excidunt, aliudq. super aliud effertur. Idque ante omnia considerari debet, & sunt notæ certæ. Si suis sedibus mota, resima, punctiōisq. sensum repræsentant, tactu inæqualia sunt. Si verò non aduersa, sed obliqua iunguntur, quod fit

\* saepe vbi \* vbi loco suo non sunt, membrum id altero latere breuius est, & musculi eius tument. Ergo si hoc \* depressum est, protinus id membrum oportet extendere. Nam nerui musculique intenti per ossa contrahuntur, neque in suum locum veniunt, nisi illos per vim aliquis \* intendit. Rursus si primis diebus id omissum est, inflammatio oritur. Sub qua & difficile & periculose vis nervis adhibetur. Nam dissentio nervorum, vel cancer sequitur, vel certum, vt \* diutissime \* alatur, pus. Itaque si antè reposita ossa non sunt, postea reponenda sunt. Intendere autem digitum vel aliud quoque membrum si adhuc tenerum est, etiam vnus homo potest, cum alteram partem dextra, alteram sinistra prendit. Valentius membrum duobus eget, qui in diuersa contendant. Si firmiores nerui sunt (vt in viris robustis, maximeque eorum feminibus & cruribus euenit) habenis quoque vel linteis fasciis vtrique capita articulorum deliganda, & per plures in diuersa ducenda sunt. Vbi paulò longius quàm naturaliter esse debet, membrum vis fecit: tum demum ossa manibus in suam sedem compellenda sunt; indiciumque ossis repositi est, dolor sublatus. Et membrum alteri parti æquatum inuolendum duplicibus triplicibusve pannis, & in vino & oleo tinctis, quos \* linteos esse commodius est. Ferè verò fasciis sex opus est. Prima breuissima adhibenda, quæ circa fracturam ter voluta sursum versum feratur, & quasi in cochlea serpat, satisque est eam ter hoc quoque modo circuire. Altera dimidio longiore, eaque qua parte os eminet, ab ea si totum æquale est, vnde libet super fracturam debet incipere priori aduersa, deorsumque tendere, atque iterum de fractura reuersa in superiore parte vltra priorem fasciam desinere. Super has iniciendum latiore linteo ceratum est, quod eas contineat,

\* depre-  
hensum

\* intende-  
rit.

\* nitissi-  
me  
\* agatur  
pus.

\* lincos



neat, ac si qua parte os eminet, triplex ea pannus obiciendus, eodem vino & oleo madens. Hæc tertia fascia comprehendenda sunt, quartaque, sic ut semper insequens priori aduersa sit, & tertia tantum in inferiore parte, tres in superiore  
 \* finiant, quia satius est, sæpius circuire, quàm adstringi. Si \* faciant, quidem id quod adstrictum est, alienatur, & cancro opportunum est: articulum autem quamminimè vincire opus est. Sed si iuxta hunc os fractum est, necesse est. Deligatum verò membrum in diem tertium continendum est. Eaque  
 \* iunctura talis esse debet, ut primo die nihil offenderit, non \* vinctura tamen laxa visa sit, secundo laxior, tertio iam penè resoluta. <sup>ra</sup> Ergo tum rursus id membrum deligandum, adiciendaque prioribus quinta fascia, iterumque quinto resoluendum est, & \* sexto fasciis inuoluendum, sic ut tertia & quinta infra, \* sexta fascia ceteræ supra finiantur. Quotiescunq. autem soluitur membrum, calida aqua fouendum est. Sed si iuxta articulum fractura est, diu instillandum vinum est, exigua parte olei adiecta, eademque omnia facienda donec \* ab eo inflammatio \* oleo soluatur, vel leuius quoque quàm ex consuetudine id membrum fiat. Quod si septimus dies non dedit, certè non exhibet. Tum facillimè ossa tractantur. Rursus ergo si parum commissa sunt, committi debent. Si qua fragmenta eminent, in suas sedes reponenda sunt. Deinde eodem modo membrum deligandum, ferulæque super accommodandæ sunt, quæ fissæ circumpositæque ossa in sua sede contineant: & in quam partem fractura inclinât, ab ea latior, valentiorque ferula imponenda est. Eaquæ omnes \* citra articulum esse \* circa oportet resimas, ne hunc lædant, nec ultra astringi, quàm ut ossa contineant: & cum spatio laxentur, tertio quoque die paulum habenis suis coartari: ac si nulla prurigo, nullus dolor est, sic manere donec duæ partes eius temporis quod os quoque conseruet compleantur, postea lenius aqua calida fouere, quia primò digeri materiam opus est, tum euocari. Ergo cerato quoque liquido id \* leniter est vīgendum, perfricandaque summa cutis est, laxiusque id deligandum est. Tercio quoque die soluendum sic, ut remota calida aqua, cæ-

yy

tera



tera eadem fiant. Tantummodo singulae fasciae quoties resolutae fuerint, subtrahantur.

### ENARRATIO.

vel cancer sequitur.

**C**ANCRI nomine pro sphacelo, hic passim abutitur.

Ferè verò fasciis sex.

**M**ODVS hic deligandi Tagaultio non placet; neque tam numerosis fasciis opus esse censet, quòd hæc in membro praefracto præter solitum iam cooperio, pruritus & dolorem (quæ duo symptomata à fractis membris diligenti studio arcenda sunt) excitare, atque eius quod iam fractura infixum est, perspirationem prohibere possint. Hippocrates duobus linteis contentus est.

Deligatum verò membrum.

**T**ERTIO die ob id ligamenta solvenda sunt, ne tensio quæpiam aut motus præter solitum contestæ particula obueniat; aut eius quod infixum est fractura perspiratus prohibeatur.

Quotiescunque autem soluitur.

**T**ANTVM aqua temperata, inquit Æginæ, superinfundere ratio est, quantum sanum discutere sufficit. Hippocrates libro De ossium medicis, Quod aqua ca-

lorem pertinet, inquit, & copiam; calor vehementior non sit, quam ut infusa possit ferri à manu: copiam ubi relaxandum at- tenuandumque est, esse convenit maximam; ubi caro producenda est; aut molliendum, minimam.

diu instillandum vinum.

**S**OLIVS olei calidi suffusio suffecerit; quanquam non inutile sit vinum, præsertim austerrum.

donec duæ partes eius.

**V**ARIIS temporibus ossa coalescunt; sicuti etiam Celsus ante scripsit: nam pedis ossa, exceptis his quæ cum tibia ossibus communione habent, atque iis quæ malè curantur (siquidem hæc non ante quadragesimum diem curationem perfectam admittunt) vicesimo die absolute restituntur. Tibia verò & brachiorum ossa, quum benè curantur, quadragesimo die restituntur. Femoris os quinquagesimo die conferuet: maxilla ossa triginta quinque diebus agglutinantur. In genere autem omnia ossa tardius corroborantur, atque ferrumen implent, si non secundum naturam posita fuerint. cuius quoque generis sunt, quæ non in eadem figura conquiescunt: nam & calli debiliores iisdem obducuntur.

### De fracti humeri curatione.

**H**ÆC communia sunt. Illa propria. Siquidem humerus fractus, non sic, ut membrum aliud intenditur, Sed homo collocatur alto sedili, medicus autem humiliore aduersus. Vna fascia brachium amplexa ex ceruice ipsius qui læsus est, id sustineat. Altera ab altera parte super caput data, ibi accipit nodum. Tercia iuncto imo humero deorsum demittitur, ibi quoque capribus eius inter se iunctis. Deinde ab occipitio ipsius minister, sub ea fascia quam secundo loco posui,

\* cubitam

\* iuncto

\* iunctis.



sui, correpto: si dexter humerus ducendus est, dextro: si sinister, sinistro brachio, demissum inter femina eius qui curatur baculum tenet: medicus super eam fasciam de qua tertio loco dixi, \* palmam inicit \* dextram: si sinister, sinistram: si dexter humerus sumatur, simulque alteram fasciam minister attollit, alteram \* premit medicus: quo fit, ut leniter humerus extendatur. Fasciis vero, si medium aut imum os fractum est, breuioribus opus est: si summum, longioribus, ut ab eo sub altera quoque ala per pectus & scapulas porrigantur. Proterius vero brachium cum deligatur, sic inclinandum est, id quod afficit, ut ante fascias quoque sic \* figurandum sit: ne postea suspensum aliter, aliter cum deligabatur, humerum inclinet. Brachioque suspensio, ipse quoque humerus ad latus leniter deligandus est. Per quæ fit, ut minimè moueatur, ideoque ossa sic se habent, ut aliquis composuit. Cum ad ferulas ventum est, extrinsecus esse earum longissimæ debent, à lacerto breuiores, sed sub ala breuissimæ. Sæpius cæ resoluendæ sunt, ubi in vicinia cubiti humerus fractus est, ne ibi nervi rigescant, & inutile brachium efficiant. Quoties solutæ sunt, fractura manu continenda, cubitus aqua calida fouendus, & molli cerato perfricandus, ferulæque vel omnino non imponendæ contra \* eminentia cubiti, vel aliquanto breuior-  
res \* sunt.

\* planam  
\* dextram,  
si sinister:  
dextram,  
si d. h. si-  
nuatur,  
\* deprimat

\* figuratū

\* eminen-  
tiam  
\* sint.

## ENARRATIO.

## Sed homo collocatur.

**R**EPOSITIONIS in proprium locum, convenientiorem multo ac faciliorem rationem edocet Hippocrates libro De fracturis. Id porro in omnibus luxationibus, fracturis observandum est: ut quam fieri potest maxime, in deligationibus, coaptationibus, repositionibusque osium, eam partis figuram observemus, in qua & ager diu immotus persistere possit, & quæ maxime à dolore abest, quæque rectissima sit. Rectissimam autem vocat Galenus, quæ venas, arterias, musculos quam rectissimos habeat: sic angularem figuram brachio rectissimam,

ut quæ dolore maxime vacet, & quæ eidem naturalis sit, appellat.

## Cum ad ferulas ventum.

**FERULÆ** usus Hippocrati septimo primum die ant. nono esse debet: nostri temporis chirurgi non omnino malè, protinus easdem circumponunt, ipsas quidem constringentes, prout sensus & tumor ex inflammatione (si adsit) postulat: ideoque easdem adhibent, non ut astringant, verum ut adaptionis figuram contineant, & ossa in suam sedem reposita fulciant. Debent autem ferulæ, sicuti docet Hippocrates De officina medici, esse lenes & æquales, ab ex-

yy 2

irema



irema parte resime, ab utraque parte vinculo paulo breviores, crassissimæque fractura extat.

### & molli cerato.

Id molle, lane, & purum esse vult Hippocrates, hoc est ut nihil sordium, nihil propolis terreni arenosique ei sit immixtum. Vti-

tur autem eiusmodi cerato, ut auctor est Galenus, in vicem perfusionis, qua perficere quidem & id poterat; verum ceratum id tutius præstat; præsertim ubi semper asidere medicus non potest, ac continuo madore aliquo subiectas partes madefacere perfunderetque.

### De brachij fracti curatione.

**A**T si brachium fractum est, in primis considerandum est, alterum os, an utrumque comminutum sit, non quòd alia in eiusmodi casu curatio admouenda, sed primùm, ut valentiùs extendatur, si utrunque os fractum est: quia necesse est minus nervos contrahi altero osse integro, eosque intendente. Deinde, ut curiosius omnia in continendis ossibus fiant, si neutrum alteri auxilio est. Nam ubi alterum integrum est, plus opis in eo, quàm in fasciis, ferulisque est. Deligari autem brachium debet paulum pollice ad pectus inclinato. Siquidem is maximè brachij naturalis habitus \* sit, idque involutum mitella commodissimè excipitur, quæ latitudine ipsi brachio perangustis capitibus collo iniicitur, atque ita commodè brachium ex ceruice suspensum est. Idque paulum supra cubiti alterius regionem pendere oportet. Quòd si \* ex summo cubito id \* factum sit, glutinare id vinciendo alienum est. Fit enim brachium immobile, ac si nihil aliud, quàm dolori occursum est, idem qui fuit eius usus est.

\* in  
\* fractum

### ENARRATIO.

**E**x cubiti ossibus, inquit Hippocrates, ubi non ambo fracta existant, facilior curatio est, si supernum os sancitum est, etiam si crassius id existat; partim quòd sanum subventum fundamento loco ipsi est; partim quòd facilius occultari potest, nisi iuxta manus iuncturam sanciri contigerit.

Crassa enim est caro que superne innascitur; infernum verò os excarnie est, & non facile occultari potest, & vehementiore excisione opus habet. si verò hoc contritum non fuerit, sed alterum illud, vilior excensio sufficit: at si ambo fracta fuerint, fortissima excensione opus habent.

### De crurum femorumque fractorum curatione.

**I**N crure aequè ad rem pertinet, alterum saltem os integrum manere. Commune verò ei femori que est, quòd ubi deligatum



ligatum est, in canalem coniiciendum est. Is canalis ab inferiori parte foramina habet, per quæ si quis humor excesserit, descendat : & à planta moram, quæ simul & sustineat eam, & delabi non patiatur : & à lateribus caua, per quæ loris datis mora quidem crus femurque, vt collocatum est, \* detineat. \* detineatur.  
Esse etiam is debet à planta, si crus fractum est, circa popliteum : si femur, vsque ad \* coxam : si iuxta superius caput femoris, sic vt ipsa quoque \* ei coxa sit. Neque tamen ignorari oportet, si femur fractum est, fieri breuius, quia nunquam in antiquum statum reuertitur, summisque digitis postea crucis eius insisti \*, sed multa tamen femori debilitas est, vbi fortunæ negligentia quoque accessit. \* coxam, iux.  
\* in eo  
\* Sed m.  
tum

## ENARRATIO.

**F**EMUR fractum in anteriorem & posteriorem partem magis promouetur; crus seu tibia in omnem partem prolabitur, quum vtraque ossa fracta fuerint. Constat enim crus, sicuti & brachium, duobus ossibus, puta sura & tibia : in tres autem, quum alterum, intra, & extra, tibia quidem retrò, sura verò antèrins.

## Neque tamen ignorari.

IOANNES Tagaultius libro suo Institutionum chirurgicarum quartò, ex Hippocrate sententiam hanc non citra rationem suspectam habet. Non enim, inquit, quoties femur frangitur, necessarium ipsum breuius efficitur, sed duntaxat si statim quum fractum est, minus quam par sit à chirurgo distentum fuerit, vel tortuose distractum, & separata & distantes ossis fracti partes non rectè & ad amissum, priusquam ferrumen impleant, coaptatae extiterint : tunc enim & breuius femur redditur, & crure eius partis homo claudicabit. Sic autem de hac re libro

De fracturis scripsit Hippocrates : At verò si femoris os fractum sit, extensio imprimis diligenter facienda est, ne minus quam debeat efficiatur ; amplior enim si sit, nullam offensionem afferit. Verum quoque est, vt in eodem opere testatur Hippocrates, quòd quibuscunque vtraque tibia vel cubiti fracta sint ossa, illa breuiora effici : quod sanè intelligendum est, nempe, vt Galenus interpretatur, nisi ante conformationem debita adhibeatur extensio, & commoda deligatione ossium coaptatio seruetur, quoad callus obducatur : tunc enim non solum in maiorem tumorem quam naturaliter illis conueniat, membrum attollitur ; verum etiam breuius propter retractos musculos efficitur. Hæc Tagaultius. Nisi igitur hac in re quisquam Celsi patrocinari velit, locum hunc sic legendum existimārim : Neque tamen ignorari oportet, si femur fractum est, fieri breuius, quoties in antiquum statum non reuertitur.

## De fracti digiti curatione.

**D**IGITVM satis est ad vnum \* furunculum post inflammationem deligari. \* furculum al. furunculum



## ENARRATIO.

**A**GINETA articuloꝝ ossa in *dum docet, dum urget inflammatio: nam*  
 digitis, quum laxa fistulo, aque sint, *facile in ipsis propter laxitatem callus am-*  
 contundi quidem plerumque; raro autem *plius concrescit.*  
 frangi auctor est. Idem deligatura vien-

*Communes curationes ad humeros, brachia, crura, femina,  
 digitosque con fractos pertinentes.*

\* ista **H**is propriè ad singula membra pertinentibus, rursus \*illa  
 communia sunt: primis diebus fames: deinde tum, cum  
 iam increfcere callum oportet, liberalius alimentum, longa à  
 vino abſtinentia, fomentum aquæ calidæ, dum inflammatio  
 eſt, liberale, cum ea deſit, modicum. Tum etiam longior  
 vltioribus è liquido cerato membris, & mollis tamen va-  
 ctio. Neque protinus exercendum id membrum, ſed ad an-  
 tiquos uſus \*reducendum eſt. Grauius aliquanto eſt, cum  
 oſſis fracturæ carnis quoque vulnus acceſſit, maximeque ſi id  
 muſculi femoris aut humeri ſenſerunt. Nam & inflamma-  
 tiones multo grauiores & promptiores caneros habent. Ac  
 femur quidem ſi oſſa inter ſe ceſſerunt, ſerè præcidi neceſſe  
 eſt. Humerus verò quoque in periculum venit, ſed faciliùs  
 \* conſeri- \* conſeruatur. Quibus periculis etiam magis id expoſitum,  
 tur. quod iuxta ipſos articulos ictum eſt. Curioſius igitur agen-  
 dum eſt, & muſculus quidem per mediam plagam tranſuer-  
 ſus præcidendus. Sanguis verò, ſi parum fluxit, mittendus:  
 corpus inedia extenuandũ, ac reliqua quidè membra lentius  
 intendenda, & lenius in his oſſa in ſuâ ſedem reponenda ſunt.  
 His verò neque intendi neruos, neque oſſa tractari ſatis ex-  
 pedit. Ipſique homini permittendum eſt, vt ſic ea collocata  
 habeat, quemadmodum minimè lædunt. Omnibus autem  
 his vulneribus imponendum primò linamentum eſt vino  
 \* cæterum madens, cui roſæ paulum admodum adiectum ſit: \* cætera  
 \* Quando bus, laxius ſcilicet, quàm ſi ea plaga non eſſet, \* quanto fa-  
 \* numero cilius & alienari & occupari cancro vulnus poteſt, \* numeris  
 potius



potius fasciarum id agendum est, ut laxæ quoque æquè contineant. Quod in femore humeroque sic fiet, si ossa fortè rectè concurrerint: sin aliter se habebunt, eatenus circundari fascia debebit, ut impositum medicamentum contineat. Cætera eadem quæ suprà scripsi, facienda sunt, præterquam quod neque ferulis, neque canalibus, inter quæ vulnus sanescere non potest, sed pluribus tantummodo & latioribus fasciis opus est, ingerendumque. Subinde in eas est calidum oleum & vinum, magisque in \* principio fame vtendum, vulnus calida aqua fouendum, frigusque omni ratione vitandum est, & transeundum ad medicamenta, quæ puri mouendo sunt, maiorque \* vulnere quàm ossi cura agenda. Ergo quotidie soluendum nutriendumque est. Inter quæ si quod paruulum fragmentum ossis eminet, id si retusum est, in suam sedem dandum: si acutum, antè acumen eius \* longius est præcidendum: si breuius, limandum, & vtrinque scalpro \* limandum, tum ipsum recondendum est: ac si id manus facere non potest, volsella, quali fabri vtuntur, iniicienda est, rectè se habenti capite ab ea parte qua \* sima est, ut ea parte qua gibba est, eminens os in suam sedem compellat. Si id maius est, membranulisque \* cinguntur, sinere oportet \* ea sub medicamentis resolui, idque os, vbi iam nudatum est, abscindere: quod maturius scilicet faciendum est, \* prodestque ea ratione & os coire, & vulnus sanescere. Illud suo tempore, hoc prout se habet. Nonnunquam etiã in magno vulnere euenit, ut fragmenta quædam velut emoriantur, neque cum cæteris coeant. Quod hic quoque ex modo fluentis humoris colligitur. Quo magis necessarium est, sæpius vlcus resolvere atque nutrire. Sequitur verò, ut id os per se post aliquot dies excidat, \* cùm tam misera antea conditio vulneris sit, tamen id interdum maius \* diutiusque facies. Sæpe enim integra \* cutis osse abruptitur, protinusque prurigo & dolor oritur. Quæ soluere, si accidit, maturius oportet, & fouere aqua per æstatem frigida, per hyemem egelida: deinde ceratum myrteum imponere. Interdum fractura quibusdam velut aculeis carnem vexat, quo à prurigine & punctiõibus cognito, aperire.

\* primo

\* vulneris  
q. ossis

\* si long.

\* limatum  
ip.

\* curua

\* cingitur  
\* eas

\* prodestque.

\* Ac càm

\* latiusque.

\* cute os



rire id melius, eosque aculeos præcidere necesse habet. Reliqua verò curatio in utroque hoc casu eadem est, quæ ubi ictus protinus intulit puro iam ulcere. Cibis hîc quoque utendum est carnem producentibus: si brevius adhuc membrum est, & ossa loco suo non sunt, paxillus tenuis quàm \* leuissimi generis inter ea demitti debet, sic ut capite paulum supra ulcus emineat, illique quotidie plenior adigendus est, donec par id membrum alteri fiat. Tum paxillus remouendus, vulnus sanandum est, cicatrix inducta fouenda frigida aqua est, in qua myrtus, hederæ, aliæve similes verbenæ sint: illinendumque medicamentum quod siccet, & magis etiam hîc quiescendum, donec id membrum confirmetur. Si quando verò ossa non conserbuerunt, \* quæ sæpe soluta, sæpe mota sunt, in aperto deinde curatio est: possunt enim \* coire. Si vetustas occupavit, membrum extendendum est, ut aliquid lædatur. Ossa inter se manu diuidenda, ut concurrando exasperentur, ut si quid pingue est, eradatur, totumque id quasi recens fiat. Magna tamen cura habita, ne nervi musculive lædantur. Tum vino fouendum est, in quo malicorium decoctum sit, imponendumque id ipsum oui albo mistum. Tercio die resolvendum, fouendumque aqua, in qua verbenæ, de quibus supra dixi, decoctæ sint. Quinto die idem faciendum, ferulæque circumdandæ. Cætera & antè & post eadem facienda, quæ supra scripsi. Solent tamen interdum diuersa inter se ossa \* coherere. Eoque & brevius membrum & indecorum fit: & si capita acutiora sunt, assidue punctiones sentiuntur. Ob quam causam frangi rursus ossa & \* dirigi debent. id hoc modo fit: Calida aqua multa membrum id fouetur, & ex cerato liquido perfricatur, intenditurque: & inter hæc medicus pertractans ossa, ut adhuc tenero callo manibus ea diducit, compellitque id, quod eminet, in suam sedem: & si parum valuit, ab ea partes, in qua os se inclinat, inuolutam lana regulam obiicit. Atque ita deligando assuescere iterum vetustæ sedi cogit. Nonnunquam autem rectè quidem ossa \* coeperunt, superincretuit verò nimius callus, ideoque locus intumuit. Quod ubi incidit, diu leniterque id membrum

\* læuissimi

\* quod sæpe mota sæpe soluta sunt, \* diu qui. \* scendo

\* conseruere: vel coalescere. \* diuini

\* cohererant,



brum perfricandum est ex oleo & sale & nitro, mulsum, aqua calida salsa fouendum, & imponendum malagma quod digeratur, attritiusque alligandum, oleisbusque & praeterea vomitu utendum. Per quae cum carne cibus quoque extenuatur, contertque aliquid de sinapi, quod cum huius in alterum pariter membrum impolitum, donec de paulo emoretur, coque euocet materiam. Vbi his tumor extenuatus est, citius ad ordinem vitae reuertendum est.

## ENARRATIO.

**T**ENVIS viciis adhibendus est, dum inflammationis omnis suspicio procul abest; assumeri denique, ut docet Hippocrates, à pane & vino ad decem usque dies: dehinc paulatim sunt resurgendi. ac immo demum intrepide vinum crassum & stipulatum concedendum est.

## Grauius aliquanto est.

**NAM** quibus haec ossa nudantur, ut ait For est Galenus, non tam osium, quam musculorum, arteriarum ac venarum magnitudine periclitantur: quibus accedit quod propinquiora sunt nervorum musculorumque initiis. Quare magis quoque eis periculis subiacere dicit eos Celsus, qui iuxta ipsos articulos isti sunt: cui non absimile est quod dicit Hippocrates, magis enadere eos, quibus inferior pars ossis quam quibus superior excescit. Celsus hic suo more Hippocratis sententiam nonnihil immutat; & neque repositionis, neque aliorum meminit: nam Hippocrates, At quilus, inquit, femoris aut brachij os, extra emineat, hi non valde superstities enadunt; sunt enim ossa haec grandia, & medulla plena; & qua simul vulnerantur, multa sunt & magni momenti, & musculi & nervi, & vena: & si quidem reposueris, convulsiones accedere solent; si vero non reposita fuerint, febres acuta & biliosa, & singultuosa oboruntur; & denigrantur. Non minus autem superstities enadunt hi quibus reposita non sunt, neque tentatum est, ut reponeretur. Celsus hic suo more cancrum pro nigritie reddit.

## Humerus vero.

**HIC** interdum potest esse vitium, legedumque sed facilius curatur.

## Omnibus autem his.

**RENE** admodum periculum olei admiscendum monet: neque enim ossis fractura, si iisdem carnis vultus decedat, ceramini aut rosarium admittunt, quod haec vltima tunc sordidum, immo putre efficiant; sed in cornu locum puluillus oblongus vino anserino nigro imbutos superintincimus.

## Caetera eadem quae supra.

**FERULAS** vocat, ne comprimant: Hippocrates tamen easdem nonnunquam admittit: dicit enim, Reliqua curatio esse debet, perinde ac si ossa citra plagam perfrigerantur, nisi quod ferula non sint imponenda. quam obrem hic plures fasciis epus est, quam alibi, quum & minus consistendum sit, & ferula tardius circumdanda: tamen si ferula superaccommodentur, è regione ulceris circumponantur; detur opera ut laxiores sint, ne vehementer astricta premant.

## Frigusque omni ratione.

**PERICVLUM** enim est ne cum felre gravis horror subsequatur, neque nervorum dissentio superueniat: nam frigida semper nervorum dissentientiam afferunt; praeterea in ulceribus.

ZZ

Inter



## Inter quæ si quod.

**HIPPOCRATES** libro De fracturis: Os præcidendum est, si restitui nequit, & parum quid excedere videatur: abscindere hoc licet, si noxium sit, & carnem aliqua ex parte vulnere ac molestiam offerat, nudumque sit, hoc quoque abscindendum est. Reliqua verò non multum refert præcidantur nec ne: ea verò præcidi non oportet, ex quibus squama resoluenda est.

## vbi iam nudatum.

**NAM** quæcumque ossa in suam sedem reuerti non poterunt, hæc scire licet abscessura esse; non etiam quæ ex toto carne iam nudata sunt: nudatur autem carne quibusdam superior, plerisque verò cunctis caro quæ circa fracturam est.

## Nonnumquam etiam.

**VBI** copiosius quàm pro ulceris modis feratur (dicit Galenus) verendum est ne subiectum os vitium sit: si præter id ad exitum festinet, iam certa res est. Propter huiusmodi igitur abundantiam hic frequenter deligendum ac resoluendum mones Hippocrates.

## Quæ soluere.

**SATIVS** tamen fuerit aqua temperate suffusione uti.

Si vetustas occupauit.

**LOCVS** admodum est obscurus: id est

men innuere videtur Celsus, quòd si fortè debito tempore ossa in suo callo non obfirmantur, propter mucosam quandam pinguedinem ipsæ adhærentem, tum deum ita extendenda esse ut ledantur, manisque diuidenda: sic ut si quid ex osse corruptum sit (diximus namque mucosam illum osis corruptionem præfigere) extirpetur. Quamquam & ipsa constabit sententia, si de ea fractura intelligatur locus, quæ nondum rectam repositionem admissit; verum per patientis negligentiam simile quid poro confractionis ossibus acciderit.

## Ob quam causam.

**ID** tamen faciendum est, antequam profus inluerit callus: nam aliqui difficilior erit curatio, neque tam facile soluetur, laborantibusque in extremos labores atque pericula adducet.

## Nonnumquam autem.

**NON** solùm innumescit locus, sed & dolorem nonnumquam inuehit, atque functiones impedit, si iuxta articulum coaluerit.

## malagma quod digerat.

**ID** enim Galeno auctore iam factos callos imminuit: Æginea si recens adhuc callus est, refrigerantibus medicamentis utitur, in quem vngua laniinam plumbi exhibet.

## CAPVT XI.

## De luxatis ossibus.

**A**c de fractis quidem ossibus hætenus dictum sit. Mouentur autem ea sedibus suis duobus modis. Nam modò quæ iuncta sunt inter se dehiscunt, ut cum latum scapularum os ab humero recedit, & in brachio radius à cubito, & in crure tibia à sura, interdum à saltu, calcis os à talo, quod rarò tamen fit. Modò articuli suis sedibus excidunt. Antè de prioribus dicam. Quorum vbi aliquid incidit, protinus is locus cauus est, depressusque digitus sinum inuenit. Deinde

grauis.



grauis inflammatio oritur, atque in talis præcipua. Siquidem  
 febres quoque & caneros & neruorum vel distentiones vel  
 rigores, qui caput scapulis annectunt, mouere consuevit.  
 Quorum vitandorum causa facienda eadem sunt, quæ in  
 \* ossibus mollibus læsis: ubi aliquid incidit, protinus his locis \* ossum  
 proposita sunt, ut dolor tumorque per ea tollantur. Nam molibus  
 diducta ossa nunquam rursus inter se iunguntur, & ut ali- \* hæc ossa  
 quid decoris eo loco sit, nihil usus admittitur. Maxilla verò  
 & \* vertebra omnesque articuli cum validis neruis compre- \* vertebræ  
 hendantur, excidunt: aut vi expulsi, aut aliquo casu neruis  
 vel ruptis vel infirmatis: faciliusque in pueris & adolescentu-  
 lis, quam in robustioribus: hi que elabuntur in priorem & in  
 exteriorem partem, quidam omnibus modis, quidam certis.  
 Suntque quædam communia omnium signa, quædam pro-  
 pria sunt cuiusque. Siquidem semper ea parte tumor est, in  
 qua os prorumpit: ea sinus, à qua recessit. Et hæc quidem  
 in omnibus deprehenduntur, alia \* verò si in singulis. \* verò in  
 Quæ simul atque de quoque dicam, proponenda erunt. Sed  
 ut excidere omnes \* articuli non possunt, sic non omnes repo- \* articuli  
 nuntur. Caput enim nonnunquam compellitur, neque in poss.  
 spina vertebra, neque ea maxilla quæ utraque parte prolapsa  
 antequam reponeretur, inflammationem mouit. Rursum  
 qui neruorum vitio prolapsi sunt, compulsi quoque in suas se-  
 des iterum excidunt. At quibus in pueritia exciderunt, ne-  
 que reposita sunt, minus quam ceteri crescunt. Omnium-  
 que, quæ loco suo non sunt, caro ea increfcit, magisque in  
 proximo membro, quam in vltiore. Ut puta si humerus  
 loco suo non est, maior in eo ipso fit, quam in brachio: maior  
 in hoc, quam in manus acie. Tum pro sedibus & pro casibus  
 qui inciderunt, aut maior aut minor usus eius membri relin-  
 quitur: quoque in eo plus usus superest, eo minus id extenua-  
 tur. Quicquid autem loco suo morum est, ante inflamma-  
 tionem reponendum est. Si illa occupauit, \* tum conquies-  
 cat, lacerandum non est: ubi finita est, tentandum est in his \* dum c.  
 membris, quæ id patiuntur. Multum autem eò confert & tunc lac.  
 corporis & neruorum habitus. Nam si corpus tenue, si humi- est:  
 dum



dum est, si nerui infirmi, expeditius os reponitur. Sed & primò faciliùs excidit, & postea minùs fideliter continetur. Quæ contraria his sunt, meliùs continent. Sed id quod expulsus est, difficulter admittunt. Oportet autem ipsam inflammationem leuare, supèr succida lana ex aceto imposita. A cibo, si valentioris articuli casus est, triduo: interdum etiam quinque diebus abstinere debet. Bibere aquam calidam dum sitim finiat. Curiosiusque hæc facere his osibus motis, quæ validis plenisque musculis continentur: si verò etiam febris accessit, multo magis: \*deinde ex die quinto fouere aqua calida, remotaque lana ceratum imponere ex cyprino factum, nitro quoque adiecto donec omnis inflammatio finiatur. Tunc infriktionem ei membro adhibere, cibis uti bonis, uti vino modicè, iamque ad vsus quoque suos id membrum promouere: quia motus ut in dolore pestifer, sic aliàs saluberri- mus corpori est. Hæc communia sunt, nunc de singulis dicam.

\* deinde  
dieq. fo. ex  
a9.

#### ENARRATIO.

**L**UXATA in suam sedem tribus generalibus modis collocantur, ut auctor est Oribasius: unus vocatur palæstricus, ad quem ferè solas manus adhibemus: atque hic utpote imbecillis aptatur ad mollia corpora, qualia sunt puerilia, & muliebria. Alter methodicus dicitur, ad quem instrumenta adhibemus, quorum usus in communi vita est: & hic omnibus idoneus est, pueris, mulieribus, masculis iam robustioribus & corpori iuuenili, atque iis luxatis, quæ iam vetusta sunt. Tertius reponendi modus qui per organa est, maius habet momentum; valet enim ad prolapsa ubi malum diutius trahitur; valet ad corpora athletarum: præterea quæcumque prolapsa curationem non accipiunt, & sub methodico modo curari nequeunt, omnia organorum opera restituntur. Est autem luxatio, sicut de ei Paulus, qui in articulus à proprio suis ad insolitum excidit, in qua motus arbut. rursus impeditur. Hippocrates in luxatis multa præpendenda monet: Si quidem nosse oportet, inquit, quod

natura à naturis multum differant; ad hoc ut elabentia faciliè rursus incendant: differt enim acerabulum ab acerabulo, quum aliud faciliè transcendendi possit, aliud minùs. Plurimum item differt nervorum ligamentum, quum in quibusdam remissum sit, in quibusdam intentum: nam humiditas hominibus sit ex articulis propter nervorum connectionem, si laxa fuerit & intensiones faciliè ferat: multos enim videas qui ad hoc humidi sunt, ut quando velint, articuli ipsis circa dolorem excidant, & absque dolore restituantur. Differt etiam habitus quidam corporis: nam hic quilibet bene se habet membrum, & minus excidit, & difficilius incidit.

#### Mouetur autem ea.

**S**ic post Hippocratem Paulus Aegineta, aliis luxationis differentias esse negauit, quam quæ ex maioris minorisque ratione sumuntur. Nam quum in totum articulus exciderit, igitur hæc: quum autem aliqua-



aliquatenus emolus est, aut usque ad inberculum è sinu elapsus, *παραγεννα* aut *παράγονος* appellatur. Recentiores, si quas alias luxationum differentias commenti sunt, improprie luxationes appellant, quum potius affectus luxationibus coniuñcti dicendi sint.

### Caput enim nonnumquam.

Id quantumvis fieri possit, rarum tamen est: nam si in partem posteriorem probatur, aut exciderit caput, nunquam in suos sinus compellitur, sed inenitabilem mortem affert: idem de spina vertebræque in totum luxatis, & maxilla quæ inflammationi iam obnoxia est, censendum est.

### Quicquid autem loco suo.

Locum hunc ita restituit Ioannes Tagaultius Institutionum chirurgicarum libro V. Quicquid autem suo loco motum est, ante inflammationem reponendum est; sin illa iam occupa-

uit, dum cõquiescat, haudquaquam laceffendum est; ubi finita est, tentandum in his membris quæ id patiuntur. Leonartus Fuchsius libro octavo Methodi curatiuæ sic legere maluit: Si verò illa occupauit, tum conquiescat; haudquaquam enim laceffendum est, &c.

### Multum autem eo.

CELSVS improprie nervos pro tendonibus aut ligamentis usurpat; sicuti passim hoc libro cancri nomine, pro sphacelo aut gangrena abutitur.

### Oportet autem.

INFLAMMATIONEM magis compesceris, doloremque lenieris, si hydraenum cum æteri momento lana succida imponas.

### deinde ex die quinto.

FOTVS enim aquæ calidæ geminatione prodest: nam dolorem, si quis adsit, demulcet, & quod in particula laborante noxium conceptum est, elicit.

## CAPVT XII.

### De maxilla luxatæ curatione.

MAXILLA in priorem partem propellitur, sed modò altera parte, modò vtraque. Si altera in contrariam partem ipsa, mentumque inclinatur, dentes paribus non respondent, sed sub his qui secant canini sunt. At si vtraque, totum mentum in exteriorem partem promouetur, inferioresque dentes longiùs quàm superiores excedunt, intentique super musculi apparent. Primo quoque tempore homo in sedili collocandus est, sic vt minister à posteriore parte caput eius contineat: vel sic, vt iuxta parietem is sedeat, subiecto inter parietem & caput eius scorteo puluino duro: eoque caput eiusque per ministrum vrgeatur, quo sit immobilis. Tum medici digiti pollices linteolis vel fascijs, ne dilabantur, inuoluti in os eius coniiciendi: cæteri extrinsecus admouendi sunt. Vbi

zz 3

vehe-



vehementer maxilla apprehensa est, si vna parte procidit, concutiendum mentum, & ad guttur adducendum est. Tunc simul & caput appichendendum, & excitato mento maxilla in suam sedem compellenda, & os eius comprimendum est, sic vt omnia penè vno momento fiant. \* Si in vtrâque parte prolapsa est, eadem omnia facienda, sed aequaliter retro maxilla agenda est. Reposito osse, si cum dolore oculorum & cervicis iste casus incidit, ex brachio sanguis mittendus est. Cùm omnibus verò, quorum ossa mota sunt, primò liquoribus conueniat, tum his præcipuè, ad eò vt sermo quoque frequenti motu oris\* per nervos lædat.

\* Sin ab  
vir.

\* nervos  
perlædat.

## E N A R R A T I O.

Primo quoque tempore.

vno momento fiant.

**I**ERICVLVM enim esset in mora: Si quidem, vt auctor est Hippocrates, si non reperatur, anima periculum imminet, præ sebitus continuus, & torpido sopore. Soporiferi enim hi musculi sunt, & dum aligerantur, & dum moriuntur præter naturam.

**P**RIVSQVAM videlicet musculi distendi ob confortum cerebri coacti: habent enim hi musculi nervos ab ipso cerebro, ac prope ipsum contingunt; quo fit vt celerimè costringantur: quare & nisi reueri queat maxilla, mori periculum imminere docet Hippocrates.

quo sit immobilis.

Si in vtraque parte.

**C**ÆSARIUS in suis Annotationibus mobilis legi posse existimat: ego cerè, si immobilis legatur, sententiam rectius constare existimo: nam quantumvis Hippocrates maxillam in vtramvis partem esse velit mobilem, & quæ huc & illuc manu deduci possit; idem tamen præcipit, vt caput scorio puluillo subiciatur, vt quam minime cedat.

**S**ATIS est conuere, mentumque adducere deorsum, vt docet Galenus, vt processus extremitas restro similis, ingali ossi inferius collocetur; scq; in interiorem partem vtriusque totam maxillam compellere, simulque præcipere homini vt os claudat.

ex brachio sanguis.

**V**T fluxionem à laborante particula auertamus.

## CAPVT XIII.

## De capite luxato.

**C**APVT duobus processibus in duos sinus summæ vertebræ demissis, super cervicem contineri in prima parte proposui. Hi processus interdum in posteriorem partem excidunt, quo fit, vt nervus sub occipitio extendatur, mentum pectori adglutinetur, neque bibere is, neque loqui possit, interdum sine voluntate semen emittat. Quibus celerimè

mors



mors superuenit. Ponendum autem hoc esse credidi, non quò curatio eius rei vlla sit, sed vt res indicijs cognosceretur; & non putarent, sibi medicum defuisse, si qui sic aliquem perdidissent.

## CAPVT XIII.

*De spina luxata.*

**I**DEM casus manet eos, quorum in spina vertebræ exciderunt. Id enim non potest fieri, nisi \* ex medulla, quæ per \* & medium, & duabus membranulis, quæ per duos à lateribus processus feruntur, & neruis, qui continent, ruptis. Excident autem & in posteriorem partem, & in priorem, & supra septum transversum, & intra. \* Si in vtranque partem exciderint, \* sed in v-  
à posteriore parte vel tumor, vel sinus oritur. Si super septum tranuis part.  
id incidit, manus resoluuntur, vomitus aut distentio neruorum insequitur, spiritus difficulter mouetur, dolor vrget, & aures obtusæ sunt. Si sub septo, femina resoluuntur, vrina supprimitur, interdum etiam sine voluntate prorumpit. Ex eiusmodi casibus, vt tardiùs quàm ex capitis, sic tamen intra triduum homo moritur. Nam quod Hippocrates dixit, vertebra in exteriorem partem prolapsa, prouum hominem collocandum esse, & extendendum, tum calce aliquem super ipsum debere consistere, \* id intus impellere: in his accipien- \* idque dum est, quæ paulum excesserunt, non in his, quæ toto loco motæ sunt. Nonnunquam enim neruorum imbecillitas efficit, vt quamuis non exciderit vertebra, paulum tamen in priorem partem promineat. Id non iugulat, sed ab interiore parte non contingit quidem \* posse: ab exteriore si \* propul- \* re: ire  
sum est, plerumque iterum redit: nisi, quod admodum rarum \* quid  
est, vis neruis restituta est. prop.

## ENARRATIO.

Idem casus manet.

**V**ERTEBRÆ spinæ, vt ait Paulus, si ipsius spinæ, vel quamlibet compressionem non sustinet, quum & solus ex ipsa neruorum processus si contundatur, hominem in periculum perducere possit.

ex toto prolabantur prociduntque, præcipitem mortem afferunt; medulla siquidem

Exci-



## Excidunt autem.

GALENVS tria vitia in spina, quum vertebra loco moventur, incidere dicituram quando in posteriorem partem convertitur, *ἀποσπῆσθαι*, quum in priorem, *ἀνὰ πρῶτον*, & quotius in letus inclinat, *σκολιῶσθαι* appellat; & extra hanc quartum vitium in spina incidere dicit, quod *σπῆλαι* vocatur; ubi videlicet vertebra loco manent, sed earum compago loco moventur.

Si in vtranque.

Vtramvis legendum videtur.

## Ex eiusmodi casibus.

NERVI omnes qui à spina medulla oriuntur, in anteriorem partem procedunt. Premuntur ergo magis ubi spina in hanc partem convertitur, ut dicit Galenus, quàm ubi in posteriorem, cumque illis urgentur partes, quaecunque spina superius sident: quo fit ut interdum quoque superior vesica pars comprimatur, & quæ cum his conjuncta habent omnia in inflammatione occupentur; unde periculum moris subitanæ imminet.

## CAPVT XV.

## De humero luxato.

\* ei vinculus  
\* al. electus  
\* rariūmō.

**H**UMERVS autem modò in alam excidit: modò in partem priorem. Si in alam delapsus est, \* & vinculus cubitus recedit ab latere, \* rursùm iuxta eiusdem partis aurem cum humero porrigi non potest, longiusque altero id brachium est. Si in priorem partem, summum quidem brachium extenditur, minùs tamen quàm naturaliter, difficiliusque in priorem partem quàm in posteriorem cubitus porrigitur. Igitur si in alam humerus excidit, & vel puerile adhuc est corpus, vel molle, certè & imbecilibus nervis intentum est, satis est collocare id in sedili, & ex duobus ministris alteri imperare, ut caput lati scapularum ossis leniter reducat, alteri ut brachium extendat: ipsum posteriore parte residentem humerum sub ala eius cogere, simulque & latum os, & altera manu brachium eius ad latus impellere. At si vastius corpus nervi robuste robustiores sunt, necessaria est \* spatula lignea, & quæ crassitu dinem duorum digitorum habet, & longitudine ab ala ad digitos peruenit. In qua summa capitulum est rotundum, & leniter cavum, ut recipere particulam aliquam ex capite humeri possit. In ea bina foramina tribus locis sunt inter se spatio distantibus, inque ea lora mollia coniunguntur. Ea que spatha fascia inuoluta, quo minus tactu lædat, ad alam à brachio dirigitur, sic ut caput eius summæ alæ subijciatur: Deinde, loris suis ad brachium deligatur, vno loco paulum

infra



infra humeri caput, altero paulū supra cubitū, tertio supra manum. Cui rei protinus interualla tunc quoq. foraminū aprata sunt. Sic brachium deligatum super scalæ gallinariæ gradum traicitur, ita altè, vt consistere homo ipse non possit, simulq. in alteram partem corpus demittitur, in alterā brachium intenditur. Eoque fit vt capite ligni caput humeri impulsū, in suam sedem, modò cum sono, modò sine hoc compellatur. Multas alias esse rationes scire facile est, vno Hippocrate lecto, sed non alia magis vsu comprobata est. At si in priorem partem humerus excidit, supinus homo collocandus est, fasciaque aut habena media ala circumdanda est, capitaque eius post caput hominis ministro tradenda, brachium alteri: præcipiendumque, vt ille habenam, hic brachium extendat. Deinde, medicus caput quidem \* hominis sinistra debet repellere, dextra verò cubitum cum humero attollere, & os in suam sedem compellere, faciliusque id in hoc casu, quàm in priore reuertitur. Reposito humero, lana alæ subijcienda est. Si in interiore parte os fuit, vt ei opponatur. Si in priore parte, vt tamen commodiùs deligetur. Tum fascia primū sub ala obuoluta, caput eius debet comprehendere, deinde \* profectus ad alteram alam, ab eaque ad scapulas, rursusque \* profecta ad eiusdem humeri caput tendere. Sæpiusque ad eandem rationem circumagi, donec bene id teneat. Vincit hac ratione humerus commodiùs continetur\*. Si adductus ad latus fit, ad id quoque fascia deligatur.

\* humeri

\* profecta

\*, qui add. quoque ad latus, ad id fasc. del.

## E N A R R A T I O.

HIPPOCRATES vno tantū modo humeri articulum luxari auctor est; atque adeò decipi medicos qui in anteriorem quoque partem luxari contendunt. eius autem verba initio de luxatis sic habent: Humeri verò articulum vno modo luxari noni ad locum sub aliis; sursum autem nunquam, neque ad exteriorem partem. Non tamen affirmaverim an luxetur an non, etiamsi habeam quod de ipso dicam. Sed neque in anteriorem partem umquam vidi, neque videtur mihi umquam excidisse: me-

dicis tamen videtur valdè in anteriorem partem luxari; & maximè decipiuntur in his, quorum carnes tabes circa articulum, & brachium occupavit: apparet enim in talibus caput brachij omnino in anteriorem partem eminens. Galenus (viri etiam Celsus) in alias etiam partes excidere testatur; idq. quinquies se vidisse affirmat, quater Roma, semel in Asia. Aegineta autem inquit, Brachij caput, scapularum sinui insertum excidit quidem frequenter; verū neque in superiorem partem (vt quod scapu-

larum

AAa



larum processus anchora similis impediatur neque in posteriorem, propter ipsas scapulas; neque in anteriorem, ob muscoli bicipitis tendinem ipsiusque humeri tuberculum: sed raro quidem in interiorem, exteriorēque prolabitur: contiuē verò, praesertim macilentioribus, ad ima, atque his sanè facile excidit, & rursus inferitur: multa autem carne praeditis contra, raro quidem elabitur, sed egrè in suam sedem compellitur.

### At si vastius corpus.

REPOSITIONIS modum hunc inter reliquos commendat Hippocrates; iustissimè enim commotionem facit, si solum penitus intus ad brachij caput lignum fuerit: iustis-

sima item sunt in utramque partem adaequationem facientes delibrationes, & adhuc ossi brachij secura. Recentes itaque luxationes citius incidunt quàm quis putare possit, & priusquam extensa esse videantur. Sed & veteres sola hac repositio reponere potest, si non iam ob vetustatem quidem caro in acetabulum deuenit: caput autem brachij in loco ad quem declinavit, semitam sibi ipsi iam fecit. Haecenus Hippocrates.

### Reposito humero, lana.

Si quidem inflammationem non sentiat pars affecta, mediocris pila ex lanà (id enim per lanam intelligit Celsus) sicca; sin iam inflammata sit, eadem oleo madens subiicitur.

## CAPVT XVI.

### De cubiti luxati curatione.

IN cubito autem tria coire ossa, humeri, & radij, & cubiti ipsius, ex his quæ prima parte huius voluminis posita sunt, intelligi potuit. Si cubitus, qui innexus humero est, ab hoc excidit, radius qui adiunctus est, interdum trahitur, interdum subsistit. In omnes verò quatuor partes excidere cubitus potest: sed si in priorem prolapsus est, extensum brachium est, neque recuruatur. Si in posteriorem, brachium curuum est, neque extenditur, breuiusque altero est. Interdum febrem vomitumque bilis mouet. Si in exteriorēve brachium porrectum est, sed paulum in eam partem à qua os recessit recuruatum, quicquid incidit, reponendi ratio vna est. Neque in cubito tantum est, sed in omnibus quoque membris longis, quæ per articulum longa testa iunguntur. Vtrunque membrum in diuersas partes extendere, donec spatium inter ossa liberum sit. Tum id os quod excidit ab ea parte, in quam prolapsum est, in contrariam impellere. Extendendi tamen alia atque alia genera sunt, prout nerui valent, aut ossa huc illucve sederunt. Ac modò manibus solis vtendum est, modò quædam alia adhibenda. Ergo si in priorem partem cubitus prolapsus est, extendi per duas manus

\* distrahitur.

\* posteriorem  
\* priorem

\* se dede-  
runt, al. ce-  
ciderunt.



manus, interdum etiam habenis iniectis satis est. Deinde rotundum aliquid à lacerti parte ponendum est, & super id repente cubitus ad humerum impellendus est. At in alijs casibus commodissimum est eadem ratione brachium extendere, quæ fracto \* cubito suprà posita est, & tum ossa reponere. \* humero  
Reliqua curatio eadem est, quæ in omnibus. Celerius \* tan- \* tamen  
tùm & sæpius id resoluendum est, multoque magis aqua calida fouendum, \* diutius ex oleo & nitro ac sale perfricandum. \* & diut  
In cubito enim celerius, quàm in vllò alio articulo, siue extrà remansit, siue intus reuertit, callus circumdatur, isque si per quietem increuit, flexus illius postea prohibet.

## ENARRATIO.

**Q**UANTO gibberi cubiti articulus magis varius est humero, ut ait Ægineta, tanto plus negotij exhibet; & tardius quidem excidit, sed difficilius reponitur, propter tuberculorum sinuumque frequentiam. Dilabitur autem in omnem partem; præcipue tamen in priorem, & posteriorem.

## Interdum febrem.

HIPPOCRATES libro De articulis: Re-  
trudescit maxime cubiti gibbus, febrilis, doloribus, nausea, & vomitu meraca bilis: præsertim si retrorsum luxatus fuerit, ob torporem; deinde in anteriorem partem.

## Si in anteriorem.

ID nullam prorsus curationem recipere testatur Paulus Ægineta: Hac enim, in-

quit, luxatio omnium quæ in cubiti gibbero sunt, maxime dolorifica est, & periculosa.

## Extendendi tamen alia.

EA ex Hippocratis De fracturâ libro, & Oribasio De machinamentis petenda sunt. Ceterum in cubiti repositione considerandum est, an videlicet protinus in ipso principio accersum sit, & in ante aut febris, aut inflammatio apprehenderit: nam si horum alterutrum apprehenderit, tantisper quiescendum est, dum inflammatio aut febris remiserit: adhibita enim vi, ut docet Hippocrates, hominem perimeret; & quoniam nullus articulus dum febris urget, in suam sedem compellendus sit, minime omnium cubitus.

## CAPUT XVII.

## De manu luxata.

**M**ANVS quoque in omnes quatuor partes prolabitur. Si in posteriorem partem excidit, porrigi digiti non possunt: si in priorem, non inclinantur: si in alterutrum latus, manus in contrarium, id est, aut ad pollicem, aut ad minimum digitum conuertitur. Reponi non difficilimè potest. Super durum locum & renitentem ex altera parte intendi

AAa 2 manus,



manus, ex altera brachium debet, sic ut prona sit: si in posteriore partem os excidit, supina: si in priorem, si in anteriorem exteriorémve, in latus. Vbi satis nervi diducti sunt, si in alterutrum latus procidit manus, \* brachium in contrarium repellendum est. At his, quæ in priorem posterioremve partem prolapsa sunt, superimponendum durum aliquid, idque supra prominens os manu urgendum est, per quod vis adiecta facilius in suam sedem compellit.

\* ut &  
brach. in  
c. repel-  
lenda est.

## ENARRATIO.

**M**ANVS in quatuor prolabitur aut intro luxari auctor est. Manus autem art-  
monetur partes; anteriorem videlicet, ticulum aut intro, idq; maximè, aut extrà  
exteriorem, posteriorem & anteriorem. Hip- tantum prolabi contendit; sicuti sequenti  
pocrates totam quidem manum aut intro, quoque capite Celsus de palma scribit.  
aut extrà, aut hac aut illac, maximè verò

## CAPVT XVIII.

*De Palma.*

**I**N palma quoque ossa interdum suis sedibus promouentur, modò in priorem partem, modò in posteriorem. In latus enim moueri paribus ossibus oppositis non possunt. Signum id solum est, quod omnium commune est, tumor ab ea, in quam os venit: sinus ab ea, à qua recessit. Sed sine intentione  
\*, digito \* digitorum, tantummodo bene pressum os in suam sedem reuertitur.

## CAPVT XIX.

*De digitis.*

**A**T in digitis totidem ferè casus, eademque signa sunt, quæ in manibus. Sed in his extendendis non æquè vi opus est, cum & articuli breuiores, & nervi minus validi sint. Super mensam tantummodo intendi debent, qui vel in priorem, vel in posteriorem partem exciderunt, tum iam palma compelli, atque id quod in latus elapsum est, digitis restitui.

## CAPVT



## CAPUT XX.

*De Femore.*

**C**UM de his dixerim, de his quoque quæ in cruribus sunt, videri possum dixisse. Siquidem etiam in hoc casu quædam similitudo est femori & humerò, & tibiæ & cubito, pedi & manui. Quædam tamen separatim quoque de his dicenda sunt. Femur in omnes quatuor partes promouetur, sæpius in interiorem, deinde in exteriorem, raro admodum in priorem aut posteriorem. Si in interiorem partem prolapsum est, crus longius altero & \* vastius est: extra enim pes ultimus spectat. Si in exteriorem, breuius \* rarumque fit, & intus inclinatur, calx ingressu terram non contingit, sed planta ima, meliusque id crus superius corpus, quam in priore casu fert, minusque baculo eget. Si in priorem crus \* extensum est, implicarique non potest, alteri cruri ad calcem par est: sed ima planta minus in priorem partem inclinatur, dolorque in hoc casu præcipue est, & maximè vrina supprimitur. Vbi cum dolore inflammatio quieuit, commodè ingrediuntur, totusque eorum \* pes est. Sed & si in posteriorem extendi non potest crus, breuiusque est, ubi \* constitit, calx quoque terram non contingit. Magnum autem femori periculum est, ne vel difficulter reponatur, vel repositum rursus excidat. Quidam iterum semper excidere contendunt, sed Hippocrates & Diocles, & Philotimus, & Nileus, & Heraclides Tarentinus, clari admodum auctores, ex toto se restituisse memoriæ prodiderunt. Neque tot genera machinamentorum quoque ad extendendum in hoc casu femur, Hippocrates, \* Andreas Nileus, Nymphodorus, Protarchus, Heraclides, Faber quoque quidam reperissent, si id frustra esset. Sed ut hæc falsa opinio est, sic illud verum est. Cum ibi valentissimi nerui, musculique sint, si suum robur habent, vix admittere; si non habent, postea non continere. Tentandum igitur est, & si tenerius membrum est, satis est habenam alteram ab inguine, alteram à genu intendi. Si validius, melius adducent, qui

\* valgium

\* varumq.

• plicari  
nō potest,  
extensum-  
que alteri\* pes etiam  
seder. Sed  
si\* constitit,  
al. insistit,• Andreas,  
Nil.

A A a 3 eadem



eadem habenas ad valida bacula deligarint: tumque eorum  
 fustium imas partes oppositæ moræ obicerint, superioresque  
 ad se utraque manu traxerint. Etiamnum valentius intendi-  
 tur membrum super scamnum, cui ab utraque parte axes  
 sunt, ad quos habenæ illæ deligantur, qui ut in torcularibus  
 conuersi, rumpere quoque, si quis perseverauerit, non so-  
 lum extendere nervos \* & musculos possunt. Collocandus  
 autem homo super id scamnum est, aut pronus, aut supinus,  
 aut in latus: sic ut temper ea pars superior sit, in quam os pro-  
 lapsum est: ea etiam inferior, à qua recessit. Nervis extensis  
 \* in priorem os venit, rotundum aliquid super inguen ponen-  
 dum, subitoque super id genu adducendum est eodem mo-  
 do, eademque de causa, qua idem in brachio fit, protinusque  
 si \* complicari femur potest, intus est. In cæteris verò casibus,  
 \* plicari ubi ossa per vim paulum inter se recesserunt, medicus debet  
 id quod eminent, retrò cogere, minister contra inde coxam  
 \* Reposito propellere. \* Posito osse, nihil aliud novi curatio requirit,  
 quàm ut diutius is in lecto detineatur, ne si motum adhuc  
 nervis laxioribus femur fuerit, rursus erumpat.

## ENARRATIO.

## Si in interiorem.

**N**ON solum longius apparet crur, si  
 sano cõferatur, & genu ipsum promi-  
 nentius; sed & ad inguina crur inflectere ne-  
 quit, & iuxta penem tumor manifestus oc-  
 currit, tanquam femoris capite illic desi-  
 deret. Dicitur autem potissimum ob causas  
 crur ipsum aliter longius est, ut docet Hip-  
 pocrates: nam os, inquit, quod à coxa pro-  
 cedit, & sursum ad pectinem fertur, fun-  
 damentum sit capitis femoris, & articuli  
 cervix in acetabulo vehitur.

## Si in exteriorem.

**Q**UIBUS in exteriora femur exci-  
 derit, contraria omnia apparet: siquidem  
 iuxta penem regio dehiscit, clunes inturges-  
 cunt, & genu intus demergitur, & crur  
 inflectere non possunt ob musculos postero-

res qui flexui repugnant; quoniam ita figu-  
 rati plurimum extendi non sistent. Con-  
 spicitur & affectum cruris sano trenius; idque  
 non immerito, ut docet Hippocrates, quum  
 femoris caput non feratur super os, sicuti  
 quando in interiorem partem procidebat;  
 sed iuxta os quod non prominet, sed natura  
 residet, in carnem natura humidam cedon-  
 temque infigatur.

## dolorque in hoc casu.

**EST** quidem in principio dolor, femo-  
 ris capite comprimente carnem in quam in-  
 cumbit; unde interdum antequam occalle-  
 scat, inflammationes oriri soleant, quas  
 urina suppressio aut difficultas comitari con-  
 suevit; potissimum quosies cervix vesicæ  
 comprimitur.

Magnum



Magnum autem  
femori.

**REPOSITVM** cruris tum aliàs, tum quotiescunque mucosus humor in iunctura coxa coacervatus fuerit, excidere solet: nam, ut Hippocrates sectione VI. Aphorismorum Aphorismus XLIX. & quinquagesimo, Quibuscunque à coxendicium dolore molestatis excidit coxa, & rursus incidit; iis mucrores superueniunt. & Quibuscunque à coxendicium dolore diuturno molestatis excidit coxa, iis crur tabescit, & claudicat nisi urantur. Quos Aphorismos sic coniunctim legit & interpretatur Tagaulius: Quibuscunque à diuturno coxendicium dolore conflatis, propter mucrores seu mucosi humoris ac pituitosi copiam in articulo seu iunctura coxa coacervatam, & idcirco, id est, coxa ipsa ( hoc est femoris caput quod in coxa sine ossis ischij cavo inseritur ) suo naturali acetabulo propulsa excidit, & rursus

incidit id est, in naturam suam selem sponte resiliit, aut aliter repulsa est; imbi. nendum persistere non potest, sed solum a compage lubrica continue ter relabatur ) iis processu temporis crur ( quod Græcis oxa. & dicitur, hoc est totum membrum, tam tibia scilicet quam femur ) necessario alimonia penuria contabescit, & ariditate conficitur, omnesque in claudicationem enadunt, si non urantur; hoc est nisi prius ferramentis igne candentibus urendo, & mucus ille qui ossis ischij finem occupat, absumatur, & laxitas cutis ad quam femoris caput subinde lubricum procidebat, contrahatur.

Collocandus autem  
homo.

**SI** in posteriorem partem femur prolapsus sit, neque primum neque supinum hominem collocamus, sed sedentem; magis autem in integram coxam inclinatum.

## CAPVT. XXI.

## De Genu.

**GENV** quoque & in anteriorem, & in posteriorem, & in posteriorem partem excidere notissimum est: in priorem non prolabi plerique scripserunt. Potestque id vero proximum esse: cum inde opposita patella, ipsa quoque caput tibiæ contineat. Meges tamen eum cui in priorem partem excidisset, à se curatum esse memoriæ prodidit. In his casibus intendi nervi rationibus iisdem quas in femore retuli, possunt. Et id quidem quod in posteriorem partem excidit, eodem modo rotundo aliquo super poplitem imposito, adductoque eo crure reconditur. Cætera verò manibus simul, tum ossa in diuersas partes compelluntur.

## ENARRATIO.

**GENV** in tres partes facillimè erumpit atque excidit; facillimè etiam reponitur: in priorem partem non prolabitur, propter patellam ei oppositam; quanquam id asserat Meges.

## In his casibus.

**ITA** ut si in anteriorem partem & anteriorem veniat, homo resupinandus sit; si in posteriorem, primum collocandus.

## CAPVT.

\* functis,  
ossa inde  
versus  
par.



## CAPVT XXII.

*De Tallo.*

**T**ALVS in omnes partes prolabitur. Vbi in interiorem partem excidit, ima pars pedis in exteriorem partem conuertitur. Vbi huic contrarius \* talus, contrarium etiam signum extat. Si in priorem partem erumpit, à posteriore latus neruus durus & \* ignauus inflexus est, minusque is opus est: si in posteriorem, \* lanx calx penè conditur, plaga maior fit. Reponitur autem is quoque per manus, prius in diuersa pede & crure diductis. Et in hoc quoque casu diutius in lectulo perseverandum est, ne is talus, qui totum corpus sustinet, parùm confirmatis neruis ferendo oneri cedat, rursusque prorumpat. Calceamentis quoque humilioribus primo tempore vtendum, ne \* iunctura talum ipsum lædat.

## ENARRATIO.

**O**RIBASIVS, *Modò, inquit, in tem prolabitur talus; nonnumquam etiam interiorem, modò in exteriorem partem in posteriorem.*

## CAPVT XXIII.

*De Planta.*

**P**LANTÆ ossa iisdem modis quibus in manu, prodeunt, iisdemque conduntur. Fascia tantummodò calcem quoque debet comprehendere: ne cum mediam plantam inumque eius vinciri necesse est, liber talus \* in medio relictus, materiam pleniorē recipiat, ideoque suppuret.

## CAPVT XXIIII.

*De Digitis.*

**I**N digitis nihil vltra fieri debet, quàm quod in his qui sunt in manu, positum est. Potest tamen conditus articulus medius aut summus canaliculo aliquo contineri. Hæc faciendæ sunt in his casibus, vbi sine vulnere ossa exciderunt. Hic quoque & ingens periculum est: & eo grauius, quo maius membrum est, quòve validioribus neruis aut musculis contine-



continetur. Ideoque humeris, femoribusque metus mortis est, ac si reposita ossa sunt, spes nulla est. Non repositis tamen, nonnullum periculum est. Eoque maior in utroque timor est, quo propius vulnus articulo est. Hippocrates nihil tutò reponi posse, præter digitos & plantas & manus dixit, atque in his quoque diligenter esse agendum, ne præcipitarent. Quidam brachia quoque & crura reposuerunt. Et ne canceri, distentionesque nervorum orientur, sub quibus in eiusmodi casu fieret mors matura, sanguinem ex brachio miserunt. Verùm ne digitus quidem, in quo minimum ut malum, sic etiam periculum est, reponi debet nisi ante inflammationem, aut postea cum iam vetus res est. Si reposito quoque osse nervi distenduntur, rursus id protinus expellendum est. <sup>\* nisi ante</sup>  
<sup>\* luxatio</sup> Omne autem membrum, quod cum vulnere loco motum, neque repositum est, sic iacere convenit, ut maximè cubantem iuvat, tantùm ne moveatur, nève dependeat. In omni quoque tali morbo magnum ex longa fame præsidium est. Deinde ex curatione eadem quæ proposita est, ubi ossibus fractis vulnus accessit. Si nudum os eminet, impedimento semper futurum est. Id quod excedit, abscindi dum est. Imponendaque super arida linamenta sunt & medicamenta non pingua, donec quæ sola esse in eiusmodi sanitas potest veniat. Nam & debilitas sequitur, & tenuis cicatrix inducitur, quæ necesse est faciliè noxæ postea pateat.

## ENARRATIO.

Hæc facienda sunt.

**P**LVRI MA qua huc referri possunt, iam ante dicta sunt: nam quod luxatio cum ulcere periculosa sit, atque magna ex

parte letalis (præsertim si nervis aut musculis principalioribus vicina sit) enarratum est. Quare si quis ante dicta huc accommodet, caput hoc planissimum comperiet.

Octavi & ultimi libri

FINIS.

BBb

LECTO.



## L E C T O R I S.

**B**ENIVOLE Lector: Ecce tibi duas has  
Celsi epistolas, vnam ad Iulium Calli-  
stum; alteram ad Pullium Natalem. Quas  
huic nostræ Celsi editioni adiungere bonum  
factum visum nobis fuit: partim, quòd idem  
argumentum quod hi Celsi libri, tractant,  
nempe de re medicâ: partim etiam quia eius-  
dem auctoris videbantur; ne quid forte Cel-  
si de re medicâ, à nobis desiderare possis.  
Vale & fruire.

CORNE-



## CORNELIVS CELSVS

CAIO IVLIO CALLISTO S.D.

**I**NTER maximos quondam habitus medicos Herophilus, Cai Iuli Calliste, fertur dixisse, *medicamenta deorum immortalum manus esse: non sine ratione, ut mea fert opinio. prorsus enim quod tactus diuinus efficere potest, id praestant medicamenta* *vsus experientia comprobata.* Animaduertimus itaque saepe inter deliberationes contentionesque Medicorum auctoritate praecedentium, dum quaritur quidnam faciendum, aut qua ratione succurrendum sit agro, quosdam humiles quidem, & alioquin ignotos, reuera peritiores, vel (quod fateri pudet) longe semotos a disciplina medicina, & ne affines quidem eius professioni, medicamento efficaci dato, protinus velut praesenti numine, omni dolore periculoque liberasse agros. Quamobrem spernendi sunt quidem, qui medicinam spoliare student vsu medicamentorum, forsitan non a medendo, sed a potentia, effectuque medicamentorum ita appellatam. Probandi autem sunt, qui omnino succurrere periclitantur student. Ego certe aliquoties magnum scientiae consequutus sum titulum, ex vsu prosperè datorum medicamentorum, multosque ex eadem causa non mediocrem gloriam tulisse memini. Est enim hac pars Medicinae vel maxime necessaria, certè antiquissima, & ob hoc primùm celebrata atque illustrata: siquidem verum est, antiquos herbis ac radicibus, corporis vitia curasse: quia timidum genus mortalium inter initia non facile ferro ignique se committebat. Quod etiam nunc plerique faciunt, ne dicam omnes. Et nisi magna compulsi necessitate,

BBb 2

ipsius



ipsius salutis, non patiuntur sibi fieri, quæ sanis vix toleranda sunt. Cur ergo aliqui excludant medicinam de usu medicamentorum, non inuenio, nisi ut detergant impudentiam suam. siue enim nullum experimentum eius generis remedium habent, meritò accusandi sunt, quòd tam negligentes in tam necessaria parte artis fuerint: siue experti quidem sunt eorum utilitatem, denegant autem usum, magis culpandi sunt, qui crimine inuidentiæ flagrant: quod malum quum omnibus animantibus inuisum debeat esse, tum præcipuè medicis, in quibus nisi plenus misericordiæ, & humanitatis animus est, secundum ipsius professionis voluntatem, hominibus, Diis quæ omnibus inuisi debent esse. Iccircò ne hostibus quidem malum medicamentum dabit, qui sacramento medicina legitime est obligatus. Sed persequetur eos, cum res postulauerit, ut militans, & ciuis bonus omni modo, quia medicina non fortuna, neque personis æstimat homines, verum æqualiter omnibus implorantibus auxilia sua porrecturam & succursuram se pollicetur, nullique vnquam nocituram profitetur. Hippocrates conditor nostræ professionis initia disciplina à iureiurando tradidit, in quo sanctum est, ut ne prægnavi quidem medicamentum, quo conceptum excutitur, aut detur, aut demonstretur à quoquam medico; videlicet longè præformans animos discipulorum ad humanitatem. Qui enim nefas existimauerit, spe dubia homines ledere, quanto scelestius perfectior iam nocere iudicabunt? Magni ergo æstimavit nomen decusque medicinae conservare, pio sancto quæ animo quemque secundum ipsius propositum se gerentem; scientia enim sanandi, non nocendi est medicina: quæ nisi omni parte sua plenè excubat in auxilia laborantium, non præstat quam hominibus pollicetur misericordiam. Desinant ergo qui prodesse afflictiis, aut nolunt, aut non possunt, alios quoque deterrere, negando agris auxilla,



auxilia, quæ per vim medicamentorum frequenter exhibentur. Etenim per gradus quosdam medicina laborantibus succurrit. Nam primum cibus, ratione aptoque tempore datis tentat prodesse languentibus: Deinde si ad hos non responderit curatio, ad medicamentorum decurrit vim. Potentiora enim hæc & efficaciora quam cibi. Post ubi ne ad hæc quidem cedunt difficultates aduersæ valetudinis, tunc coacta ad sectionem; vel ultimò ad usionem venit. At Asclepiades maximus auctor medicinae negavit aëris danda medicamenta. Quidam enim hoc mendacio pro argumento vtuntur. Poteram tamen, si verum id esset, dicere quid Asclepiades senserit. forsitan non omnino in hanc partem animum intendit. Homo sanè fuit qui parùm feliciter se in hoc negotio gessit. Itaque non deterreor persona, cum re manifesta prodesse videor. Nunc verò cum tam impudenter quidam de eo mala comminiscantur, quid possum ultra dicere, nisi quodammodo parricidium ac sacrilegium eos committere qui hæc dicunt? Ille enim febricitantibus, vitiiisque præcipitibus correptis, quæ oxypathe Græci dicunt, negavit medicamenta danda, quia cibo vinoque interdum aptè dato remediari eos tutius existimauit. Caterùm in libro qui Parascension, id est, Preparationum inscribitur, contendit ultimæ sortis esse medicum, qui non ad singula quæque vitia binas ternasque compositiones, & expertas, & protinus paratas habeat. Vides ergo quàm non placeat Asclepiadi usus medicamentorum? cui nisi plura ad vnumquodque genus vitij medicamenta composita habeat, non videtur dignus professione medicinae. Sed ista licentia nomine tantummodò medicorum propter quorundam negligentiam latius processit. Rarò enim aliquis priusquàm se suosque tradat medico, diligenter de eo iudicat, cum nemo ne imaginem suam pingendam comittat, nisi probato prius artifice per quæ-



dam experimenta, atque electo, habeat ne omnia pondera ac  
 mensuras exactas, ne quid errorum in rebus necessariis accidat:  
 videlicet quia sunt quidam qui pluris alia quam seipsos aesti-  
 ment. Ob quod sublata est vnicuique studendi necessitas, &  
 non solum antiquos auctores per quos consummatur professio,  
 quidam ignorant sed etiam comminisci falsa de iis audent. Vbi  
 enim delectus non est personarum, sed eodem modo bonus ma-  
 lusque habetur, disciplina ac secta observatio perit, quodque sine  
 labore potest contingere, & in quo dignitatis atque utilitatis  
 prestare videtur aequalitas, id unusquisque magis sequitur.  
 Atque ut quisque vult facit & medicinam. Quosdam enim a  
 peruerso proposito nemo potest mouere: Et sane cum illos per-  
 misit liberum arbitrium magnitudo professionis eius. Multos  
 itaque animaduertimus vnius infirmitatis scientia, medici ple-  
 num nomen consecutos. Nos vero ab initio rectam viam se-  
 cuti, nihil prius in totius artis perceptione, quam homini per-  
 mittitur, iudicauimus. Quia ex hac omnia comoda consecu-  
 turos nos existimabamus, non mediis fidius tam pecunia aut  
 gloria cupiditate, quam ipsius artis scientia. Magnum enim,  
 & supra hominis naturam duximus, posse aliquem tueri, vel  
 recuperare suam, Et vnicuique bonam valetudinem: ita-  
 que ut ceteris partibus disciplina, ita huic quoque, quae per  
 medicamenta virtutem suam exhibet, curiose instuimus, eo  
 magis quod percipiebamus indies ex usu profectus eius, quos  
 interdum supra fidem & opinionem plurimorum exhibeba-  
 mus. Sed quid ultra opus est probare necessarium esse usum  
 medicamentorum? praecipue tibi, qui, quia percepisti utilita-  
 tem eorum, idcirco a me compositiones quasdam petisti. Ego  
 autem memor humanitatis tuae, candorisque animi tui, quem  
 omnibus quidem hominibus plenissime, mihi etiam peculiariter  
 praestas, non solum quae desideras remedia, verum etiam si  
 qua



751  
qua alia de expertis in presenti habui, in hunc librum contuli,  
quem ad te misi. Cupio enim mediusfidius quā possum tuā in  
me tam perseveranti benevolentia respondere, adiutus omni  
tempore à te, præcipuè verò istis diebus: ut primum enim  
potuisti, non es passus cessare tuæ erga me pietatis officium, tra-  
dendo mea scripta Latina de medicinalibus, nostro Casari.  
Quorum potestatem tibi feceram, ut ipse prior legeres, sim-  
pliciterque indicares mihi quid sentiret de iis. Plurimum enim  
iudicio tuo tribuo. Tu porro candidissimo animo, & erga me  
benevolentissimo, dignos nomine editionis, non verbis, sed re  
probasti, periculumque non minus tui iudicii quàm ego stili  
propter me adisti, quo tempore diuinis manibus ea tradendo  
consecrasti. Fateor itaque me gratias tibi agere, quòd &  
prius quàm rogareris consummasti amicissimo affectu vota  
mea, & quòd contigit mihi favore tuo maturiorem percipere  
studij huius mei fructum ac voluptatem. Ignoscas autem, si  
parua tibi visa fuerint compositiones, & non ad omnia vitia  
scriptæ: sumus enim, ut scis, peregrè, nec sequitur nos nisi  
necessarius admodum numerus libellorum. Postea autem si  
& tibi videbitur, ad singula quæque compositiones collige-  
mus. Oportet enim copiam earum selectam habere, quoniam  
reuerà quædam magis quibusdam, & non omnes omnibus  
conveniunt, propter differentiam scilicet corporum, & affe-  
ctionum, quarum initium à capite faciemus. (Summum enim  
& quasi primum locum hoc obtinet,) dantes operam ut sim-  
plicia remedia prima quæque ponamus. Interdum enim hæc  
efficaciora sunt, quàm ex pluribus composita medicamenta.  
Erit autem nota denarij pro Græca drachma: æquè enim in  
libra denarij LXXXIII, apud nos sunt, sicut drachmæ apud  
Græcos incurrunt.

CORNE-



**L**ECTIS duobus libris compositionum Gracis, Pulli Natalis, quos misisti mihi ut in Latinum sermonem conuerterem, libenter parui tuae voluntati, dignos eos existimans quibus operam impenderem, quos plenos utilitatis comperi, alioqui excusassetem, ni me propositum haberet, nihil non dignum sublimi Romanorum maiestate, de bono medicinae artis splendidissime scribere, idque perennitati, & literis mandare. Habebit ergo & praesens tempus, & futura posteritas, in hoc perpetuae voluntatis meae curaeque gratissimum munus, siquidem bona valetudine nihil est pulchrius. Dedi operam quantum potui, ut ad verbum transferrem, quae in Gracis medicinalibus reperi, nec necessariam curam cultus orationis putavi, quia rectius duxi proprietates nominum edere, & rem veram sub herbarum peregrinatum vocabulis explicare. Unum genus fateor me translationis de industria declinasse, quo fere Graci utuntur, in medicamentorum scripturis, omnia ad secundam personam dirigentes. Ego vero in usum medicamentorum quae edidi, omnis boni gratia nullam malui quam infinitam inserere personam. Admoneremque, nisi certum haberem te non ignorare, me huiusmodi bona utilitatis magis quam delectationis causa scripsisse. Graci medici pondera medicamentorum ad drachmas redigunt: quae quia ad denarium nostrum conueniunt, (octoginta enim & quatuor in libram incurrunt) pro nota Graecae drachmae quae est figura talis, Z; notam denarii Latini, quam nosti, posui; id est hanc, \* : & ad eius pondus Graecas drachmas rediges. Et quando quae volui praefatus sum, nunc quae desideras explicabo.

INDEX



INDEX  
OMNIVM, QVÆ IN CELSO  
CONTINENTVR.

*Primus numerus librum, secundus caput designat.*

A.		Agamemnon	1. proœ.
A	Bdomen lib. 4. cap. 1	Agricolam vsu fieri, non disputa-	
	Abdominis ruptura quomodo curanda sit 7. 17	tione	ibid.
	Abditæ causæ 1. in proœ.	Aiax quo genere insanix laborauerit.	3. 18
	Abscessus quibus signis indicentur futuri 2. 6	Alentia	5. 14
	Abortus periculum quando 1. 7	Alopecia	6. 4
	Abstinencia nimia sæpe inutilis ibidem	Alphos	lib. 5. cap. ult.
	Accessiones in febribus 3. 3	Aluum stringentia	1. 5
	Aceri natura & vsus 5. 27	Aluum soluentia	ibid.
	Acopa 5. 2. 3	Aluus quæ mala	1. 3
	Acrochordones lib. 2. cap. 14. & lib. 5. cap. 28	Aluus soluta, quibus remediis coërceatur	1. 6
	Actiones naturales quæ 1. proœ.	Alui indicatio	2. 7
	Adolescentia quibus morbis magis obnoxia sit 1. 1	Ambrosia Anidoti nomē lib. 5. 2. 3	
	Adurentia 5. 8	Ammonius lithotom.	7. 26
	Adulta quomodo curari debeant 5. 26	Anatomice, id est, infectio corporum necessaria	1. proœm.
	Ægilops 7. 7	Ancyloblepharos	7. 7
	Æstas periculosa 2. 1	Andreas medicus	5. proœ.
	Æstas quos pariat morbos 1. 2. 1	Andræ collyrium	6. 6
	Æstate quæ ad victum magis conducant 1. 3	Andro medicus	6. 18
	Æstuant in balneo, quid opus sit facere 1. 3	Angina	4. 4
	Ætatis differentia victu & curatione 1. 3	Angina subito finita, quid portendat	2. 5
	Ætatum differentia, quantum ad bonam, malamve valetudinem 2. 1	Animalium quadrupedum differentia	2. 17
	Æsculapius in deorum numerum relatus 1. proœ.	Angues in Italia, & in frigidis regionibus minus terribiles	5. 26
		Ani vitia quomodo curari debeant	7. 30
		Anodyna	5. 25
		Antidoti, & eorum compositiones	5. 23
		Antheræ	6. 11
		CCc	Antigo-



# INDEX,

Antigonus rex	3.22	Aurium morbi	7.8
Apollonius medicus	1. proœ.	Aurium fracturatum curatio	8.6
Apollonius, qui Mys cognominatus est	5. proœ.	Autumnus periculosissimus	2.1
Apostemata	2.1	Autumnus quos morbos pariat	ibid.
Aphthæ	ibid.	Autumni tempore quæ ad victum	
Aperientia	5.8	magis conferant	1.3
Aqua frigida quibus proſit	1.9	Auſter quos morbos generet	2.1
Aquæ differentia in potionibus	2.17	Autopyron.	2.17
Aquæ bonitatis probatio	ibid.		
Aqua in qua candens ferrum tin- ctum ſit	4.9	B.	
Aqua inter cutem quando minime terribilis	2.7	Baſilicon emplaſtrum	5.19
Aqua quomodo hydropicis emit- tatur	7.13	Boëthius	ibidem
Aquilonis ſtatus quos generet morbos, & quid boni ſanis cor- poribus adferat	2.1	Brachij fracti curatio	8.10
Area	6.4	Brachium	8.1
Arquatus morbus	3.24	Bronchocele	7.13
Arteriæ compoſitio	5.26	Bubonocèle.	7.18
Articulorum vitia	2.7		
Arteria aſpera, cuiusque deſcri- ptio	4.1	C.	
Articulorum dolores	4. vlt.	Cachexia	2.1. & 3.22
Ad articulos malagma	5.18.	Cacoëthes	5.28
Aristonis malagma	ibid.	Calefacientia	1.3
Articulorum curationes	5.26	Calculoſi quibus indi- cijs cognoscuntur	2.6
Aſclepiades	1. proœ.	Calculus quibus ſignis cognoscatur	7.26
Aſcites	3.21	Caluaria	8.7
Aſthma	4.4	Caligatio oculorum	6.6
Aſius lapis lib. 4. cap. vlt. aduerſus		Calor quibus proſit	1.9
Aſpidis iſtum	5.26	Calor quid corporibus adferat	2.1
Athenio	5.25	Calculo quomodo ſuccurratur	7.26
Atheroma	7.6	Cancer in ore	6.15
Attoniti qui dicantur	3.26	Cancer in cole	6.18
Atrophia	3.22	aduerſus Cantharidas	2.27
Attalicum emplaſtrum	5.19	Capitis dolores quibus leuentur	2.7
Auium differentia in cibo	2.17	Capitis longus dolor ſi ſine cauſa eſt, &c.	ibid.
Aurium vitium	6.7. & cap. 18	Capitis deſcriptio	4.1
		Capitis morbi, & eorum curatio	4.2

Caput



I N D E X

Caput quibus infirmum est, quid facere conveniat	1.4	Chryssippi malagma	5.18
Caput quod firmissimum	8.1	Cibus à quibus rebus melius inci- piat	1.2
Caput luxatum	8.13	Ciborum potionumque differen- tiæ	2.17
de Capillis fluentibus	6.1	Cibus quomodo & quando in fe- bribus dandus	lib.3.cap.4.5
Carbunculus in oculis	6.6	Cibi varij eduntur facilius quàm concoquuntur	3.6
Carbunculi in cole curatio	6.18	Cibus febricitantibus dandus qualis esse debeat	ibid.
Carcinodes	6.8	aduersus Cicutam	5.27
ad Carcinodas malagma	5.18	Cirfocele	7.18
Carcinoma	5.28	Circulatores	5.26
Cardiacus morbus quis dicatur	3.19	Clauus	5.28
Casus quid inuenerit	5.26	Clauus oculorum	7.7
Cassius medicus	1.proæ.	Cleonis collyrium	6.6
Cataportiorum descriptio, siue va- ria compositio	5.25	Coli dolor quibus remedijs iuu- tur	1.7
Cataportium ad somnum	ibid.	Coles	4.1
Cataportium Athenionis	ibid.	Colicon medicamenti genus, ex quibus rebus constet	4.14
Cataportiu Heraclidis	ibid.	Collyriorum variaz compositiones	6.6. & 4.28
Causæ abditæ quæ sint	1.proæ.	Coëuntia in aliqua corporis par- te dissoluentia	5.11
Causæ euidentæ quæ	eod.	Cæliacus morbus, & eius curatio	4.12
Causæ obscuræ quæ	eodem	Comitialis morbus	3.23
Cephalæa	4.2	Concoctio cibi in stomacho, lib.1, in proæm.	
Cerebri vel membranæ eius per- cussæ curatio	5.22	Concoctio quibus fit, quomodo se gerere debeant	1.2
Chirurgus Tryphon lib.7.in pro- æm. & lib.8.cap.5.		Conubitus qualis esse debeat	1.1
Chirurgus Sostratus	1.proæ.	Conubitus in scæminis, si per na- turam prohibitus, quomodo restitui debeat	7.28
Cæsarianum collyrium	6.6	Condita duabus de causis inutilia	1.2
Cercis	lib.8.cap.1	Condylomata	5.28
Chiragra	2.6. & 4.24	Condylomatum curatio	7.30
Chirurgica	lib.1.in proæ.	Coquentia & maturantia pus	5.3
Chironium vlcus	5.28	CCc 2	Cordis
Chirurgus qualis esse debeat	7.		
Chænicion	8.3		
Cholera	4.11		
Chordapfos	4.13		
Chordien	ibidem		
Crite tuberculum	7.6		
Chrysippus	1.in proæ.		
Chrysippi discipulus medicus	2.21		



INDEX.

Cardis descriptio, & ubi sit	4.1	Deserti differentia in portionibus	
Cardis percussus signa	5.22		2.17
Coryza	4.2	Dentarij pondus	5.17
Corpus integrum quodnam habeatur	1.2	Dentium situs & ordo & numerus & nomina	8.1.
Corporum incisio,	1. proœ.	Dentium dolor	6.7
Corpus gracile quale	2.1	Dentium curatio	7.12
Corpus quæ extenuent	1.3	Dentes quomodo extrahendi sint, ibidem	
Corporis humani descriptio	8.1	Destillatio, eiusque curatio	4.2
Corpus quodnā habilitissimū	2.1	Destillatione laborantibus quid opus sit	1.5
Corporis noxæ quinque	5.26	Desidia	lib.1. in proœ.
Costæ, & earum situs atque differentia	8.1	Detractio materia à corporibus, quot modis fiat	2.8
Costarum fracturarū curatio	8.9	Dexij malagma	5.18
Coxarum dolores	4.22	Diaphragma	1. proœ.
Coxarū dolor, quid portēdat	2.5	Dietetica medicina	ibid.
Coxarum os	8.1	Dies critici	3.4
Crato medicus	6.7	Digitum lib.8. cap.1. 19	
Crustas vulneribus inducētia	5.10	Digitorum cohærentium curatio	7.32
Crustas ulcerum resolutientia eod.		Digitorum vlcera	6.19
Cremasteres	7.18	Difficillimè curationem admittentia	5.22
Crassissimum os in capite	8.1	Diocles	1. proœ.
Cubitus	ibid.	Disciplina corpori inimica	ibid.
Cubitus luxatus quomodo restitui debeat, & quot in eo ossa coeant	8.16	Dionysij collyrium	6.6
Curta in auribus quomodo saccari debeant	7.9	Dyspnœa	4.4
Cutem purgantia	5.16	Dysenteria.	4.15
Cucurbitularum genera duo	2.10		
Curatio morborum quot modis fiat	2.8		
Curationum duo genera	7.7		
Cucurbitulis quomodo sanguinis detractio fiat	2.10		
Cynicus spasmus.	4.2.		
		E.	
		Ecropsium oculbrum	7.7
		Elæodes	5.26
		Elcodes	5.28
		Elephantia	3.25
		Empiricus unde dictus sit	lib.1.
		in proœ.	
		Empirici qui sint	ibid.
		Empedocles	ibid.
		Emplastrorū varæ cōpositiones, & descriptiones	5.17. & deina.
		Empro-	



952

I N D E X.		
Emprosthotonos	4.3	Fistularum curatio 5.28
Encanthis	7.7	Fluxus ventris, eiusq̃ curatio 4.19
Enterocoele	7.18	Fœmina 8.1
Enneapharmacû emplastrum	5.19	in Fœminis secundæ 7.30
Ephesium emplastrum	5.19	Foramina in capite ibid.
Epinyctis	5.28	Frigus quibus inimicum 1.9
Ephelis	6.5	Frigus quibus profit ibid.
Epiploce	7.18	Frigus quid mali corporibus ad-
Epispastica	5.18. & 19	ferat 2.1
Erasistratus	1. in proœ.	Frigus in febribus quid dicatur 3
Errorem suum de futuris in ca-		Fructuum arboreorum differen-
pite ingenuè confessus est Hip-		tiæ in cibis 2.17
pocrates	8.4	Frumentorum differentie in cibis
Erysipelas	lib. 5. cap. 26. & 28	ibid.
Evidentes causæ	1. proœ.	Furunculus, 5.28
Euocantia & educentia	5.12	
Euticleus	5.18	G.
Euelpidis collyrium	6.6	<b>G</b> Angræ curatio 7.33
Euelpistus chirurgus	7. proœ.	Ganglion 7.6
Exagitatio quid faciat	4.15	Gargarizationes 5.22
Exanthemata	5.28	Genuum dolores & eorum cu-
Experientia	1. in proœ.	ratio 4.23
Exercitatio quibus fiat modis 1.2		Genu luxatum 8.21
Exercitationis finis, quisnam esse		Gingiuarum vlcera, 5.13
debeat ibid.		Glaucias 1. proœ.
Exercitationem quæ sequi de-		Glandulæ 4.1
beant ibid.		Glans colis quo pacto tegēda 7.25
Excedentia 5.7		Glans colis siue penis contacta,
Expletus cibo potūve quid facere		quomodo aperienda sit ibid.
debeat. 1.2		Glutinantia 5.2
F.		Glutinatio vulnery 5.26
<b>F</b> Acies in homine 8.1		Gorgias medicus 2.14. & lib. 7.
Fatigato quotidianum cubile		in proœ.
tutissimum 1.3		Grauedines quomodo curētur 4.2
Fatigatum inter ambulandum		Grauedine laborantibus quid con-
quæ resciant ibid.		ueniat 15.
Febrium differentie 3.3		Gubernatorem vsu fieri non dis-
Febrem sæpe praesidio esse 2.7		putatione. 1. proœ.
Fel & eius situs 4.1		H.
Feratum differentie in cibis 2.17		<b>H</b> Ammonius medicus 7. pro.
Femur 8.1.		Hapsus 7.26
Fistula in homine ibid.		Hecæxi emplastrum 5.19
		Hepati-



I N D E X.			
Hepaticus morbus	4.7	Hypochoyfis.	6.6
Hæmorrhoids	6.18	I.	
Herbarū differentia in cibis	2.17	I Chor	5.26
Heracides	1.proæ.	I lecur,& eius situs	4.18
Herophilus lib.1. in proæ. &		ad lecur dolens malagma	5.18
lib.5. cap.25.		Ieiuni hominis vis aduersus fer-	
Hecataeus	5.25	pentis iſtum	5.26
Hermionis collyrium	6.6	Ignauia quid faciat	1.1
Hernia	7.18	Ileos	2.1
Heron ſive Hieron medicus	7.	Ileon	4.13
proæm.		ad Infantem mortuum expellen-	
Herpes	5.28	dum	5.25
Hippocrates	1.proæ.	Ilia,& eorum ſitus	4.1
Hippocrates omnis medicinae pa-		per Imbres qui morbi oriatur	2.1
teus	7.proæ.	Imbecilliffima materia quæ	2.17
Hirenæus	5.25	Implentia	5.14
Hieracis collyrium	6.6	Inſanabilia quæ ſint	3.26
Hieræ compositio	5.27	Inſibulatio quomodo fiat	7.25
Homerus	1.proæ.	Inedia ſi cui eueniat, quid facien-	
Homo ſanus, nullis ſe medicorum		dum	1.2
legibus obligare debet	1.1	Inguen quomodo incidendum ſit	7.20
Hominem ſanum, varium vitæ			
genus habere oportet	eod.	Intemperantia qua in re tolerabi-	
Horror in febribus	3.3	lior	1.2
Humeſtantia	1.3	Intemperantiæ exemplum	3.21
Humerus	8.1	Inſania quibus ſignis denuntie-	
Humerorum dolores quibus tol-		tur futura	2.5
lantur	2.7	Inſaniæ ſpecies	3.18
Humeri fracti curatio	8.10	Inſanientium communia reme-	
Humerus luxatus quomodo re-		dia	3.18
ſtitui debeat	8.15	Intestinum ieiunum, & cur ita	
Humor ſpiſſeſcens, aceto intus		dictum	4.1
ſumpto diſcutitur	5.26	Intestinum tenuius	ibid.
Hyeme quæ magis cõueniant	1.3	Intestinum craſſius	ibid.
Hyems ſalubris eſt	2.1	Intestinatorum nomina diuerſa, &	
Hyems quos morbos pariat	ibid.	differentia & ſitus	ibid.
Hydrocele	7.18	Intestinum cæcū & rectum	ibid.
Hydrops, ac eius ſpecies tres	3.21	Intestinatorum morbi, & eorum	
Hydropis curatio	ibid.	curatio	4.10
Hydrocephalon	4.2	Intestini tenuioris morbi curatio	
aduerſus Hyoſcyamum	5.27	4.14	
Hypoſarca	3.21	Iocinoris morbus	4.8
		in Ioci-	



I N D E X.

in Iocinoris morbo quæ periculo- fa	2.7	ad Lienem malagma	5.18
Intestinatorum percussorum signa	5.26	Lienis vulnerati signa	5.26
Intestina vulnerata quomodo cu- rari debeant	7.16	Linguae resolutio, eiusque cura- tio	4.2
Iollæ medici compositio	5.22	Linguarum vlcera	6.12
Iocinoris percussu signa	5.26	Lippitudine laborantibus quid opus sit	1.5
Iudæi compositio	5.22	Litterarum disciplina animo ne- cessaria, corpori inimica	1.pro.
Iudæi emplastrum	5.19	Lucubrandum quando potissi- mum	1.2
Iugale	lib.8, cap.1.	Luxata membra quomodo resti- tui debeant	8.11
Iuguli fracti curatio.	4.8	Luxuria.	lib.1. in proœ.
L.			
<b>L</b> Abor quid faciat	1.1	M.	
Laborem quis faciliùs toleret per ætatem	1.3	<b>M</b> Achaon	lib.1. in proœ.
Laborantibus ex partu remedium	5.25	Malagmatum compositio- nes variae	5.17
Lagophthalmos.	7.7	Malæ	8.1
Lateris dolor	4.6	Manus luxata quomodo restitui debeat	8.17
ad Laterû dolores malagma	5.18	Materia extrahenda per mala- gmata	5.18
Lauatio	1.3	Materiae genere & modo vten- dum pro viribus cuiusq.	2.17
Leguminum differentiae in cibis	2.17	Maxilla	8.1
Lenticula	6.5	Maxillæ fractæ curatio	8.7
Lepis	8.3	Maxillæ luxatæ curatio	8.12
Lethargus	3.20	Medicina nusquã non est	1.pro.
Leucæ	lib.5. cap.vlt.	Medicina quid promittat	ibid.
Leuis ingenia qualia	8.4	Medicina multiplex	ibid.
Leuitas intestinatorum, à quibus ætatibus depellitur	2.7	Medendi scientia, sapientiae pars	ibidem
Leuitas intestinatorum, & eius cu- ratio	4.16	Medicina triplex	ibid.
Leucophlegmatia	3.21	Medicina quæ victu curat, in duas partes diuisa	ibid.
Leuantia siue laxigantia	5.13	Medicinae quæ pars difficillima	ibidem
Lienteria	2.1	Medicinam artem coniecturalem	ibidem
Lien siue lienis	4.1	Medicina quid	ibid.
Lienes quibus magni sint	2.5	Medico-	
Lienis malum quando periculo- sum	2.7		
Lienis morbi curatio	4.9		

759



I N D E X.	
Medicorum officium, quodnam fit in curando, ex Aſclepiadis ſententia	3.4
Medici periti officiũ circa ægrum, cuiusmodi eſſe debeat	3.6
Media materia	2.17
Medullæ percuffæ ſigna	5.26
Meſes chirurgus lib.5. cap.28. & lib.7. in proœ.	
Melaſ	lib.5. cap.vlt.
Melancholia	2.5
Mellis natura in medicina	3.9
ad Melicerias malagma	5.18
Meliceria	5.26
Meliceria ſive meliceris	lib.5. cap.28.& lib.7. cap.6.
Meningophylax	8.3
Menophilus medicus	8.7
Menemachus	6.9
Meſa ſecunda	1.2
Metrodorus medicus, Epicuri diſ- cipulus	3.20
Mentum	8.1
Mithridatis antidorum	5.23
Modiolus	8.3
Mollientia	5.15
Morbos in deorum iram relatõs 1. in proœ.	
Morbos non eloquentia, ſed reme- dijs curari	ibid.
Morborum tria genera	ibid.
Morbi per ſingulas tempeſtates 2.1	
Morbus comitialis, qua ætate ægrè curetur	2.7
Morborum diuiſio & differentiæ 3.1	
Morbus increſcens quibus ſignis dignoscatur	3.2
Morbi decedentis quæ notæ ſint eodem	
Morbus ſi acutus fuerit, quomo-	
do æger tractandus ſit	cod.
Morbus ſi longus ſit quomodo æger tractandus ſit	cod.
Morbus comitialis	3.23
Morſus omnis quodam modo venenofus	5.26
Mortis indicia quæ	2.
Mos magnorum virorum qui ſit 8.4	
Mulieri gravidæ quæ incommoda evenire poſſint	2.5
Mullis differentia in potionibus 2.17	
Mutatio per vitæ curſum quomo- do moderanda	1.3
Mycon	5.18
Myron	5.28
Myrmecia	4.28
Mydriasis oculorum.	6.6
N.	
Narium morbi	6.6
Narium fracturæ curatio	8.5
Naturales cauſæ quæ ſint 1. proœ.	
Naviganti & nauſea preſſo, quid facere opus ſit	1.3
Negotioſi hominis prima curatio, exercitatio eſt	1.2
Nervorum dolore laborantibus, quid obſervandum ſit	1.9
Nervorum diſtentione, quibus futu- ra deprehendatur	2.5
Nileus, ſive Nilei collyrium	6.5
Notæ in ſingulis morbis obſer- uandæ	2.6
Notæ	8.1
Numenij malagma	5.18
Nymphodorus medic.	8.20
O.	
Oſcænarũ partiũ vitia quo- modo curanda ſint	6.18
Oculorum varij morbi	6.6
Oculo	



# INDEX.

Oculorum natura indicatio	7.7	Pastillus Andronis	ibid.
Oculorum vitia, & eorum cura- tiones	6.6	Parotides arteria	4.1
Olerum differentia	5.17	Patella	8.1
Omentum, cuiusque officium	4.1	Pecten	ibid.
Omenti curatio	7.21	Pediculi in palpebris oculorum	6.6
Omoplate	8.1	ad Pedu dolores malagma	5.18
Opisthotonos	4.3	Peripneumonia	4.7
Opisthotonos	6.4	Pessli compositio	5.21
Orestes, quo genere insanit labo- rauerit	3.18	Pessli alia compositio	cod.
Oris vlcera, quomodo curari de- beant	7.11.& 6.11	Pessli Numenij	cod.
Orthopnea	4.4	Pestilentia unde fiat.	1.2
Ossis fracti curatio	8.7	in Pestilentia qua sint obseruan- da	1.3. cap. 10
Os quot modis excidatur	8.3	Petro medicus	3.3
Ossa vitata	8.1	Pharmaceutica	1. proæ.
Osteos	7.18	Phacos	6.5
Osteos	6.8.& 7.3	Phagedaenæ in cole nascentis cu- ratio	6.18
Osteos	5.11	Philippus Epirotes medicus	3.21
P.		Philocratis emplastrum	5.19
P Alma	8.1	Philocrates	5.16
Partus emortuus in utero		Philon	6.6
quomodo excutiendus	7.29	Philothis collyrium	cod.
ad Panum malagmata	5.18	Philoxenus medicus	6.19
Paralysis	2.1	Philotimus	8.20
Paralysis oculorum	6.6	Phlegmone	1. in proæ.
Parasynanche	4.4	Phrenesis siue phrenetidis genera plura	3.18
Periculum in tabe qua denun- tiantur	2.7	Phthisis	2. ca. 1. & lib. 3. cap. 22
Parodontides	16.13	Phygethlon	5.18. & 6.28
Parotides	6.16	Phymata	2.7. & 5.18. & 5.28
ad Parotidas malagmata	5.18.	Piscium differentia in cibis	2.17
Partium animalium differentia in cibis	2.18	Pituita oculorum quomodo curan- da sit	7.7
Panificia	codem	Planta	8.1
Passi differentia in potionibus		Plistonicus Praxagora discipulus	1. in proæ.
codem		Podagra	lib. 2. cap. 6. & 4.24.
Pastilloium descriptiones, & va- ria compositiones	5.20	Podagra calida curatio, per ma- lagma	5.18
Pastillus Polybij	ibid.	Polypus	6.8
		DD d	Poly-



INDEX.

Polypus in naribus	7.10	in Quartana veteri quid observa-	
Ponderum ratio	5.17	re proſit	3.15
Porrigo	6.2	Quartana febris curatio.	ibid.
Potionum differentia	2.17		
Potiones in febris, quando & quomodo dari debeant	3.6	R.	
Praxagoras	lib.1.in pro.	R Adius	8.1
Prandium quid requirat	1.3	R Rationalis medicus quis, & vnde dicatur	1.pro.
Protarchus	5.28	aduerſus Rabidi canis mortum	
Proptofis	6.6	5.26.	
Prudens medicus quis habeatur	5.26	Ramex	7.18
Pſorici deſcriptio	6.6	Ramicis curatio	7.22
Pſydracion	5.28	Recidiua quando timenda	3.4
Pſylli, quibus medicamentis v- tuntur aduerſus venena	5.26	Refrigerantia quæ	1.3
Pterygion	6.19	Regius morbus, & cur ita dictus ſit	3.24
Ptolemæus rex	5.23	Renes & eorum ſitus.	4.1
Ptolemæus chirurgus	6.7	Renum curatio	4.10
Pueritia quibus morbis periclite- tur	2.1	Renum percufforum ſiue vulne- ratorum ſigna	5.26
Pulmo vbi ſitus ſit & qualis ſit	4.1	Reſolutio ſtomachi	4.5
Pulmonis morbus, quæ pericula portendat	2.7	Reſolutio oculorum	6.6
Pulmonis percufſi ſig.	5.26	Rhagadia	6.18.
Purgantia	5.5	Rhyas	7.7
Purgationes reiectæ ab Aſclepia- de	1.12	Rhypodes emplaſtrum	5.19
Purgationes interdum neceſſariæ, interdum inutiles	1.3	Rodentia	5.6
Puſtulæ in oculis	6.6	Rosæ natura in medicina.	3.9.
Puſtularum genera	5.28	S.	
Puſ, eiusque differentia	5.26	S Acer ignis	5.28.
Puris ſignificatio	2.7	S Sanguis ex naribus, quibus ſæpe fluit	2.5.
Pus coquentia ſiue maturantia, & mouentia	5.3	Sanguinis detractio, quot modis fiat	2.9
Pyloros	4.1	Sanguinis natura & proprietas.	4.3
Pyrites	5.18	Sanguinem ſupprimentia	5.1
Pythagoras.	1.proæ.	ad Sanguinem ſupprimendum malagma	5.8
Q		Sanguis, atq. eius differētia	5.26
Q Vartana neminem iugulat		aduerſus Sanguinis profuſionem in vulneribus	codem. aduerſus.
3.15			



I N D E X.

aduersus Sanguisugam	ibi.	Sphagitides venæ	4.1
Sanies & eius differentia	ibid.	Spina luxata quomodo restitui	
de Sanitate tuenda librum scripsit		debeat	4.14
Asclepiades	1.3	Sputum quid significet	2.7
Satietas nimia nunquã utilis	1.2	Staphiloma	7.7
Sarcophagus	4.c.vlt.	Statura longa	2.1
Sarcocele	7.18	Steatomata	7.6
Scapula	8.1	Sternutamenta quomodo exci-	
Scoptula	cod.	tanda	5.22
Scorpio sibi ipse medetur	5.26	Stercus animalium	5.5. & 8.12
aduersus Scorpionis ictum	ibid.	Stomachum infirmum indicantia	
Scrotum, quod & scortum qui-		1.8	
dam dicere malunt	7.18	Stomacho laborantibus quæ a-	
Secundæ quæ sint	7.29	genda sint	cod.
Secunda mensa	1.2	Stomachi infirmitas quibus signis	
Seminis profusio, & eius curatio		cognoscatur	ibidem
4.21		Stomachus nonnunquam pro gu-	
Senectus, quibus morbis magis		la accipitur	4.1
obnoxia sit	2.1	Stomachi duplex significatio	ibid.
Septum transuersum	lib.1. in	Stomachi curatio	4.5
proæ. & lib.4.c.1.		Stomachi percussi sig.	5.26
Septi trãuersi percussi signa	5.26	Stomachus studiosorum qualis	
Septicum	7.21	plerumque sit	1.2
Serapion	1. in proæ.	Stomoma	6.6
Siccitas quid mali inferat corpo-		Stranguria	2.1
ribus	2.1	Struma	5.28
Signa in ægrotantibus bona quæ		Strophos	2.6
sint	2.2	Sudanti ex labore & itinere frigi-	
Signa in ægrotantibus mala quæ		da potio periculosissima est	
sint	2.3.	1.3	
Signa longæ valetudinis quæ sint		Suffusio oculorum	6.6
2.4		Sumpturis cibum post fatiga-	
Signa membrorum percussorum		tionem, quæ obseruanda	1.3
5.26		Suppurationes	3.27
Silanus	3.18	Supprimentia sanguinem	5.1
Siligō	2.7	Suturæ in capite quot sint	8.1
Singultus frequens quid indicet		Sycosis	6.3
2.5		Synanche.	4.4
Singultus sternutamento finitur			
2.7			
Sofagoras	5.8		
Spasmos	2.1		

T.

**T** Abes 2.1. & 4.7

Tabes, eiusque species 3.12

Tali 8.1

DDd 2 Talus



# I N D E X.

Talus luxatus, quomodo restitui debeat	8.22	Varices quomodo curandi sint	7.17
Telum latum, quomodo educen- dum	7.5	Varicum curatio	7.31
Telis extrahendis remediū	cod.	Vectus toto die quid facere de- beat	1.3
Tempora anni considerata	1.3	Ventrem solutum quid compri- mat	cod.
Tempestates quæ optimæ, quæ- que pessimæ	2.1	Ventrem compressum quid soluat eodem	
Terebra	8.3	Ventriculus ex quibus constet, & eius situs	4.1
Teranus	2.1. & 4.3	Ventriculi vulnerati signa	5.26
Tetherapeumena	5.19	Venatum ora subito suppressa, alioqui sanguinē fundere con- sueti, quid indicent	2.5
Tetrapharmacum emplastrum	5. 19. & 6.18	Venere abstinendum quando sit, & quando non	1.3
Testiculorum natura, & eorum morbi	7.18	Venti quinam salubres, & qui non sint	1.1
de Testiculorum morbis	6.18	Venenis, omnibus contrarium quid	5.26
Testiculorum incisio	7.19	aduersus Venenosorum anima- lium ictus	cod.
Thartias medicus	3.20	Ver saluberrimum	2.1
Themison	1. in proœ.	Vere quæ ad victum magis con- ueniant	1.3
Theodoti collyrium	6.6	Vere qui morbi fiant	2.1
Therionia	5.28	Vertebræ	8.1
Theosenus	5.18	Vesica, & eius situs	4.1
Thymium	5.28	Vesicæ vulneratæ signa	5.26
Tibiæ	8.1	Vivere elatum Asclepiades funeri obuius intellexit	2.5
Timæi compositio	5.22	Viuorum corpora incidere, crude- le & superuacuum esse 1. proœ.	
Titio extinctus	3.12	Vmbilici prominētis curatio	6.17
Tonsillarum vitium	6.10	Vmbilici vitia quomodo curari debeant	7.18
Tonsillis laborantibus quid con- ueniat	1.5	Vngues	8.1
Tormina quando periculosa non sint	2.7	Vnctio	1.3
Tormina quibus bona sint	cod.	Vomitum quando, & quibus utilis aut inutilis	cod.
Tormina id est dysenteria	4.15	Vomitum si post cibum fieri de- beat,	
Tristitia longa quid indicet	2.3		
Tussis	4.4		
Tympanites	3.21		
V.			
V Aletudinis iustantis quæ signa	lib. 1. proœ.		
Valentissimum quid	2.17		
Vari	6.5		



INDEX.

465

beat, quomodo prouocandus		Vulnerum signa	cod.
eodem		Vulnerum differentia ex ipso	cod.
Vrina sana quæ	1.2	morsu	cod.
Vrina reddendæ difficultati quomodo succurratur	lib.7.	Vulnus glutinantia	5.2
cap.26.& lib.1. cap.25.		Vulnera aperientia	5.4
Vrina parum liquida, in sano homine quid significet.	2.5	Vulsella	7.30
Vrina quæ mala	2.3	Vulua & eius situs	4.1
Vreteres	4.1	Vulvæ percussæ signa	3.26
Vt synanche	4.4	Vulvæ natura mirabilis.	7.21
Vua morbus intra fauces	6.14.& 7.12.		
Vulnera quomodo glutinanda.	5.26	Z.	
		ZEnon	lib.5.in proce.
		Zopyrus	lib.5.cap.25

FINIS.

DDd 3

ERRA-



# ERRATA.

Pagina 14. Columna 1. Linea 20.	quidem lege quidam.
Pag. 16. colum. 1. linea 27.	sine lege si ne.
Pag. 18. colum. 2. lin. 24.	( quantum enim spiritus cibo statim recrean-
ti r, proportio statim offendit corporis) est	parenthesis.
Pag. 23. colum. 1. lin. 34.	vilescunt, lege vilescunt.
Pag. 31. colum. 1. lin. 12.	emariat lege amariat.
Pag. 36. colum. 2. lin. 32.	vocant lege vorant.
Pag. 37. col. 1. lin. 1.	lege enim ex iu sunt qui medicamentis.
Pag. 38. col. 1. lin. 33.	non tamen si lege nam.
eadem col. 2. lin. 21.	fusio lege fusior.
Pag. 40. col. 1. lin. 5.	Itaque lege ita.
Pag. 61. col. 1. lin. 13.	huic lege hinc.
Pag. 63. col. 1. lin. 43.	siquidem eos lege siquidem si eos.
Pag. 72. col. 2. lin. 6.	sed ita virio lege sed id virio.
Pag. 73. col. 1. lin. 31.	sanguinis lege sanguinis.
Pag. 74. colum. 2. lin. 9.	pituitosam lege pituitosorum.
Pag. 88. col. 2. lin. 15.	non solum illa lege non solum in illa.
Pag. 92. col. 2. lin. 26.	expunge ut.
Pag. 93. col. 2. lin. 8.	quam lege quum.
Pag. 121. col. 2. lin. 11.	soluturam lege solvere
Pag. 132. colum. 2. lin. 21.	abscessum lege abscessuum.
Pag. 146. col. 1. lin. 28.	frigidorum in siccos lege in calidos & ficcos.
Pag. 180. col. 2. lin. 20.	lege elicant, ac euacuent.
Pag. 184. col. 2. lin. 7.	§. 3. lege § 1. aut § 1. §. pro, &c.
Pag. 197. col. 2. lin. 43.	principio vititur, deest frictione.
Pag. 200. colum. 2. lin. 12.	strataioria, lege stratoria.
Pag. 215. col. 2. lin. penultima.	quo lege quum
Pag. 217. col. 2. lin. 15.	habeat, lege habet
Pag. 243. col. 2. lin. 10.	dele fuerint.
Pag. 254. col. 1. lin. 26.	adnuemus lege adnuerimus.
Pag. 256. colum. 1. lin. 42.	ipsas oleo lege ipsas cum oleo.
Pag. 313. col. 2. lin. 2.	cubitus lege decubitus.
Pag. 315. col. 2. lin. 20.	vacuatus lege vacuatis.
Pag. 320. col. 1. lin. 5.	fit ut, lege fit qua leniter.
Pag. 321. col. 2. lin. 3.	etiam magnis lege etiam à magnis.
Pag. 361. col. 2. lin. 20.	deest tota hæc periodus :

## Protinus.

Vtriusq. cubiti secunda vena est sine dila- tione; reniscit enim, ut docet Aëtius, inde aliquo modo insit calor, ut sensibilibus cor- pus ipsum alleuetur: habendus tamen modus est in euacuando: in multo enim inuili, & Pag. 370. colum. 1. lin. 33.	vitiatu sanguine, parum quiddam gennini sanguinis inest. Mittendus est sanguis si morbi seras occasio, verno potissimum tem- pore; siquidem lues hac sub hoc tempus & nascitur & intenditur.
Pag. 386. col. 1. lin. 24.	scilicet lege scilicet.
Pag. 408. col. 1. lin. 29.	tum lege tam.
	minatur lege minantur.

Pag.



Pag. 419. col. 2. lin. 13.

eadem eadem lin. 31.

Pag. 442. colum. 2. lin. 23.

Pag. 489. post §.

ratio:

Sanguis enim quo nutritur lien, crassior, faculentiorque est, unde & magis nigricans redditur.

Pag. 511. col. 2. lin. 23.

exercere lege exerere.

quem quidam lege quod quidam.

glossos, lege grossos.

Signa vulnerati lienis deest hæc enar-

deest tota hæc periodus:

### Miserrimum.

Ut quod plurimos iugulet, nullos etenim verum nec iidem à cane rabioso morfi  
qui mortem evasissent, se vidisse meminisse erant, sed ab homine.

Paulus ex Ægina Medicus, præter duos:

Pag. 539. col. 2. lin. 2.

Pag. 543. col. 2. lin. vltima

Pag. 547. col. 2. lin. 8.

Pag. 693. col. 1. lin. 22.

Pag. 724. col. 2. lin. 31.

atque ad lege atque id ad.

psydriachiam, lege psydriachion.

ordiri lege oriri.

capite, lege capiti.


fundamento lege fundamenti.



14

1,6498







1.6.498




Solu calidi 26. diluti portiones 25. conclusis altus 20.


¶ In nam aspectu est: ardeamus in quoniam sunt qui benevidi vident.

1.6.498

































005663628

11